

ہو میو پیتی

# پریکٹس آف میڈیسن



ڈاکٹر دولت سنگھ ایم۔ ڈی

PDFBOOKSFREE.PK



Pakistan Virtual Library

[www.pdfbooksfree.pk](http://www.pdfbooksfree.pk)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## معزز قارئین توجہ فرمائیں!

پاکستان ورچوئل لائبریری پر موجود تمام کتابیں  
قارئین کے مطالعے اور دعوتی و اصلاحی مقاصد کے  
لئے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔

### تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر  
استعمال کرنے کی سخت ممانعت ہے، اور ان کتب کو  
تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی  
، قانونی و شرعی جرم ہے۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY  
www.pdfbooksfree.pk



# پرکپس آف میڈیسن



مصنفہ

ڈاکٹر دولت سنگھ ایم۔ ڈی

## دیباچہ اول

پریکٹس آف میڈیسن عرصہ دراز سے ہومیوپیٹھی کے حلقہ میں مقبول آرہی ہے۔ اس کتاب کی افادیت سے انکار نہیں۔ مگر پاکستان بھر کے تمام ہومیوپیٹھی اس کتاب سے محض اس لیے اس کتاب سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے کہ یہ ایک جنگی کتاب ہے۔ ہماری کافی دیر سے خواہش رہی ہے کہ اس کتاب کی کتابت و اشاعت کو مزید حسن بخش کر سستے داموں تمام ہومیوپیٹھی تک پہنچایا جائے۔

اور امید ہے اس حلقہ کے لوگ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔



# انڈکس مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	<b>باب اول</b>	
۲۵	ہومیوپیتھک ادویات کا طریقہ استعمال	۱
۲۶	دوائی کی طاقت	۲
۲۷	چند ضروری ہدایات	۳
۲۸	خداۓ مریم	۴
۳۰	ڈاکٹری و طبی اوزان و پیمانے اور ان کا باہمی مقابلہ	۵
	<b>باب دوم</b>	
۳۱	ہومیوپیتھک دوا سازی	۶
۳۲	دوائی لیوسٹرو بنانے کا طریقہ	۷
۳۲	ٹری ٹورشن یعنی سفوف (اؤڈر) بنانے کا طریقہ	۸
۳۵	گلوبولز - پانی لیولز اور ٹیلش میں دوائی جذب کرنے کی ترکیب	۹
۳۶	اچھی اور خراب دوائی کی پہچان	۱۰
۳۶	مشہور ہومیوپیتھک ادویات کی فہرست	۱۱
	<b>باب سوم</b>	
۳۸	(Ague MALARIAL) طیر یا بخار - نوبتی بخار - تب لزدہ	۱۲
۳۸	(FEVER Intermittent Fever) سادہ لازمی بخار	۱۳
	(SIMPLE Continued Fever)	
	طیر یا تب سادہ اول لازمی بخار وغیرہ	۱۴
۵۳	Reperitury of FEVER) کی رپیرٹری یعنی علاج علامات	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۹	(TYPHOID FEVER } تپ محرقہ - میعادہ بخار Enteric Fever)	۱۵
۷۶	(REPERTORY) تپ محرقہ کی ریسپرٹری یعنی علاج علامات	۱۶
۸۳	(DENGUE, BREAK } ہڈیوں کا بخار - ڈنگو Bone Fever)	۱۷
۸۶	(INFLUENZA) انفلوئنزا - وبائی بخار	۱۸
۹۰	(SCARLATINA) سرخ بخار	۱۹
۹۲	(YELLOW Fever) زرد بخار	۲۰
۹۵	(BLACK FEVER) کالا آزار - کالا بخار	۲۱
۹۸	(PUERPERAL Fever) پر سوت کا بخار	۲۲
۱۰۳	(MEASLES Morbilli) خسرہ - کھسرہ	۲۳
۱۱۶	(SMALL-POX Variola A) چیچک - مٹا - سیٹلا	۲۴
۱۱۹	(REPERTORY) چیچک کی ریسپرٹری (علاج علامات)	۲۵
۱۲۰	(VACCINATION) چیچک کا ٹیکہ	۲۶
۱۲۲	(CHICKEN POX Varicella) لاکڑا لاکڑا - بوتیا - سیٹلا	۲۷
۱۲۳	Pneumonia نمونیا - پھیپھڑے کا درد - پھیپھڑے کا پردہ ذات الریه	۲۸
۱۳۶	(Broncho Pneumonia) براکھو نمونیا - کھانسی کا نمونیا	۲۹
۱۴۱	(PLEURISY) پلورسی - ذات الجنب	۳۰
۱۴۵	(DIPHTHERIA) خناق وبائی	۳۱
۱۵۲	(MUMPS Parotitis) گلہوے - کن پیرے	۳۲
۱۵۶	Tuberculosis Consumption رسل - تپدق - ٹیوبرکیولوسس	۳۳
۱۷۸	(SCROFULA, Struma) اجمیری - کنٹھ مالا - خنازیر - سکرافیولا	۳۴
۱۸۱	(CONSUMPTION of the } پیٹ کی رسل Bowels) (Tabesmesenterica) رسل بطنی - ماسارقی	۳۵
۱۸۳	(TUBERCULAR Meningitis) } دماغ پردہ - اے دماغ سلی (Hydrocephalus) دماغ میں پانی بھر جانا	۳۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۸۷	(PLAGUE) پلگ - طاعون	۳۷
۲۰۸	(Plague Reperctory) پلگ کی ریسپری یعنی علاج العلایات	۳۸
۲۲۲	(WHOOPING Cough) کالی کھانسی - کوکر کھانسی - ہوپنگ کف	۳۹
۲۲۸	(DYSENTERY) پیچش - مروڑ	۴۰
۲۳۵	Erysipelar Stonthony's Fir سرخ باد - حمرو	۴۱
۲۴۰	(CHOLERA) مہینہ - کالا	۴۲
۲۸۱	(HYDROPHOBIA RABIES) بکاؤ	۴۳
۲۸۷	(MALIGNANT Pustula Anthrax) انگارہ - خبیث پختسی	۴۴
۲۸۸	(LEPROSY) کورسہ - جذام	۴۵
۲۹۱	(TETANUS—Cockjaw) کزاز - پاندنی	۴۶
۲۹۵	(NEONATORUM Tetanus) بچوں کی کزاز	۴۷
۳۹۶	(GONORRHOEA) سوزاک	۴۸
۳۰۹	(GLEET) قرصہ - مزمن سوزاک	۴۹
۳۱۳	(IRRITATION of the Bladder) جلن و خراش شانہ	۵۰
۳۱۶	(ERYSIPELAS of the Penis) حمروہ قضیب	۵۱
۳۱۶	(CHORDEE) نفوذ سوزاک کی کارڈی	۵۲
۳۱۷	(STRICTURE) سٹرکچر	۵۳
۳۱۹	(GONORRHOEAL Rheumatism) سوزاک کی گتھیا - وجع المفاصل سوزاک	۵۴
۳۲۱	(GONORRHOEA in Women) عورتوں میں سوزاک	۵۵
۳۲۲	Syphilis Chancre) آتشک یا بادفرنگ ریجلی گری	۵۶
۳۳۲	(BUBO) غدود جنگاسہ یا بدی	۵۷
۳۳۵	(SYPHILITIC Diseases of the Eye) آتشکی امراض چشم	۵۸
۳۳۷	(HEREDITARY Syphilis) بچوں میں آتشک	۵۹
۳۳۹	(AFFECTIONS OF THE OSSEOUS SYSTEM) استخوان کی آتشکی بیماریاں	۶۰



نمبر شمار	مضمون	نمبر
۶۱	(GUMATA) گمات	۳۵۱
۶۲	خصیہ کی آتشکی سوجھ (SYPHILITIC Sarcocoele)	۳۵۱
۶۳	واغ اور حرام مغز کے (SYPHILITIC Diseases of the Brain and Spinal Cord) آتشکی امراض	۳۵۲
۶۴	آتشکی نقاہت (SYPHILITIC Cachexia)	۳۵۳
۶۵	شدید وجع المفاصل (Acute Rheumatism) گنٹھے کا بخار	۳۵۵
۶۶	پران گنٹھیا مومن وجع المفاصل (CHRONIC Rheumatism)	۳۵۸
۶۷	شدید نقرس (ACUTE Gout)	۳۶۵
۶۸	پران نقرس (CHRONIC Gout)	۳۶۸
۶۹	ذیابیطس شکاری (DIABETES Mellitus)	۳۷۳
	بول شکاری (Glycosuria)	۳۷۳
۷۰	ذیابیطس سادہ - کثرت البول (Diabetes Insipidus, Polyuria)	۳۷۹
۷۱	استسقا - جلد صر (DROPSY)	۳۷۹
۷۲	موٹاپا - فرہین (OBESITY, Corpulency)	۳۸۶
۷۳	بھس - کئی خون (ANAEMIA Chlorosis)	۳۸۸
۷۴	بچوں کا پیرھا ہونا (RICKETS Rachitis)	۳۹۲
۷۵	سکڑی - گوشت خرد (SCURVY, Scorbutus)	۳۹۷
۷۶	بالو گولہ - ہسٹیریا - اعتقاد بالرم (HYSTERIA)	۳۹۹
باب چہارم مروں کے خاص امراض		
۷۷	فیوق قلعہ - اندو - قنٹی موسس (PHIMOSIS)	۴۰۸
۷۸	پیرا قنٹی موسس (PARAPHIMOSIS)	۴۰۹
۷۹	پاسی کی سوجھ - ورم شمر (EALANITIS Gonorrhoea)	۴۱۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۱۲	(HERPES of the Gland) سپاری کی پھنسیاں - ثبور شفق	۸۰
۴۱۲	(OEDEMA of the SCROTUM) فوطوں کی سوجن	۸۱
۴۱۳	(VARICOCELE) فوطوں کی وریدوں کا پھول جانا	۸۲
۴۱۴	(HYDROCELE) فوطوں میں پانی بھر جانا	۸۳
۴۱۵	(Prurigo Scroti) فوطوں کی کھجلی	۸۴
۴۱۶	(NEURALGIA of the Testicles) خسیوں کا درد	۸۵
۴۱۶	(ORCHITIS) خسیوں کی سوجن - ورم خصیہ	۸۶
۴۲۰	PROSTATITIS INFLAMMATION OF THE PROSTATE GLAND) ورم غدۃ قدامیہ - مزی کے غدود کی شدید سوجن	۸۷
۴۲۳	(PROSTATORRHOEA) جریان مزی - سیلان مزی	۸۸
۴۲۵	(SPERMATORRHOEA, SEMINAL) جریان منی - سیلان منی	۸۹
	(EMISSION Nocturnal Emission) سپریمیٹوریا - اختلام	
۴۳۱	(PREMATURE Ejaculation) سرعت انزال	۹۰
۴۳۳	(ONANISM or Masturbation and Nervous Debility from Self Abuse) مشت زنی - جلق اور اس کے بدنتا بچ	۹۱
۴۳۸	(IMPOTENCE Sexual.-Debility) نامردی - ضعف باہ - کمزوری با	۹۲
<b>باب پنجم</b>		
<b>عورتوں کے خاص امراض</b>		
۴۴۳	(PRURITIS Vulva) شرمگاہ کی خارش	۹۳
۴۴۵	(VAGINITIS Vulvitis) شرمگاہ کی سوجن - ورم الفرج	۹۴
۴۴۹	(VAGINISMUS) اندام نہانی کی سوجن	۹۵
۴۴۷	(AMENORRHOEA) اندام نہانی کی انہیض	۹۶
	بیضی کا بند ہونا	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۵۰	(DYSMENORRHOEA	۹۷
۴۵۷	(MENORRHAGIA Metrorrhagia)	۹۸
۴۶۰	(LEUCORRHOEA Whites)	۹۹
۴۶۵	(LEUCORRHOEA in the little girls)	۱۰۰
۴۶	(METRITIS Snelommetris)	۱۰۱
۴۶	(SUBINVOLUTION of the Uterus)	۱۰۲
۴۶۲	DISPLACEMENT	۱۰۳
۴۶۲	(PROLAPSUS UTERI)	۱۰۴
۴۶۴	(STERILITY)	۱۰۵
فصل دوم ایام عمل کے امراض		
۴۶۶	(MELANCHOLY-FEVER ETC)	۱۰۶
۴۶۶	(FAINITING AND HYSERICAL FITS)	۱۰۷
۴۶۶	(HEADACHE DIZZINESS)	۱۰۸
۴۶۶	(TOOTH ACHE)	۱۰۹
۴۶۶	(PALPITATION of the Heart)	۱۱۰



صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۷۷	(VARICOSE VE NS)	۱۱۱
۴۷۷	(SWELLING of the Lower Extremities)	۱۱۲
۴۷۷	(PAINS in the Back and Loins)	۱۱۳
۴۷۷	(SLEEPLESSNESS)	۱۱۴
۴۷۷	(CRAMPS of the Legs)	۱۱۵
۴۷۷	(SALIVATION)	۱۱۶
۴۷۸	(MORNING SICKNESS)	۱۱۷
۴۷۸	(COLIC)	۱۱۸
۴۷۸	(CONSTIPATION)	۱۱۹
۴۷۸	(DIARRHOEA)	۱۲۰
۴۷۸	(FLATULENCE)	۱۲۱
۴۷۹	(FALSE LABOR PAINS)	۱۲۲
۴۷۹	(COUGH of PREGNANCY)	۱۲۳
۴۷۹	(PILES)	۱۲۴
۴۷۹	(INCONTINENCE of URINE)	۱۲۵
۴۷۹	(RETENTION of URINE)	۱۲۶
۴۸۰	(PAINS in the BREASTS)	۱۲۷
۴۸۰	(ITCHING OF THE GENITAL-PARTS)	۱۲۸
۴۸۰	LEUCORRHOEA	۱۲۹
۴۸۱		۱۳۰
۴۸۱		۱۳۱

حاملہ کی وریدوں کا پھول جانا

حاملہ کی ٹانگوں کا پھول جانا

حاملہ کی کمر درد

حاملہ کو نیند نہ آنا

حاملہ کو کڑول پڑ جانا

حاملہ کو تھوک بھرت آنا

حاملہ کی تھ اور متلی

حاملہ کا درد قولنج

حاملہ کی قبض

حاملہ کو دست آنا

حاملہ کو لہج شکم کی شکایت کا ہونا

حاملہ کو جھوٹی صدوں کا ہونا

حاملہ کی کھانسی

حاملہ کی بواسیر

حاملہ کو بد بدمشیاپ آنا

حاملہ کا پیشاب بند ہو جانا

حاملہ کے پستان میں درد ہونا

حاملہ کی شرمگاہ میں خارش

حاملہ کو سفید طوبت آنا

حاملہ کے رحم میں درد و تکلیف ہونا

حاملہ کے رحم کے اندر خنک کی حرکت دھوناک

معلوم ہو۔

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۲۸۱	حاملہ کا دل کو ملہ وغیرہ کھانے کو کرتا	۱۳۲
۲۸۱	ABORTION MISCARRIAGE حمل کا گر جانا۔ استغاثہ عمل	۱۳۳
	<b>باب ششم</b>	
	<b>زچہ کے امراض</b>	
۲۸۶	POSTPARTUM Haemorrhage Flooding	۱۳۴
	کثرت نفاس۔ ولادت کے بعد خون جاری ہو جانا	
۲۸۹	SUPPRESSION OF LUCHIA	۱۳۵
	نفاس کا بند ہو جانا	
۲۸۹	AFTER PAINS	۱۳۶
	ولادت کے بعد کی دردیں	
۲۹۰	MILK FEVER	۱۳۷
	دودھ کا بخار	
۲۹۲	PUERPERAL FEVER	۱۳۸
	پرست کا بخار (دیکھو صفحہ)	
۲۹۲	INSUFFICIENT SUPPLY OF MILK	۱۳۹
	دودھ کی کمی	
۲۹۲	EXCESSIVE SECRETION OF MILK	۱۴۰
	دودھ کی زیادتی	
۲۹۳	INVOLUNTARY ESCAPE OF MILK	۱۴۱
	چھلکتی ہوئی دودھ کا بے اختیار نکلنے رہنا	
۲۹۴	DETERIORATED MILK	۱۴۲
	زچہ کا دودھ خراب ہونا	
۲۹۵	(PUERPERAL Convulsions)	۱۴۳
	زچہ کا تشنج	
۲۹۶	PUERPERAL MANIA	۱۴۴
	جنون زچہ۔ زچہ کی دیوانگی	
۲۹۸	LEG PHLEGMASIA DOLENS	۱۴۵
	زچہ کی ٹانگ کا سفید دم	
	<b>باب ہفتم</b>	
	<b>امراض سر و دماغ</b>	
۲۹۸	HEAD ACHE	۱۴۶
	سر درد	
۵۰۰	MIGRAINE HEMICRANIA	۱۴۷
	دردِ شقیقہ	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۰۷	VERTIGO GIDDINESS سرچکچہ - دوران سر - سر گھومنا	۱۴۸
۵۱۰	CONCUSSION OF BRAIN دماغ کا ہل جانا	۱۴۹
۵۱۲	CEREBRAL HYPERAEMIA دماغ خون کی زیادتی	۱۵۰
۵۱۳	CEREBRAL ANAEMIA ضعف دماغ - کمی خون دماغ	۱۵۱
۵۱۵	CHRONIC HYDROCEPHALUS { سر میں پانی بھر جانا استقرار الدماغ مزمن	۱۵۲
۵۱۹	APOPLEXY سکته	۱۵۳
۵۲۱	SCLEROSIS OF THE BRAIN دماغ کا نرم پڑ جانا	۱۵۴
۵۲۲	MENINGITIS INFLAMMATION OF THE BRAIN { دماغی پردوں کا دم لوگنا - سکته شمسی	۱۵۵
۵۲۵	SUNSTROKE HEAT STROKE گرمی سے بے ہوش ہو جانا	۱۵۶
۵۲۶	EPILEPSY مرگی - صرع	۱۵۷
۵۳۳	CHOREA رشتہ - کوریا - مرزہ کا پھٹنا	۱۵۸
۵۳۶	SLEEPLESSNESS INSOMNIA بے خوابی، نیند نہ آنا	۱۵۹
۵۳۹	INSANITY MELANCHOLIA دیوانگی، جنون، پاگل پن	۱۶۰
۵۴۲	DELIRIUM ہڈیاں، ہلکا، ہلکا	۱۶۱
۵۴۵	HEMIPLEGIA PARALYSIS; PARAPLEGIA فالج، شل ہو جانا ادھرنک	۱۶۲
۵۴۹	INFANTILE PARALYSIS بچوں کا فالج	۱۶۳
۵۵۲	NEURALGIA درد عصبی، نیورلجیا	۱۶۴
۵۵۹	INFANTILE CONVULSIONS تشنج اطفال، ام اصبیان - مجرگا	۱۶۵
۵۶۱	LUMBAGO BACK ACHE درد کمر	۱۶۶
۵۶۴	SCHIATICAT لنگڑی کا درد، رینگنی، عرق اشار	۱۶۷



صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	<b>باب ہشتم</b>	
	<b>امراض چشم یعنی آنکھ کی بیماریاں</b>	
۵۶۹	FOREIGN BODY IN THE EYE	آنکھ میں کچھ پڑ جانا ۱۶۸
۵۷۱	CONJUNCTIVITIS OPHTHALMIA	آنکھ دکھنا۔ آشوب چشم ۱۶۹
۵۷۲	PURULENT CONJUNCTIVITIS	پیپ دار آنکھ دکھنا ۱۷۰
۵۷۳	OPHTHALMIA NEONATORUM	پیدائشی آنکھ دکھنا ۱۷۱
۵۷۳	BONORRHOEAL CONJUNCTIVITIS	سوزاکی آنکھ دکھنا ۱۷۲
۵۷۸	MYOPIA	قریب نظری ۱۷۳
۵۷۸	CATARACT	موتیا بند، نزول المار ۱۷۴
۵۷۹	GLAUCOMA	سبز موتیا بند ۱۷۵
۵۸۲	AMBLYOPIA	دُھند، غبار ۱۷۶
۵۸۲	AMAUROSIS	اندھا پن۔ نظر کا یکایک جلتے رہنا ۱۷۷
۵۸۵	NYCTALOPH	رتوندا۔ اندھرا آ۔ شبکوری ۱۷۸
	HEMERALOMA	۱۷۹
۵۸۵	STRABISMUS SQUINT	بھینٹا پن ۱۸۰
۵۸۶	MUSCEVOLITANTES OF THE EYE	آنکھ کے ترمے ۱۸۱
۵۸۶	BLEPHARITIS	بامہنی، سلاق ۱۸۲
	INFLAMMATION OF THE EYE LIDS	
۵۸۸	HORDEOLUM	انجن داری، گھیری، گواجنی ۱۸۳
	SIYE ON THE EYE LID	
۵۹۰	GRANULAR LIDS	لگرے، روہے ۱۸۴
۵۹۱	PTERYGIUM	ناخنہ ۱۸۵
۵۹۱	OPACITY OF THE CORNEA	جالا۔ پٹلی ۱۸۶

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۵۹۳	ECCHYMOSIS	۱۸۷
	آنکھ میں خونی نقطہ	
	باب نہم	
	کان کی بیماریاں	
	AFFECTIONS OF THE EARS	
۵۹۴	FOREIGN BODY IN THE EAR	۱۸۸
	کان میں کچھ پڑ جانا	
۵۹۴	EAR ACHE OTALGIA	۱۸۹
	کان درد	
۵۹۶	OTORRHOEA	۱۹۰
	کان بہنا	
۵۹۸	OTITIS MEDIA	۱۹۱
	کان کا ورم	
۵۹۹	WAX IN THE EAR	۱۹۲
	کان کا میل	
۶۰۰	ECZEMA OF THE EARS	۱۹۳
	کان کی جلندار پھنیاں	
۶۰۰	TINNITUS	۱۹۴
	کان بجنا	
۶۰۱	DEAFNESS	۱۹۵
	کابروپی	
	باب دہم	
	ناک کی بیماریاں	
	AFFECTIONS OF THE NOSE	
۶۰۳	FOREIGN BODY IN THE NOSE	۱۹۶
	ناک میں کچھ پھنس جانا	
۶۰۴	CORYZA—COLD IN THE	۱۹۶
	زکام اور نزلہ	
	HEAD CATARRH RHINITIS	
۶۰۸	EMSTAXIS	۱۹۸
	نکسیر پھوٹنا	
۶۱۱	OEDEMA	۱۹۹
	ناک سے بدبو آنا۔ پھپھ	
۶۱۲	VERMISNASI	۲۰۰
	ناک کے کیڑے	
۶۱۴	POLYPUSNASI	۲۰۱
	ناک کی بواسیر	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶۱۲	SENSE OF SMELL LOST	۲۰۲ قوتِ شامہ کا ناکل ہو جانا
<p>باب یازدہم</p> <p>امراض آلات تنفس</p> <p>AFFECTIONS OF THE RESPIRATORY ORGANS</p>		
		۲۰۳ حنجرو یعنی نرخرہ کی سوجن اور نوا کی نالی کی سوجن
۶۱۵	LARYNGITIS AND TRACHITIS	۲۰۴ تشنج حنجرو، نرخرہ کی اینٹھن، جھوٹا خناق
۶۱۹	LARYNCISMUS STRIDULUS	
۶۲۲	HAEMOPTYSIS	۲۰۵ خون تھوکانا، نفث الدم
۶۲۶	ASTHMA	۲۰۶ دہرہ ضیقِ نفس
۶۲۲	ACUTE BRONCHITIS	۲۰۷ شدید کھانسی - براؤنکائٹس
۶۲۲	CHRONIC BRONCHITIS	۲۰۸ مزمن کھانسی
		۲۰۹ دردِ سینہ، فاسد پورسی، ذاتِ الجنب غیر خالص
۶۴۰	PLEURODYNIA	
۶۴۲	COUGH	۲۱۰ کھانسی
<p>باب دوازدہم</p> <p>امراض قلب یعنی دل کے امراض</p> <p>AFFECTIONS OF THE HEART</p>		
۶۴۶	PERICARDITIS	۲۱۱ دل کے غلاف کی سوجن، ورمِ حجابِ القلب
۶۴۲	ENDOCARDITIS	۲۱۲ دل کی اندرونی جھلی کی سوجن
۶۴۲	MYOCARDITIS	۲۱۳ دل کی سوجن - ورمِ قلب



صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶۵۳	ANGINA PECTORIS	۲۱۳
۶۵۷	PALPITATION	۲۱۵
۶۶۰	CARDIAC INTERMISSION	۲۱۶
۶۶۱	SYNCOPE FAINTING	۲۱۷
<p>باب سیزدہم</p> <p>منہ، زبان اور حلق کے امراض</p> <p>AFFECTIONS OF THE MOUTH TONGUE AND THROAT</p>		
۶۶۳	HERPES LABIALIS	۲۱۸
۶۶۴	STOMATITIS INFLAMMATION OF THE MOUTH	۲۱۹
۶۶۵	APHTHAE - THRUSH	۲۲۰
۶۶۸	CANCERUM GANGRENOUS STOMATITIS	۲۲۱
۶۶۱	PTYALISM SALIVATION	۲۲۲
۶۶۳	TOOTHACHE ODONTALGIA	۲۲۳
۶۶۷	REPERTORY	۲۲۴
۶۸۰	GUM BOILS	۲۲۵
۶۸۲	GLOSSITIS.	۲۲۶
۶۸۳	CRACK FISSURE OF THE TONGUE	۲۲۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶	PARALYSIS OF THE TONGUE	۲۲۸
	زبان کا فالج	
	گواگرنہ - کوا پھولٹ	۲۲۹
۶۸۸	ELONGATION OF THE UVULA	
	UVULA SWOLLEN	
۶۸۹	PHARYNGITIS SORE THROAT	۲۳۰
	حلق کی سوجن، درد گلو، لیکچاروں کا درد گلو	
۶۹۵	PHARYNGITIS SORE THROAT	۲۳۱
	گلے پڑنے، حلق کی گلیٹیوں کا متورم ہو جانا۔	
<b>باب چہار دہم</b>		
معدہ اور انٹسٹینوں کی بیماریاں، امراض معدہ و امعاء		
۶۹۹	GASTRITIS	۲۳۲
	معدہ کی سوجن، ورم معدہ	
۷۰۳	ULCER OF THE STOMACH	۲۳۳
	زخم معدہ	
	GASTRIC ULCER	
۷۰۵	CANCER OF THE STOMACH	۲۳۴
	سرطان معدہ	
	GASTRIC ULCER	
۷۰۶	HAEMATEMESIS	۲۳۵
	خونی قے، قے الدم	
۷۰۸	RETCHING VOMITING	۲۳۶
	متلی اور قے	
	حاملہ کی متلی اور قے	۲۳۷
۷	VOMITING OF THE PREGNANCY	
۷۱۶	HEART BURN GASTRIC CRAMP	۲۳۸
	پیٹ کا درد، درد معدہ، پیٹ کی موڑ، پیٹ کا شدید درد	
	کلیجہ جلنا	
	GASTRODYNIA CARDIALGIA GASTRALGIA	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۷۱۹	ANOREXIA-APPETITE LOST APPETITE DEPRATED	۲۳۹ بھوک کا مرجانا - بھوک کا کم ہو جانا
۷۲۰	BULIMIA-BULIN'S APPETITE EXCESSIVE	۲۴۰ بھوک بہت لگنا - بھوک کا ہو کا
۷۲۱	DYSPEPSIA	۲۴۱ بد ہضمی
۷۲۵	ENTERITIS	۲۴۲ انٹریوں کی سوجن
۷۲۶	DIARRHOEA	۲۴۳ اسہال - دست
۷۲۲	FLATULENCE	۲۴۴ نفخ شکم، اچھارہ - پیٹ اچھڑنا
۷۲۶	COLIC	۲۴۵ درد قولنج، قولنج
۷۲۰	LEADCOLIC	۲۴۶ سیر سے قولنج
۷۲۱	HICCUP HICCOUGH	۲۴۷ اچھکی لینا
۷۲۲	CONSTIPATION	۲۴۸ قبض
۷۲۸	TYPHILITIS APPENDICITIS	۲۴۹ اندھی آنت کی سوجن
۷۵۰	INTESTINAL WORMS	۲۵۰ پیٹ کے کیڑے
۷۵۲	ILEUS INTUSSUSCEPTION	۲۵۱ انٹریوں میں بل پڑ جانا
۷۵۲	PERITONITIS	۲۵۲ درم صفاق - پیٹ کی عابداری کی سوجن
۷۵۹	FISSURE OF THE RECTUM OR ANUS	۲۵۳ مقعد کا پھٹنا، شقاق المقعد
۷۵۹	PRURITUS ANI ITCHING OF THE ANUS	۲۵۴ مقعد کی غارش
۷۵۵	PROLAPSUS ANI	۲۵۵ کانچ نکلنا - خروج المقعد، ڈھونڈری نکلنا
۷۶۰	FALLING OF THE BOWEL	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۷۴۲	FISTULA IN ANUS	۲۵۶
۷۴۳	PILES HAEMORRHOIDS	۲۵۷
۷۴۴	HERNIA—RUPTURE	۲۵۸
<p style="text-align: center;">باب پانزدہم</p> <p style="text-align: center;">امراض جگر و طحال (تلی)</p>		
	جگر کا بڑھ جانا، جگر میں خون جمع ہو جانا - ورم جگر	۲۵۹
۷۴۹	HEPATITIS, CONGESTION OF THE LIVER SIMPLE ENLARGEMENT OF THE LIVER	
۷۵۰	'JAUNDICE ICTERUS'	۲۶۰
	یرقان	
	درد جگر، صفراوی، قوتیج، صفراوی پتھریاں	۲۶۱
۷۵۵	BILIARY CALCULI HEPATIC COLIC BILIAR COLIC	
۷۵۶	جگر کا سکڑ جانا، جگر کا چھوٹا ہو جانا	۲۶۲
	CIRRHOSIS OF THE LIVER	
	تلی کا بڑھ جانا - عظم الطحال	۲۶۳
۷۵۸	ENLARGEMENT OF THE SPLEEN	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	<b>باب شانزدہم</b> <b>امراض گردہ و مثانہ</b>	
۷۶۳	گردہ کی سوजन، برائیتس ڈیزر	۲۶۳
۷۶۹	NEPHRITIS BIGHT'S DISEASES	
۷۸۳	ورد گردہ و پتھری . سنگ مثانہ اور پیشاب میں نگر آنا	۲۶۵
	RENAL COLIC CALCULUS OR STONE IN	
۷۸۸	پیشاب میں ریگ آنا	۲۶۶
	URINARY SAND RENAL SAND UNIRARY DEPOSITS	
۷۸۹	پیشاب میں ایومن آنا - بول زلالی	۲۶۷
۷۹۱	ALBUMINURA جس بول، پیشاب کا رک جانا - پیشاب کا مشکل سے آنا	۲۶۸
	DYSURIA RETENTION OF THE URINE	
۷۹۲	سلس بول، بے ارادہ پیشاب کا نکل جانا	۲۶۹
	INCONTINENCE OF URINE OF ENURESIS	
۷۹۶	بول الدم - خونی پیشاب آنا	۲۷۰
۷۹۹	HAEMATURIA سمیت بول - پیشاب کا زہر چڑھنا	۲۷۱
۸۰۰	UREMIA خواش و جلن مثانہ - تشنج مثانہ - پیشاب کا تکلیف سے آنا	۲۷۲
	IRRITABILITY OF THE BLADDER AND SPASM OF BLADDER STRANGUARY	
	CYSTITIS INFAMATION مثانہ کی سوজন، ورم مثانہ	۲۷۳
	OF THE BLADDER	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	<b>باب ہفتم</b>	
	<b>جلد بال اور تانخن کے امراض</b>	
۸۰۴	ERYTHEMA	جلد کا سرخ ہو جانا ۲۶۴
۸۰۴	URTICARIA NETTLE RASH	پتی اچھلنا، پتی، چھپاکی ۲۶۵
۸۰۶	ACNE PIMPLES	مہلے، کیل ۲۶۶
۸۰۶	PRURIGO	خارش سوکھی، کھجلی ۲۶۷
۸۱۰	ECZEMA	چھاجن، تار فارسی، ایکزیما ۲۶۸
۸۱۱	PSORIASIS	چنبل، اپرس، سوداس ۲۶۹
۸۱۲	PEMPHIGUS RUPLA	آبلے، پھالے ۲۷۰
۸۱۳		چھائیاں، سیاہ داغ ۲۷۱
	FRECKLES LENTIGO CHLOASMA	
۸۱۴	LEUCODERMA	برص، سفید داغ، پھلہری ۲۷۲
۸۱۴	CORNS CLAVUS	اٹن - گٹھ - چنڈی ۲۷۳
۸۱۵	WARTS	مستے - وارٹس ۲۷۴
۸۱۶	CHAPPED HANDS CHILBLAINS	بوائی پھٹنا ۲۷۵
۸۱۶	BROMIDROSIS	بدبودار پسینہ آنا ۲۷۶
۸۱۷	SEBORRHOEA	بھوسی - بفا ۲۷۷
۸۱۸	BALDNESS ALOPECIA	بال جھڑنا - بال گرنا - بالچھڑ ۲۷۸
۸۱۸	ONYCHIA	بسہری - بلنڈا ۲۷۹
۸۱۹	ITCH-SCABIES	پھوت دار خارش، چھوٹا رکھجلی ۲۸۰

صفحہ	معنون	نمبر شمار
۸۲۰	RINGWORM	۲۹۱ واد، قوبا، وحدی
۸۲۱	FAVUS	۲۹۲ گنج
۸۲۲	PEDICULOSIS	۲۹۳ جوئیں پڑنا
۸۲۳	NAEVUS MOLES MOTHER'S MARK	۲۹۴ تلی - چاند گرہن کے نشانات
<p style="text-align: center;">باب ہر دھم فصل اول امراض متعلقہ تہاجی</p>		
۸۲۴	INFLAMMATION	۲۹۵ سوجن، ورم، سوزش
۸۲۵	BOIL	۲۹۶ بال توڑ پھنسی
۸۲۶	CARBUNCLE	۲۹۷ ہزار چشم، کاربنکل، شب چراغ
۸۲۸	ULCER	۲۹۸ زخم، گھاؤ
۸۲۹	WHITTLOW	۲۹۹ بسہری، لمٹوہ
۸۲۹	ABSCESS	۳۰۰ پھوٹا
۸۳۱	GOITER BRONCHOCELE	۳۰۱ گیگہ، گہلڑ
۸۳۲	SCALD BURN	۳۰۲ آگ سے جلنا، گرم پانی وغیرہ سے جلنا
۸۳۳	CHILBLAINS FROST BITE	۳۰۳ پالا مارنا، سردی لگنا
۸۳۵	DROWNING	۳۰۴ ڈوبنا



نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	<b>فصل دوم</b>	
	<b>زہریلے جانوروں اور کیڑوں کا ڈسنا</b>	
	<b>STING OF POISONOUS INSECTS</b>	
۳۰۵	سانپ کا ڈسنا	۸۳۶ SNAKE BITE
۳۰۶	بچھو کا ڈنگ مارنا	۸۳۸ BICHHU-BITE
۳۰۷	بھڑیا شہد کی مکھی کا ڈنگ مارنا	۸۳۸ BEE BITE
۳۰۸	دیوانے کتے کا کاٹنا	۸۳۹ MAD DOG BITE
۳۰۹	پتو یا مچھر یا مکمل وغیرہ کا کاٹنا	۸۳۹ MOSQUITOE BITE
	<b>باب نہدھم</b>	
۸۴۰	زہریں اور اُن کا علاج - سمیات و اُن کے تریاق	
۳۱۰	سفید سنگیا، سم افار، آرسینک	۸۴۲ ARSENIC
۳۱۱	پارہ کا زہر	۸۴۴ MERCURY
۳۱۲	سیسہ کا زہر	۸۴۵ LEAD
۳۱۳	تانبا کا زہر	۸۴۵ COPPER
۳۱۴	سنگِ سرمہ کا زہر	۸۴۶ ANTIMONY
۳۱۵	آیوڈین کا زہر	۸۴۶ IODINE
۳۱۶	کاشک سوڈا، کاشک پوٹاش، ایمونیا، نوشادر	
	<b>CAUSTIC SODA CAUSTIC POTASH AMMONIA</b>	۸۴۷
۳۱۷	شورہ کا زہر	۸۴۸ POTASSIUM NITRATE
۳۱۸	فاسفورس کا زہر	۸۴۸ PHOSPHORUS

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۸۴۹	GLASS	۳۱۹ کانچ کا سفوف
۸۵۰	ACID	۳۲۰ تیزابی زہری
۸۵۱	CARBORIC ACID	۳۲۱ کاربوالک ایسڈ
<b>نباتاتی زہری</b>		
۸۵۲	ACCONITE	۳۲۲ میٹھا تیلیا کا زہر
۸۵۳	OPIUM	۳۲۳ افیون کا زہر
۸۵۴	STRAMONIUM	۳۲۴ دھتورہ کا زہر
۸۵۵	BELLADONNA	۳۲۵ بیلا ڈونا یعنی بیروچ کا زہر
۸۵۵	CROTON OIL	۳۲۶ جمال گوٹہ کا زہر
۸۵۶	MUSHRROOM	۳۲۷ کھمب کا زہر - کھمبی
۸۵۶	NUX VOMICA IGNATIA	۳۲۸ کچلا کا زہر - پیپٹا کا زہر
۸۵۷	TOBACCO	۳۲۹ تنباکو کا زہر
۸۵۸	HEMP	۳۳۰ بنگ اور گانجا کا زہر
۸۵۸	CONIUM	۳۳۱ کونیم یعنی شوکران کا زہر
۸۵۸	DIGITALIS	۳۳۲ ڈیجی ٹیلز کا زہر
۸۵۹	CAMPBOR	۳۳۳ کافور کا زہر
۸۵۹	TURPENAINP	۳۳۴ تارپین کا زہر
۸۶۰	ALCOHOL	۳۳۵ شراب کا زہر، الکحل
۸۶۰	COCAINE	۳۳۶ کوکین کا زہر
		۳۳۷ مٹی کے تیل کا زہر، پٹرمل کا زہر، پیرافین کا زہر
۸۶۱	KEROSINE OIL PETROL PEARAFINE	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۸۶۲	MEAT & FISH	۳۳۸
۸۶۲	CHLOROFORM	۳۳۹
	گوشت کا زہر، مچھلی کا زہر	
	کلوروفارم کا زہر	
	باب ہفتم	
	ننھے بچوں کے امراض	
	DISEASES OF INFANTS AND CHILDREN	
۸۶۳	INFANTILE CONSTIPATION	۳۴۰
۸۶۴	INFANTILE COLIC,	۳۴۱
۸۶۶	INFANTILE DIARRHOEA	۳۴۲
۸۶۸	INFANTILE DYSENTERY	۳۴۳
۸۶۹	INFANTILE CHOLERA	۳۴۴
۸۶۹	INFANTILE FEVERISHNESS	۳۴۵
۸۷۱	TEETHING	۳۴۶
۸۷۳	MAKASMUS	۳۴۷
۸۷۵	CONVULSIONS	۳۴۸
۸۷۷	INFANTILE	۳۴۹
	ROLAPSUS ANI	
۸۷۷	BRONCHO PNEUMONIA	۳۵۰
۸۷۸	CROUP	۳۵۱
	برانکو، نمونیہ	
	ڈبہ، پسلی چلنا	

# پریکٹس آف میڈیسن

## حصہ اول

### باب اول

## ہومیو پیتھک ادویات کا طریقہ استعمال

۱- دوائی بشکل ٹنکچر (عرق) } جوان کو تین قطرے - بچوں کو دو اور شیر خوار  
بچوں کو ایک یا نصف قطرہ پانی میں ملا کر دیتے  
ہیں۔ پانی کی مقدار فی خوراک اتنی سمجھنی چاہیے جتنا کہ مریض کا گھونٹ ہوا کرتا ہے۔ یا بالفاظ  
دیگر شیر خوار بچہ کے لیے آدھا چھوٹا چمچ جس کو چائے کا چمچ کہتے ہیں۔ بچہ کے لیے چمچ، نوجوان  
کے لیے ڈیڑھ چمچ اور پورے جوان کے لیے دو چمچ فی خوراک ہے۔ اسی تناسب سے دوائی  
کی خوراکیں بنالیں اور خوراکیں کے نشان نشیسی پر لگائیں۔ جتنے جتنے وقفہ کے بعد دوائی دینی  
مطلوب ہو نشیسی کے اوپر درج کر دیں۔

۲- دوائی بشکل گولیاں } جوان کو خشتاشی گولیاں چھ عدد - ذرا بڑی گولیاں تین  
عدد - بچوں کو اس کا نصف اور شیر خوار بچوں کو  
ایک تہائی۔ گولیاں مریض کی زبان پر رکھی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ گھلتی رہتی ہیں جب  
گھل جائیں تو ایک آدھ گھونٹ پانی پی لیا جاتا ہے۔ بچہ کی زبان پر گولی کو پس کر رکھا جاتا  
ہے۔ یہ پانی میں گھول کر دی جاتی ہے۔

۳- دوائی بشکل سفوف } جوان کو دس گرین (۵ رتی) بچوں کو پانچ گرین (۲ ۱/۲ رتی)  
اور شیر خوار بچوں کو دو گرین یعنی ایک رتی  
سفوف کو مریض کی زبان پر رکھا جاتا ہے۔ اگر زبان خشک ہو تو پہلے اس کو پانی کے ساتھ

ترک کر لینا چاہیے پھر سفوف یا گویاں اس پر رکھنی چاہئیں۔ بچوں کی حالت میں سفوف کو پانی میں گھول کر بھی دیا جاتا ہے۔

## دوائی کی طاقت

معالج کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ مریض کو دوائی کس طاقت کی دی جائے اور کتنے کتنے وقفہ کے بعد دوائی کی خوراک دہرائی جائے۔ کتاب ہذا میں ہر ایک دوائی کے ساتھ اس کی طاقت بھی درج کی گئی ہے اور دہرانے کا وقفہ بھی دیا گیا ہے۔ اپنے بہت سالوں کے تجربہ و دیگر ڈاکٹروں کی تصانیف کی بنا پر یہ درج کیا گیا ہے۔ لیکن اس کو قاعدہ کلیہ نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ سب مریضوں کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی بیماری کا دورہ ایک طرح کا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے بعض حالتوں میں دوائی کی طاقت اور وقفہ کو کم و بیش کیا جاسکتا ہے۔

Q سے مراد مدرٹنکچر ۳x سے مراد ۳ طاقت ۶x سے مراد ۶ طاقت ۱۲x

سے مراد ۱۲ طاقت اور ۳۰ سے مراد دوائی کی ۳۰ طاقت ہے۔

بعض ادویات کے نیچے دوائی کی تین چار طاقتیں درج کی گئی ہیں۔ مثلاً ۳x Q

۶x - ۳۰ اس سے یہ مراد ہے کہ خواہ دوائی مدرٹنکچر میں استعمال کی جائے۔ خواہ

۳x میں خواہ ۶x میں اور خواہ ۳۰ طاقت میں طاقت کا فیصلہ کرنا معالج کی ہوشیاری

اور تجربہ کاری پر منحصر ہے۔ مریض کی حالت اور مرض کی سختی اور نرمی کو دیکھ کر اس

کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون سی طاقت میں دوائی کو استعمال کرنا مفید ترین ہو سکتا ہے۔

## مقدار خوراک دوائی

ماسوائے چند حالتوں کے جن میں دوائی کی مقدار کم و بیش دینی پڑتی ہے۔ دوائی

کے ساتھ ساتھ مقدار خوراک کا ذکر کیا گیا ہے۔ باقی حالتوں میں مقدار خوراک کا قاعدہ

وہی سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ صفحہ ۲۵ پر درج ہے۔

## چند ضروری ہدایات

چونکہ ہومیو پیتھک ادویات از حد نازک ہوا کرتی ہیں۔ اس لیے ان کو تیز روشنی گرمی اور دھوپ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نہ ہی کوئی خوشبودار چیز ادویات کے قریب رکھنا چاہیے اور ایسی دوائی کی شیشی جدا کسی محفوظ طریقہ سے رکھنی چاہیے۔

ہومیو پیتھک ادویات کے استعمال کرنے والے مریض خوشبودار چیزوں سے پرہیز رکھیں۔ نیز ایسی خوراک نہ کھائیں جس میں گرم مصالحہ تیز ہوا تیز ہو اور نہ ہی کوئی ایسی چیز کھائیں۔ جس میں دوائی والی تاثیر موجود ہو۔ ہومیو پیتھک ادویات کسی معتبر ڈسپنسری سے حاصل کرنی چاہئیں محض سستا پن کو دھیان میں نہیں رکھنا چاہیے کامیاب ہومیو فارمیسی لاہور سے با اعتماد ادویات ہر وقت مل سکتی ہیں۔

## نبض

عمر کے پہلے دوسرے سال میں ————— ۱۱۰ سے ۱۲۰ فی منٹ

بچپن میں ————— ۹۵ " ۱۰۰ "

نوجوانی میں ————— ۹۰ " ۹۵ "

جوانی میں ————— ۷۵ " ۸۵ "

بڑھاپے میں ————— ۶۵ " ۷۰ "

بخاروں اور دیگر حاد امراض میں زبان عموماً خشک ہوا کرتی ہے۔ زبان میں تری ایک اچھی علامت سمجھی جاتی ہے اور خاص کر جب کہ خشکی کے بعد زبان میں تری آجائے تو یہ ایک نیک علامت سمجھی جاتی ہے۔

زبان پر زردی کا ہونا جگر میں نقص کی علامت ہے۔ بھوری یا سیاہ زبان بتلاتی ہے کہ زندگی کو قائم رکھنے والی طاقتیں کمزور و پست پر چکی ہیں اور خون زہر آلود ہو رہا ہے

جب زبان سرے اور کناروں پر سے صاف ہونی شروع ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض رو بہ صحت ہو رہا ہے۔

**غذائے مریض** مریض کی غذا کا انتظام بھی نہایت ضروری ہے۔ بعض اوقات مناسب غذا دواسے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ایک تو حالت مرض میں جسم ویسے ہی زیادہ تحصیل ہو کر باعث کمزوری ہو جاتا ہے اور پھر جب مناسب غذا نہ دی جائے تو ضعف کا اور بھی زیادہ اخلہ ہو جاتا ہے مگر مریض کو غذا دینے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی اشد ضروری ہے کہ حسب ہدایت معالج مناسب غذا مقررہ وقت پر دی جائے۔ نامناسب غذا کا استعمال سخت بد پرہیزی کہلاتی ہے۔ ایسی غلطی کرنے سے بعض اوقات مہلک نتائج پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ ٹائیفائیڈ فیور (تب محرقہ میں) آنتوں میں بعض مقامات پر زخم ہو جایا کرتے ہیں۔ جن کے اچھا ہو جانے سے پہلے اگر مریض کو کوئی سخت غذا یا گوشت وغیرہ دے دیا جائے تو مقام زخم پر آنت کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جس کا نتیجہ بالعموم موت ہی ہوا کرتا ہے۔

بعض اوقات دوران مرض میں یا بعد شفا یابی غذا میں بد پرہیزی کرنے سے بیماری طویل پکڑ جاتی ہے۔ یا عود کر آتی ہے اس لیے مریض کو کھانے پینے میں نہایت احتیاط رکھنی چاہیے۔

خوراک کا کوئی ایسا قاعدہ مقرر کرنا جو تمام کیسوں میں کافی دوائی ہو سکے ناممکن ہے کیونکہ ہر ایک کیس مختلف ہوا کرتا ہے۔ تاہم ضروری ہدایات درج کی جاتی ہیں جو کہ مفید ثابت ہوں گی۔

یہ ایک امر مسلمہ ہے کہ جو لوگ سبزی خور ہوتے ہیں۔ ان پر ہومیو پیتھک دوائی کا اثر بہت جلدی اور بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ بہ نسبت ان اشخاص کے جو گوشت خور ہوں اور عام طور پر عسفی غذا سادہ ہوا اتنی ہی ہومیو پیتھک دوائی کے فعل کے مؤثر ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اگر مریض سادہ غذا کھایا کرتا ہے اور اس کی قوت ہاضمہ میں کوئی نقص نہیں ہے تو پھر اس کی غذا میں تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں اور اگر مریض سادہ غذا کھانے کا عادی نہ ہو تو پھر اس کے لیے مندرجہ ذیل ہدایات ملحوظ رکھنی چاہئیں۔

شراب خوری۔ خشیات و تبا کو بے قلعی پر ہیز نیز تیز چائے و کافی سے تیز ترشیات اچار، زیادہ گرم مصالحہ اور بہت نمکیں اشیاء اور دبیں و تیل کی بنی ہوئی



چیزیں مثلاً پکوڑے۔ کچوری وغیرہ سے پرہیز لازمی ہے۔ دودھ ڈبل روٹی۔ پھلکا کھن چاول کچھڑی مونگ کی دال۔ ساگو دانہ۔ دلیا۔ آش جو۔ انڈے و پکے پھل و سبزی ترکاری مثلاً پالک کاساگ۔ کدو۔ ٹیڈے۔ شلغم وغیرہ یہ سب اشتیاء ہیں جو کہ حسب موقع بیمار کو دی جاسکتی ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ غذا مریض کو بار بار نہیں دینی چاہیئے بلکہ مناسب وقفہ کے بعد دہرائی چاہیئے۔

سادہ بخاروں میں عام طور پر آش جو اور تازہ پانی کھلے دل استعمال کرنا بخار چاہیئے اور بسا اوقات بخار کے دوران میں صرف یہی عمل کافی ہوا کرتا ہے جب بخار اتر جائے اور مریض کا معدہ دیگر غذا مضہم کرنے کے قابل ہو جائے تو پھر دوسری غذا دینی چاہیئے۔ لیکن جب بخار کا دودھ لمبا ہو جیسا کہ تب محرقہ وغیرہ میں ہوا کرتا ہے تو ایسی حالتوں میں دودھ ایک خاص غذا ہے (دودھ کو ابال لینا چاہیئے) اگر خالص دودھ مضہم نہ ہو سکے تو اس میں ۱/۲ حصہ لائٹ واٹر (چونے کا پانی) یا مساوی حصہ سوڈا واٹر ملا کر دینا چاہیئے۔ اس کو معدہ اکثر قبول کر لیتا ہے۔ لمبے بخاروں میں دودھ تو ایک خاص غذا ہے لیکن گاہے گاہے ساگو دانہ۔ مونگ کی دال کی کچھڑی جنوں کا رس اور چاولوں کی پیچھ میں تھوڑا دودھ و میٹھا لاکر بھی دینا چاہیئے۔ بخار کی حالت میں نہ تو بار بار غذا دینی چاہیئے اور نہ ہی بالکل خالی معدہ رہنا چاہیئے۔ جتنا بیمار مضہم کر کے اتنا ہی دینا چاہیئے اور زبردستی غذا اس کے اندر نہیں ٹھونسنی چاہیئے۔ تب محرقہ کا جب آرام آجائے تو غذا کے متعلق اور بھی احتیاط لازمی ہوا کرتی ہے۔ مریض کو ٹھوس غذا نہیں دینی چاہیئے جب تک کہ بخار کو صاف ہوئے چند یوم نہ گزر جائیں۔ نوٹ: لمبی بیماریوں میں گلوکوز (ولائتی کھانڈ) کا استعمال نہایت مفید ہوا کرتا ہے اس کے متواتر استعمال سے جسم بہت کمزور نہیں ہونے پاتا اور مریض مرض کا دیر تک مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کو پانی میں یا دودھ میں حل کر کے پلاتے ہیں۔

اس مرض میں غذا لطیف۔ زود مضہم اور مقررہ وقت پر خوب چاکر کھانی بلکہ چاہیئے سرغن اور ثقیل غذا نہ کھانی چاہیئے۔ مٹھائی۔ کیک۔ مرتبہ۔ اچار چٹنی وغیرہ سے بھی پرہیز لازم ہے۔ نثر بیدا کرنے والی سبزی ترکاری بھی نہیں کھانی چاہیئے اور جو سبزی کھائی جائے وہ خور۔ ملی ہوئی چاہیئے حقہ وغیرہ سے حتی الوسع پرہیز

کرنا چاہیے اور شراب کا تو نام تک نہیں لینا چاہیے۔

نوٹ: ۱۔ ورد قوتیج اسہال۔ پیچش یا سینہ میں ہر قسم کے میوہ جات سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۲۔ جن غذاؤں کی مریض کو دینے کی اجازت ہے اگر وہ اس میں سے کوئی غذا مریض کو

ناموافق پڑتی ہو تو اس کے لیے ایسی غذا سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ خواہ وہ غذا دوسرے مریضوں کو مفید کیوں نہ بیٹھتی ہو۔

۳۔ جو بچے مال کا دودھ پیتے ہوں۔ بیماری کے ایام میں ان کا دودھ نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس کی مال کو ممنوع چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۴۔ تباکو سے پرہیز لازمی ہے۔ کیونکہ اگر کسی حالت میں بغیر تباکو کے گزار نہ ہو سکتا ہو تو حتی الامکان بہت کم استعمال کرنا چاہیے۔

## ڈاکٹری و طبی اوزان و پیمانے اور ان کا باہمی مقابلہ

ڈاکٹری پیمانے			ڈاکٹری اوزان		
۲۰ گریں	کا	ایک سکروپل	۶۰ یونڈ	کا	ایک ڈرام
۶۰ گریں یا ۳ سکروپل	کا	ڈرام	۸ ڈرام	کا	اونس
۸ ڈرام	کا	اونس	۲۰ اونس	کا	پائونڈ
۱۶ اونس	کا	پونڈ	۸ پائونڈ	کا	گیسن

## سیال ادویات تاپنے کے عام پیمانے

ایک چائے کا چمچہ یا ٹی سپون فل	ایک ڈرام	۴ ماشہ
درمیانہ چمچہ ڈیزرٹ	۲	۸
بڑا چمچہ یا ٹیبل	۴	۱۶ تولہ
شراب پینے کا گلاس یا صاف گلاس فل	۲ اونس	ایک چھٹانک
چائے کی پیالی یا ٹی کپ فل	۴	۲
بڑا گلاس پانی کا یا ٹمبر فل	۸	۴

# باب دوم

## ہومیو پیتھک دوا سازی

ہومیو پیتھک ادویات مندرجہ ذیل شکلوں میں دستیاب ہوتی ہیں :-

- ۱- ٹنکچر TINCTURE یعنی سیال حالت میں۔
- ۲- ٹری ٹیو ریشن TRITURATION یعنی سفوف پوڈر باریک بسی ہوں۔
- ۳- گلوبولز GLOBULES یعنی گولیاں اور ٹیبلٹس TABLETS یعنی چھوٹی چھوٹی قرص یا ٹمکیاں۔

ہومیو پیتھک ادویات کے تیار کرنے میں مندرجہ ذیل چیزیں کام آتی ہیں ان کو انگریزی میں VEHICLES کہتے ہیں۔ یہ چیزیں بالکل کوری ہوتی ہیں۔ یعنی ان میں اپنی کوئی خاصیت دوائی کی موجود نہیں ہوتی۔ یہ صرف دوائی کے تیار کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔

۱- ریکٹی فائیڈ سپرٹ RECTIFIED SPIRIT یا الکوحل ALCOHOL

۲- مقطر پانی DISTILLED WATER

۳- شوگر آف ملک SUGAR OF MILK

۴- گلوبولز GLOBULES پانی لیولز PILULE ٹیبلٹس TABLETS

(الف) ہومیو پیتھک استعمال کے لیے ریکٹی فائیڈ سپرٹ نہایت اعلیٰ اور صاف ستھری ہونی چاہیے جو سپرٹ گندی ہو اور ہلانے سے گدلی ہو جائے اور اس میں مٹی کارک دیگر اجزائے تیرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کو ہومیو پیتھک ادویات کے تیار کرنے میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہومیو پیتھک دوائی کے جو ہر نشو و نما نہیں پاسکتے اور نہ ہی وہ خاص جو ہر ظہور پذیر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے متعدد کارخانوں میں ریکٹی فائیڈ

سپرٹ تیار ہوتی ہے۔ لیکن جو ریکٹی فائیڈ سپرٹ ۶۰٪ ہومیو پیتھک استعمال کے لیے تیار ہوتی ہے۔ وہ بہت اعلیٰ ہے اور اسی کو ہومیو پیتھک دوائی کے ڈائلو شنز (DILUTION) تیار کرنے میں استعمال کرنا چاہیے۔ کامیاب ہومیو سٹور لاہور ساہا سال سے اسی سپرٹ سے اپنے ڈائلو شنز بنا کر استعمال کر رہا ہے۔ (ب) مقطر پانی (ڈسٹیلڈ واٹر) بھی کسی معتبر ہومیو پیتھک فارمیسی کا کشید کردہ استعمال میں لانا چاہیے۔ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایلو پیتھک و دیگر کارخانے مقطر پانی کشید کرنے کا جنتر بوتلیں۔ کارک۔ فنل وغیرہ کی صفائی میں پورا پورا دھیان نہیں دیتے۔ تھوڑی سی بے احتیاطی بھی ہومیو پیتھک ادویات کے لیے ہلک ثابت ہوتی ہے۔ کامیاب ہومیو سٹور لاہور میں جو مقطر پانی کشید ہوتا ہے وہ پوری صفائی سے تیار کیا جاتا ہے۔ کارک۔ بوتلیں ڈس انفیکٹ کی جاتی ہیں اور پھر مقطر پانی کو فیلٹر کر کے بوتلوں میں بھرا جاتا ہے۔ اس لیے یہ قابل اعتبار ہے۔

(ج) ہومیو پیتھک ادویات کے تیار کرنے میں جو ملک شوگر استعمال کرنی چاہیے وہ بہت صاف ستھری اور معتبر کارخانے کی ساختہ ہونی چاہیے۔ بہت سستی ملک شوگر استعمال نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اگر ملک شوگر صاف ستھری نہ ہوگی، تو ہومیو پیتھک دوائی کے جو ہر ظہور پذیر نہیں ہو سکیں گے جو ملک شوگر کاغذ کے پکٹیوں میں بند شدہ ولایت سے آتی ہے اس میں تری و بحری آب و ہوا کا اثر ہو جایا کرتا ہے اس لیے اس کے بگڑنے کا گمان رہتا ہے۔ لہذا پیکٹوں کی ملک شوگر ہومیو پیتھک دوائی کے تیار کرنے میں استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ کامیاب ہومیو سٹور لاہور نے خاص انتظام ملک شوگر برائے ہومیو پیتھک استعمال سکوانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور واجبی نروں پر وہ ملک شوگر فروخت کرتے ہیں۔

(د) ہومیو پیتھک ادویات کی تیاری میں جو شیشیاں کام آتی ہیں وہ بالکل کوری ہونی چاہئیں اور ان کو حسب قاعدہ ڈس انفیکٹ کر لینا چاہیے۔ پہلے گرم پانی میں پھر سرد پانی میں اور پھر ریکٹی فائیڈ سپرٹ کے ساتھ دھو کر ڈس انفیکٹ کر لینی چاہئیں، کارک بھی کورے ہونے چاہئیں اور ان کو ڈس انفیکٹ کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ کامیاب ہومیو سٹور لاہور میں شیشیاں اور کارک ڈس انفیکٹ شدہ ہر وقت مل سکتے ہیں۔

مدر ٹینکچر (Q) - 1x - 2x - 3x وغیرہ

## ڈائلوشنز بنانے کا طریقہ

ہومیو پیتھک ادویات - جڑی بوٹی نباتات معدنیات اور کئی اقسام کے جانوروں کے زہروں اور کئی ایک امراض کے زہریلے مادہ سے تیار کی جاتی ہیں - ان کے تیار کرنے کا طریقہ ہومیو پیتھک فارموکوپیا میں مفصل درج ہے اور مختلف طریقوں سے یہ ادویات تیار ہوتی ہیں - چونکہ یہ مضمون فارموکوپیا کا ہے - اس لئے یہاں اس پر مفصل بحث نہیں ہو سکتی - یہاں صرف ہم ایک آدھ مثال دینے پر ہی اکتفا کرتے ہیں - مثلاً بیلادونا کے پودے سے ہم نے ہومیو پیتھک دوائی تیار کرنی ہے - جس کو ہومیو پیتھی کی اصطلاح میں مدر ٹینکچر (MOTHER TINCTURE) کہتے ہیں - بیلادونا کے سالم پودے کو جب کہ وہ پھول دینے پر آتا ہے - کتر کر خوب باریک کوٹ لیتے ہیں - پھر باریک کپڑے میں ڈال کر اس کا رس نچوڑ لیتے ہیں - جتنا یہ ہوتا ہے اتنی ہی وزنی الکوحل ملا کر بڑی تیزی سے بوتل کو ہلاتے ہیں اور اس بوتل کو مضبوط کارک دے کر آٹھ یوم تک ٹھنڈی اور اندھیری جگہ میں رکھ دیتے ہیں - اس کے بعد اس کو فلٹر کر لیتے ہیں - جو دوائی تیار ہو جاتی ہے اس کو بیلادونا کی مدر ٹینکچر (MOTHER TINCTURE) کہتے ہیں - اور اس کے لیے یہ Q نشان مقرر ہے - اس سے آگے 1x 2x 3x وغیرہ ڈائیلوشنز (طاقیتیں) تیار کرتے ہیں - مثلاً 1x بنانے کے لیے دو قطرے مذکورہ بالا ٹینکچر (Q) کے اور آٹھ قطرے ڈائیلیوٹ الکوحل کے حساب سے ایک صاف ستھری کوری شیشی جو کہ ڈس انفیکٹ شدہ ہو میں ڈال کر آٹھ دس تھپکیاں زور سے دیتے ہیں تاکہ دوائی کے محفی جو ہر بیدار ہو جائیں اس طرح 1x دوائی تیار کر لیتے ہیں اور شیشی پر بیلادونا کا لیبل لگا کر اس کے آگے 2x تحریر کر دیتے ہیں - پھر 1x دوائی کا ایک قطرہ اور ڈائیلیوٹ الکوحل کے نو قطرے کے حساب سے مذکورہ بالا طریقہ سے بلا کر 2x تیار کرتے ہیں - اور اسی طرح سے

۳x تیار کرتے ہیں اور ۳x کا ایک قطرہ اور الکوحل خالص کے نو قطرے ملا کر ۴x بن جاتی ہے و علیٰ ہذا قیناس۔

اوپر کی مثال دینے سے ہمارا یہ مطلب ہے کہ ناظرین کو Q - 1x - 2x - ۳x وغیرہ طاقتوں کا مطلب سمجھ میں آجائے۔ یہ دوائی بہ شکل تیل (عرق) ہوگی۔ اسی کو انگریزی میں ٹینکچر کہتے ہیں۔

## ٹری ٹیوریشن سفوف و پوڈر بنانے کا طریقہ

بعض ہومیو پیتھک ادویات معدنیات و نمکیات سے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ سفوف کی شکل میں تیار کی جاتی ہیں۔ ان کے تیار کرنے کا طریقہ حسب ذیل ہے:-  
سفوف (ٹری ٹیوریشن) گرم اور خشک ہوا میں تیار کرنے چاہئیں۔ کھل اور دستہ کو پہلے ٹھنڈے پانی اور پھر گرم پانی سے دھو ڈالو۔ ان کو پونچھ کر خشک کر لو اور پھر تھوڑی سی الکوحل کھل میں جلا دو۔ یہی ترکیب ہر بار نیا ٹری ٹیوریشن بناتے وقت عمل میں لاؤ۔ ایک حصہ خالص دوائی اور نو حصے ہلکے شوگر ملا کر اور مندرجہ ذیل طریقہ سے کھل کرنے سے 1x ٹری ٹیوریشن تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے تین عمل کیے جاتے ہیں۔

(الف) فرض کرو کہ آپ خالص نیٹرم میور سے 1x بنانا چاہتے ہیں۔ آپ خالص نیٹرم میور ایک ماشہ (۱۶ گریں) لیں اور اس کو صاف ستھرے کھل میں ڈال کر خوب باریک پیس لیں۔ پھر اس میں تین ماشہ ہلکے شوگر ڈال دیں۔ اور ہاتھی دانت یا سینک کے بنے ہوئے چمچہ کے ساتھ اچھی طرح سے ملا لیں۔ اور ایک صاف ستھرے دستے کے ساتھ چھ منٹ کھل کریں۔ بعدہ تین منٹ چمچہ کے ساتھ کھریں اور ایک منٹ خوب گڈ مڈ کریں۔ پھر مانند سابقہ چھ منٹ خوب کھل کریں۔ تین منٹ کھریں اور ایک منٹ خوب ملا لیں۔ اس طرح سے عمل کا پہلا حصہ بین منٹ میں ختم ہو جائے گا۔

(ب) اس کھری شدہ دوائی میں تین ماشہ ملک شوگر اور ملائیں۔ اور گچے سے خوب گڈ بند کر دیں۔ پھر چھ منٹ خوب زور سے کمرل کریں۔ پھر تین منٹ کھرچیں اور ایک منٹ ملائیں۔ اس طرح سے عمل کا دوسرا حصہ دیگر بیس منٹ میں ختم ہو جائے گا۔

(ج) اس کھری شدہ دوائی میں تین ماشہ ملک شوگر اور ملائیں اور مثل سا بقدر عمل کو دہرائیں یعنی چھ منٹ کمرل کریں۔ تین منٹ کھرچیں اور ایک منٹ گڈ بند کریں۔ پھر چھ منٹ کمرل کریں۔ تین منٹ کھرچیں۔ اور ایک منٹ ملائیں وغیرہ عمل کا تیسرا حصہ بیس منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ یعنی پورے ایک گھنٹہ میں نیٹرم میور x ۱ تیار ہو جائے گی۔ ۲۱ کو ایک عمدہ صاف اور خشک شیشی میں بھر دیں اور اس پر نیٹرم میور x ۱ کا لیبل لگائیں۔ x ۱ دوائی کا ایک حصہ اور ملک شوگر نو حصے یا سکر مذکورہ بالا طریقہ پر ایک گھنٹہ میں x ۲ تیار کر لیں اور اسی طرح سے x ۳ - x ۴ وغیرہ تیار کی جاتی ہیں۔

بعض اوقات دوائی بشکل ٹشکر سے سفوف میں بنا کر بیمار کو پڑیاں باندھ کر دی جاتی ہے۔ جتنی خوراکیں بنانی ہوں اس حساب سے ملک شوگر کی مقدار کورے کاغذ پر یا بٹرز پیپر (BUTTER PAPER) جو معمولی کاغذ کی نسبت زیادہ موزوں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ دوائی کو جذب نہیں کرتا۔ سیکھی کورے کاغذ میں کچھ نہ کچھ دوائی بند ہو جاتی ہے۔ پر ڈال کر اوپر اس کے مطلوبہ دوائی کی ٹشکر کے مناسب قطرے ڈال کر اچھی دانت کے تمچے کے ساتھ اس کو خوب ملا دو۔ اور جتنی پڑیاں بنانی ہوں بنا کر باندھ دو۔

## گلوبولنز۔ پائیلیولنز اور ٹیبلٹس میں دوائی جذب کرنیکی

### ترکیب

ایک صاف ستھری خشک شیشی میں گویاں یا قرص بھر دو اور مطلوبہ دوائی کی ٹشکر شیشی میں اتنی بھر دو۔ کہ ٹشکر گویوں کے اوپر تیرنے لگے۔ شیشی کو مضبوط کارک دے کر



خوب تھکیاں دو۔ پھر اس کو چوبیس گھنٹہ تک ٹھنڈی جگہ میں رکھ چھوڑ دو۔ چوبیس گھنٹہ کے بعد شیشی میں جو عرق موجود ہو اس کو باہر نکال لو اور صاف کتھرے خشک فلٹر پیپر کے ٹکڑے پر گویوں کو بچھا کر خشک کر لو اور شیشی میں بھر لو اور جس دوائی کی ٹشکر چھتے نمبر کی گویوں میں ڈالی تھی وہ لیس ہر درجہ کر دو۔ مثلاً آپ نے ایکونائیٹ تیس طاقت کی گویاں بنائی ہیں۔ تو ایکونائیٹ نمبر ۳ گویوں میں قال کر مذکورہ بالا طریقہ سے ایکونائیٹ نمبر ۳ کی گویاں بنالو۔

نوٹ: ۱۔ جو ٹشکر فارمو کو پیا کے ماتحت ڈاٹیلیوٹ الکوہل یا ڈسٹلڈ واٹر (مقطر پانی) میں تیار کئے گئے ہوں۔ ان میں گویاں تیار نہیں کرنی چاہئیں۔ کیونکہ گویاں ان میں ڈالنے سے گھل جائیں گی۔

۲: بڑی بڑی ہو میو پٹیک فارمیسیوں میں ہر دوائی کی گویاں بنی بنائی مل سکتی ہیں۔ وہاں سے منگوانے میں زیادہ آرام رہتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی گویاں خود بنانے میں خرچ زیادہ آتا ہے۔

ہر دوائی کی گویاں ہر نمبر کی ہر وقت تیار مل سکتی ہیں۔

## اچھی و خراب دوائی کی پہچان

دوائی کی شیشی کو خوب ہلا دو۔ اگر اس میں مٹی کارک یا دیگر غیر اشیاء کے اجزا تیرتے دکھائی دیں یا اس میں جالا پڑا ہوا ہو۔ یا گدلی ہو تو اس کو خراب دوائی سمجھو ایسی دوائی قابل اعتبار نہیں۔ اچھی دوائی کی پہچان یہ ہے کہ وہ بالکل صاف و شفاف ہو اس میں کسی قسم کے اجزا ہلا کر دیکھنے سے دکھائی نہ دیں اور نہ ہی اس میں جالا پڑا ہوا ہو۔

## مشہور ہو میو پٹیک ادویات کی فہرست

۱	آر سینکم ایلم	۲	اپیکاک	۵	اگنیشیا	۷	ایٹھیوزا
۲	آرنیکا مونٹانا	۴	اسپنجیا ٹوسٹا	۶	آرٹس وری کو	۸	اپس

ایڈ فاس	۹	چائٹ	۳۳	کاربودیجی	۵۷	لاکے کس	۸۱
ایڈ نائٹرک	۱۰	چیلی ڈونیم	۳۴	کائیوس	۵۸	نیڈم	۸۲
ایسی کیوس	۱۱	ڈایا سکوریا	۳۵	کاسٹی کم	۵۹	لائیکو پوڈیم	۸۳
اسٹی لاگو	۱۲	ڈکا مارا	۳۶	کابچیکم	۶۰	لوبلیا	۸۴
ایکونائیٹ	۱۳	ڈیجی ٹیلیس	۳۷	کاف	۶۱	مرکیورس کار	۸۵
ایلووز	۱۴	ڈراسرا	۳۸	کالین سونیا	۶۲	مرکیورس ڈلس	۸۶
ایفٹیم مارٹ	۱۵	رستم کس	۳۹	کالوسنتھ	۶۳	مرکیورس سالو	۸۷
ایفٹیم کروڈم	۱۶	رومیکس	۴۰	کالی کارب	۶۴	مرکیورس بن آئیوڈائیڈ	۸۸
آیوڈیم	۱۷	زکم میٹلیکم	۴۱	کالی بائی کروڈیکم	۶۵	میگنیشیا کرب	۸۹
ارٹیکا ارز	۱۸	سائٹ	۴۲	کالی ہائیڈرائڈیم	۶۶	میگنیشیا فاس	۹۰
انا کارڈم	۱۹	سہائٹا	۴۳	کالی فاس	۶۷	نکس وامیکا	۹۱
بیپ ٹیشا	۲۰	سہاڈلا	۴۴	کالی میور	۶۸	نیرم میور	۹۲
بورکس	۲۱	سپائی جیلیا	۴۵	کالونائیم	۶۹	ورائٹم ایلم	۹۳
برائی ادنی	۲۲	سفر	۴۶	کینتھرس	۷۰	ورائٹم ایلم ورائٹڈ	۹۴
برائٹا کرب	۲۳	سمی سی فیوگا	۴۷	کیپ سی کم	۷۱	وائی برٹم آپوس	۹۵
بربریس وگرس	۲۴	سلیٹیا	۴۸	کلکیریا فاس	۷۲	ہائیوسائیمس	۹۶
بیلادونا	۲۵	سی پیا	۴۹	کلکیریا کرب	۷۳	ہائیڈرائٹس	۹۷
پلم بم	۲۶	سڈرن	۵۰	کینابس سٹوا	۷۴	ہیلی بورس	۹۸
پسٹا	۲۷	سکیل	۵۱	کیویلا	۷۵	ہیر سلف	۹۹
پلائینگو	۲۸	سینگونیریا	۵۲	کوپرم آرس	۷۶	ہیمامیل	۱۰۰
پوڈونائیم	۲۹	فاسفورس	۵۳	کوپر ٹیلیکم	۷۷	ہیلونائیز	۱۰۱
تھوبا	۳۰	فائٹولیکا	۵۴	کیفر	۷۸	یوپاٹوریم پری ایٹم	۱۰۲
ٹیری بن تھینا	۳۱	فیرم ٹیلیکم	۵۵	کالونائین	۷۹	یوفیرنیریا	۱۰۳
جلسی میم	۳۲	فیرم فاس	۵۶	گریفائٹس	۸۰	یوکیٹس	۱۰۴

## باب سوم

## متعدی امراض عام امراض

نوبتی بخار	ملیریا بخار	تپ لرزہ
Intermittent Fever	MALARIAL FEVER	Ague

یہ ایک متعدی مرض ہے اس میں بخار باری سے ظاہر ہوتا ہے بعض حالتوں میں بخار ہر روز۔ بعض میں دوسرے تیسرے یا چوتھے روز ظاہر ہوتا ہے وغیرہ نوٹ: بلحاظ نوبت کے اس کی تین بڑی قسمیں ہیں :-

۱۔ روزانہ بخار۔ جس کا دورہ ہر روز ہوتا ہے۔ اس کو انگریزی اصطلاح میں کوٹڈین کہتے ہیں۔

۲۔ قے کا بخار۔ اس کا حملہ ہر تیسرے دن ہوتا ہے۔ یعنی ۲۸ گھنٹہ کے بعد اس کو ڈریشن کہتے ہیں۔

۳۔ چوتھے کا بخار۔ اس میں بخار کا دورہ ہر چوتھے روز یعنی ۷۲ گھنٹہ کے بعد ہوتا ہے۔ اس کو وارٹن کہتے ہیں۔

اسباب مرض۔ اصلی سبب تو اس بخار کا جراثیم ملیریا ہیں۔ جو کہ خون میں سرایت کر کے اس بخار کو پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں لیکن سردی۔ رنج و غم۔ تھکان و تھکاوٹ اور غذا کی خرابی وغیرہ بھی اس کے مددگار اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یہ بخار مرد و عورت۔ بچہ۔ بوڑھا اور جوان سب کو ہوتا ہے جبکہ ایک بار بخار کا حملہ ہو جائے تو دوبارہ اس کے قبول کرنے کے لیے طبیعت بہت مستعد ہوتی ہے۔

نوٹ: بلحاظ علامات کے ملیریا کی بخاروں کی دو قسمیں ہیں :-

## ۲۔ لازمی بخار

## ۱۔ نوبتی بخار

نوبتی بخار اور لازمی بخار دو مختلف بخار نہیں مانے جلتے بلکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر لیبریا کی خیراتیم ایک ہی وقت میں اپنی نیلیں بڑھا کر حملہ آور ہوں تو روزانہ نوبتی بخار ہوتا ہے اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی تعداد میں متواتر بڑھتے رہیں تو لازمی بخار ہوتا ہے۔ پس لازمی بخار کوئی علیحدہ بخار نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ روزانہ نوبتی بخار ہی ہے جس میں ایک باسی اترنے نہیں پاتی کہ دوسری آد باقی ہے۔

**علامات مرض**۔ انسان کے جسم میں لیبریا کی زہر داخل ہو کر عموماً تین سے بارہ دن تک پوشیدہ طور پر نشوونما پاتا رہتا ہے لیکن گاہے بگا ہے اس عرصہ سے پہلے ہی بخار چڑھ جاتا ہے۔ یعنی زمانہ اخفائے مرض میں مریض کی طبیعت عموماً سُست و کاہل رہتی ہے۔ اور اس کو انگڑائیاں و جمائیاں آتی رہتی ہیں۔ کمر میں دھبہ دھبہ درد اور سر چکراتا ہے ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں۔ بھوک ماری جاتی ہے۔ چونکہ اس قسم کے بخار میں پہلے سردی لگتی ہے۔ پھر گرمی اور اس کے بعد پسینہ آکر بخار اُتر جاتا ہے۔ اس لیے اس بخار کے علامات کے تین درجے ہوتے ہیں۔

## ۱۔ سردی کا درجہ ۲۔ گرمی کا درجہ ۳۔ پسینہ کا درجہ

سردی کے درجہ میں سُستی۔ کاہلی اور اعضاء ٹوٹتے ہیں۔ رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جاڑا لگتا ہے اور تمام جسم کا پتلا ہے۔ جب لہزہ شدت کا ہو تو مریض کے دانت بچھتے ہیں۔ بہت سے کپڑے اوڑھنے پر بھی سردی رفع نہیں ہوتی۔ بعض مریضوں کو لہزہ اتنی شدت کا ہوتا ہے کہ ان کے ناخن اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں اور اندرونی اعضاء میں اکثر خون جمع ہو جاتا ہے۔ جس کے باعث سردی یا سرمی ہو جھ معلوم ہوتا ہے اور بعض اوقات سرمی زیادہ اجتماع خون ہونے کے باعث بے ہوشی یا ہریان ہو جاتا ہے۔ پھیپھڑوں میں اجتماع خونی کے باعث سانس تیزی کے ساتھ آتا ہے۔ جگر و معدہ میں اجتماع خون ہونے کے باعث جی متلاتا ہے اور قیئ آتی ہیں۔ مریض کا منہ خشک ہوتا ہے اور اسے بڑی سخت پیاس لگتی ہے۔ یہ سردی کا درجہ اکثر کھنڈ یا ڈیڑھ گھنٹہ تک رہتا ہے۔ لیکن بعض مریضوں کو چار چار پانچ گھنٹوں تک لہزہ ہوتا رہتا ہے۔ مگر جب اس بخار کی کئی باریاں آچکی ہوں تو سردی بہت نہیں لگا کرتی۔ صرف ایک آدھ لمحہ

کے لیے خفیف سی سردی محسوس ہوتی ہے جب سردی کا درجہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد گرمی کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رفتہ رفتہ مریض کا تمام بدن گرم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض مارے گرمی کے کپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ نبض بھرپور اور تیز چلتی ہے سردی کو کہتا ہے اور کینٹھی کی شریانیں خوب تپتی ہیں۔ منہ اور زبان خشک ہوتے ہیں۔ اور زبان پر سفید قرجی ہوتی ہے۔ بعض اوقات جی ملتا ہے۔ پیشاب تقوڑی مقدار میں اور رنگین آتا ہے۔ حرارت جسم عموماً ۱۰۰ سے ۱۰۴ درجہ تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ حالت دو تین گھنٹے بلکہ بعض اوقات ۶ سے ۱۲ گھنٹوں تک رہتی ہے پھر اس کے بعد تیسرا درجہ یعنی پسینہ کا درجہ شروع ہو جاتا ہے اور مریض کو بہت تسکین معلوم ہونے لگتی ہے۔ پیاس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نبض کی تیزی بھی گھٹ جاتی ہے اور پیشاب میں سرخ ذرات بہت خارج ہوتے ہیں۔ پہلے پسینہ پیشانی اور چہرہ پر آتا ہے۔ پھر تمام بدن پسینہ سے تر ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات پسینہ کم آتا ہے اور بعض اوقات زیادہ یہاں تک کہ مریض کے پارچات اور بستر پسینہ سے تر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح علامات میں تخفیف ہو کر بخار بالکل اُتر جاتا ہے اگر مریض کمزور ہو تو پسینہ آنے کی حالت میں بعض اوقات مدد حال ہو جاتا ہے بعض مریضوں کو پسینہ آتے ہوئے نیندا جاتی ہے اور جب وہ جاگتے ہیں تو وہ بالکل آرام میں ہوتے ہیں۔

نوٹ: اکثر مریضوں میں تو یہ تینوں درجے یعنی لہزہ گرمی اور پسینہ واضح طور پر پائے جاتے ہیں۔ لیکن بعض مریضوں کو سردی لگتی ہے صرف بخار ہو جاتا ہے اور پسینہ آکر بخار اُتر جاتا ہے اور کسی کو صرف سردی لگتی ہے۔ گرمی اور پسینہ کی نوبت بھی نہیں آتی کہ بخار اُتر جاتا ہے۔ بعض مریضوں کو قبض آتی ہیں اور بعض کو نہیں آتیں۔ بعض مریضوں کو سخت بے چینی ہوتی ہے اور وہ بار بار کوٹ بدلتے اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں۔ لیکن برعکس اس کے بعض مریض جب چپ چاپ پڑے رہتے ہیں اور وہ ہلنا چلنا اور بولنا چلنا نہیں چاہتے بعض مریضوں کو بخار چڑھنے کے قبل اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کو سخت قبض ہو جاتی ہے۔ لیکن قبض کی شکایت عموماً بہت مریضوں میں ہوا کرتی ہے۔

**عوارض و نتائج**۔ چونکہ بار بار لرزہ لگنے کے باعث اندرونی اعضاء میں اجتماعِ خون ہوتا رہتا ہے اس لیے جگر، اندریوں اور بعض اوقات گردوں میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ مریض کا رنگ پیلا اور اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ شکم تن جاتا ہے اور قبض رہتی ہے خاص کر تلی بڑھ جاتی ہے اور اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کا وزن کئی پونڈ ہو جاتا ہے اور شکم پر ہاتھ رکھنے سے وہ خاصی معلوم پڑتی ہے تلی اور جگر بڑھ کر یرقان وغیرہ کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ بعض اوقات گردوں میں ورم ہو کر خونی پشیا ب آنے لگتا ہے اور کبھی کھانسی اور دمہ کی شکایات ہو جایا کرتی ہیں۔

**مختصر ملاحظہ**۔ چونکہ یہ بیماری مچھروں سے پھلتی ہے۔ اس لیے مچھروں سے بچنے کے لیے تمام ذرائع اختیار کرنے چاہئیں۔ پردوں، مچھردانی اور مسہری کے اندر سونا چاہیے۔ تالابوں، جوہڑوں اور گندے پانیوں میں مچھر بڑھتے اور پیتے ہیں اس لیے ان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ تازہ پانی ڈال کر گندے پانی کو نکال دینا چاہیے۔ طیریا کے موسم میں مٹی کا تیل ساکن پانی پر چھڑک دینے سے پانی مچھروں سے متبر ہو جاتا ہے۔ طیریا کے موسم میں بخار سے بچنے کے لیے کونین کا استعمال لیکن تھوڑی مقدار میں مانا گیا ہے۔ یعنی چنیم سلف  $x$  کے ۵ گرین صبح اور ۵ گرین شام کو استعمال کرنے سے طیریا بخار سے بچاؤ رہتا ہے اور اسی طرح سے آرسلنیم  $x$  کا استعمال مرض سے بچائے رکھتا ہے۔

## علاج

**چائنا یا سکونا**۔ یہ دوائی اس وقت کام دیتی ہے جب کہ اس کے خاص علامات موجود ہوں یعنی لرزہ، پیاس اور پسینہ کی تینوں حالتیں پائی جائیں۔ پیاس جاڑے سے پہلے لگتی ہے جس سے مریض کو بخار کے حملہ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ جاڑا اور حرارت کے بعدان میں پیاس نہ لگتی ہو۔ مریض صرف ہونٹوں کو گیسلا کرنا چاہتا ہو لیکن پسینہ میں پیاس بہت لگتی ہو۔ جس بخار میں یہ علامات واضح طور پر پائی جائیں۔ اس میں چائنا یا کونین مفید پڑتی ہے۔ لیکن ہر ایک طیریا بخار میں اس کو اندھا دُعا استعمال کرنا بجائے فائدہ کے نقصان دہ ہوتا ہے۔ چائنا دوائی تیسے کے بخار

میں خاص طور پر ٹوڑ ہوتی ہے۔ بخار کے دوران میں دریدیں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں اجتماع خون بجانب سر ہو چہرہ سرخ اور گرم ہو۔ اگرچہ جسم کے دوسرے حصے سرد ہی کیوں نہ ہوں۔

جب بخار پیچھا نہ چھوڑتا ہو اور جگر دلی بڑھ گئے ہوں یا جن میں کہ کوئین بہت مقدار میں استعمال کی جا چکی ہے۔ ایسے کیسوں میں چائنا دوائی شاذ و نادر ہی منظر ہوتی ہے۔ بلکہ غیر مفید ہوتی ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بڑھی ہوئی طحال میں چائنا دوائی برخلاف اثر رکھتی ہے۔

✽ خوراک: مدرشکچر (۵) کے ایک یا دو قطرے یا x کے چار قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

چینی نم سلف رکونین x ۱ ٹری ٹیویشن بھی مذکورہ بالا علامات کی موجودگی میں دی جاتی ہے۔

✽ خوراک: x ۱ ٹری ٹیویشن کے ۵ گرین (۲ ۱/۲ رقی) ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
نکس و امیکا۔ اگرچہ یہ دوائی ضدی قسم کے بخاروں میں زیادہ مستعمل نہیں ہوتی۔ لیکن جن حالتوں میں معدی اور صفراوی علامات زیادہ آشکارا ہوں ان میں یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ لرزہ روزانہ لگتا ہو۔ سہ پہر اور شام کو لرزہ لگتا ہو۔ لرزہ بہت لگتا ہو اور لرزہ کی ابتدا میں ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن نیلے پڑ جاتے ہوں۔  
اعضا درد کرتے ہوں۔ جمائیاں بہت آتی ہوں۔ پیاس خاص نہ لگتی ہو۔ ماتھے میں دھما دھما درد ہو۔ سر چکراتا ہو اور سبکیاں آتی ہوں۔ نکس و امیکا کی یہ خاص علامت ہے کہ بخار کی حالت میں مریض خوب ڈھپا رہنا چاہتا ہے ذرا سانگہ ہونے سے اس کو جھٹ جاڑا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔

✽ خوراک: x ۲ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرٹیمیکیم۔ یہ بڑی کارآمد دوائی ہے اور شاید چائنا اور چینی نم سلف سے دوسرے درجہ پر مستعمل ہوتی ہے اس کے علامات یہ ہیں کہ بخار کا حملہ لمبا ہوتا ہے خاص کر حرارت کے ساتھ تمام جسم یا کسی حصے میں جلن ہوتی ہو۔ پیاس بہت لگتی ہو۔ تشویش اور بے چینی



بہت بونہن چھوٹی اور تیز ہو اور زبان صاف ہو۔ شریہ قملوں میں جتنی زبان صاف  
ہو اتنی یہ دوائی زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔ بخار کا دورہ ختم ہونے کے بعد بھس  
اور نقا بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پرانے طیریا بخار میں جس کو انگریزی میں طیریل کچکیسا  
کہتے ہیں۔ آرسلیم سب دوائیوں کی سرتاج دوائی ہے۔ یہ کوہن کے بد اثرات کو  
دور کرتی ہے جتنی بیماری زیادہ لمبی ہو گئی ہو اتنی ہی یہ دوائی زیادہ منظر ہوا کرتی  
ہے جب مرض کا اثر اعضاء رئیسہ پر زیادہ ہونے کے باعث طاقت مریض بہت  
کم ہو گئی ہو اور نقا بہت نے آدایا ہو تو یہ دوائی جادو نما اثر دکھلاتی ہے۔ بخار  
کا حملہ دوپہر کے بعد یا آدھی رات کے بعد ہوتا ہو۔ جاڑا خاص طور پر نہ گتا جو نرم  
پانی پینے سے مریض کو قدرے تسکین دیتی ہو۔

✽ خوراک۔ ۳ دن میں دو یا تین مرتبہ۔

نیٹریم میورک۔ یہ دوائی ابتدا میں شاذ و نادر ہی کام آتی ہے لیکن جب  
مرض لمبا ہو چکا ہو اور بخار بچھانہ چھوڑتا ہو یا غلط علاج کرانے سے بخار خراب ہو گیا  
ہو تو یہ دوائی مؤثر ہوا کرتی ہے۔ جاڑا گرم اور پسینہ کی حالتیں تینوں ایک جیسی  
نہیں ہوتیں۔ جاڑا تو بعض اوقات لگتا ہی رہتا ہے حرارت بہت تیز نہیں ہوا  
کرتی اور سر درد سخت ہوتا ہے یا تو پسینہ بالکل ہی نہیں آتا اور یا بہت ہی زیادہ  
آتا ہے اور کمزوری بہت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن پسینہ آنے سے سر درد کا آرام آ  
جاتا ہے۔ رنگ مریض کا زردی پے ہوئے خاکستری اور محال و جگر بڑھے ہوئے ہوتے  
ہیں۔ نیٹریم میورک کے بخار کی خاص علامت یہ ہے کہ جاڑا اس بجے قبل دوپہر سے  
شروع ہونے لگتا ہے اور کمزور پاؤں سے شروع ہوا ہے پیاس بہت گنتی ہے  
رہیں درد ہوتا ہے تنفس چھوٹا ہو جاتا ہے اور اکثر ہونٹوں پر بخار کی پٹیاں  
بھی نکل آتی ہیں۔ جب یہ علامات موجود ہوں تو پہر یہ دوائی خاص طور پر منظر ہوتی  
ہے۔ نیٹریم میورک کے مریضوں کی زبان پر سفید فرجی ہوئی ہوتی ہے۔ دن کو تودہ  
سوتے ہیں لیکن رات کو نیند نہیں آتی۔

✽ خوراک۔ ۳ ٹری ٹیوریشن۔ اس دوائی کی دو خوراکیں صبح و شام کے سے پیلے دینی

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

چاہئیں اور ایک خوراک شام کو دینی چاہیے۔

یوپاٹوریم پرفولی ایم۔ روزہ کا دورہ ہوتے ہی ہڈیوں میں درد اور قیوں کا آنا اس دوائی کی علاماتِ مخصوصہ ہیں۔ معدی علامات تو اپنی کاک مانند ہوں تمام جسم کے عضلات دکتے ہوں۔ ایک روزہ جاڑا صبح کو ہوتا ہو اور دوسرے روز شام کو جاڑا کے قبل پیاس لگتی اور کڑوی قیئیں آتی ہوں۔

مریض پیاس سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ اب جاڑا لگا چاہتا ہے روزہ کر سے شروع ہوتا ہو اور ساتھ ہی سر کی کھوپری کے سامنے جھتہ میں دباؤ کا احساس ہو بخار کا حملہ نو دس بجے شروع ہوتا ہے۔

ڈاکٹر بیض کا قول ہے کہ پیشانی کے اوپر دباؤ اور وزن اس دوائی کی یقینی علامات ہیں حرارت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں میں درد بھی بڑھتا ہو اور پسینہ یا تو بالکل ہی نہیں آتا ہو اور آگوتا ہو تو بہت خفیف۔ جگر میں نقص اور جلد کا رنگ ندوی لیے ہوئے ہو صفراوی اور ہڈ توڑ بخار میں یہ دوائی اکیر کا حکم رکھتی ہے۔

✽ خوراک: ہڈنکچر (۵) کے ایک سے پانچ قطرے ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

اپنی کاک۔ جاڑا خوب لگتا ہو اور ساتھ ہی ہاضمہ کی خرابی ہو۔ بھوک نہ لگتی ہو۔ خوراک سے نفرت ہو۔ آبکائیاں قیئیں اور اسہال آتے ہوں۔ شروع بخاروں میں اور خاص کر ذکی الحس مریضوں کے لیے یہ دوائی زیادہ موثر ہوا کرتی ہے۔ جاڑا لگتے وقت یا تو پیاس بالکل نہ لگتی ہو اور اگر لگتی بھی ہو تو بہت خفیف لیکن جاڑا بہت لگتا ہو۔ حرارت بخار تھوڑی ہوتی ہو اور پسینہ عموماً ندارد۔ بعض حالتوں میں روزہ تو تھوڑا عرصہ رہتا ہو لیکن بخار زیادہ دیر تک چڑھتا رہتا ہو اور حملہ کے دوران میں دم گھٹنے والی کھانسی اور کوتاہی ہوتی ہو۔ جب بخار کے علامات صاف طود پر عیاں نہ ہوں تو اس دوائی کی چند خوراکیں دینے سے کیس صاف ہو جاتا ہے اور مناسب دوائی کے انتخاب میں مدد ملتی ہے۔ آبکائیاں اور قیئوں کی زیادتی اس دوائی کی خاص علامت ہے اور خاص کر جب کہ قیئیں شام یا رات کو زیادہ آتی ہوں تو اس دوائی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

✽ خوراک ۳ - نمبر ۳ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم - جب جگر - معدہ یا اعصاب میں کوئی خاص نقص نہ پایا جاتا ہو تو یہ دوائی استعمال میں لائی جاسکتی ہے۔ پنچوں کے طیریا بخار میں یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے جاڑا یا تو کمر کے اوپر دوڑتا ہے یا پاؤں سے شروع ہوتا ہے تمام جسم دکھتا ہوا اور لہزہ کے دوران میں مریض یہی چاہتا ہو کہ کوئی اس کو تھامے رکھے۔ لہزہ نصف دن کے قریب شروع ہوتا ہو حرارت میں چہرہ سرخ ہوتا ہو۔ غنودگی کاہلی اور سستی اس دوائی کی خاص علامت ہیں۔ پیاس زیادہ نہیں لگا کرتی۔

✽ خوراک ۱ - نمبر ۱ ہر دو گھنٹہ کے بعد

سلفر - جب کسی دوائی کی علامت صاف طور پر عیاں نہ ہو تو سلفر ڈرنکچر یا تیس طاقت کی چند خوراکیں ہر آٹھویں گھنٹے دینے سے کیس صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل شفا ہو جاتی ہے نیز ایسے مریضوں کو جن کو پھوڑے پھنسیاں نکلتی رہتی ہوں۔ اور خارجی ادویات کے استعمال سے دب گئی ہوں۔ بخار ہر ۱۲ یا ۲۴ یا ۳۶ یا ۴۸ گھنٹہ کے بعد ظاہر ہوتا ہو۔ اعضائے تناسل برف کی مانند سرد ہوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں۔ شب کو پسینے بکثرت آتے ہوں اور نیند بے آرام ہوتی ہو۔ یا جب بخار اتر جاتا ہو تو پیاس زیادہ لگتی ہو۔ تو سلفر دوائی دینی چاہیے۔

✽ خوراک ۱ - ڈرنکچر کے ایک یا دو قطرے یا نمبر ۳ یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کیپ سی کم - جاڑا بہت لگتا ہو۔ شدت کی پیاس ہو پانی پینے سے لہزہ بڑھ جاتا ہو۔ جاڑا کمر سے شروع ہوتا ہو۔ گرمی سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ حرارت کے دوران میں پیاس نہ لگتی ہو۔ کھانے یا پینے سے زیادتی پیدا ہو جاتی ہو۔

✽ خوراک ۳ - ہر دو گھنٹہ کے بعد

سیدرن - عین الوقتی اس دوائی کی ناس علامت ہے اور عین الوقتی بھی ایسی کہ اس کو گھڑی کی عین الوقتی سے نامزد کیا جاتا ہے۔ بخار کا حملہ ٹھیک عین وقت پر ہوتا

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

ہے۔ دلدلی مقامات کے بخار کے لیے یہ ایک بہتر دوائی ہے۔ سر کی جانب اجتماع

خون ہوتا اس کی خاص علامت ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۳۷ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ: تپتے اور چوتھے۔ کہ بخار میں چائٹ (۵) آرسینک نمبر ۳۷ اور نیٹرم میو نمبر ۳۷ یہ تینوں ادویات اکسیر کا حکم رکھتی ہیں۔ دوران وقفہ میں اگر کھلائی جائیں تو باری رک جاتی ہے اور بخار نہیں چڑھتا۔

حفظ مالتقدم۔ اگر طیریا کے موسم میں طیریا بخار سے آرام رہے۔ پہلی نم سلف (کونین) ۱۷ پانچ گرین صبح اور ۵ گرین شام کو کھالینی چاہیے اگر کونین موافق نہ پڑتی ہو تو آرسینک ۱۷ اسی طور پر استعمال کرنی چاہئے۔ تازہ پانی کے ہمراہ

ضروری ہدایات - دوائی دینے کا سب سے اعلیٰ وقت وہ ہے جبکہ بخار دور ہو چکا ہو اور حرارت جسم نارمل ہو چکی ہو اس وقت دی ہوئی دوائی نہایت موثر ہوتی ہے اور منظر دوائی آئندہ حملہ کو روک دیتی ہے جبر، دن بخار کا دورہ ہونا ہو اس دن مریض کو خالی پیٹ رہنا چاہیے اور اگر خالی پیٹ نہ رہ سکے تو صرف دودھ یا تھوڑا سا ساگو دانہ یا اراروٹ کھانا چاہیے۔ پیٹ بھر کر غذا نہیں کھانی چاہیے اور نہ ہی دیرینہم غذا کھانی چاہیے۔ خالی شکم رہنا مفید ہے بخار اترنے پر ہلکا ہونے پر ہلکی اور زود مضام غذا کھانی چاہیے۔

پلاس کی شدت کو دور کرنے کے لیے مریض کو سرد پانی تھوڑا تھوڑا پلاتے رہنا چاہیے۔ برف کے ٹکڑے چوسنے کے لیے دیں۔ سوڈا واٹر برف میں سرد کیا ٹھوڑا پلائیں۔ آتش جو پینے کے لیے دیں یا آتش جو اور دودھ ملا کر۔ یا سوڈا واٹر اور دودھ ملا کر تھوڑا تھوڑا پینے کے لیے دیں۔ بخار میں پانی بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ تھوڑا تھوڑا سرد پانی ضرور دیتے رہنا چاہیے۔ اس سے پسینہ آنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ پانی نہ دینے سے گھبراہٹ اور بیقراری بڑھ جاتی ہے۔

اُبکائیاں اور قیئیں بعض تیز بخاروں میں خود بخود آنے لگتی ہیں۔ اگر معدہ غذا سے لدا ہوا ہو۔ تو حلق میں انگلی ڈال کر یا ایک پاؤ گرم پانی میں سوا یا ڈیڑھ تول نمک

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

لا کر اور پلا کرتے کرادینی چاہیے۔ تاکہ معدہ فاسد اور خراشدار غذا سے خالی ہو جائے۔ اور اگر خالی معدہ میں آبکائیاں آتی ہوں تو برف کے ٹکڑے چوسنے کے لیے دیں یا برف میں ٹھنڈا کیا ہوا سوڈا وائٹ گھونٹ گھونٹ پلائیں یا فم معدہ پر برف کی تھیلی رکھیں یا رائی کا پستہ لگائیں۔

**قبض۔** طیریا بخار میں قبض کا دور کرنا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات تو ہومیو پیتھک دوائی دینے سے قبض رفع ہو جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات قبض رفع کرنے کے لیے دیگر ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ مثلاً انہما یعنی پچکاری کا کرنا۔ کیسٹرائیل یا بادام روغن یا روغن زیتون کا پلانا۔ قبض کشا گولیوں کا استعمال کرنا وغیرہ وغیرہ اور جب تک یہ ذرائع اختیار نہ کیے جائیں قبض رفع ہونے میں نہیں آتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ بند و پاک کے باشندے جلاب لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن اس کو کیسٹرائیل گروہتی۔ کیلول اور گرگوریز پوڈر اور پرائی وینی شروع کر دیتے ہیں ذرا قبض ہوئی اور جلاب دے دیا اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو جب تک کوئی سخت جلاب نہیں دیا جاتا۔ تب تک اس کی قبض کشائی نہیں ہوتی۔ لہذا ہومیو پیتھک ڈاکٹر کو مشکل پیش آتی ہے اور ہمارے ملک کا رواج بھی ہے کہ جب تک مریض کو دو چار پاخانے نہیں آجاتے۔ تب تک اس کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ بخار اس کا گیا نہیں ہے۔ اس لیے ایسے حالات میں ہومیو پیتھک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ مریض کی تسلی کے لیے جو ذرائع قبض کشائی کے مناسب سمجھے عمل میں لائے۔

**سرور و ہڈیان۔** شدید بخار میں سرور و کی شکایت بہت سخت ہوا کرتی ہے اور بعض اوقات حرارت بخاری کی تیزی کی وجہ سے ڈی لیریم یعنی ہڈیان ہو جایا کرتا ہے ایسی حالت میں چند بلیا اور پیشانی پر برف کی پتلی رکھنا چاہیے یا سرد پانی یا برفاب میں کپڑے کا ٹکڑا بجا کر سر اور ماتھے کے اوپر رکھنا چاہیے اور اس کو خشک نہیں ہونے دینا چاہیے۔ جب حرارت بخار ۱۰۳ درجہ سے کم ہو جائے تو پھر برف کی تھیلی یا بھیکا ہوا کپڑا سر کے اوپر رکھنے کی ضرورت نہیں رہتی جب حرارت بخار ۱۰۴ یا اس سے زائد ہو تو مریض کے پاؤں کے تلوے خشک تولیہ سے ملنے چاہئیں اور سر پر برد یا کپڑے کا ٹکڑا برفاب میں تر کر کے اور نچوڑ کر رکھنا چاہیے۔ حرارت بخار کو کم کرنے کیلئے بیلادونا

اور وراثت کا استعمال مفید ہوتا ہے بشرطیکہ علامات ملتی جلتی ہوں۔

## سادہ لازمی بخار

(SIMPLE Continued Fever)

یہ بخار چوبیس گھنٹوں سے لے کر ۷۲ گھنٹوں تک بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ تک چڑھتا رہتا ہے اور بدوں کسی زیادہ تکلیف کے یہ اتر جاتا ہے۔  
علامات مرض۔ یہ بخار عموماً لوزہ لگ کر چڑھتا ہے یا کبھی کبھکی ہوتی ہے۔ اور گرمی بعدہ جسم کی جلد خشک اور حرارت سے جلتی ہے۔ نبض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہے۔ منہ خشک۔ ہونٹ خشک اور زبان خشک و ہونگ سرخ یا اس پر سفید فرجی ہوتی ہے پیاس لگتی ہے اور پیشاب مقدار خفیف لیکن بڑا رنگین آتا ہے۔ مذکورہ بالا علامات کے ساتھ بعض اوقات کمر میں درد کئی اشتہاد تنفس تیز اور ہڈیاں وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ علامات بوقت شب اکثر زیادہ سخت ہوا کرتی ہیں۔ جب بخار اترنے پر آتا ہے تو یا تو پسینہ بہت آتا ہے یا کبھی پھوٹ نکلتی ہے۔ یا اسہال آتے ہیں۔ یا دلنے جسم پر نکل آتے ہیں اور بخار اترنے کے بعد بجز کمزوری کے دوسرے مرض تندرست ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض۔ موسم کی یکایک تبدیلی بھگے ہوئے کپڑے پہننا یا مندر مکانات میں رہنا۔ رومی ناکافی غذا کھانا۔ یا برخلاف اس کے زیادہ شکم پری شراب خوری چوٹ کا لگنا۔ بدبودار اور گندی ہوا میں رہنا دماغی یا جسمانی تھکاوٹ یا اکساہٹ یا دیگر ایسے اسباب کہ جن سے نظام عصبی کو دھکا لگے۔

## علاج

کیمفر۔ جب یکایک لوزہ شروع ہو جائے۔ کپکپی ہو اور سستی اور کاہلی بہت ہو تو یہ دوائی دی جاتی ہے۔ لوزہ کپکپی کو دور کرنے میں اس دوائی کو خاص شہرت و فہلیت حاصل ہے۔

✽ خوراک۔ درجنکے دو قطرے معری یا تاشہ پر ڈال کر ہر ۱۵ منٹ کے بعد تین یا چار مرتبہ دینے چاہئیں۔

ایکونائٹ۔ یہ دوائی لازمی بخار و دومی بخار میں کام آتی ہے جبکہ نبض تیز چلتی ہو۔  
حرارت تیز ہو اور قدرے ہڈیاں بھی ہو چہرہ مریض کا سرخ ہو اور بخار تیز ہو اور  
اکثر اوقات سرور دہی ساتھ ہو۔ ایکونائٹ میں مریض کے دل کی حالت خاص  
قابل لحاظ ہوا کرتی ہے یعنی (۱) سخت بے چینی (۲) تشویش (۳) ڈر  
یہ تینوں علامات خوب آشکارا ہوا کرتی ہیں۔ (لیکن) اگر مریض کو قدرے ہڈیاں  
بھی ہو تو بھی ایکونائٹ کو نہیں بھوننا چاہیے) جلد جسم خشک، پیاس شدید اور  
نبض بھرپور و تیز چلتی ہے اور پسینہ آنے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔ جب خشک  
سرور ہونے کے باعث بخار پیدا ہو جائے یا جب کہ جسم گرم ہو یا پسینہ آیا ہو  
ہو اور فوراً ہی ٹھنڈ لگ جاوے یعنی جسم سرد گرم ہو جائے تو ایسی حالت  
میں ایکونائٹ دوائی نہایت مؤثر ہوتی ہے اور مضبوط اور نوجوان مریضوں کے  
لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ مگر ذرا اور ناتواں دوائی مریضوں کے ساتھ اس کا  
کوڑا واسطہ نہیں ہے۔ دل میں تشویش کا موجود ہونا اس دوائی کی خاص علامت  
ہے۔ بجز پانی کے ہر چیز کو نہ لگتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳ ہر پندرہ منٹ یا نصف گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے بعد بموجب  
علامات۔

ورائٹرم ورائیڈ۔ مذکورہ بالا علامات، اگر موجود ہوں۔ نبض بہت تیز چلتی ہو۔ لیکن دل  
تشویش اور سخت بے چینی موجود نہ ہوں تو ایکونائٹ کی بجائے یہ دوائی زیادہ  
مؤثر ہوتی ہے۔

✽ خوراک۔ ۱۰ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد  
جلسی میم۔ کاہلی سستی اور غنودگی اس دوائی کی خاص علامات ہیں مریض پر سستی و  
غنودگی طاری رہتی ہے۔ یہ دوائی مسلسل لازمی بخاروں پر مفید ہوتی ہے۔  
نیزاب۔ ناروں میں جو کہ موسم گرما کی گرمی کے باعث پیدا ہوئے ہوں۔ مریض

کابل دست ہوا کرتا ہے اور اس کے تمام عضلات ٹوٹتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ بالکل آرام میں پڑا رہے۔ بخار میں عدم پیاس جلسی میم کی خاص علامت ہے جب بچوں اور جوانوں کو متواتر بخار پڑھا رہے اور پسینہ نہ آئے تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک: ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فیرم فاس - یہ دوائی بخار میں اکیونائٹ اور جلسی میم کے بین بین کام آتی ہے۔ نہ تو اکیونائٹ کی مانند اس میں دلی تشویش ہوتی ہے اور نہ جلسی میم کی طرح کابلی اور غنودگی جب بخار کے ہمراہ زکام بھی ہو اور کھانسی نہایت تکلیف دہ ہو تو یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔

✽ خوراک: ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیپ ٹیشیا - سادہ لازمی بخاروں میں یہ دوائی موثر ہوتی ہے جب تپ محرقہ کا شک ہو تو یہ دوائی ضرور دینی چاہیے۔ نیز موسم گرما کے بخار میں موثر ہوتی ہے۔

✽ خوراک: - در شکر یا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر - یہ بخار کی بڑی اعلیٰ دوائی ہے اور اکیونائٹ کے بعد اس کی باری آتی ہے۔ جب جلد جسم خشک اور گرم ہو اور پسینہ نہ آتا ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہو۔ گویا بخار سے مریض جل رہا ہے۔ زبان خشک اور سرخ ہو اور ابتدا میں تو مریض کو بے خوابی اور بے چینی رہی ہو۔ لیکن پھر جلدی ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی ہو سلفر اکیونائٹ کی مضمین ہے وریدوں کے ساتھ اس کا ویسا ہی تعلق ہے جیسا کہ اکیونائٹ کا شریانوں کے ساتھ۔ جب ریگر منظر ادویات کوئی اثر نہ کریں اور سورا کا زہر شفا یابی میں حارج ہو۔ جلن ہر جگہ موجود ہو۔ جب علامات پورے طور پر منظر نہ ہوں تو اس دوائی کے دینے سے علامات اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔

✽ خوراک: - نمبر ۳x یا ۶x یا ۳۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد

بیلادونا - یہ دوائی اس وقت منظر ہوتی ہے جب کہ اعصابی آگاہٹ بہت ہو

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھئے صفحہ نمبر ۲۵



ہڈیان شدید اور سر درد ہو کپٹی کی تھریا میں خوب تر پتو ہوں اور بخار نے دماغ پر اثر کیا ہوا ہو۔ آنکھیں سرخ اور پکلی ہوں۔ جلد جسم گرم اور جلتی ہو اور ایسا محسوس ہو گویا جسم سے گرمی کی بھاپ اٹھ رہی ہے اگر پسینہ بھی آتا ہو تو بھی اس سے کوئی آرام نہ آتا ہو۔

بیلہ ڈونا کی مختصر علامات مخصوصہ ہیں۔ عموماً خشک حرارت ہو۔ پیاس بہت تھوڑی ہو یا بالکل نہ ہو۔ مریض پانی سے خوف کھاتا ہو۔ اطراف ٹھنڈے ہوں اور مچن کی سر درد ہو اور خون کا دورہ سر کی جانب ہو بخار رات کو زیادہ ہوتا ہو اکثر اکیونائٹ اور بیلہ ڈونا تو باری باری سے بھی دیتے ہیں لیکن اکیونائٹ میں زیادہ تکلیف چھاتی اور قلب ردل تک محدود ہوتی ہے اور بیلہ ڈونا میں سر میں۔

✽ خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

روائی اونیا۔ سر درد کو اس میں بھی شدید ہوتا ہے لیکن اجتماع خون بیلہ ڈونا جتنا نہیں ہوتا۔ سر درد شدید مانو کہ کپٹیوں کے رستے بھیجا پھٹ نکلے گا اور آنکھوں کے اوپر تیز دروے ہوتی ہوں۔ اٹھنے پر غشی آجاتی ہو۔ منہ خشک اور زبان درمیان میں سفید ہو۔ پیاس بہت ہو یعنی مریض بہت پانی پیتا ہو۔ لیکن دیر دیر کے بعد مریض کو حرکت سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ اگر وہ بے چین ہوتا ہو اور ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ لیکن ایسا کرنے سے اس کی تکلیف میں اتنا اضافہ ہوتا ہو۔ قبض ہو۔

✽ خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس۔ جب بخاروں کی وجہ بارش میں بھیگنا یا نمدار مکانات میں رہائش رکھنا ہو۔ تمام اعضاء میں زردی ہوتی ہوں۔ کمر میں درد بہت ہوتی ہو بے چینی ہو چپ چاپ پڑا رہنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو بھوک ماری گئی ہو۔ خوراک سے نفرت ہو۔ پیاس زیادہ ہو۔ زبان اور منہ خشک ہوں۔ جب بخار تب محرقہ کی صورت اختیار کرنے لگا ہو۔ تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

بہت دیر تک جو ہڑوں میں نہا۔ نے یا تیرنے کی وجہ سے جب بخار ہو گیا ہو۔ تو سانس نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

✽ خوراک ۳۔ ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کیمو میلا۔ دانت نکلانے کے زمانہ میں جو غواض بچوں کو ہوتے ہیں ان کے لیے کیمو میلا۔ نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔ رات کو بخار زیادہ ہوتا ہو۔ ایک طرف کا رخسارہ سرخ اور گرم۔ لیکن دوسری طرف کا زرد اور ٹھنڈا ہو مزاج پڑ پڑا اور اٹھتا ادھر ادھر پھرانے سے بچہ چپ کر جاتا ہو۔ وگرنہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہو۔ اس حال بھی بہت دفعہ بخار کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔

✽ خوراک ۳۔ ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم ایچم۔ جب بخار کا عرصہ لمبا ہو گیا ہو۔ کمزوری بڑھ گئی ہو اور علامات آدھی رات یا بعد از دوپہر زیادتی اختیار کرتی ہوں۔ پیاس بار بار لگتی ہو۔ لیکن مریض پانی تھوڑا تھوڑا پیتا ہو۔ یا صرف ہونٹوں کو تر کر لیتا ہو۔ مریض از حد کمزور ہو چکا ہو۔

✽ خوراک ۳۔ ۳۰ یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پلساٹلا۔ بخار میں پیاس نثار ہو۔ سرگرم۔ ہونٹ خند۔ اور تمام جسم میں سردی لگتی ہو۔ خاص کر بوقت شام۔ سردی اس دوائی کا خاصہ ہے بخار کی وجہ جب مرغن اشیا کا استعمال ہو۔ ذائقہ پھیکا۔ پیاس نثار ہو۔ جاڑا زیادہ لگتا ہو زبان پر سفید فرجی ہوئی ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک ۳۔ ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس وامیکا۔ مریض ہر وقت کپڑے اوڑھے رکھتا ہو بخار کی وجہ گوشت شراب یا دیگر تیز مصالحہ اور اشیا کا بکثرت استعمال ہو۔ قبض ہو۔ یعنی پاخانہ جانے کی خواہش تو ہوتی ہو لیکن آتا نہ ہو منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔

✽ خوراک ۳۔ ۲۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ایٹمی منی کروڈم۔ باضمہ کے فتور کی وجہ سے جب بخار ہو گیا ہو مثلاً زیادہ مرغن اشیا

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھئے صفحہ نمبر ۲۵

کے کھانے یا ترش اشیاء کے زیادہ استعمال سے زبان پر دودھ کی مانند گاڑھی سفید رنگ کی کثافت جمی ہوئی ہو۔ کھانے اور پینے سے نفرت ہو۔ بچوں میں بخار کی زیادتی ہمیشہ رات کو ہوتی ہو۔ غمناکی زیادہ ہو۔

✽ خوراک - ۳ x دن میں چار مرتبہ

## ضروری ہدایات

مریض کو بہت روشنی۔ گرمی۔ شور و غل سے بچنا چاہیے اور نہ ہی بہت سے کپڑے پہننے چاہئیں۔ بستر کے کپڑے بھی بہت موٹے نہیں ہونے چاہئیں اور نہ کوئی دیگر ایسی بات ہونی چاہیے۔ کہ جس سے نیند میں خلل ہو یا بے چینی پیدا ہو۔ مریض کو پانی تھوڑی مقدار میں اور بار بار پلانا چاہیے تاکہ پسینہ آنے میں سہولت ہو۔ یہ بڑی غلطی ہے کہ بخار میں مریض کو پانی نہیں دیا جاتا اس سے مریض کو گھبراہٹ رہتی ہے۔ اس کا خون گاڑھا ہو کر سخت بقیہ رہتی ہے۔ پاشویہ کرنا بھی مفید ہے۔

نوٹ: دیگر ہدایات لمبریا کے بیان میں درج کی گئی ہیں وہاں ملاحظہ ہوں۔

# لمبریا تب سادہ اور لازمی بخار وغیرہ کی ریپرٹری یعنی

## علاج العلامات

Repertory

بیلادونا۔ کینتھرس  
امونیم میور۔ پانی جو جینہ  
ٹیو برکیولا ٹینم

ارنیکا

سردی کمر اور پاؤں میں لگتی۔  
سردی کمر اور کندھوں کے درمیانی مقام  
میں لگتی ہو۔  
سردی دھڑ اور پاؤں میں لگتی ہو۔  
سر اور چہرہ گرم ہوں۔

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب کے لیے دیکھئے صفحہ نمبر ۲۵

سردی ہاتھوں میں لگتی ہو۔  
 { سردی ہاتھوں میں اور کمر میں لگتی ہو۔  
 سردی کے ہمراہ نزلہ ہو۔  
 سردی لگتے وقت کھانسی خشک اور  
 { نہایت تکلیف دہ ہوتی ہو۔  
 سردی کے ہمراہ سر درد ہو۔

سردی اور گرمی باری باری سے  
 لگتی ہو۔

سردی لگتی ہو اور آبکائیاں آتی ہوں  
 سردی لگتی ہو اور خارش ہوتی ہو۔  
 سردی کے ہمراہ جسم دکھتا ہو اور  
 دریں ہوتی ہوں۔  
 سردی لگتی ہو اور دم گھٹتا ہو۔

سردی کے ہمراہ پیاس لگتی ہو۔  
 سردی کے ہمراہ پیاس ندارد  
 کھانا کھانے کے بعد سردی لگتی ہو۔  
 پینے کے بعد سردی لگتی ہو۔  
 سردی ہلنے چلنے سے زیادہ لگتی ہو۔  
 سردی جمع کے وقت زیادہ لگتی ہو۔

ڈراسرا  
 کاکٹس  
 مرکوریس سالو

رٹاکس

کینویریا میجالس  
 ایپس - آر سیلیم - ایپس نگرابیپ ٹیشیا  
 بیلا ڈونا - برائی او نیا - کیو میلا ڈوچی ٹیلس  
 مرکوریس کار - مرکوریس سالو - فائی ٹو لیکا  
 پلساٹلا -

ایگی نیشیا - اپنی کاک  
 میزیریم

بیپ ٹیشیا - رٹاکس  
 آر جنٹم - نائٹریکیم - میگنیشیا فاس - اکیونائٹ  
 آر سیلیم - کاربودیجی -  
 کنویریا - ڈکامارا - اگنیشیا سی کیل  
 سی پیا - وراڈم - ایلم  
 ڈراسرا - جیسی میم - نکس ماشکاٹا - پٹلا  
 میگنیشیا فاس  
 کیپ سی کم  
 آر سیلیم - نکس وامیٹا - پائی جیلیا  
 کلکیریا کارب  
 اکیونائٹ - ایلم - امونیم کارب آر سیلیم  
 سیڈرن - ڈکامارا - میگنیشیا کارب

میگنیشیا فاس - مرکوریس سالو - پلسٹا -  
فاسفورس - سی پیا -

سرور شام کو اور دات کو زیادہ لگتی ہو

## حرارت بخار

حرارت کھلے سے اُپر پڑھتی ہو -

ارے غصے کے بخار چرمھ جاتا ہو -

بخار شام کو موجاتا ہو - حرارت کے

دوران میں مریض موجاتا ہو اور جب

بخار اُتر جاتا ہو تو مریض جاگ اُٹھتا ہو -

ہاتھوں کی ہتھیلیاں گرم ہوں -

پاؤں کے تلوے گرم ہوں -

بخار میں درد توجہ ہو -

بخار بدول پسینہ آنے کے صبح اُتر جاتا ہو -

بخار میں ہڈیاں جو سرد رہیں

بخار میں غنودگی اور ادرادھر ہاتھ پاؤں

مارنا - ٹھنڈی جگہ کی تلاش کپڑا نہ پہن

نہ لینا - قے - اسہال اور تشنچ ہوں

بخار میں سوتے سوتے گرمی خشک

کھانسی ہوتی ہو -

بخار میں جلد جسم خشک رہتی ہو -

پسینہ نہ آتا ہو -

بخار میں بیرونی جسم ٹھنڈا ہو -

بخار میں غشی ہو پسینہ آتا ہو -

بخار میں سرد درد موتا ہو -

بخار میں نفخ ہو اور آنتوں میں پھل ہو -

سی پیا  
کیو میل - سی پیا

کلارڈیم

چنو پوڈیم

کینتھرس

درارٹرم ایلم

جلدی میم

انارڈ کرک - بیلا ڈونا

اوپیم

سمبوکس

ایومین - ٹمس ماشکام

آرینیکم کینتھرس

ڈیجیٹلس - سی پیا - سلفر - سلفورک ایسڈ

رسماکس

ریڈیم

پسٹلا

{ بخار میں چہرہ گرم - کمر میں لرزہ اور پاؤں سرد ہوں -

سٹرامونیم

{ بخار میں چہرہ گرم - ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں -

آرنیکا - فانی ٹو لیکا

{ بخار میں چہرہ گرم - جسم ٹھنڈا اور ضعف اور ناطا قتی ہو -

کیو میلہ

{ بخار میں چہرہ گرم - نہ بچنے والی پیاس ڈالہ کر موات - تشویش اُبکایاں بچینی اور زبان خشک

سمانی سیگریا

{ بخار ہونے سے کئی روز قبل خوب بھوک لگتی ہو -

سیڈرن

{ بخار میں آنکھوں میں خارش ہوتی ہو - ٹانگیں اور بازو ٹٹتے ہوں - جسم سُکی ہو - سر میں درد ہو -

ہیپہ سلفر

{ بخار میں رات کو پسینے آتے ہوں -

کلکیریا کارب

{ بخار میں دل کی دھڑکن ہو اور مقام دل میں تشویش ہو -

نیم مارٹ چینی نم آرس - فانی ٹو لیکا

{ بخار میں ضعف بہت محسوس ہو -

بیلادونا - لیم ٹگرانی نم - پسٹلا - تھوجا

{ بخار میں تمام جسم میں نہیں تڑپتی ہوئی محسوس ہو -

پسٹلا - تھوجا

{ بخار میں تمام جسم میں نبض تڑپتی ہو اور وریدیں پھولی ہوئی ہوں -

کلکیریا کارب

{ بخار میں نیند بے آرام ہو -

ایکونائٹ

{ بخار میں جلد جسم خشک گرم شدہ امین میں اکسائٹ تشویش - بے چینی اور

مریض ادھر ادھر بات پاول مارتا ہو  
بخار میں جسم دکھتا ہو۔

بخار میں تشنج ہوتے ہوں،

بخار میں انگڑائیاں بہت آئیں۔

بخار میں کپڑا اور ہننے کی بہت خواہش ہو۔

بخار میں پیاس بہت لگتی ہو۔

بخار میں پیاس نہ لگتی ہو۔

بخار کی سرت رات کو زیادہ ہو۔

بخار ایام حیض میں ہوتا ہو۔

بخار دوران خواب زیادہ ہو۔

بخار میں بلغم جلد سے تکلیف ہو کیونکہ

مریض کو سردی لگتی ہو۔

ماہ بعد درپہر زیادہ ہوتا ہو۔

ایکونائیٹ

آرنیکا - فانی ٹولیکا - رستاکس

بیلادونا

رستاکس

انیشیا - نکس وامیکا - سمبوس - سلیم

ایکونائیٹ - انیم کروڈم - برائی ادنیا

لارسی ماس - پاشا بیرری بن تھینا

ایسی ٹک ایڈ - ایتھیوزا - بیلادونا -

جلسی میم - انیشیا - میورٹک ایڈ -

نفس ماشکانا - پٹلا

ایکونائیٹ - ایسی کیولس - انیم کروڈم

آرسینک - بیلادونا - کلکیریا کارب - پروکیم

جلسی میم - بہر سلف - کالی سلف - پٹلا

مینگیشیا کارب - فاسفورس - سلیشیا -

سینم - آرنیکا - آرنز

کلکیریا کارب - تھوجا

کلاڈیم

نفس وامیکا

آزاد رختا - بیلادونا - فیرم

## پینہ

پینہ خونی آتا ہو۔

کروڈیلس - لاکس - لایک پوڈیم -

نفس ماشکانا - نکس وامیکا

بیلس کیناڈنس - ایسی ٹک ایڈ -

پینہ ٹھنڈا چھپا آتا ہو

پسینہ ٹھنڈا چھپا آتا ہو۔

پسینہ جھکنا تیل نما آتا ہو۔

پسینہ گرم ہو۔

پسینہ صرف جہرہ یا پیشانی پر آتا ہو۔

پسینہ صرف پاؤں پر آتا ہو۔

پسینہ صرف اعضاء تناسل پر آتا ہو۔

ایٹھیوزا - ایملنائی ٹراس - انیم آکس -  
 انیم ٹارٹ - آر سینکم - ہنز ایک ایڈ -  
 کاکٹس کلکیریا کارب - کلکیریا فاس - کیمفر  
 کینتھرس - کاربوویجی - سنکونا - کورم آرس  
 ڈیجی ٹیس - ڈلکامارا - یوفوریم - انگیشیا -  
 اپی کاک - لاکس - لاراسی راسس -  
 لائیکوپوڈیم - مرکوریس کار - مرکوریس  
 سانیٹس - مرکوریس - سال نٹرم کارب -  
 پانی رو جینیم - سی کیولا سکیل ٹینکم - ٹیری  
 برہ تھینا - وراٹرم ایلم - وراٹرم وراٹرم  
 برائی ادینا - کاربوویجی - چائنا - میلنیشیا -  
 کارب - مرکوریس سالو -

ایسی کیولس - کاربوویجی - کیمویدا - جینوپوڈیم  
 لاکس اوپیم - وراٹرم وراٹرم -  
 کلکیریا کارب - کائیوس - فاسفورس -  
 یوفیرینا -  
 نائٹرک ایڈ - پٹرولیم - سیپیا - سلیشیا

بیلادونا

ایسی ٹک ایڈ - ہنز ایک ایڈ - سائنا -  
 کلکیریا کارب - یوفوریم - فاسفورس - رڈیم  
 سلفر - وراٹرم ایلم  
 کلکیریا کارب - گریفائٹس - مرکوریس سالو  
 پٹرولیم - فاسفورس - سی پیا - سلی شیا  
 پٹرولیم - فاسفورک ایڈ - تقوجا -



کلیریا کارب - سائنا کو نیم - فلورک ایڈ  
 ٹائٹرک ایڈ فاسفورک - سلیشیا -  
 کروکس - سنی کیولا -

ایکونائیٹ

بنز ایک ایڈ - تھوجا  
 تھوجا -

آزاورختا - کلیریا کارب - کیومیل - کالی  
 کارب - نکس و امیکا - سلیشیا -  
 برائی اونیا - کلیریا کارب - چائنا - فلورک  
 ایڈ - ہیرسلف - پٹریلیم - فاسفورس  
 پلسا - سلے نم - سلیشیا - سلفر

{ پسینہ صرف اعضائے تناسل پر آتا ہو -

{ پسینہ صرف جسم کے نچلے حصہ پر آتا ہو -

{ پسینہ جس پلو مریض لیٹے اس پلو پر  
 آتا ہو -

{ پسینہ جس پلو مریض لیٹے اس پر نہ آتا  
 ہو بلکہ دوسرے پر آتا ہو -

{ پسینہ آن ڈھکے رنگے حصوں پر آتا ہو -

{ پسینہ اوپر کے دھڑ پر آتا ہو -

{ پسینہ اوپر کے دھڑ پر آتا ہو -

## تب محرقہ میعادنی بخار

TYPHOID FEVER  
 Enteric Fever

یہ ایک قسم کا میعادنی بخار ہے جس کی میعاد عموماً اکیس دن تک گنی جاتی ہے راگرچہ  
 ہو میو مٹیک علاج نے اس کی میعاد میں نمایاں کمی کر دی ہے، اس بخار میں انتڑیوں پر  
 زیادہ اثر ہوا کرتا ہے اور سفید دانے خنثا کی مانند جسم پر نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ دانے  
 عموماً چھاتی - پیٹ اور پشت پر نظر آتے ہیں - کمزوری سخت ہو جاتی ہے - دہلنے سے  
 شکم درد کرتا ہے اور انتڑیوں میں سوزش واقع ہو کر دکھنے لگتی ہیں - اسہال عموماً  
 متعفن و بدبودار آیا کرتے ہیں - یہ بخار متعدی ہوا کرتا ہے -

اسباب مرض - اس بخار کا ذہر گندے پانی کی مٹانڈ میں پیدا نہیں ہوتا - بلکہ

یہ سڑاند اس زہر کے پھیلانے اور ترقی دینے میں مددگار معاون ہوا کرتی ہے۔ اس بخار کا زہر مریض کے بول و براز میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ پینے کے پانی میں کسی وجہ سے پہنچ جاتا ہے اور تندرست اشخاص جب وہ پانی پیتے ہیں۔ تو ان کے اندر یہ زہر داخل ہو کر اس بخار کے پیدا کرنے کا موجب ہوا کرتا ہے۔ یا یہ زہر کھیاں مچھر وغیرہ پھیلاتے ہیں۔ بیمار کے بول و براز پر بیٹھ کر اس بیماری کے اجزاء اپنے ساتھ لے جلتے ہیں اور پھر اشیاء خوردنی اور پوشیدہ فی پر بیٹھ کر یہ اجزاء ان میں داخل کر دیتے ہیں اور پھر اس سے یہ مرض پھیل جاتا ہے۔

موسم خزاں میں یہ بخار زیادہ ہوا کرتا ہے۔ بچوں اور جوان کو یہ زیادہ ہوتا ہے چالیس سال سے زیادہ عمر والے اشخاص اس میں بالعموم کم مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

**علامات مرض** ان علامات کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں :-

اول وہ علامات جو زمانہ نقصانت یعنی بیماری کے جسم میں پوشیدہ رہنے کے زمانہ میں پیدا ہوتی ہیں۔

**دوم:** وہ علامات جو مرض کے دور میں پیدا ہوتی ہیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس بخار کا زہر یکایک حملہ کر دیتا ہے اور ابتداء سے ہی بخار اپنا دورہ شروع کر دیتا ہے۔ زمانہ نقصانت کی علامات پیدا نہیں ہوتیں لیکن سوائے اس حالت کے عموماً مرض کے جسم میں پوشیدہ رہنے کی علامات یہ ہوا کرتی ہیں۔ زمانہ نقصانت مرض قریباً دس دن یا اکیس دن تک ہوا کرتا ہے اس اثنا مریض سست و کابل رہتا ہے کسی کام کے کرنے کو دل نہیں کرتا اور کبھی کبھی جاڑہ معلوم ہوتا ہے۔ بیمار آگ کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا کمر میں خفیف درد اور ٹانگیں چلنے پھرنے میں ڈنگاتی ہیں۔ بھوک کم ہو جاتی ہے جی مٹلاتا ہے۔ اور مریض مرلی معلوم ہوتا ہے۔ زبان سفید تنفس بہ بودار اور اکثر گلے میں درد بار بار پاخانہ یا پیچے دست آتے ہیں۔ نبض کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور نیند میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ یہ علامات آہستہ ترقی کرتی جاتی ہیں اور مریض کو اتنا کمزور کر دیتی ہیں کہ بیمار اب بستر پر لیٹ جاتا ہے۔ سہولت بیان کے لیے اس مرض کی ہفتہ وار علامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔

**پہلے ہفتہ میں**۔ موٹی موٹی علامات یہ ہوا کرتی ہیں۔ بخار روز بروز تیز ہوتا

جاتا ہے۔ نبض بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں نو سے یا اس سے زیادہ تیز جلتی ہے جلد کی حرارت تیز ہو جاتی ہے اور پیاس زیادہ لگتی ہے۔ دل کی شکلیاں مدہم پڑ جاتی ہیں۔ بیمار اپنی بیماری کا حال صاف طور پر نہیں کہہ سکتا اور دریافت کرنے پر صرف سر کے متعلق شکایت کرتا ہے۔ شکم بڑھ جاتا ہے اور ٹوٹنے سے سخت آواز پیدا کرتا ہے اور دہانے سے درد کرتا ہے۔ خاص کردار میں طرف جس مقام پر چھوٹی انتڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اور بڑی انتڑیوں کا شروع ہوتا ہے اس مقام کو دہانے سے انگلیوں کے نیچے گڑ گڑا ہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس مقام کو انگریزی میں ال ایک فوسا کت ہیں کیونکہ یہ مقام بہت دکھاؤ ہوتا ہے اس لیے یہاں زیادہ زور سے نہیں دہانا چاہیے۔ کبھی کبھی ریض کو کبیر پھوٹ آتی ہے۔ اور قوتِ سماعت کمزور پڑ جاتی ہے۔

**چھٹے روز**۔ جسم پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں اور تعداد میں یہ چند ہی ہوتے ہیں۔ مریض کو رات کے وقت عموماً ہڈیاں ہوا کرتا ہے۔ اس مرض میں بخار کی حالت بھی قابلِ ذکر ہے۔ بخار درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہے اس کا مفصل ذکر آگے پہل کر کیا جائے گا۔ زبان پر سفید فرجی ہوتی ہے لیکن اس کی نوک اور کنارے صاف اور سرخ ہوتے ہیں۔ اس عرصہ میں بیمار کو عموماً قبض کی شکایت رہتی ہے۔ لیکن کبھی اسہال بھی جاری ہو جاتے ہیں۔

**دوسرے ہفتہ میں**۔ مذکورہ بالا تمام علامات شدید ہوتی جاتی ہیں۔ بخار تیز ہوتا جاتا ہے اور نبض بھی تیزی سے جلتی ہے یہاں تک کہ کمزوری اور نقابہ بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ گوشہ اور چربی جسم کی گھل گھل کر جسم ڈبلا ہوتا جاتا ہے پیشاب مقدار میں کم ہو جاتا ہے اور رقیق ہو کر وزن میں بڑھ جاتا ہے۔ چونکہ اس میں یوریا خارج ہوتا ہے اس لیے اس کی اسپیسفک گریوٹی مخصوص وزن بڑھ جاتا ہے۔

اس ہفتہ میں اسہال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات پانچ پانچ چھ چھ پچیس گھنٹوں میں آجاتے ہیں سُن کی رنگت پیلی یا سیاہی مائل ہوتی ہے۔ ان میں پت خارج نہیں ہوتا۔ چھپچھرے خارج ہوتے ہیں۔ لیکن پچیس فی صد مریضوں میں قبض ہوتی ہے اور دست نہیں آتے۔ اس ہفتہ کے اخیر میں دہانے سے نیوٹروفیلوں کو دہانے

خون ہو جاتا ہے۔ انٹریوں میں جہاں زخم تھے وہاں سے خون بہنے لگتا ہے۔  
 تیسرے ہفتے میں۔ کمزوری اور نفاہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بیمار شیت  
 کے بل لیٹا رہتا ہے اور اپنے پاؤں کی طرف پھسلتا جاتا ہے۔ بیمار میں اپنی حالت  
 برقرار رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ زبان خشک اور بھونسل یا سترج اور چمکیلی اور اکثر  
 اوقات کھروری اور سخت پڑانے چمڑہ کی مانند ہو جاتی ہے۔ مثلاً اخراج بول نہیں کر  
 سکتا۔ اس لیے پیشاب، عموماً رک جاتا ہے اور پاخانہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ برہ پن  
 کی علامات ذرا تیز ہو جاتی ہیں۔ بیمار کے ہوش و حواس اتنے کمزور پڑ جاتے ہیں کہ وہ  
 اپنے دوستوں کو شناخت نہیں کر سکتا لیکن اس ہفتہ میں بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے  
 اور عموماً اکیس یوم کے بعد اتر جاتا ہے۔

جب مرض خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو موت عموماً تیسرے ہفتہ کے  
 اخیر میں واقع ہوا کرتی ہے۔

اقبال ہفتہ کے اخیر یا دوسرے ہفتہ کے آغاز میں سفید رنگ کے  
 جسم پر چھانٹ گول باریک دانے جسم پر نکل آتے ہیں اور تپ محرقہ کے تشخیص  
 کرنے میں بڑے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ یہ دانے بالعموم سینہ یا شکم پر نمودار ہوئے  
 ہیں۔ تعداد میں یہ چند ہی ہوتے ہیں۔ ان گول دانوں کی تعدادیں کمی یا بیشی تپ محرقہ کی  
 سختی یا نرمی کا کوئی ثبوت نہیں ہوا کرتی۔

ڈاکٹر ایکس صاحب فرماتے ہیں۔ کہ ان دانوں کا روزانہ ظاہر ہونا اور ذرا  
 دبانے سے پھر غائب ہو جانا اور اسی طرح۔ سے تین یا چار یوم تک متواتر ظاہر ہونے  
 رہنا تپ محرقہ کی خاص علامات میں سے ہے۔

جب دانے اول روز آشکارا ہوں۔ تب یہ فیصلہ کر لینا کہ یہ تپ محرقہ ب  
 درست نہیں ہے۔ البتہ اگر متواتر تین چار یوم تک نکلنے اور غائب ہوتے رہیں۔  
 تو پھر تپ محرقہ میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ لیکن بعض مریضوں میں یہ دانے اول  
 سے اخیر تک ظاہر ہی نہیں ہوتے اور نہ کبھی نظر آتے ہیں۔ اکثر مریضوں میں بہت  
 باریک خشتا مس کے دانوں سے بھی زیادہ باریک سفید سفید دانے گردن۔ سینہ۔  
 پیٹ اور جنگا سہ پر نکل آتے ہیں۔ ان کو موتی جھرا پنجابی میں مبارکی کہتے ہیں۔ یہ بھی

بیان کر دینا مناسب ہے کہ موتی جھڑا کے دانے کیا ہیں۔ یہ ایک گرم کا زہر ہے جو قدرت جسم سے خارج کرنا چاہتی ہے۔ اس زہر کے خارج کرنے میں قدرت کو ہر طرح سے مدد دینی معالج کا پہلا فرض ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ بیمار کے جسم کو روزانہ صاف کیا جائے۔ اس کی ترکیب آگے چل کر بتائی جائے گی۔ اور اگر شک ہو کہ مبار کی اچھی طرح سے نہیں نکلی۔ یا ابھی یہ زہر جسم میں پوشیدہ ہے۔ تو دوائی دے کر اس کو نکلنے میں مدد دینی چاہیے جو میوٹھی میں ایسی بہت سی ادویات ہیں جو کہ آبسانی اس زہر کو باہر نکال دیتی ہیں اور بیمار کی جان بچ جاتی ہے۔ اس زہر کا جسم سے خارج ہونا مبارک نشان سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے پنجابی میں اس کو مبارکی کہتے ہیں۔

چوتھے ہفتے میں اکثر آرام آنا شروع ہو جاتا ہے اور بخار آہستہ آہستہ اترنے لگتا ہے۔ دست آنے بند ہو جاتے ہیں اور بیمار کی زبان صاف ہو جاتی ہے اور جھوک لگتی ہے۔ بعض اوقات بخار اترنے پر ٹہننے والا ہو جاتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بالکل اتر جاتا ہے۔ غرضیکہ پانچویں اور چھٹے ہفتے میں صحت کامل ہو جاتی ہے۔

## جسم صاف کرنے کی ترکیب

ایک برتن میں گرم یا تازہ پانی دھبیا کہ موسم ہو لینا چاہیے اور بیمار کو کمرہ کے اندر لے جا کر کمرہ کی کھڑکیاں اور دروازے بند کر دینے چاہئیں۔ ایک صاف ستھرا تولیہ لے کر اس کو پانی میں بھگو کر اور پنجوڑ کر اس سے آہستہ آہستہ بیمار کے جسم کے ہر ایک حصہ کو صاف کرنا چاہیے۔ پانچ دس دفعہ جسم پر ملنے سے جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس صاف شدہ حصہ جسم کو دوسرے سوکھے تولیہ سے پونچھ کر دھانپ دینا چاہیے اور اس ترکیب سے سارا جسم صاف کر دینا چاہیے۔ اور بیمار کو صاف ستھرے کپڑے پہنا دینا چاہئیں۔ ایسا کرینے سے ایک، تو زہر جسم سے دور ہو جاتا ہے اور دوسرے بیماری کی سختی اور بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے اس زہر کے خارج ہو جانے سے مریض کو بڑیان کے مرض میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حالت عامہ تسلی بخش ہو جاتی ہے۔

بخار۔ تپ محرقہ کا بخاریکا یک تیز نہیں ہو جاتا۔ یہ آہستہ آہستہ تیز ہوتا ہے مثلاً پہلا روز صبح کو بخار کی حرارت تھی۔ شام کو اس کی نسبت ایک یا دو ڈیڑھ درجہ تیز ہو جاتی ہے لیکن پھر صبح کو بہ نسبت شام کے تو حرارت کم ہوتی ہے لیکن گزشتہ صبح کی نسبت قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح سے دوسری شام کو گزشتہ شام کی نسبت بخار تیز ہو جاتا ہے اور اسی ترتیب سے یہ بخار بتدریج بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ چوتھے یا پانچویں دن ۱۰۲ - ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر رڈن صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ تپ محرقہ کے بخار کی پہچان ہی یہی ہے کہ یہ بتدریج بڑھتا ہے۔ اگر چوتھے یا پانچویں روز ۱۰۲ یا ۱۰۴ درجہ تک نہ پہنچ جائے تو اس کو تپ محرقہ نہ سمجھنا چاہیے اور اسی طرح سے اگر بخار ابتداء میں ایک دو روز کے اندر ہی ۱۰۳ یا ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جائے تو بھی اسے تپ محرقہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ اور کوئی بخار سمجھنا چاہیے۔ بخار کا بڑھنا اور گھٹنا تپ محرقہ کی تشخیص میں بڑا پُر معنی ہوا کرتا ہے پس اگر دوسرے ہفتہ میں بخار کی یہ حالت ہو جائے کہ صبح کو بہت کم اور شام کو بہت تیز تو اس کو سخت یا بی کا نشان سمجھنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اب بخار زیادہ طول نہیں کھڑے گا اور اگر بخار کا وقت بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر حرارت فوراً گر جاتی ہے خواہ دن کے کسی حصہ میں ہو تو اس کو اچھی علامت سمجھنا چاہیے اور اگر کوئی برخلاف اس کے دوسرے ہفتہ میں حرارت تیز رہے اور کم نہ ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مرض کا حملہ سخت ہے اور اس کا دورہ لمبا ہے۔

تپ محرقہ کا بخار جس طرح سے بتدریج بڑھتا ہے۔ عام طور پر اس طرح سے بتدریج گھٹتا ہے۔ دوسرے ہفتہ کے بعد جب یہ گھٹنا شروع ہو تو جس طرح میٹر ہی بہ میٹر ہی اول ہفتہ میں بتدریج تیز ہوا گیا تھا۔ اسی طرح گھٹتا جاتا ہے حتیٰ کہ بالکل اتر جاتا ہے بخار کا یہ ایک گم ہو جانا۔ اسہالوں کی بدولت یا جریان خون کے سبب سے ہوا کرتا ہے۔ جب اسہال بہت آئیں یا جریان خون بہت ہو تو حرارت جسم کم ہو جاتی ہے۔

خطرناک مرض۔ ۱۔ جریان خون۔ انٹریوں میں جو زخم ہوتے ہیں۔ ان سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ یا کسی زخم کے مقام سے شریان یا ورید چھد جاتی

ہے اور اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ اخراج خون اتنا کثیر ہوتا ہے کہ فوراً موت واقع ہو جاتی ہے یا جریانِ خون کے باعث کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ بیمار مارے ضعف و نقاہت کے جانبر نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات جریانِ خون کے بغیر ہی بیمار کا رنگ سفید پونی ہو جاتا ہے اور غشی کی حالت میں جان بحق تسلیم ہو جاتا ہے ایسے بیمار کی لاش کو چیر پھاڑ کرنے سے انٹریوں میں خون منجمد پایا جاتا ہے۔

۲۔ سمیت خون سب سے زیادہ خطرناک حالت ہے اس حالت میں بیمار کو بستر پر آرام کرنا لازم ہے پھر ناسخت ممنوع ہے ڈاکٹر بارلٹ صاحب کا تجربہ ہے کہ اگر ابتداء سے ہی مریض بستر پر لیٹ جائے تو اس خطرہ سے بچا رہتا ہے۔ بافراط پانی پینا بھی مفید ہوتا ہے۔

۳۔ اسہال بے شمار کھلے اور بے تحاشا اسہال بھی اس مرض میں خطرناک علامت گنی جاتی ہے۔ اس لیے اس کا ہر موقع علاج کرنا مناسب ہے۔

۴۔ پرفیوریشن۔ چوتھا خطرہ انٹریوں کے چھد جانے کا ہے۔ اس کو انگریزی میں پرفیوریشن کہتے ہیں اور پردہ صفاق میں ورم ہو کر جس کو انگریزی زبان میں پیری ٹو نائٹس کہتے ہیں۔ ملک نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اکثر دوسرے میسرے ہفتے میں ہوتا ہے اکثر اوقات یہ اُن ایام میں ہوتا ہے جب کہ مرض زیادہ طول پکڑ جائے اس کی علامات یہ ہوا کرتی ہیں کہ شکم میں یکایک درد اور سوجن کم و بیش ابکائیاں اور قے۔ چرو کے خط و خال میں نمایاں تبدیلی۔ ایسی حالتوں میں ایک دو روز میں موت واقع ہو جایا کرتی ہے۔

۵۔ اجتماعِ خون۔ پھیپھڑوں میں اجتماعِ خون کے باعث بروز نکائٹس پوری (ذات الجنب) نمونیا (ذات الریہ) وغیرہ وغیرہ عوارض پیدا ہو جاتے ہیں یا جراثیم ٹو برکل جو پے مخفی حالت میں تھے۔ اب جاگ اُٹھتے ہیں اور ملک نتائج پیدا کرتے ہیں۔

۶۔ مرض کا عود کر آنا۔ اکثر غذا میں بد پرہیزی کرنے یا بہت جلدی بستر پر سے اُٹھ کر باہر چلا جانے کے باعث مرض پھر عود کر آتا ہے اور خطرناک ثابت ہوتا ہے۔

## علاج

چونکہ یہ بیماری اپنا دورہ ایک جیسی حالت میں نہیں رکھتی بلکہ بعض کیس ایسے دیکھنے میں آتے ہیں کہ بدول کسی خوفناک علامت پیدا ہونے کے نتیجہ نہایت مہلک ثابت ہوتا ہے اس مرض کے علاج میں اس قدر مختلف حالتوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ تقریباً تمام ادویات جن کا ذکر پرکٹس آف میڈیسن میں آتا ہے مستعمل ہوتی ہیں۔

مختصر علاج ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

شروع مرض میں۔ بیپ ٹیشیا۔  
سخت نقاہت میں۔ آرٹک۔ میوٹک ایڈ وغیرہ۔  
اسہال میں۔ آرٹک ورائٹم ایلم (بے تحاشہ اسہالوں کی حالت میں) اپیکاک۔  
کار بوویجی۔ سروپانی سے بھیگا ہوا چارتہ شدہ کپڑا پیٹ کے اوپر رکھنا بڑا مفید ہے۔

قبض کی حالت میں۔ برائی اونیا۔  
انٹریوں سے اجزائے خون۔ ٹیری بن تھینا۔ ناسٹرک ایڈاپی کاک۔ ہماہلس  
سیکیل وغیرہ۔

مرض کے بعد کمزوری کی حالت میں۔ فاسفورک ایڈ۔ اگنیشیا۔ فرم۔ سفر۔  
چائنا۔ نکس واما۔

پیری ٹوٹائٹس۔ یعنی پردہ صفاق کے متوہم ہونے کی حالت میں (کالوسنتھ۔ مرکوریس  
کار۔ آرسینک کار بوویجی۔

## علاج

بیپ ٹیشیا۔ جب یہ شک پیدا ہو جائے کہ تپ حرہ کا آغاز ہے تو یہ دوائی دینی چاہیے اور یہ دوائی اکیر کا حکم رکھتی ہے اس دوائی کے دینے سے تپ حرہ کی میعاد گھٹ جاتی ہے۔ بعض اوقات بخار بالکل ہی صاف ہو جاتا



ہے۔ یہ دوائی تپ محرقہ کے زہر کو مارتی ہے۔ اس بخار میں اکیونائٹ کارآمد نہیں ہوتی کیونکہ یہ اس بیماری کے زہر کو ہلاک نہیں کر سکتی۔

لنڈن کے ڈاکٹر بائیز صاحب پورے وثوق سے تجربہ کی بنا پر کہا کرتے تھے کہ اگر ابتداء سے ہی ہومیو پیتھک علاج کیا جائے تو تپ محرقہ کا دورہ کم ہو سکتا ہے۔ اور بیپ ٹیشیا دوائی اس مطلب کیلئے پوری مددگار ہو کر رہتی ہے۔ تمام ہومیو پیتھک ڈاکٹر اس کی تائید کرتے ہیں۔ ہم بھی ذاتی تجربہ کی بنا پر اس امر کی بڑے زور سے تصدیق کرتے ہیں۔

**بیپ ٹیشیا کی خاص علامات یہ ہیں۔** کاہلی۔ پریشان چہرہ مانو کہ نشہ پیے ہوئے ہے۔ یہ بیپ ٹیشیا کی خاص علامت چہرہ کی ہے مریض اپنے آپ کو تھکا ٹوٹا پاتا ہے۔ اس کا تمام جسم دکھتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے اور نرم جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر کر دیتا رہتا ہے مریض کا دل زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ بہ نسبت اس کی جسمانی بے چینی کے۔

آنکھیں وزنی اور بھدی ہوتی ہیں۔ مریض کو اکثر بذیان رہتا ہے اور اس میں جو ایک خاص علامت ہوا کرتی ہے وہ یہ کہ مریض خیال کرتا ہے کہ اس کا جسم بکھرا ہوا ہے اور اس لیے وہ اپنے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بستر کے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور ساتھ ہی مریض کو نقاہت بدرجہ کمال ہوا کرتی ہے زبان کے میاں میں بھوسہ لکیر ممتی ہے۔ دانتوں کے اوپر میل جمی ہوتی ہے۔ تنفس بدبودار ہوتا ہے اور تمام مواد مثلاً پیشاب و پاخانہ وغیرہ جو کہ مریض کے جسم میں سے خارج ہوتے ہیں وہ نہایت ہی متعفن ہوتے ہیں۔ حرارت جسم تیز اور ساتھ ہی نبض بھی تیز ہوتی ہے اور چھوٹی و بڑی انٹریوں کے ملاپ کی جگہ پر جس کو انگریزی میں ان ایک نوں سلکتے ہیں۔ دکھن سی ہوتی ہے۔ چہرے کی خاص صورت دل کی خاص حالت اور تمام موادوں کے تعفن کو مد نظر رکھتے ہوئے بیپ ٹیشیا دوائی کے دینے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔

✽ خوراک نمبر ۱ x یا ۶ x یا ۱۲ x یا ۲۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس - یہ دوائی بھی تپ محرقہ میں نہایت ہی مؤثر ہوا کرتی ہے۔ مریض

بے چین رہتا ہو۔ زبان بھوری اور عضلات دھکتے ہوں۔ بیپ پیشیا میں بھی یہ دونوں علامتیں ملا کرتی ہیں۔ لیکن رٹاکس کی بے چینی زیادہ جسمانی ہوا کرتی ہے۔ زبان کے سرے پر کمزوری شکل کا نشان رٹاکس کی ایک خاص علامت ہے جو کہ بیپ پیشیا میں نہیں پائی جاتی۔ مریض بے ہوشی میں بڑبڑاتا ہے اور نہ ہر خورائی کے قدر کے مارے دوائی لینے سے انکار کرتا ہے۔ اکثر سرور و کرتا ہے اور ناک سے خون جاری ہوتا ہے۔ جس کے جاری ہونے سے سرور کا آرام معلوم ہوتا ہے پیٹ تنا ہوا اور چھوٹی بڑی انٹریوں کے ملاپ کی جگہ پر دھکتا ہے کمر اور اعضا میں درویں ہوتی ہیں۔ جب سرور و نہایت شدید ہو تو یہ دوائی نہایت مضر ہوا کرتی ہے۔ جب تپ محرقہ میں اسہال آتے ہوں اور رات کو خاص کر نیم شب کے بعد مرض میں زیادتی اور بے چینی زیادہ ہوتی ہوں تو رٹاکس دوائی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۳ یا ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی ادنیا - تپ محرقہ میں یہ دوائی خاص درجہ رکھتی ہے اور تپ محرقہ کے بہت زیادہ کیسوں میں یہ مضر ہوا کرتی ہے۔ برائی ادنیا کے علامات مخصوصہ یہ ہیں۔ تمام جسم بہت دھکتا ہو۔ تھکا ٹوٹا ہو خفیف سی حرکت بھی تکلیف دہ ہوتی ہو اس لیے ذرا حرکت کرنے سے بھی مریض خوف کھاتا ہو پیشانی میں پھاڑنے والا اور جان کنی کا سا درد ہوتا ہو جس میں حرکت کرنے سے زیادتی ہوتی ہو۔ شام کو چہرہ سرخ ہو جاتا ہو۔ صبح کو سر بھر پور ہو جاتا ہو اور مابعد میں کسیر بھوٹ آتی ہو میند میں آرام نہ ہوتا ہو اور مریض ایسا خیال کرتا ہے کہ وہ گھر پر نہیں ہے اور اس لیے وہ گھر جانے کی ضد کرتا ہے۔ پیاس بہت لگتی ہو یکسے لمبے لمبے عرصہ کے بعد جب پیاس اس قسم کی موجود ہو تو برائی ادنیا کی خاص علامت سمجھنی چاہیے برائی ادنیا میں عموماً قبض ہوا کرتا ہے اور بعض ڈاکٹروں کا یہ قول ہے۔ کہ جب اسہال آنے شروع ہو جائیں تو پھر برائی ادنیا مفید نہیں ہو سکتی۔ یہ دوائی مرض کے ابتداء میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ پیشتر اس کے قبض یا اسہال کی وجہ سے قوت زیست و زندگی کی طاقت بہت کمزور ہو چکی ہو رٹاکس اور برائی ادنیا میں نمایاں فرق یہ ہے کہ رٹاکس عموماً اسہال میں کام آتی ہے اور برائی ادنیا قبض میں۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۶۵

✽ خوراک - نمبر ۳ یا ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد -

آرنیکا - اکثر اوقات یہ دوائی بھی تپ محرقہ میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے اس کی کئی علامات بیپ ٹیشیا اور رسٹاکس کے ساتھ ملتی ہیں - لیکن اس کی اپنی خاص علامات بھی ہیں - بیپ ٹیشیا کی مانند یہ دوائی مرض کے ابتدا میں منظر نہیں ہوتی غنودگی سی ہوتی ہے اور مریض ہر ایک بات سے لا پرواہ ہوتا ہے سوال کا جواب دیتے دیتے وہ سو جاتا ہے - سرگرم اور باقی جسم سرد ہوتا ہے تمام جسم دکھتا ہے اور مریض نرم جگہ کی تلاش میں بستر پر کرومیں بدلتا ہے پاخانہ اور پیشاب بے اختیار نکل جاتے ہیں - جسم پر (اُپرے) بستر کے زخم اور سپاہ چٹاخ پڑ جاتے ہیں -

مندرجہ ذیل تین علامات آرنیکا کی خاص ہیں :-

۱- تمام جسم کا دکھنا

۲- جسم پر چٹاخوں رخونی نشانات کا ہونا -

۳- پیشاب اور پاخانہ کا بے اختیار نکل جانا

اور کسی دوائی میں مذکورہ بالا تینوں علامات اکٹھی نہیں پائی جاتیں - اس دوائی کو رسٹاکس اور برائی اوپیا کے بین بین سمجھنا چاہیے -

✽ خوراک - نمبر ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد

آرسینیکم - جب مرض گہرا ہوا معلوم ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے مرض کے ابتدا میں نساؤناور ہی منظر ہوتی ہے - اگرچہ بعض ڈاکٹر مرض کے ابتداء سے اخیر تک اس دوائی پر بھروسہ رکھتے ہیں - خطرناک نقاہت کے ہمراہ جب بے چینی و تشویش شامل ہوں - تو یہ علامات اس دوائی کی مخصوصہ سمجھنی چاہئیں -

مریض کمزور اور بے ہوش سا اور تھکا ہوا ہوتا ہے اور اکثر اس کو سرد پسینہ (تریلی) ہمارا تھلا ہے اور ہڈیاں ہوتی ہیں - اور منہ اور دانتوں پر میل جمی ہوتی ہے - منہ میں زخم ہوتے ہیں اور اسہال سیاہ اور بدبودار آتے ہیں - حرارت بخار تیز ہوتی ہے اور آرسینیکم کی مخصوص ہائیس موجود ہوتی ہے - یعنی مریض بار بار پانی پیتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی بے چینی آرسینیکم اور رسٹاکس دونوں میں ملا کر قی ہے لیکن آرسینیکم کی بے چینی نقاہت اور

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

ولی تشویش کے باعث ہوتی ہے اور رستائیں کی بے چینی عضلات کے دیکھنے کے لیے آرسینکیم کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ مرض کا زور نیم شب کے بعد بڑا کمزور ہے زبان کا لکھنائی درجہ کا سرخ ہونا اس دوائی کی بلاشبہ خاص علامت ہے المختصر جب مندرجہ ذیل علامات پیاس - ماندگی - سرخ زبان - کمال کی نقابت - اسہال اور ولی بے چینی موجود ہوں تو پھر آرسینکیم دوائی کے منظر ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا -

✽ خوراک - نمبر ۳ یا ۴ ہر دو گھنٹہ کے بعد -

چائنا - چائنا اور آرسینکیم کی نقابت ایک جیسی ہوتی ہے لیکن چائنا میں شکم کی تناوٹ بھی ساتھ ہوتی ہے - جب نقابت کے ہمراہ شکم کی شکایات زیادہ تکلیف دہ ہوں - تو چائنا دوائی منظر ہوا کرتی ہے - نیز جب مرض کا آرام ہو چکا ہو تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے چائنا ایک بہتر دوائی ثابت ہوتی ہے -

✽ خوراک - نمبر ۱ یا ۲ دن میں چار مرتبہ

کاربوئیکی - جب مرض زیادہ بڑھ چکا ہو اور جسم کی تمام طاقتیں جواب دے رہی ہوں اور مریض موت کے دروازے پر پہنچ چکا ہو نبض کم ہو اور جسم سرد ہو ٹانگیں اور پاؤں خاص کر گھٹنوں کے نیچے سرد ہوں - اور تمام فضلات جو جسم سے خارج ہوتے ہوں - نہایت بدبودار اور بمقدار کثیر ہوتے ہیں -

علامات مخصوصہ یہ ہیں - سخت نقابت ہوا کی طلب مریض ہی چاہتا ہے کہ اس کو نیکھ لے جاؤ) بانو اور ٹانگیں ٹھنڈی اور سرد پسینہ سے اکثر تر اندر کو دبا ہوا مردنی سا چہرہ جسم کی رنگت نیلگوں - جابجا جسم پر خون کے سیاہ دھبے نمودار

✽ خوراک - نمبر ۳ یا ۴ ہر نیم گھنٹہ کے بعد -

میوہ آمک ایسڈ - یہ دوائی بھی مرض کے آخری درجہ میں کامد ہوتی ہے نقابت کمال - تنفس نہایت بدبودار اور تمام رطوبتی جھلیوں کا زخمی ہونا اس دوائی کی خاص علامت ہیں - لعاب دہن کے غدود نرم اور سوجھے ہوئے ہوں اور منہ بہت دکھتا ہو - مریض کمزور ہو کہ وہ بستر کے پائنتی کی طرف کھسکتا جاتا ہو - زبان اتنی خشک ہوتی ہے کہ منہ میں کھڑکھڑ کرتی ہے - اسہال آبی آتے ہیں اور پیشاب کھتے وقت دست بھی نکل جاتا ہے - دل کی

✽ دوائی کی خاص مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

دھڑکن کمزور اور ہر تیسری دھڑکن کے بعد نبض غوطہ کھا جاتی ہے۔ پاؤں کے ٹخنے سوج جاتے ہیں۔ مدہوشی بھی ہو جاتی ہے۔

✽ خوراک نمبر ۳۰ یا ۳۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کالی فاسفوریکم۔ زبان خشک اور جھونسل۔ گھٹے بدبودار اسہال۔ سخت نفاہت کمزوری۔ نبض متفص بدبودار۔ دانتوں کے اوپر میل۔ دلی حالت نہایت پست اور ہڈیاں یہ سب کالی فاس کی علامتیں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ خون تپ محرقہ کے زہر سے پر ہے ہے تمام فضلات نہایت بدبودار ہوں۔

✽ خوراک نمبر ۳۲ یا ۳۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم۔ یہ دوائی اکثر ابتدا میں کام آتی ہے اور خاص کر نرم کیسوں میں مستعمل ہوتی ہے۔ مریض کا تمام جسم دکھتا ہو۔ گویا کہ کوٹ کر دھریا ہے۔ حرکت کرنے سے ڈر لگتا ہو۔ سردرد۔ مدہوشی۔ سرخ چہرہ اور اعصابی علامات خوب آشکارا ہوں۔ مریض سست اور در ماندہ سا معلوم دیتا ہو اور وہ اپنی بیماری کی کچھ لمبی چوڑی شکایات نہ کرتا ہو۔ آنکھوں کے چہرے گرے رہتے ہوں۔ اور سستی و غنودگی طاری رہتی ہو۔ یہ اس دوائی کی علامت مخصوصہ ہے۔ لڑکھڑاہٹ بھی اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔ مریض ٹنڈ محسوس کرتا رہتا ہو۔ نبض بھری ہوئی اور خوب رواں چلتی ہو لیکن ایکو نائیٹ کی مانند سخت نہ ہو۔ عام طور پر جلسی میم دوائی بیپ ٹیشیا سے پہلے دی جاتی ہے دونوں کی علامات ملتی جلتی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ جلسی میم کی علامات نرم ہوا کرتی ہیں۔ ڈاکٹر نیش کا قول ہے کہ بیپ ٹیشیا اس وقت منظر ہوتی ہے جب کہ جسم دکھتا بہت ہو اور جلسی میم اس وقت جب کہ ماندگی بہت ہو۔

ڈاکٹر جوئسز بیپ ٹیشیا کے مقابلہ میں جلسی میم کو ترجیح دیا کرتے تھے اور جلسی میم نمبر ۶ طاقت میں استعمال کیا کرتے تھے۔

✽ خوراک نمبر ۱ یا ۲ یا ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورک ایسڈ یا ایسڈ فاس۔ جب حواسِ خمسہ کی قوتیں پست پڑ چکی ہوں مریض چپ چاپ اور ادگر دسے بے خبر پڑا رہتا ہو۔ لیکن ذرا سا بلانے سے

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

بھٹ ہوشیار ہو جاتا ہو اور بڑی عقل سے ہر ایک بات کا جواب دیتا ہو تو یہ دوائی مظهر ہوا کرتی ہے۔ نکیر کا آنا اور شکمی نقائص کا ہونا اس دوائی کی علامات میں سے ہیں۔ شکم تپ ہوا اور پھولا نہا اور پیٹ میں گڑ گڑاہٹ بہت ہوتی ہو۔ اسہال بدول درو کے آتے ہوں اور اکثر نا معضم شدہ غذا اسہال میں خارج ہوتی ہو۔ انتڑیوں سے جریان خون بھی ہوتا ہو۔ آر سینک۔ بیپ ٹیشیا اور کالجیکم کی طرح زبان خشک ہو اور دانتوں کے اوپر میل جمی ہوئی ہو۔ اس دوائی کی یہ خاص علامت ہے کہ مریض گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور اکثر کابل سائیکس کی باندھے دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن سٹرامونیم کی علامات بالکل اس کے برخلاف ہیں مریض گفتگو کرنے کا خواہشمند اور وحشیوں کی طرح سے گھورتا ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۰ یا ۳۰ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس۔ میں بمقابلہ فاسفورک ایسڈ کے زبان بہت زیادہ خشک ہوا کرتی ہے اور جب تپ محرقہ کے ہمراہ نمونہ بھی شامل ہو گیا ہو۔ تو فاسفورس بڑی قیمتی دوائی ہوتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۶ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ہائیوسائیمس۔ زبان سرخ۔ بھوری اور چٹھی ہوئی چرمہ کی مانند نوٹ بھلے ہوئے۔ سر سام نرم یا شدید بے ہوشی۔ آوارہ بند مریض کو اس کرے۔ بستر پر تنکے چنے۔ بے چینی ہو اور بستر پر سے دوڑنے کی کوشش کرے۔ دست خود بخود نکل جاتے ہوں۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۰ یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

ٹیری بن تھینا۔ نائٹرک ایسڈ اور ملی فولیم بھی کام آتی ہیں۔ جب کہ انتڑیوں سے جریان خون ہو۔

✽ خوراک۔ نمبر ۵ یا ۳۰ یا ۳۰ ہر ایک دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیر یا فاس۔ جب بخار کا آرام ہو جائے اور مریض رو بھت ہو تو کمزوری کو دور کرنے کے لیے نمبر ۳۰ ٹری ٹیوڈین کی دو خدا کیں روزانہ کچھ عرصہ تک استعمال کرتے جانا چاہیے۔

## ضروری ہدایات

کمرہ : بیمار کو ایسے کمرہ میں رکھنا چاہیے جس میں کھڑکیاں، دروازے، روشندان وغیرہ ہوں تاکہ تازہ ہوا کا گزر خاطر خواہ ہو سکے۔ کمرہ میں کسی قسم کا فالتو سامان وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بیمار کا بستر بدلتے رہنا چاہیے یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ بیمار کے لیے دو چار پائیاں رکھی جائیں۔ جب بستر بدلتا منظور ہو تو دوسری چار پائی پر بیمار کو لٹا دینا چاہیے اور پہلی چار پائی کا بستر کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر خوب صاف کر لینا چاہیے۔ اس طرح سے جب دوسری چار پائی سے پہلی چار پائی پر بیمار کو بدلا جائے تو دوسری چار پائی کا بستر صاف کر لینا چاہیے۔ بیمار کے پوشیدنی پارچات اور بسترون میں ایک بار ضرور بدلتا چاہیے اس امر کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے کہ کمرہ میں دھوپ کا بہت زور نہ ہو اگر دھوپ تیز پڑتی ہو تو اس کو مدھم کر دینے کا انتظام کر لینا چاہیے۔

آرام - بیمار کو بلانا۔ بلانا یا اس کے پاس شور وغل کرنا منع ہے دوران مرض میں اپنی حسب خواہش جس طرح بیمار پڑنا پسند کرے اسی طرح پڑا رہے۔

صفائی - بیمار کا بستر اور اس کے پوشیدنی پارچات بدلنے کے علاوہ جو غلاظت بیمار خارج کرے اس کو جلدی اٹھوا دینا چاہیے اور صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ صاف تولیہ سے منہ کو وقتاً فوقتاً پونچھتے رہنا چاہیے اور زبان اور دانتوں کو بھی صاف کرتے رہنا چاہیے تاکہ جو میل اُن پر جمی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے۔ جسم کو تولیہ کے ساتھ گلہے بگلہے بلکہ روزانہ گرم یا ٹھنڈے پانی سے جیسا کہ موسم ہو اور بیمار کو خوشگوار معلوم ہو صاف کرتے رہنا چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ جسم زیادہ دیر تک بھیگا نہ رہے۔ سوکھے تولیہ سے فوراً خشک کر لینا چاہیے۔ اس عمل سے بیڈ سورس (جن کو پنجابی میں پڑے پڑنا کہتے ہیں) بچا رہتا ہے اور اگر پڑے پڑ چکے ہوں تو آرمیکا یا کیسٹنڈولا پلستر لگاتے ہیں۔

خوراک - تپ محرقہ میں خوراک کے متعلق مختلف رائیں ویدک و یونانی حکماً اور ایلمینٹیک ڈاکٹر صاحبان کی پائی جاتی ہیں۔ یا یونانی حکماً اور ویدوں کا قول ہے کہ بیمار کو سوائے پانی یا آتش جو کے اور کچھ نہیں دینا چاہیے۔ جب تک کہ ورم، معاذ

کم ہو کر بیمار خود بخود کھانے کے لیے طلب نہ کرے۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں لیکن ایلو پیتھک طریقہ علاج اس ملک میں آیا تو ایلو پیتھک ڈاکٹروں نے اس تجویز کو رد فرمایا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خوراک دیتے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بہا بہا سبب کمزوری کے جاں بحق تسلیم ہو جائے۔ بیمار کی طاقت کو قائم رکھو اور سچ پوچھو تو تپ محرقہ کا علاج وہ آتا ہی بتلاتے ہیں۔ اگر قدرت نے مہربانی کی اور بخار اتر گیا تو زہے قسمت۔ وگرنہ اگر بخار نے کوئی خوفناک صورت اختیار کی تو بیمار کا خدا حافظ۔ اُن کا مقولہ ہے کہ بیمار کی طاقت کو کمزور مہنے سے بچاؤ اور اس کو دودھ۔ انڈا۔ پنجنی وغیرہ زبردستی دیتے جاؤ خواہ بیمار طلب کرے یا نہ کرے۔

لیکن ہومیو پیتھک علاج نے تپ محرقہ میں نمایاں کام کر دکھایا ہے۔ جہاں ہومیو پیتھک ادویات میں یہ طاقت ہے کہ تپ محرقہ کی میعاد اور سختی کو کم کر دیتی ہیں اور ہیجڈگی پڑنے سے بچائے رکھتی ہیں وہاں ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کی رائے خوراک کے متعلق بھی ایلو پیتھک ڈاکٹروں سے مختلف ہے۔

اصل بات تو یہ ہے کہ تپ محرقہ میں انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور ان میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ اگر ایسے موقعہ پر بیمار کے اندر زبردستی خوراک ٹھوسی جاوے تو اس سے بُرے نتائج پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اسہال کا مریض اکثر دامگیر رہتا ہے۔ اس لیے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں انتڑیوں پر زبردستی بوجھ نہ ڈالا جائے اور بیمار کو صرف تھوڑے دودھ، آس جو یا سوڈا واٹر پہ ہی دکھا جائے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال بیمار کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے اس سے حرارت کو تسکین رہتی ہے۔ ڈاکٹر پی۔ سی موزن دار اپنے رسالے انڈین ہومیو پیتھک ریویو بابت ماہ مئی ۱۹۱۷ء میں امریکہ کے چند سربراہان اور ہومیو پیتھک ڈاکٹر صاحبان کی رائے خوراک کے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں۔

ڈاکٹر ایچ سی ایلن ایم۔ ڈی اور ڈاکٹر ریوی صاحب ایم ڈی کے تجربہ میں آیا ہے کہ تپ محرقہ کے مریض بدول خوراک کے جلدی اور باسانی سخت یا ب ہو جاتے ہیں۔ بہ نسبت اُن مریضوں کے جن کو خوراک دی جاتی ہے اسی طرح کئی ایک ڈاکٹروں کی رائے ہے جو کہ تجربہ کی بنا پر بڑے زور سے کہتے ہیں کہ تپ محرقہ میں غذا دینی مفید



نہیں ہے۔ بلکہ بدوں غذا مریض اچھا رہتا ہے۔۔۔ اسی طرح ڈاکٹر سی ایم بونکر ایم ڈی کہتے ہیں کہ تپ محرقہ میں غذا دینا زیادہ مضر ہے۔ بہ نسبت بھوکا رکھنے کے بیمار کو بار بار خوراک دینے سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ سب مریضوں کو خوراک دینی مطلوب ہو تو بموجب وقت اور مریض کی طاقت کے خوراک دینی چاہیے۔ عام طور پر خود خوراک زیادہ مفید پڑتی ہے وہ دودھ پالا سا گودا یا اراروت یا مونگ کی مٹھی ہو لی وال کا پانی یا چنے کا رس یا یخنیا وغیرہ ہے جو کہ مناسب موقعہ محل پر دینی چاہیے۔ یعنی جب کم از کم چار یوم تک حرارت زیر ۱۰۱ فہرینہ رہے تو پھر اس کو دودھ ڈل روٹی۔ مٹھکا مونگ کی وال کے ساتھ دیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ خیال رہے کہ بیمار کو جتنی بھوک ہو اس کی نسبت خوراک کم دینی چاہیے اور بڑی احتیاط سے دینی چاہیے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بیماری سے قدرے آرام آنے کے بعد بیمار کو بڑی بھوک لگتی ہے اور وہ کھانے کے لیے بار بار مانگتا ہے اور تنگ کرتا ہے اگر ایسے موقعہ پر اسہ کو زیادہ خوراک دی جائے تو خراب نتائج نکلتے ہیں۔ اور پھر بیماری کے عود کر آنے کا خطرہ لگ جاتا ہے۔ ایسے موقعہ پر ہومیو پیتھک دوائی چائنا بڑے کام کی چیز ہے۔ ایک تو وہ جسم کو طاقت دیتی ہے۔ دوسرے بھوک کی سختی کو اعتدال میں رکھتی ہے اس لیے چائنا نمبر ۳ یا ۳۰ کا استعمال کرنا چاہیے۔

اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ایک بچہ تپ محرقہ کا مریض ہے اور قدرے آرام آنے پر اس کو خوب بھوک لگتی ہے اور وہ روٹی وغیرہ کھانے پر ضد کرتا ہے اور چیخا چلاتا ہے تو مستورات مارے پیار کے روٹی یا جو چیز وہ مانگتا ہے دے دیتی ہیں اور پڑوس کی مستورات بھی یہی ترغیب دیتی ہیں کہ اس کو روٹی۔ مولی۔ گاجر۔ دانے وغیرہ دے دو۔ جب یہ کھائے گا تو جلدی تندرست ہو جائے گا۔ حکیم ڈاکٹر تو منع کرتے ہی رہتے ہیں۔ اس وقت کوئی دیکھ رہا ہے۔ پس ایسی ترغیب سے بچہ کی والدہ یا دیگر لواحقین اکثر اوقات اس کو کھانے کے لیے دے دیتے ہیں۔ جن کا نتیجہ سہال چیش یا دوبارہ بخار کا عود کر آنا ہوا کرتا ہے پس یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔

## حفاظتِ مریض

احتیاط کے طور پر یہ بھی بیان کر دینا لازمی ہے کہ جب مرض کا زور ہوتا ہے تو اکثر بیمار کو ہڈیاں ہوجایا کرتا ہے اور وہ باہر بھدگنے کی کوشش کرتا ہے ایسے موقع پر اس کی خبر گیری اور حفاظت بڑی ضروری ہے۔ تاکہ مریض بستر پر سے اٹھ کر باہر نہ نکل سکے یا کھڑکی میں سے گھر کر اپنی جان نہ گنوا دے اور یوں بھی اس کی حفاظت اور صفائی وغیرہ کا خیال لازمی و لابدی ہوا کرتا ہے۔ صحت کے بعد تبدیل آب و ہوا پڑی مفید ہوتی ہے۔ باوام روغن و خالص کا استعمال تپ محرقہ میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ جبکہ قبض ہو اس سے قبض کشائی بھی رہتی ہے اور مریض کی طاقت بھی بحال رہتی ہے یہ دوران مرض میں تھوڑا تھوڑا دیتے رہنا چاہیے۔

## تپ محرقہ کی مختصر ریپریٹری یعنی علاج العلامات

اگاری کس الینتھیس - ایپس - ار جنٹم  
 نائٹریکیم - آرنیکا - آر سینکم - آرم ٹری  
 فائیکم - بیپ ٹیشیا - بیلاڈونا - برائی  
 اونیا - کلکیریا کارب - کاربوہی - سائٹ  
 سنکونا کالچیکم - کروٹلیس - کورم  
 آرس - گنیشیا - یو کلیٹس - جلسی میم  
 گلوٹا پین - ہیلی بوس - ہائیڈرائٹس -  
 ہائیوسائیس - آیوڈیم - اپی کاک - کالی  
 فاس - لاکس - لایویرکس - لائیکو پوڈیم  
 مرکورس سالو - میورٹک ایسڈ - نائٹرک  
 ایسڈ - نکس ماشکاٹا - اوپیم فاسفورک ایسڈ  
 فاسفورس - پائیزیم رٹاکس - سٹرا مونیم ٹری  
 بن تعینا - ویرایانا - وراٹم ٹیم - نکم میٹلیکیم

تپ محرقہ کی ادویات عامہ

## دل و دماغ

نشوونماک اور خوف زدہ

موت کا خوف

اکیلا رہنے کا ڈر

مریض سوال کا جواب دیر سے دیتا ہو۔

{ مریض سوال کا جواب دیتے دیتے  
سو جاتا ہو۔

مریض آہ وزاری کرتا ہو

آر سینکیم

آر سینکیم

آر سینکیم - لائیکو پوڈیم - سٹرامونیم

مرکیورس - فاسفورک ایسڈ

بیپ ٹیشیا

بیلادونا - برائی اونیا

## ہذیان - ڈیلیرم

ہذیان مند ہو

بہت گفتگو کرتا ہو۔

بڑبڑاتا ہو۔

بستر کے پارچات نوچتا ہو

بوتا چالتا نہ ہو۔

بستر پر سے کود کود کر گھر جانے کی خواہش

کرتا ہو۔

{ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہو گویا کہ وہ  
اپنے جسم کے حصوں کو اکٹھا کر رہا ہے

غنودگی بہت ہو۔

بیلادونا - ہائیوسائیمس - سٹرامونیم

ہائیوسائیمس - لاکس - سٹرامونیم

ایس - لاکس - مرکیورس - رشاکس

آر سینکیم - ہائیوسائیمس - میورٹک ایسڈ

ادپیم - سٹرامونیم

بیلادونا - ہائیوسائیمس - سٹرامونیم

بیلادونا - برائی اونیا

بیپ ٹیشیا

بیلادونا - لائیکو پوڈیم - ادپیم - رشاکس

لاکس

چوٹی جلتی ہو

سر پھٹتا ہو۔  
 سر میں تکیں ہو۔  
 اٹھنے پر سر جکڑاتا ہو

بیلا ڈونا۔ برائی ادنیٰ  
 بیلا ڈونا  
 برائی ادنیٰ

### چہرہ

نیسلگوں ہو۔  
 پھولا ہوا ہو۔  
 منہ کے آس پاس پھپھولے ہوں  
 چہرہ سرخ ہو۔  
 چہرہ سیاہی مائل سرخ ہو۔  
 چہرہ سرخ اور سوجا ہوا ہو۔  
 چہرہ زرد اور اندر دیا ہوا ہو

اد پیس  
 آر سینکیم  
 رستاکس  
 بیلا ڈونا  
 بیپ ٹیشیا۔ برائی ادنیٰ  
 برائی ادنیٰ  
 آر سینکیم۔ فاسفورس

### آنکھیں

بگڑی ہوں  
 بھینگا پن ہو۔  
 چمکیلی ہوں۔  
 سرخ ہوں۔

بیلا ڈونا۔ سٹرامونیم  
 بیلا ڈونا  
 بیلا ڈونا۔ سٹرامونیم  
 بیلا ڈونا۔ برائی ادنیٰ

### ناک

ناک سے اپنی بہتا ہو۔  
 نکسیر پھوٹتی ہو  
 نٹنے پنکھے کی طرح چلتے ہوں

آر سینکیم۔ مرکوریس  
 آر سینکیم۔ فاسفورس  
 لائیکو پوڈیم

### منہ

تنفس بدبودار

بیپ ٹیشیا۔ ایکلی نیشیا۔ مرکوریس

سانس میں بدبو ہو اور رالیں بہتی ہوں  
منہ کھلا ہوا اور جہڑا نیچے گرا ہو۔

سوئدوں سے خون نکلتا ہو  
تھوک خون آمیز ہو  
دانتوں پر میل جمی ہو  
ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے ہوں  
ہونٹ سیاہ ہوں

مرکیورس  
آر سینکیم - لاکس - لائیکو پوڈیم - میور  
انگ ایسڈ - اڈپیم  
مرکیورس فاسفورک ایسڈ  
آر سینکیم - رٹاکس  
آر سینکیم - بیپ ٹیشیا - رٹاکس  
برائی ادینا  
آر سینکیم - فاسفورس

## زبان

زبان جلتی ہو  
زبان سیاہ ہو  
زبان بھونسل ہو  
زبان سرخ ہو  
زبان چمکتی ہو  
زبان کی نوک سرخ ہو  
زبان زرد ہو  
زبان تر اور زرد ہو۔

آر سینکیم  
آر سینکیم  
بیپ ٹیشیا - رٹاکس  
آر سینکیم - بیلا ڈونا - ٹیری بن تھینا  
لاکس - ٹیری بن تھینا  
آر سینکیم - رٹاکس  
بیپ ٹیشیا - برائی ادینا - مرکیورس  
مرکیورس

## ذائقہ

ذائقہ کڑوا ہو  
ذائقہ خراب دگندہ ہو

برائی ادینا - مرکیورس  
مرکیورس

## حلق

حلق خشک اور دھکتا ہو۔

بیلا ڈونا

بیل ڈونا - لاکس

حلق دبانے سے دکھتا ہو۔

## معدہ

برائی ادینا - مرکبوس

برائی ادینا

برائی ادینا

آر سینٹیم

فاسفورس

معدہ دبانے سے درد کرتا ہو

اٹھنے پر جی متلاتا ہو۔

خوراک قے ہو جاتی ہو۔

پانی پینے کے بعد جلدی قے ہو جاتا ہو۔

معدہ میں پانی جو نہی گرم ہوتا ہو بذریعہ

قے نکل جاتا ہو۔

## شکم

آر سینٹیم - لائی کو پوڈیم - فاسفورس - فاسفورک

ایڈ - رشاکس - تیرن - بن تھینا

لائی کو پوڈیم - فاسفورس - فاسفورک ایڈ

فاسفورک ایڈ - سٹرا منیم

مرکبوس - نامٹک ایڈ

فاسفورس

شکم پھولا ہوا - نفخ ہوتا ہوا ہو

شکم گرد گرد آتا ہو

{ شکم گرد گرد آتا ہو اور ساتھ ہی اسہال بھی آتے ہوں

شکم خالی محسوس ہوتا ہو اور کمزوری ہو۔

## جگر

برائی ادینا

برائی ادینا

مرکبوس

مرکبوس

جگر جلتا ہو

جگر میں چھن پڑتی ہو

{ جگر میں ڈنگ مارنے کی سی دردیں

ہوتی ہوں

جگر دکھتا ہو۔

## پاخانہ

امونیم کارب - آرسینکیم - فاسفورس - ٹیری بن تھینا -	}	پاخانہ خونی آتا ہو -
آرسینکیم - اوپیم - سٹرامونیم آرنیکا - آرسینکیم - ہائیوسائیمس - اوپیم رٹا کس میوراٹک ایڈ	}	پاخانہ سیاہ بدبودار ہو
امونیم کارب - ایومن - کاربوئیجی - میوراٹک ایڈ: انٹرک ایڈ سکیل ۲۰	}	اسہال بے اختیار نکل جاتے ہوں
	}	پاخانہ میں خون خارج ہوتا ہے -

## پیشاب

کینٹھرس مرکیورس ٹیری بن تھینا لایسکو پوڈیم ہائیوسائی مس آرنیکا - آرسینکیم - کینٹھرس ۱۰		پیشاب گرم اور تھوڑا تھوڑا آتا ہو - پیشاب مانند خون کے آتا ہو - پیشاب دھو سرخ ہو - پیشاب میں سرخ ریگ تہ نشین ہوتی ہو پیشاب بے اختیار خارج ہو جاتا ہو - پیشاب رگ گیا ہو -
---	--	--

## سینہ

برائی اونیہ - لاکس فاسفورس فاسفورس فاسفورس - اینٹیم ٹارٹ	{	گہرا سانس لینے کی لگنا رخو امش بنی رہتی ہو - پھیپھڑے دھکتے ہوں سینہ میں کچھاوٹ محسوس ہوتی ہو - تپ محرقہ کے ہمراہ نمودار ہو
---	---	--

## جلد

ہاتھ لگانے سے جلد حسیم جلتی معلوم ہوتی ہو۔ پسینہ بکثرت آتا ہو۔ پسینہ چکنا اور ٹھنڈا ہو۔	{	بیلہ ڈونا برائی ادنیا۔ فاسفورک ایسڈ۔ ایٹم ٹارٹ مرکیورس
---	---	--

## علاماتِ عامہ

بستر تنور کی مانند گرم معلوم ہو بستر مانند لکڑی کے تختہ کی سخت ہو بستر پر سے اٹھتے وقت غشی ہو جاتی ہے۔ سوتے سوتے فوراً چونک اٹھتا ہو بے چینی ہو۔ مریض بڑی جلدی جلدی گفتگو کرتا ہو۔ مریض لٹکھڑاتا ہو اور ڈگمگاتا ہو۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ مریض کو نپکا کر دانے کی خواہش ہو	{	اوپیم آرنیکا۔ بیپ ٹیشیا برائی ادنیا بیلہ ڈونا۔ برائی ادنیا۔ ہائیوسائیمس آرسینیکم۔ رشاکس مرکیورس۔ سٹرامونیم بیپ ٹیشیا۔ اوپیم۔ رشاکس آرسینیکم کاربووہیجی۔ میورائٹک ایسڈ رشاکس بیپ ٹیشیا۔ کاربووہیجی
---	---	--

## نبض

نبض رک رک کر چلتی ہو۔ نبض بہت سست ہو۔		میورائٹک ایسڈ۔ نائٹریک ایسڈ اوپیم۔
--	--	---------------------------------------



# ہڈ توڑ بخار - ڈنگو

(DENGUE, BREAK Bone Fever)

یہ ایک قسم کا شدید متعدی بخار ہے۔ جو کہ اکثر دوبار پھیلا کرتا ہے اس میں جسم کی ہڈیوں اور جوڑوں میں سخت درد ہوتا ہے اور جسم پر سرخ سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بخار بہت جلدی پھیل جاتا ہے لیکن شاید ونا دہی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اسباب مرض۔ اس مرض کا سبب بھی ایک قسم کا چھوٹا سا کرم ہے۔ جس کو ایک قسم کا پتھر مریض کے خوں کو چوس کر تندرست اشخاص میں پہنچاتا ہے اور جس کے باعث یہ مرض تندرست اشخاص میں بھی پھیل جاتا ہے۔

علامات مرض تین سے پانچ یوم تک یہ مرض جسم میں مخفی رہ کر پھر سردی شروع ہوتا ہے اور جوڑوں و عضلات میں شدید دردیں ہوتی ہیں۔ پھر حرارت جسم قیز ہونے لگتی ہے اور بخار کی دیگر علامات مثلاً جھوک کا مارا جانا۔ زبان پر میل کا جم جانا وغیرہ مریض میں موجود ہوتی ہیں۔ جسم پر سرخ دھبے نمودار ہوجاتے ہیں۔ مرض کا دورہ سات یا آٹھ دن تک رہتا ہے اور بڑی بھاری نقابت پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات جریانِ خون بھی ہوتا ہے۔

## علاج

یو پا ٹوڈیم پروفولی ایٹم اس مرض کی یہ ایک خاص دوائی ہے اور یہ دوائی اس بخار میں نہایت سودمند ہوتی ہے جب کہ امتحان میں نہایت شدید دردیں ہوتی ہوں۔ مانو کہ کوئی ہڈیوں کو توڑ رہا ہے اور جوڑ کو جوڑ سے الگ کر رہا ہے۔  
 \* خوراک۔ نمبر ۱ یا ۳ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔ علاوہ اس کے حلیمی مہم ۵ بیپ ٹیشیا نمبر ۵ سی سی فیوگا نمبر ۳ اور آر سینکیم نمبر ۳۰ ادویات بھی کام آتی ہیں۔

مابعد کی نقاہت کو دور کرنے کے لیے ایسڈ فاس نمبر ۵ ایونیا سٹیو مادرشکمیر  
یا سورا نیم نمبر ۳۰ دینی چاہیے۔

ضروری ہدایات - پرہیز اور غذا جیسا کہ طیر یا بخار اور انفلوئنزا وغیرہ میں ذکر کر دیا  
گیا ہے۔ اسی طرح سے ہونے چاہئیں۔

## انفلوئنزا - (وبائی زکام)

(INFLUENZA)

یہ ایک ایسی مشہور بیماری ہو گئی ہے کہ اس کے نام سے ہندو پاک کا بچہ بچہ  
کا پتا ہے۔ ۱۹۱۸ء کے وسط میں یہ بیماری یورپ سے ممبئی میں آئی اور دیگر وبائی  
امراض کی مانند یہ ایسی جلد پھیلی کہ اکتوبر میں اس کا بڑا بھاری زور تمام ہندو پاک میں  
ہو گیا۔ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس کو اس موذی مرض سے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ صرف  
پنجاب میں لاکھوں اموات اس مرض سے واقع ہوئیں۔ ابتدا میں کہنے سکول اس کا کچھ  
نام نہ رکھ سکا اور کئی مختلف ناموں سے یہ نامراد مرض میں پکارے جانے لگا۔ پراسرار  
بیماری تہنگی بخار۔ وار فیور۔ ٹوئچ فیور۔ لاگڑ پ وغیرہ نام اس کو دیئے گئے۔  
سچ تو یہ ہے کہ چار پانچ ماہ میں یہ تمام دنیا میں پھیل گیا۔

اقسام مرض - یہ مرض کئی صورتوں میں انسان پر حملہ کرتا ہے۔

۱۔ بعض اوقات اس کا حملہ بڑا معمولی ہوتا ہے۔ زکام کی علامت نرم بخار  
کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں۔ عام عصبی و عضلاتی کمزوری۔ منہ کا مزہ بد ذائقہ کھانے  
پینے سے نفرت۔ تمام جسم میں تھوڑا تھوڑا درد اور معمولی کھانسی و نزلہ اس کو  
انگریزی میں کمنارل فارم کہتے ہیں۔ یہ حالت چار پانچ یوم رہ کر بیمار صحت پا جاتا  
ہے۔

۲۔ لیکن اس کے ہمراہ اگر پورسی یا برونکائٹس اور نمونیہ شروع ہو جائیں یعنی  
کھانسی ہوتے وقت چھاتی میں درد ہو اگلے اور سانس کی نالی میں ورم ہو جائے چہرہ  
کچھا ہوا ہو۔ بخار تیز اور پیاس کی شدت ہو۔ آواز بھاری ہو یا گلا بیٹھ جائے اور

کھانسی سخت تکلیف دے تو یہ مرض زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے اور اس کا آرام دیر میں ہوتا ہے۔ انگریزی میں اس کو پورے ٹک اور برائکو پورے ٹک کہتے ہیں۔

۳۔ بعض بیماروں میں یہ مرض ریوٹائیڈ ویرائٹی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ بخار و زکام تیز اور تمام جسم میں ایسا سخت درد جیسا کہ وجع المفاصل میں ہوا کرتا ہے۔ یہ درد کبھی جسم کے کسی حصہ حصہ میں ہوتا ہے اور کبھی کسی حصہ میں اور بڑی تکلیف دیتا ہے۔

۴۔ بعض اوقات اس مرض کے شروع ہوتے ہی قے اور دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آبکائیاں آتی ہیں اور مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو انگریزی میں کالرائٹک ویرائٹی کہتے ہیں۔

۵۔ بعض حالتوں میں ۱۰.۴ یا ۱۰.۵ درجہ فارن ہیٹ کا آغاز ہی میں بخار شروع ہو جاتا ہے۔ غنودگی اور بعض اوقات بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ چہرہ اور زبان کی رنگت بدل جاتی ہے۔ عضبی اور عضلاتی کمزوری از حد بڑھ جاتی ہے۔ غویہ وغیرہ امراض ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دم کھج کو آتا ہے یہ اس مرض کا سخت ترین حملہ ہے۔ اس میں موت اکثر تین چار یوم میں واقع ہو جاتی ہے اس کو انگریزی میں ملگ ٹیلنٹ کہتے ہیں۔

۶۔ بعض مریضوں میں اس کے ساتھ تپ معرقہ کی علامات پائی جاتی ہیں۔  
۷۔ بعض مریضوں کو چار پانچ چھ بلکہ زیادہ یوم تک بخار متواتر چڑھا رہتا ہے اور بعض کو بخار اتر کر پھر سردی سے چڑھ جاتا ہے۔ کھانسی زکام وغیرہ کی علامات ساتھ ہوتی ہیں۔ غرضیکہ یہ بیماری کئی قسم کی دیکھنے میں آتی ہے۔

زیادہ خرابی اس مرض میں یہ ہے کہ بخار کے دور ہو جانے کے بعد بھی کھانسی رہتی ہے اور نہایت ہی نقاہت اور کمزوری واقعہ ہوتی ہے اور کئی کئی روز تک کھانسی اور کمزوری تنگ کرتی رہتی ہیں۔

اسباب مرض۔ یہ مرض وبائی ہے۔ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ہو

جاتا ہے۔ جب اس کا زور ہو۔ تو اس میں کوئی احتیاط کارگر نہیں ہو سکتی۔ یہ نہایت عسرت سے پھیل جاتا ہے۔ اہل اٹلی کا خیال تھا کہ یہ مرض خاص ستاروں کے اثر سے پیدا ہوتا ہے اسی لیے اس کا نام انفلوانزا رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر پائی فر کا فرمان ہے کہ یہ مرض ایک خاص قسم کے جرم سے پیدا ہوتا ہے۔ جس کو انگریزی میں "انفلوانزا ویس" کہتے ہیں ٹھنڈک تھکاوٹ اور خوراک میں بے اعتدالی وغیرہ یعنی وہ تمام باتیں جن سے زندگی کی طاقت (قوت زبیت) کمزور ہو جاتی ہے۔ اس مرض کے اسباب مؤیدہ ہیں۔ اور ایک بار اس مرض کے ہونے سے دوبارہ اس کے برخلاف قوت مافعت پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ مرض بار بار ہو جاتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ۔ ابتدائی حالت میں یہ بڑی کارآمد دوا ہے جب ٹھنڈے سر اور خشک ہوا کے جھونکے یا پسینہ کا دب جانا اس بیمار کے اسباب ہوں اور نیز مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں تو یہ دوائی اکیسرا حکم رکھتی ہے اور مرض کو ابتداء ہی میں روک دیتی ہے

علامات۔ اس کی یہ ہیں:-

بے چینی دل کی بے قراری، موت کا ڈر، تیز بخار، خشک بدن پھرتیلی نبض، سر درد، تمام جسم میں درد، چہرہ گرم، آنکھیں سرخ، ناک روال، کلا اور منہ عموماً خشک اور گلے میں درد، خشک تکلیف وہ کھانسی رات کے وقت اور گرم کمرہ میں بیماری کا زور۔ کھلی ہوا بھلی معلوم ہو پسینہ آنے پر آرام معلوم پڑے لیکن جب اس دوائی کی تین چار خوراکیں دینے کے بعد تکلیف میں تخفیف نہ ہو تو دیگر مناسب دوائی دینی چاہیے۔

\* خوراک۔ نمبر ۱ یا ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد  
جلسی میم۔ یہ دوائی اکثر ابتداء میں منظر ہوا کرتی ہے۔ جبکہ مریض کا تمام جسم دکھتا ہو،

تھکا ٹوٹا ہو اور کمزور ہو۔ اس دوائی کے دینے سے درد عضلات بہت جلدی  
 کافور ہو جاتا ہے۔ مریض ٹھنڈکی متواتر محسوس کرتا رہتا ہو اور آگ کو چھوڑنے کو  
 دل نہ کرتا ہو۔ بخار بہت شدید نہ ہو اور کھانسی سنت ہو۔ اور درد کرتی ہو۔  
 چھینکوں کے دورے ہوتے ہوں اور جلتا ہوا پانی ناک سے نکلتا ہو۔ کابلی اور سستی  
 بہت ہو۔ مریض الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہو اور بولنا نہ چاہتا ہو۔ پیاس کی کمی  
 بھی اس دوائی کی علامت ہے۔

✽ خوراک - مڈسکچر (Q) یا ۱۰۰ ابراہیم، یا دو گھنٹہ کے بعد۔

یو پائوریم پروفولی ایٹم۔ یہ دوائی اس مرض میں اکثر منظر ہوا کرتی ہے۔ درد کی زیادتی  
 ہو۔ تمام جسم بہت دکھتا ہو۔ آواز بیٹھ گئی ہو اور کھانسی ہوتی ہو۔ ساتھ ہی گلا  
 اور چھاتی کے اوپر کا حصہ بہت دکھتا ہو۔ زکام ہو اور پیاس لگتی ہو اور پیسے سے  
 قے آجاتی ہو۔ کھانسی بہت دکھ دینے والی ہو اور چھاتی و سر کو کھانسنے سے مدہ  
 پہنچا ہو اور مانند ڈرا سر کے مریض دونوں ہاتھوں سے اپنی چھاتی کو سہارا دیتا ہو۔  
 اس دوائی کی یہ خاص علامت ہے کہ دریں ہڈ توڑ ہوا کرتی ہیں۔ اگر مذکورہ بالا  
 علامات کے ساتھ صفراوی علامات بھی شامل ہوں تو یہ دوائی خصوصاً منظر ہوا کرتی  
 ہے۔ بہت سے ڈاکٹر صاحبان تو زکام و بائی کے ابتدا میں اسی دوائی پر زیادہ  
 انحصار رکھتے ہیں۔

✽ خوراک - مڈسکچر ۱ یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد

سباڈلا۔ چھینکیں اس دوائی کی خاص علامات میں۔ پہلی ہوا میں جلنے سے چھینکیں آئیں  
 اور بہت سا پانی آئے۔ گلاسو جال ہوا اور خالی نکلنے سے زیادہ تکلیف ہو۔ چھینکیں  
 بہت آتی ہوں اور سارے جسم کو بلا دیتی ہوں۔ تھرتھرا کا پنا اور ٹھنڈا۔ کانچے سے  
 اوپر کی طرف چڑھنا یہ بھی اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ پیشانی میں۔ رونہ کا  
 خشک ہونا۔ عدم پیاس اور کھانسی۔ بیٹنے پر تکلیف کا زیادہ بڑر جانا۔ یہ سب  
 علامات بھی سباڈلا کے ہیں۔ زکام و بائی میں جبکہ زکام کا زور ہو۔ تو اکثر کیسوں  
 میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے دیکر ادویات جو چھینکوں میں کام آتی ہیں۔ سائی

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

کلیمن اور یوفوریا ہیں۔

✽ **خوراک** - مدرٹنکچر (R) یا ۱ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم ایلیکم - یہ دوائی انفلوآنزا کے علاج میں خاص درجہ رکھتی ہے۔ شاید اور کوئی دوائی آر سینیکم کے برابر اس مرض میں مستعمل نہیں ہوتی۔

ڈاکٹر جیوگس فرماتے ہیں کہ آر سینیکم دوائی مرض کے دورہ کو کم کر دیتی ہے۔ خاص کر جبکہ پانی بہت بہتا ہو۔ نقاہت اور زکام کے دورے ہوتے ہوں جب مرض کا حملہ چھاتی کے اوپر والے حصہ پر ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ بلن دار اور جلتے ہوئے پانی کا بکثرت خارج ہونا اور کینکھٹو اور پردہ ملحمہ چشم کا مبتلائے مرض ہونا یہ سب ایسے علامات ہیں جن میں آر سینیکم بلا کسی کام کے منظر ہوا کرتی ہے۔

کمزوری اور نقاہت اس دوائی کی خاص علامت ہے۔

✽ **خوراک** - نمبر ۳ یا ۳۰ ہر نین گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم آیوڈائیڈ - ٹھنڈک گرمی کی لہریں اور شدید رواں زکام اور جو پانی وغیرہ مواد نکلیں سب جلانے والے ہوں چھینکیں اور نقاہت یہ سب اس دوائی کی علامات ہیں۔ اصلی انفلوآنزا کے مرض میں یہ دوائی خاص کر منظر ہوا کرتی ہے۔ اور تہید صاحب اس کے بھاری مداح ہیں۔

✽ **خوراک** - نمبر ۶ x ٹری ٹوریشن ہر نین گھنٹہ کے بعد

ڈلکا مارا - مرض کی شدید حالت میں ادویات زیادہ کارآمد ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک ڈلکا مارا بھی ہے جبکہ آنکھیں پھیلی ہوئی ہوں۔ گلا دکھتا ہو اور گھانسنے سے درد ہوتا ہو۔ جب اس مرض کا باعث نمی یا موسم یکایک سرد ہو جاتا ہو تو یہ دوائی اور بھی یقیناً منظر ہوا کرتی ہے۔

✽ **خوراک** - نمبر ۵ یا ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا - جب نمونیا بھی ساتھ ہو جائے۔ یا کھانسی بہت تکلیف دہ ہو پیا س زیادہ لگتی ہو مریض پانی بہت پیتا ہو۔ لیکن دیر دیر کے بعد پیتا ہو۔ ہڈیوں میں درد ہو اور زیادتی حرکت سے پیدا ہو کھانستے وقت سر میں درد ہوتا ہو۔ مریض سانس

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

رنگ ناک کر لیتا ہو۔

✽ خوراک: نمبر ۲۰ یا ۳۰ ہر ایک دو گھنٹہ کے بعد

فاسفورس جب انفلونزا کے ساتھ نمودار ہوتا ہے یا گیا ہو اور سینہ میں تکلیف بہت ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ یہ کام دوائی کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے۔ انفلونزا کے بعد یہ دوائی ٹانگ کا کام دیتی ہے جب کھانسی کا زور ہو۔ تو برائی اوٹیا اور فاسفورس ادویات باری باری سے بھی دی جاتی ہیں۔

✽ خوراک: نمبر ۶۰ یا ۳۰ ہر دو تین گھنٹہ کے بعد۔

رسٹاکس۔ جب انفلونزا کے ساتھ تمام استخوان میں نہایت شدید درد ہوتا ہو چھینکیں اور کھانسی آتی ہو تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کھانسی شام کو زیادہ ہوتی ہو اور سترم (سینہ کے سامنے کی ہڈی) کے اوپر والے حصہ کے زیریں گدگدی پیدا ہونے کے باعث کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔ جب نمی میں رہنے کے باعث انفلونزا کا عارضہ ہوا ہو تو یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ کمزوری اور نفاہت بہت ہو اور تپ محرقہ کا شک پیدا ہو گیا ہو یعنی زبان جلتی ہو۔ مدہوشی اور ہڈیاں ہر دردوں کا ہونا اور رات کو مرض کا زور پکڑنا۔ یہ اس دوائی کی علامت مخصوصہ ہیں۔

✽ خوراک: نمبر ۳۰ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیپ ٹیشیا۔ تمام جسم میں درد ہو۔ چہرہ بھرا یا ہوا۔ تپ محرقہ کی علامات شروع ہوں مریض مدہوش سا ہو اور اگر اسہال آتے ہوں تو نہایت بدبودار اور سرخ رنگ کے آتے ہوں۔

✽ خوراک: نمبر ۱ یا ۲ یا ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

دیگر ادویات کا سٹی کم۔ اٹیم سی پیا۔ شکلا اور سیگونیٹریا بھی اپنے اپنے علامات کے ساتھ کام آتی ہیں۔ کمزوری کو دور کرنے کے لیے نیٹرم سلف ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

**ضروری ہدایات** تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آرام۔ گرمی۔ خوراک بیمار کو آرام سے لیٹے رہنا مناسب ہے اور اس کے جسم

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو نمبر ۲۵

کو گرم رکھنا ضروری ہے سرد اور کھلی ہوا میں پھرنا ممنوع ہے۔ جس کمرو میں بیمار لیٹا ہوا ہو وہ صاف ستھرا اور ایسا ہونا چاہیے جس میں تازہ ہوا کا گزر ہو۔ بیمار کو غذا ہلکی اور نرم دینی مناسب ہے۔ مثلاً مقوڑا دودھ ساگو دان، شوربا، تری، مونگ، دال، کدو، شلغم، پتی کچڑی وغیرہ استعمال کرنی چاہئیں۔ اگر نمونیہ ہمراہ ہو تو پھر دودھ نفع نہیں کرتا۔ بلکہ نقصان کرتا ہے۔

## سُرخ بخار

(SCARLATIN)

یہ ایک قسم کا متعدی بخار ہے۔ اس میں گلا متورم ہو جاتا ہے اور بخار چڑھنے کے دو تین روز بعد سُرخ دھبے جسم پر نکل آتے ہیں۔

**اسباب مرض**۔ اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا کوم ہے اور اس کی خصوصیت مریض کے لعاب دہن یا سانس وغیرہ سے لگ جاتی ہے پانچ سال سے کم عمر کے بچے اس مرض میں بالعموم زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

**نوٹ:** انگلستان اور امریکہ میں یہ بخار بکثرت ہوتا ہے اور ہندوپاک میں تو شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے۔

**علامات مرض**۔ اس بخار کی بجاۓ علامات تین قسم کی ہیں۔

۱۔ تپ سُرخ سادہ ۲۔ سُرخ خنثی ۳۔ تپ سُرخ مہلک

تپ سُرخ سادہ میں سخت بے چینی ہوتی ہے۔ سر میں خصوصاً بہت درد ہوتا ہے۔ دوسرے تیسرے دن سُرخ سُرخ دھبے جسم پر نکل آتے ہوں۔ جب ان کو انگلی سے دبایا جائے تو سُرخ دھبہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر جب انگلی کو ہٹایا جائے تو سُرخ عود کر آتی ہے۔ حلق سُرخ اور متورم ہوتا ہے۔ نکلنے وقت اور دم لیتے وقت تکلیف ہوتی ہے پانچویں یا چھٹے دن دھبے مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں اور آٹھویں نویں دن غائب ہو جاتے ہیں۔ بعدہ جلد پر سے بھومی اُترنے لگتی ہے۔

تپ سُرخ خنثی میں علامات زیادہ تر شدید ہوتی ہیں۔ حلق متورم اور اس میں



ایک غلیظ رطوبت چمٹی رہتی ہے۔ ناک سے بھی پیپ آمیز رطوبت نکلتی رہتی ہے۔  
تپ سرخ ہلک میں وجہ جسم پر اچھی طرح سے نمایاں نہیں ہوتے اور دیگر تمام  
علامات زیادہ شدید ہوتی ہیں۔

## علاج

بیلادونا۔ یہ دوائی اس مرض میں خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ جبکہ جلد کی رنگت چمکی  
سرخ۔ گلابی ہو۔ گلابی چمکیلا سرخ ہو۔ معدہ میں درد ہو اور غدد پھولے  
ہوئے ہوں۔ مزید برآں دماغی اکساہٹ موجود ہو۔ مثلاً ہڈیاں عضلات کا جھٹکنا  
اور بے آرام نیند جب حلق میں تکلیف زیادہ ہو۔ تو بعض قسم کے سرخ بخاروں  
میں مرکبورس زیادہ مفید ہوتی ہے لیکن عام طور پر بیلادونا اکثر مظہر ہو کر قی  
ہے۔

ڈاکٹر ہینی مین نے سرخ بخار کی روک تھام کے لیے بیلادونا کو بہت مفید بتلایا  
ہے اور کئی ایک ڈاکٹروں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ سرخ بخار میں سلفر بھی  
بہت دوائی ہے اور خاص کو خنازیری مزاج والے مریضوں کے لیے نہایت  
موثر ہوتی ہے۔

✽ خوراک: نمبر ۱ یا ۳ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم۔ جبکہ مریض چپ چاپ اور کابل ہو۔ تھکا ماندہ اور بے ہوش ہو اور  
نبض دھڑکتی ہو۔ لیکن دہانے سے دب جاتی ہو۔ جب مرض کی ابتداء میں  
ایکونائٹ اور بیلادونا غلظت ہوتی ہوں۔ تو جلسی میم کام آتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا بھی اس مرض میں بڑے کام کی دوائی ہے۔ جبکہ سرد و اور پہلے زبان  
سفید ہو اور پھر بھوسلی ہو۔ پیاس بہت لگتی ہو مگر بہت دیر کے بعد سینہ میں  
تیز دردیں ہوں اور وجہ جسم پر کھل کر نہ نکلتے ہوں یا بجھے نکل کر گم ہو گئے ہوں  
اور ہڈیاں ہو۔ تو ایسے حالات میں برائی اونیا مفید ہوتی ہے۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

✽ خوراک: نمبر ۲ یا ۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس جبکہ مریض بے چین ہو اور مدہوش ہو زبان اس کی سرخ اور صفا ہو، تالو سوجا ہوا ہو۔

علاوہ ازیں اینتھیسیس - آرم ٹری فائیلیم - ایپس - لاکس - امونیم کارب - زینکم کالی سلف - کلیریا کارب اور کوپریم بھی اپنی اپنی علامات کے ساتھ کام آتی ہیں -

## ضروری ہدایات

مریض کو الگ تھلگ کمرہ میں رکھنا چاہیے اور کمرہ خوب ہوادار ہونا چاہیے۔ لیکن ہوا کے جھونکوں سے مریض کو بچانا چاہیے۔ مریض کے پارچات وغیرہ کو بدلتے رہنا چاہیے۔ مریض کا جسم سرد یا نیم گرم پانی میں تولیہ بھگو کر گلہے بگاھے پونچھتے رہنا چاہیے۔ اگر حلق متورم ہو اور غدود پھولے ہوئے ہوں تو گرم پانی کی بجائے دینی چاہیے۔ پینے کیلئے پانی اور آٹس جو دینے چاہئیں۔

## زرد بخار

(YELLOW Fever)

یہ خاص قسم کا شدید بخار ہے جو کہ گرم ممالک میں پایا جاتا ہے۔ اس کے ہمراہ یرقان اور ابومی نیریا کے امراض ہوتے ہیں۔ سیاہ رنگ کی قلیں اور جریان خون بالخصوص معدہ سے ہوتا ہے۔

اسباب مرض - اس بخار کا باعث بھی ایک خاص قسم کا نہایت چھوٹا سا کیڑا ہے جس کو زرد بخار کا کیڑا کہتے ہیں۔ اس کیڑے کو ایک خاص قسم کا میچ جس کو انگریزی اصطلاح میں 'سٹے گویا' کہتے ہیں۔ بیمار کے خون سے تندرست اشخاص کے خون میں پہنچا دیتا ہے۔

علامات مرض - یکایک لرزہ لگ کر بخار چڑھ جاتا ہے۔ ابکائیاں اور قلیں

✽ ذوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کیلئے صفحہ نمبر ۱۵ دیکھیو۔

آتی ہیں سنے کے ساتھ زرد رنگ کا کڑوا پانی نکلتا ہے۔ مریض کے جسم کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ نبض کی رفتار تیز ہوتی ہے اور حرارت جسم ۱۰۱ سے ۱۰۵ درجہ تک ہو جاتی ہے۔ پیشانی۔ کمر اور منہ میں درد ہوتا ہے۔ تیسرے چوتھے روز قیوں کی رنگت خون کی آمیزش کے باعث عموماً سیاہ ہوا کرتی ہے۔ نیز یرقان کا عارضہ ہو جاتا ہے اور پیشاب میں ایسومن خالص ہوتی ہے۔ پیشاب بند ہو جاتا ہے پانچویں چھٹے روز بخار جاتا رہتا ہے یا بخار دوبارہ پڑھ جاتا اور بہ نسبت اول مرتبہ کے علامات زیادہ سخت ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ یرقان بہت شدید ہو جاتا ہے۔ مریض کی ناک منہ یا مقعد وغیرہ سے خون جاری ہو جاتا ہے اور دیگر کئی رومی علامات پیدا ہو کر مریض بے ہوشی یا تشنچ یا بوجہ ضعف چل بتا ہے۔

**حفظ ماقدم۔** اس بخار کے پھیلانے والے مچھروں کو نیست و نابود کر دیں، اور جہاں یہ بخار پھیلا ہوا ہو۔ وہاں کے لوگوں کو لازم ہے کہ مچھروں یا نیاں لگا کر سویا کریں۔  
نوٹ: یہ بخار جزائر غرب الہند۔ مغربی افریقہ اور جنوبی امریکہ میں ہوا کرتا ہے۔  
ہندو پاک میں دیکھنے میں نہیں آتا۔

## علاج

ایکونائٹ۔ ابتدائے درجہ میں اس دوائی کی فضیلت تقریباً تمام بڑے بڑے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ تیز ہو جلد جسم خشک ہو اور نبض بھرپور چلتا ہو اور خاص جبکہ اس دوائی کی علامات مخصوصہ موجود ہوں مثلاً دل میں، زردی خاص کر موت کا ڈر بے چینی اور بے قراری۔ دماغی اور جسمانی گھبراہٹ۔ شدت پیاس۔  
اس دوائی کے استعمال سے بخار کو بہت جلد تسکین ہوتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۲ یا ۳ ہر گھنٹہ کے بعد

نوٹ: جلدی نیم بھی درجہ ابتدائے کی دوائی ہے جبکہ مریض سست و کاہل ہو اور اسی طرح سے بیلہ ڈونا اور بلانی او نیا بھی درجہ ابتدائے میں کام آتی ہیں۔ لیکن ان سب سے زیادہ کیمفر کام آتی ہے جبکہ مریض بہت ٹھنڈک محسوس کرتا ہو اور کو بیس کی حالت

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھیں صفحہ نمبر ۲۵

طاری ہونے کو ہو۔

درجہ ابتدائیہ میں قیوں کو روکنے کے لیے اپنی کاک ایک نہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔  
 آر سینکیم - مرض کے دوسرے و تیسرے درجہ میں یہ دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔  
 مریض کو لگاتار ابکائیاں آتی ہوں اور قیوں میں پت یا سیاہ رنگ کا مادہ  
 خارج ہوتا ہو۔ چہرہ زرد اور نبض چھوٹی کمزور اور لغزش کھاتی ہو۔ فم معدہ میں  
 بہت جلن ہوتی ہو۔ اور شدید پیاس ہو لیکن پیاس بار بار لگے اور مریض ایک دو  
 گھنٹہ پی کر بس کر دے جب مذکورہ بالا علامات موجود ہوں تو آر سینکیم سے بڑھ  
 کر اور کوئی دوسری دوائی نہیں ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۳۵ یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

لاس - زرد بخار میں اس دوائی کے پینے سے بہت تسلی بخش نتائج برآمد ہوتے  
 ہیں۔ خاص کر جب قیوں آتی ہوں۔ شکم دکھتا ہو زبان کی رنگت بڑاون ہو۔  
 ہڈیاں ہو۔ مریض بڑی آہستہ گفتگو کرتا ہو۔ ابکائیاں آتی ہوں۔ بدبودار مواد  
 خارج ہوتا ہو اور پیشاب برنگ سیاہ آتا ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۱۲۵ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کروٹیلس - یہ دوائی بھی زرد بخار میں خاص وقعت رکھتی ہے جب کہ سیاہ قیوں  
 آتی ہوں۔ اور سمیت خون کی علامات موجود ہوں۔ نرم ہڈیاں ہو چلند زرد اور  
 جسم کے ہر ایک مخزج سے خون خارج ہوتا ہو۔ یہاں تک کہ پسینہ بھی خونی آتا ہو۔  
 ✽ خوراک - نمبر ۱۲۵ یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

کاربوویکی - یہ دوائی زرد بخار کی روک تھام کے لیے مفید مانی گئی ہے۔ نیز مرض  
 کے تیسرے درجہ میں کام آتی ہے جب کہ حالت کو لپس ہو۔ جسم ٹھنڈا ٹھار  
 مواد نہایت ہی بدبودار اور قوت زہیت نہایت ہی کمزور۔

✽ خوراک - نمبر ۶۵ یا ۳۰ ہر گھنٹہ کے بعد

علاوہ ازیں سلفیورک ایسڈ - ار جڈٹم نائٹریٹم اور فاسفورس ادویات اپنی اپنی

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## غذا

مریض کو پینے کے لیے سرد پانی دیں اور پہلے ایک، دو سوڑ تو غذا کچھ نہ دیں اور بعدہ آتش جو اور دودھ دیں۔ نیز مریض کو کھلے ہوا فار کمرہ میں رکھیں۔

## کالا آزار۔ کالا بخار

(BLACK FEVER)

یہ عارضہ گرم ممالک میں ہوتا ہے اور اس میں جگر خصوصاً اور تلی بہت بڑھ جاتا ہے۔ بخار بھی بے قاعدہ طور پر ہوتا رہتا ہے جس سے مریض روز بروز لاغر اور اس میں خون کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ یہ مرض بنگال اور آسام میں بہت ہوتا ہے اور ہندو پاک کے دیگر حصص میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے۔

## اسباب مرض

اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کا چھوٹا سا کرم ہے جس کو کرم کالا آزار کہتے ہیں ایک خاص قسم کا کھٹمل اس کرم کو بیمار کے خون سے تندرست اشخاص کے خون میں پہنچاتا ہے۔ یعنی جب کھٹمل کالا آزار کے مریض کو کاٹتا ہے اور اس کا خون چوتھا ہے تو اس کے منہ میں کالا آزار کے کرم چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ کھٹمل کسی دیگر تندرست شخص کو کاٹتا ہے تو یہ کیرٹ۔ اس تندرست شخص کے خون میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے اس میں یہ بیماری سرایت کر جاتی ہے

## علامات مرض

جگر بڑھا ہوا نیز تلی بہت بڑھی ہوئی۔ رنگ مٹیالا کمئی خون کمزوری اور لازمی

بخار بے قاعدہ طور پر چڑھا رہا ہوتا ہے۔ گاہے بگاہے ناک اور مسوڑھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ تپہ اور نخنوں پر سوجن ہوتی ہے اور اگر جگر بہت بڑھ گیا ہو تو استسقا کی شکایت ہو جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں پر آماس آ جاتی ہے۔

## انجام مرض

اگر دست یا مڑ عرصہ تک آتے رہیں یا ناک اور منہ سے جریان خون ہو یا ہاتھ پاؤں پر سوجن آجائے تو اچھا نتیجہ نہیں ہوا کرتا۔ برعکس اس کے اگر کوئی چیچک پیدا نہ ہو بخار کے دورے بڑی بڑی دیر کے بعد ہوں اور کمی خون بھی بہت زیادہ نہ ہوں۔ تو نتیجہ عموماً اچھا ہوا کرتا ہے۔

## تشخیص مرض

گہرے ہوئے طیر یا بخار میں بھی جگر اور تلی بڑھ جاتے ہیں اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک پاک و صاف سوئی نہایت ہی احتیاط کے ساتھ جگر تلی میں چھو کر اور ذرا سا خون نکال کر اس کا خورد بینی امتحان کیا جائے تو خون میں کالا آزار کے کرم موجود ہوں گے۔ اگر کالا آزار کے کرم موجود نہ ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ کالا آزار نہیں۔

## حفظ مآل قدم

کالا آزار کے پھیلانے والے کھٹملوں کو چار پائیل اور بستروں وغیرہ سے نیت و نابود کرنا اس مرض کی روک تھام ہے۔

## علاج

ہومیوپیتھک علاج کو اس مرض میں خاص کامیابی حاصل ہے۔ ایلوپیتھک اس میں کارگر نہیں ہوتی۔

آر سیلکم۔ کا درجہ اس مرض کے علاج میں بہت بلند ہے جب بخار چوبیس گھنٹے

گھنٹوں میں دو مرتبہ تیز ہو جاتا ہو اور کئی خون بہت نمایاں ہو اور جلن بہت زیادہ ہوتی ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۳۰۰ دن میں تین مرتبہ جبکہ بخار کمی پر ہواؤںچی طاقتوں میں دوائی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

ایسپس - جب استسقا ہو۔ پیشاب بمقدار خفیف آتا ہو اور سہ پہر کو خصوصاً تین بجے بخار تیز ہو جاتا ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۳۰۰ دن میں تین مرتبہ

نیٹریم میور - یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ دوائی اس مرض کی ہے۔ بڑھتی ہوئی تکی کو کم کرنے میں نیٹریم میور نہایت کارآمد دوائی ہے لیکن اس کا استعمال کچھ عرصہ تک کرنا چاہیے اور گاہے بگاہے اس دوائی کو بند کر دینا چاہیے اور پھر جاری کر دینا چاہیے۔

✽ خوراک - نمبر ۶۰ یا ۳۰ لیکن نمبر ۳ طاقت بہت مؤثر ہوتی ہے۔

نیٹریم سلف - یہ دوائی نیٹریم میور کے مشابہ ہے اور ورم جگر کے لیے مفید تر ہے جب معدی شکایت زیادہ آشکارا ہوں تو نیٹریم سلف کو ترجیح دینا چاہیے۔

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۶۰ دن میں ۳ مرتبہ

بیسی لائٹیم - نمبر ۲۰ کی ایک خوراک ہر آٹھویں دن دینی نہایت حیرت انگیز اثر پیدا کرتی ہے۔

سائی میکس - یہ دوائی بھی اس مرض میں بہت مفید مانی گئی ہے۔ کئی ڈاکٹر ساحبان کا تجربہ ہے کہ یہ دوائی اس مرض میں بہت افضل ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۶۰ یا ۳۰

علاوہ ازیں یو پا ٹوریم پر فولی ائیم کیپسکیم - ٹاکس و امیکا - رشاکس - کلکیر یا کارب - اور کلکیر یا آرس وغیرہ بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں مفید ہیں۔

غذا - ہلکی اور زود ہضم دینی چاہیے اور ثقیل و دیر ہضم غذا یہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

# پرسوت کا بخار

(PUERPERAL Fever)

یہ ایک عفونی بخار ہے جو کہ زچہ کے خون میں عفونی مادہ کے جذب ہو جانے سے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بخار زمانہ زچگی میں اور اسقاطِ حمل کے بعد ہو جایا کرتا ہے یہ مرض بہت مہلک ہے۔ بعض اوقات یہ مرض دوبار بھی پھیلا یا کرتا ہے۔ یعنی ایک زچہ سے دوسری زچوں کو ہو جایا کرتا ہے۔

ڈاکٹر فرگوسن ایلوپیتھی کے مشہور ڈاکٹر کا قول ہے کہ باوجود تمام ادویات اور تمام ذرائع کے جو ہم کو حاصل ہیں بشکل سے ہم تین مریضوں میں سے ایک کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں اور اگر ہم تین میں سے دو کو بچا سکیں تو ہم بڑی بھاری کامیابی سمجھتے ہیں۔

خوش قسمتی سے ہو میو پیتھی میں ایسی ادویات موجود ہیں کہ جن کو علامات کے بموجب استعمال کرنے اور بر موقعہ مریض کا علاج کرنے سے بڑی بھاری کامیابی ہو سکتی ہے اور شاذ و نادر ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔

اسباب مرض - اس مرض کا باعث ایک کرم مانا گیا ہے جس کو انگریزی اصطلاح میں سٹرپٹوکس پائیو جے نس "کہتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد آنول وغیرہ درست طور پر خارج نہ ہو اور رحم میں خون کے لوتھڑے یا آنول کے ٹکڑے متعفن ہو جائیں یا جنین رحم میں سڑ جائے یا وضع حمل کے وقت دایہ کی انگلیوں یا اوزاروں کے ذریعہ رحم میں زخم ہو جائیں اور ان میں اس مرض کی چھوت لگ جائے تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ دایہ کی غلطی سے یہ مرض ایک مریضہ سے دوسری میں چلا جاتا ہے۔

علامات مرض - بچہ پیدا ہونے کے تین چار یوم کے بعد خفیف جاڑہ لگ کر پابیس ہی بخار چڑھ جاتا ہے بخار کی حرارت ۱۰۳ سے ۱۰۵ درجہ تک ہے۔ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ نبض تیز چلتی ہے۔ ۱۲۰ سے ۱۶۰ مرتبہ فی منٹ اور



رغم کے مقام میں درد ہو کر سبب شرم بچوں جاتا ہے۔ بڑے بچے اور بچہ کو پشت سے بل لٹکانا پڑتا ہے اور مٹکوں کو سکیرنا پڑتا ہے۔ سانس تکلیف آتا ہے اور جلد جلد آتی ہے اور پیاس شدت کی لگتی ہے۔ بعض اوقات متلی اور قہیں آتی ہیں۔ پیاسوں میں دودھ پیدا نہیں ہوتا اور رغم سے رعبیت خارج نہیں ہوتی اور اگر خارج بھی ہوتا ہے تو بہت مختصری مقدار میں اور نہایت متعفن یعنی بدبودار، سر میں نہایت شدید درد ہوتا ہے۔ چہرہ تھمتا جاتا ہے۔ آنکھیں پلکتی ہیں۔ مریضہ کی شکل نہایت قفسر معذوم ہوتی ہے اور اگر مرض کا جلدی آرام نہ آجائے تو تب مرنے کی علامات یا دیگر ملک علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات مریضہ کو ہڈیاں ہو جاتا ہے اس بخار میں ایک عجیب علامت کہیں کہیں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مریضہ نوزائیدہ بچے سے بلکہ اپنے خاوند سے بھی نفرت کرنے لگتی ہے۔ اس مرض میں شفا یا بی بڑی آہستہ آہستہ ہوا کرتی ہے۔

## علاج

ادویات عامہ: ایکونائٹ - آسینکیم - بیپ ٹیشیا - بیلا ڈونا - برائی اونیا - ہائیو سائیمس - مرکیورس - اوپیم - ایسڈ فاس - رسٹاکس - وراڈم ورائیڈ - پانی - وجینم - ایکنیشیا -

ایکونائٹ - یہ دوائی ابتداء بخار میں دی جاتی ہے۔ جبکہ بخار تیز ہو۔ جلد جسم خشک ہو۔ گھبراہٹ اور بے چینی بہت ہو۔ مریضہ ادھر ادھر باغ پاول مارتی ہو اور پیاس شدت کی ہو۔ دودھ کے بخار میں یہ دوائی کیسی ہی کافی تھا کرتی ہے۔ بشرطیکہ اس کے ساتھ دماغی فتور موجود نہ ہو۔  
\* خوراک - نمبر ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

بیلا ڈونا - اجتماع خون ہونے کے باعث سر میں درد چہرہ تھمتا ہو، پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ بڑی بے چینی اور بے آرامی ہو۔ دماغ میں نقص ہو اور ہڈیاں وغیرہ کا ڈر ہو۔ آنول کا اخراج بالکل نہ رک گیا ہو بلکہ بدبودار مواد خارج ہوتا

ہو ایکو نائٹ اور بلیا ڈونا کو باری باری سے دینا مفید ٹھہا کرتا ہے۔

✽ خوراک نمبر ۲۸ یا ۳۰ ہر ایک یا نیم گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا۔ پستان تنے ہوئے ہوں۔ سینہ میں دباؤ ہو اور گولی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ حرکت کرنے سے دردوں میں زیادتی ہو۔ نفاس کا اندام نہانی سے نکلنا بند ہو چکا ہو۔ سر درد کی شدت ہو اور حرکت سے زیادتی ہو۔ جی ملتا ہو اور بیاس کی شدت ہو۔ قبض ہو پاخانہ خشک اور سخت ہو ہلنے چلنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ زبان خشک ہو اور منہ خشک ہو۔

✽ خوراک نمبر ۳۰ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیپ ٹیشیا۔ مریضہ تھکی ٹوٹی ہو۔ اس کا تمام جسم دکھتا ہو۔ بے چین ہو اور نرم جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر کر دہیں بدلتی رہتی ہو مریضہ کا دل زیادہ بے چین رہتا ہو بہ نسبت اس کی جسمانی بے چینی کے آنکھیں وزنی اور بھدی ہوں۔ اکثر ہڈیاں رہتا ہو۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ زبان کے میاں میں بھوری لکیر ہو۔ دانتوں کے اوپر میل جمی ہو۔ تنفس بدبودار ہو اور تمام مواد مثلاً پیشاب اور پاخانہ وغیرہ جو کہ مریضہ کے جسم میں سے خارج ہوں نہایت متعفن ہوں۔ غرضیکہ تب محرقہ کی سی علامات موجود ہوں۔

✽ خوراک نمبر ۵ یا ۱۰ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس۔ مریضہ بے چین ہو اور عضلات دکھتے ہوں زبان کے سرے پر تگونی شکل کا نشان رٹاکس کی ایک خاص علامت ہے۔ مریضہ بے ہوشی میں بڑ بڑاتی ہو اور زہر خورانی کے ڈر کے مارے دوائی لینے سے انکار کرتی ہو۔ کمر اور اعضا میں دردیں ہوتی ہوں۔ جب درد سر نہایت شدید ہو۔ رات کو خاض کر نیم شب کے بعد علامات میں زیادتی ہوتی ہو۔ اور بے چینی زیادہ ہوتی ہو۔ تو

۱۔ وہ خون جو بچہ بننے کے بعد زچہ کو پندرہ سے چالیس روز تک آتا ہے۔ اس کو نفاس کہتے ہیں۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

رٹاکس کو نہیں بھولنا چاہیے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۰ یا ۴۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سمی سی فیوگا۔ جب مریضہ کا پتی ہو۔ ذکی الحس ہو۔ اور اس کو تشنج ہوتے ہوں۔

لفاس ردکیو صفحہ ۱۰۰ کا اشراج رک گیا ہو اور اس کی وجہ سے دروں نہایت شدید و تشنجی ہوتی ہوں یا نفاس مانند پانی کے خارج ہوتا ہو اور ساتھ ہی اس میں خون کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے خارج ہوتے ہوں۔ پستانوں میں ڈنگ مارنے کی سی درد ہوتی ہوں۔

x خوراک۔ نمبر ۱ یا ۱x دن میں دو یا تین مرتبہ

پانی رو جینیم۔ جب سمیت خون کا ڈر ہو۔ اور حرارت جسم بہت تیز ہو۔ مریضہ کی جلد حرارت سے جلتی ہو تو یہ دوائی دی جاتی ہے پرسوت کے سمیتی بخار میں پانی رو جینیم ایک خاص دوائی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۶ یا ۳۰ یا ۲۰۰ دن میں دو مرتبہ ایک خوراک صبح اور شام کو یہ دوائی بار بار نہیں دہرائی چاہیے۔

ایکی نشیا۔ پرسوت کے بخار میں جب خون زہرا کو دھو جائے تو یہ دوائی زہر کے اجزاء کو مارنے میں نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس کے دینے سے حرارت بخار میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ مستورات کے اندام نہانی میں اس دوائی کی پچکاری بھی کی جاتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۶ کے دس سے بیس قطرے دن میں تین مرتبہ یا چار مرتبہ۔

ڈاکٹر جہار صاحب اپنی مشہور تصنیف ”فورٹی ایڈ پریکٹس“ چالیس سالہ پریکٹس میں پرسوت کے بخار کا علاج حسب ذیل تحریر فرماتے ہیں۔

پرسوت کے بخار کے ساتھ خواہ خواہ پیٹ کی آب دار جھلی میں ورم ہو جائے یا ورم رحم ہو یا تپ محرقہ کی سی علامات پیدا ہو جائیں۔ اگر ابتدا ہی میں مجھے علاج کے لیے بلایا جائے تو میں اکیونائٹ نمبر ۳۰ سے علاج شروع کرتا ہوں

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

یعنی دو گویاں تھوڑے سے پانی میں گھول دیتا ہوں اور اس میں ایک چھوٹا چمچ ہر دو یا تین گھنٹہ کے وقفہ پر دیتا ہوں۔ بعض اوقات یہ ایسی دوائی ہی سفایابی کے لیے کافی ہوتی ہے اگر ایکونائٹ کافی ثابت نہ ہو اور رحم میں زیادہ تکلیف ہو تو میں بیلادونا دیتا ہوں۔ اور اگر پیٹ کی آب دار بھٹی زیادہ مبتلائے مرض ہو تو برائی ادویہ دیتا ہوں اور اگر شروع میں میرا علاج نہ ہو بلکہ اس وقت مجھے بلایا جائے جبکہ بخار تب محرقہ کی صورت اختیار کر چکا ہو۔ یا شروع بخار میں تب محرقہ کے علامات آشکارا ہوں۔ بخار کا اثر دماغ پر ہو چکا ہو، تو بیلادونا یا ہائیوسائیمس دیتا ہوں۔ خاص کر جب کہ تشنج بھی شروع ہو گئے ہوں۔ برعکس اس کے اگر تشکی تکلیف زیادہ ہوں اور آبی بدبودار اسہال آتے ہوں اور جسم پر پھنسیاں یا توڑ کی یا نکل آئی ہو، تو رسٹاکس یا آر سینیم دیتا ہوں۔

ایک زیادہ خواب کیس میں جب کہ ایلیو میٹک علاج سے تب محرقہ کی سی حالت پیدا ہو گئی تھی اور مریض بالکل بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ آنکھیں تارے لگی تھیں۔ چہرہ مہیب اور زرد تھا۔ کسی وقت بڑبڑاتی تھی اور کسی وقت تندہ زبان کا دورہ ہوتا تھا اور گلے منہ سے بدبودار سانس دور سے نکلتا تھا اور ہائیوسائی مس۔ رسٹاکس یا آر سینیم کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہاں سلفر کے دینے سے غیر متوقع حالت بہتر ہو گئی۔ اس کے بعد کس و امیکا کے دینے پر مکمل صحت ہو گئی تھی۔

## ضروری ہدایات

مریض کو ٹھنڈا پانی تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیتے رہنا چاہیے اس سے بخار کو تسکین ہوتی ہے اور پسینہ آتا ہے۔ اس جو اور دودھ مریض کو دیتے جانا چاہیے۔ تاکہ اس کی طاقت قائم رہ سکے۔ گرم پانی کے دینے سے قے کو آرام آجایا کرتا ہے۔ مریض جس کمرہ میں ہو وہاں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہونا چاہیے اور

نہ ہی تیمار دار کو تیمار داری کرتے وقت کسی قسم کے غم و فک کا اظہار کرنا چاہیے۔ گلے بگاڑے۔ مریض کا جسم شیر گرم پانی میں تولیہ مہسگو کر اور اس کو پنچوڑ کر اس سے پونچھ دینا چاہیے اور اگر شکم بڑا اتنا بڑا ہو اور درد کرتا ہو تو گرم گرم تھپان کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر اس سے ٹکڑ کر فی چاہیے۔

اگر اندام نہانی میں سے بدبودار نفاس خارج ہوتا ہو تو تھوڑے سے گرم پانی میں چند قطرے ایکی میٹھا کے ملا کر اس سے پچکاری کرنی چاہیے۔ جو ہنی پر سوئی بخار۔ شردخ ہو بچہ کو زچہ کا دودھ پلانا بند کر دینا چاہیے۔

## خسرہ - کھسرہ

(MEASLES Morbilli)

یہ ایک متعدی اور لازمی بخار ہے۔ قبل از بخار شدید ایک قسم کا زکام و نزلہ ہوتا ہے اور بخار کے تیسرے چوتھے یوم منہ زنگ کے دانے جسم پر نکل آتے ہیں اور بعض اوقات اعضائے تنفس میں سوزش واقع ہو جاتی ہے۔

نوٹ: کبھی کبھی یہ مرض و باڑ پھیلا کرتا ہے۔ بچوں کو یہ بیماری عموماً زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اگر جوانوں کو یہ مرض ہو تو اس کا حملہ شدید ہوتا ہے۔

یہ مرض عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ ہوا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی دوسری دفعہ بھی ہو جاتا ہے اس مرض کا زہر ایک مریض سے دوسرے مریض میں پھیل جاتا ہے اور بڑے بڑے شہروں میں یہ مرض عموماً ہر وقت موجود رہتا ہے۔

## علامات مرض

بملاحظہ علامات کے خسرہ کے یہ درجات ہیں۔ (۱) زمانہ خصانت مرض۔ (۲)

بخار۔ (۳) جسم پر چھانٹ (۴) زمانہ انحطاط مرض (۵) عوارض و نتائج مرض  
ان زمانہ خصانت مرض۔ یعنی مرض کے جسم میں ٹھنہ رہنے کا زمانہ جب خسرہ کی چھوٹ ایک ہیما میں لگ جاتی ہے تو اس کو قدرے کمائی ہوتی ہے۔

کاہلی اور سستی زیادہ رہتی ہے اور یہ حالت عموماً آٹھ سے بارہ یوم تک رہتی ہے۔

۲۔ پھر لوزہ سے بخار چڑھ جاتا ہے اور زکام کی علامات آشکارا ہو جاتی ہیں چھینکیں آتی ہیں۔ آنکھیں سرخ ہو کر سوج جاتی ہیں اور ان میں سے پانی بہتا ہے۔ ناک سے بھی پانی بہتا ہے۔ کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ طبیعت میں کاہلی بڑھ جاتی ہے اور بعض اوقات اسہال یا قیئیں بھی آتی ہیں اور کبھی کبھی قبض بھی ہوتی ہے۔ یہ علامات روز بروز ترقی کرتی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ چوتھے یوم جسم پر دانے نمودار ہو جاتے ہیں۔ اعداد اس کو (۳) جسم پر چھانٹ لکنا کھتے ہیں۔ ابتدا میں یہ دانے چہرے پر نکلتے ہیں پھر گردن اور سینہ پر اور اس کے بعد تمام جسم پر نکل آتے ہیں۔ یہ دانے سرخ ہوتے ہیں اور کسی قدر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں اور آپس میں ہلالی شکل کے دھبے بن جاتے ہیں۔ بہ سبب ان دانوں کے چہرہ سوج جاتا ہے۔ تھوڑے دانے نکلنے کی بجائے اگر دانے بکثرت نکلیں تو زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ان دانوں کو باہر نکلنے میں دو تین یوم لگ جاتے ہیں اور یہ تین یوم تک نکلتے رہتے ہیں اس کے بعد بخار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دانے مرجھانے لگتے ہیں۔ ان کی رنگت بھوری ہوتی جاتی ہے اور ان کے اوپر سے گیہوں کی بھوسی کی مانند باریک چھلکے اترتے رہتے ہیں اور اس وقت جسم پر بہت خارش ہوتی ہے۔ جسم پر چھانٹ نکلنے سے پہلے منہ کی لعاب دار جھلی پر دھبے نکل آتے ہیں۔ اور یہ دھبے اس مرض کی تشخیص میں بڑے قیمتی نشان ہوتے ہیں۔ یہ دھبے درمیان میں سفید اور گرد دیں سرخ ہوتے ہیں اور نیچے سے سامنے والے دانوں کی جڑ میں دونوں اطراف میں ہوتے ہیں۔

۳۔ زمانہ انحطاطِ مرض یعنی مرض کے گھٹنے کا زمانہ جب یہ چھانٹ کمی پر ہوتی ہے تو اکثر اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ مفید ہوتے ہیں لیکن اگر یہ اسہال زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوں تو پھر ان کا علاج کرنا ضروری تھا کہ تلبہ بخار کی حرارت عموماً ۱۰۳ درجہ تک پہنچتی ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کو شدید خضر سمجھنا چاہیے اور اگر ۱۰۳ سے بہت کم ہو تو اس کو خفیف خضر سمجھنا چاہیے۔ بخار کا روز عموماً پانچویں روز ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔

شدید خسرہ میں دانوں کا رنگ سیاہی مائل اور غوائی ہوتا ہے اور یہ مرض پُر از خطرہ ہوتا ہے۔

## علاج

**پلٹلا** اگر مرض کے پیدا ہونے کے علامات یعنی نزلہ و کھانسی وغیرہ موجود ہوں، تو دوائی دینے سے مرض بڑھنے نہیں پاتا۔ اگر بخار موجود ہو تو ایکونائٹ دی جاتی ہے۔ یہ بخار کو کم کر دیتی ہے اور بے چینی وغیرہ کو تسکین دیتی ہے۔ کھانسی کم ہو جاتی ہے اور دانے نکل کر مرض اپنا دورہ کم کر دیتا ہے۔ ایسے حالات میں ایکسیل ایکونائٹ ہی کافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر باوجود ایکونائٹ کے استعمال کے نہ تو بخار میں تخفیف ہو اور نہ ہی دانے نکلیں تو اس وقت برائی اونیا دی جاتی ہے۔ اس دوائی کے دینے سے دانے بھی نکل آتے ہیں۔ بخار اور کھانسی کو بھی آرام آ جاتا ہے۔ لیکن اگر برائی اونیا کے استعمال کے باوجود بھی مریض کی حالت اچھی نہ ہو۔ بلکہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے نبض کمزور اور رک رک کر چلے تو ایسی حالت میں ورائٹم ایلم یا آسینکیم یا کاربودیجی کام دیتی ہیں اور بقول ڈاکٹر ہونگ کیمفر نمبر ۳۰ زیادہ مفید پڑتی ہے۔ اگر چھانٹ کے نکلنے میں دیر ہو اور قہیں آتی ہوں تو اینٹیم کروڈم یا اپنی کاک دینی چاہیے۔ اگر دانے تو بخوبی نکل چکے ہوں لیکن بخار میں کمی نہ ہو (جو کہ شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ ماسوائے ان بچوں کے جن کا مزاج خاندیری ہوتا ہے) تو ایسے موقع پر سلفر اکیس کا حکم رکھتی ہے اور سلفر کے دینے سے مرض آبسانی تمام اپنا دورہ ختم کر دیتا ہے۔ ایکونائٹ اور سلفر دونوں ادویات اس مرض میں مدد دینے سے کسی قسم کی پیچیدگیوں سے بچاؤ رہتا ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مرض کا علاج شروع ہی سے ہومیو پیتھک طریقہ پر نہیں کرایا جاتا اس لیے کئی طرح کی پیچیدگیاں پڑ جاتی ہیں۔

## تشریح خواص الادویات

ایکونائٹ - ابتدائی بخار کی تیزی یا دورانِ مرض میں ورم کم کرنے کے لیے یہ دوائی

دی جاتی ہے ابتداء میں یہ دوائی بڑی مفید پڑتی ہے جبکہ گھبراہٹ ہو۔ پیال  
کی زیادتی ہو اور بخار کی تیزی ہو بغض بھری ہوئی ہو نزله ہو اور شدید کھانسی  
موجود ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۱ یا ۳ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

فیرم فاس - بہت سی علامات میں یہ ایکونائٹ کے مشابہ ہے۔ صرف فرق یہ ہے  
کہ ایکونائٹ میں بے چینی اور تشویش بہت پائی جاتی ہیں۔ لیکن فیرم فاس  
میں یہ دونوں علامات موجود نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جب زکام کا زور ہو اور سینہ  
بھی مبتلائے مرض ہو تو فیرم فاس زیادہ موثر دل ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۳ یا ۶ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم - ابتداء میں اس دوائی کا استعمال بہ نسبت ایکونائٹ کے اکثر حالتوں  
میں زیادہ مفید ہوا کرتا ہے یعنی بہت کیسوں میں بمقابلہ ایکونائٹ کے  
جلسی میم کے علامات پائے جاتے ہیں۔ یعنی زیادہ جاڑے کا لگنا۔ بخار کا موجود  
ہونا۔ مریض کا کمزور اور کابل ہونا اور مریض بچہ کا یہی چاہنا کہ کوئی اس کو نہ  
پھیرے۔ ناک سے پانی کا بہنا اور پانی بھی ایسا جو کہ اوپر کے ہونٹ اور ناک کو  
جلا دیتا ہے اور سخت کٹے کھانسی کا موجود ہونا جس کے ساتھ سینہ کا دکھنا اور  
گلابیٹھ جانا یہ سب علامات ہیں جو کہ جلسی میم کو چاہتی ہیں۔ جلسی میم جلد جسم پر  
پر بھی اپنا اثر کرتی ہے۔ اس لیے جب دانے بھی نکل آئے ہوں تب بھی اس  
دوائی کا جاری رکھنا مفید ہوا کرتا ہے جلد جسم سرخ ہوتی ہے۔ اور خارش  
کرتی ہے۔ تمام اعضاء دھکتے ہیں۔

✽ خوراک - نمبر ۱ یا ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا گٹے میں درد۔ نکلنے میں تکلیف اور درد خشک۔ تشنجی کھانسی آنکھوں  
میں سوچن بے چینی اور ہڈیاں کا ڈر لگا رہے۔ دماغ پر اثر ہو۔ حلق اور زبان  
نہایت سرخ اور چمکتے ہوں۔ تپکن کا سرد درد ہو۔ بیمار نیند میں کراہتا ہو۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵



اور سوتے سوتے چونک پڑتا ہو اور باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۱ یا ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

یوفریزیا - جب علامات زکام زیادہ زوروں پر ہوں تو یوفریزیا دوائی کام آتی

ہے۔ آنکھوں سے کڑوا پانی نکلتا ہو اور پردہ ملتحمہ (کنجکٹیوا) سرخ اور سوجا

ہوا ہو۔ کھانسی خشک اور کھردری ہو اور شدید تپکن کا سردرد ہو اور چھانٹ

کے ظاہر ہونے پر سردرد کا آرام ہوتا ہو۔

x خوراک - نمبر ۱ یا ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

خارجی علاج - پندہ یا بیس قطرے یوفریزیا مدرٹسکچر کے آدھ پاؤ پانی میں ڈال کر

اس کا لوشن تیار کر لینا چاہیے اور آنکھوں کو بار بار دھونا چاہیے۔

پسٹلا - تھوڑے دنوں کے بعد پسٹلا کے علامات ظاہر ہوتے ہیں جب کہ بخار کم

ہو چکا ہو یا بالکل ہی اتر چکا ہو۔ نزلہ ہو اور آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہو۔

رات کو تو کھانسی خشک ہو لیکن دن کے وقت تھوڑی بلغم نکلتی ہو۔ کان درد

کرتا ہو اور معدہ میں نقص واقع ہو چکا ہو۔ جب خوراک کی نالی میں سوزش ہو۔

اوردست آتے ہوں تو پسٹلا دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ آنکھیں کچھڑے

بڑھ جاتی ہیں اور گارٹھا کچھڑ نکلتا ہو۔ منہ تو خشک ہو لیکن پیاس ندرد۔

✽ خوراک - نمبر ۲ یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی بانی کرومیکم - بہت حالتوں میں پسٹلا سے مشابہ ہوتی ہے اور جب

پسٹلا کے دینے کے باوجود علامات مرض زیادتی پکڑتی جائیں اور غدد پھول

جائیں تو کالی بانی کرومیکم نہایت مؤثر ٹوا کرتی ہے اور امراض گلو کے لیے یہ

ہماری ایک خاص دوائی ہے جب کہ بھنڈی اور خشک کھانسی آتی ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۳ یا ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر - زمانہ انحطاط مرض میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ جب دانے نکل چکے ہوں۔

بخار اتر چکا ہو اور بیمار رو بخت ہو رہا ہو مرض کے جو جو نقائص باقی رہ جائیں

اس دوائی کے دینے سے اُن کو آرام آجاتا ہے پہلے دو چار یوم تک دو دو تین

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

تین خوراکیں روزانہ بعد میں ایک ایک خوراک روزانہ

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۳۰ یا ۲۰۰ بطریق مندرجہ بالا -

آر سینکیم - جب مرض زیادہ ترقی کر جائے اور کمزوری بڑھ جائے، جلد میں جلن ہو، گھبراہٹ اور اضطراب بہت ہو موت کا خوف ہو - بیمار ٹھنڈا پانی پینے کو چاہے بار بار پیوے اور گھونٹ گھونٹ پیوے اور نیم شب کے بعد مرض میں زیادتی ہو - اسہال آتے ہو ہڈیاں ہو - اسہال خصوصاً بدبودار اور کمزور کرنے والے ہوں تو آر سینکیم دوائی ان حالات میں مریض کی جان بچانے میں کامیاب ہوتی ہے -

ڈاکٹر گانڈی کا خیال ہے کہ مرض خسرہ میں آر سینکیم دوائی اگر حکم رکھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا اثر جادو نما ہوا کرتا ہے مرض کے روک تھام اور اس کی پیچیدگیوں کو دور کرنے میں آر سینکیم دوائی نہایت موثر ہوتی ہے -

✽ خوراک : نمبر ۳۰ یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد -

سٹرامونیم - جب چھانٹ پورے طور پر باہر نہ نکلی ہو یا نکل کر چانک ہی گم اور نابود ہو گئی ہو اور نہایت خوفناک علامات ظہور پذیر ہو گئی ہوں تو چند ایک ادویات میں جو کہ اس موقع پر کام آتی ہیں - سٹرامونیم کا درجہ ان سب میں اول ہے مندرجہ ذیل علامات کی موجودگی میں یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے - چھانٹ کا نہ نکلنا بچے کا گرم اور بے چین ہونا اور سوتے سوتے چلا اٹھنا گویا کہ وہ ڈر گیا ہے - تشنجی حرکات کا موجود ہونا اور چہرہ کا سرخ ہونا

✽ خوراک : نمبر ۶۰ یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد

کوہ پریم - جب چھانٹ کے یکایک گم ہو جانے کے باعث تشنج ہونے لگ پڑیں اور جلنے پر بچہ کو بہت خوف لگتا ہو اور چہرہ بجائے سرخ ہونے کے نبلگوں پڑ گیا ہو تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے -

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۱۲ ہر دو گھنٹہ کے بعد -

زنکیم - زنکیم میں بھی وہی علامت پائی جاتی ہے - یعنی فینڈ سے میدار ہونے پر بچہ ڈر جاتا ہے اور زنکیم کی یہ خاص علامت ہے کہ بچہ اتنا کمزور ہوا کرتا ہے کہ بوجہ کمزوری کے چھانٹ

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

بخوبی نہیں نکل سکتی۔

\* خوراک - نمبر x ۳ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

اینیم مارٹ - جب چھانٹ بخوبی نہ نکلی ہو یا نکل کر کم ہو گئی ہو سانس بڑی دقت سے آتا ہو۔ پیغم کھڑکتی ہو چہرے کا رنگ نیلگوں یا ارغوانی ہو گیا۔ غنودگی ہو اور عضلات جھٹکتے ہوں۔

\* خوراک - نمبر x ۶ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا - یہ دوائی مفید ہوتی ہے جب کہ چھانٹ، دیر سے نکلے یا بے قاعدہ نکلے اور جب کہ سینہ کے ورمی امراض بھی موجود ہوں کھانسی خشک اور درد سے آتی ہو تمام اعضائے جسم دھکتے ہوں اور چھاتی میں تھپن پڑتی ہو ابتداء میں یہ دوائی اکیونائٹ کے ہمراہ باری باری سے دی جاتی ہے تاکہ مونیہ اور نشید کھانسی کا خوف جاتا رہے۔ برائی اونیا کی یہ بھی علامت ہے کہ بیمار جب بستر پر سے اٹھنے کو اس کو متلی اور غشی ہو۔

جب کھانسی کی شکایت حد سے بڑھ جائے تو برائی اونیا اور اینیم مارٹ باری باری سے بھی دیتے ہیں

\* خوراک - نمبر x ۲ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد

شکلا - فاسفورس - روکیس - ڈراسر اور سباڈلا ادویات: بھی مرض خسرہ میں کام آتی ہیں جبکہ

اس مرز کے ساتھ سینہ کے امراض بھی پیدا ہو گئے ہوں۔

۵۔ عوارض و نتائج مرض - حادثہ شدید امراض یا تو اپنی شدید علامات کے باعث خوف ک و خطرناک ٹھاکتے ہیں یا کسی دیرینہ مرض کو جو کہ قبل ازان بیمار کے جسم میں پوشیدہ ہو جگا دیتے ہیں۔ خسرہ کے بعد کئی قسم کے عوارض لاحق ہو جایا کرتے ہیں جن کا علاج کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ عوارض بڑے خطرناک ثابت ہوئے ہیں۔

یہ عوارض کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ غلط اور بہ اصول علاج کا نتیجہ ہوا کرتے

ہیں۔ لیکن ہومیوپیتھک علاج اور بیمار کی پوری حفاظت اور تیاری کو نئے سے ان عوارض کا ظہور نہیں ہوتا اور مریض جسکی تکالیف سے بچا رہتا ہے۔

اگر دونوں کے ہٹ جانے کے بعد بھی مریض کی حواست جسم ۱۰۰ درجہ فارن ہٹ چکی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ جسم میں کوئی نہ کوئی پیچیدگی موجود ہے۔ موٹے موٹے امراض (عوارض) بمعہ علاج ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی پیچیدگی جس کا ذکر ہوا کرتا ہے سوہ برا کو نمونیا ہے جو کہ بے شمار کیوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے لیے اینٹیم ٹارٹ۔ فاسفورس۔ اپنی کاک۔ کالی میو۔ اور برائی اونیا اعلیٰ ادویات ہیں۔

آنکھوں کے پتھوٹوں کا ورم۔ مرکریس۔ سلفر۔ ایکونائٹ۔ بیلادونا۔

ہر جین یا کالہ سے بدبودار مواد کا بہتے رہنا۔ پستلا۔ سلفر۔ سلیٹیا۔ مرکوریس۔ ہیرپلس۔ بیلادونا (دوائی) ایک حصہ اور گلیسرین ۵ حصہ ملا کر کان میں ڈالنی چاہیے۔

غددوں کا بڑھ جانا۔ مرکوریس۔ آیوڈیم۔ کلیریا کرب۔ لائیکو پوڈیم۔ امراض سینہ کالی کھانسی۔ شدید کھانسی۔ گلے کا بیٹھ جانا وغیرہ فاسفورس۔ ہیرپلس۔ کالی بائی کرب۔ سپنجیا۔ آرسینکم۔ کاسٹی کم۔ کاربووہیجی۔ سلفر وغیرہ۔

شدید نمونیا۔ برائی اونیا۔ فاسفورس۔ سلفر۔ کلیریا۔ پستلا وغیرہ۔ جسم پر چھانٹ کا نکلنے رہنا۔ سلفر۔ آیوڈیم۔ آرسینکم وغیرہ۔

گلے کے بیٹھ جانے کی مزمن مرض میں کاربووہیجی۔ ڈراسرا۔ سلفر وغیرہ۔ مزمن بلغمی کھانسی میں۔ پستلا۔ سلفر۔ ڈلکا مارا۔

دیرینہ اسہال کے مرض میں اپنی کاک نمبر ۱۵ ٹری ٹوڈیشن۔ یہ بڑی مفید دوائی ہے۔ آرسینکم۔ کاربووہیجی۔ سلیٹیا۔ مرکریس اور چائنا بھی مفید ہوتی ہیں۔

درم امعد میں۔ جس کو انگریز کایں یا این ٹرائی ٹس کہتے ہیں۔ فاسفورس سلفر  
آرسینکیم۔ رساکس سوراٹرم۔ ایلیم۔

چھانٹ ظاہر ہو کر پھر گرم ہو جانے کی حالت میں جیسی میم۔ امونیم کارب۔ برائی ادینا  
زہکم۔ کو پریم۔ سلفر وغیرہ۔

**ضروری ہدایات** اس مرض میں ہر قسم کے نشہ کا استعمال ممنوع ہے۔ تیزی

مرض میں دودھ وغیرہ نرم اغذیہ دی جاتی ہیں۔ پھر آہستہ  
آہستہ اصل غذا پر مریض کو لایا جاتا ہے جوں جوں بخار اترتا ہے۔ مریض کو ایسے  
کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ جس میں روشنی مدھم ہو، تاکہ آنکھیں ابھی طرح کھل سکیں۔  
لیکن تازہ ہوا کی آمد و رفت کا کافی انتظام ہونا چاہیے روزمرہ بیمار کے جسم کو  
گرم و تر تولیہ سے صاف کرنا اور جس حصہ جسم کو گرم تولیہ سے صاف کیا جائے  
اس کو فوراً خشک کر لینا اور ڈھانپ لینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر بوقت صبح  
آنکھیں مندمی ہوئی ہوں تو نیم گرم پانی سے توکر کے ان کو کھول لینا چاہیے۔  
مرض سے شفایاب ہونے کے بعد بیمار کو کافی پارچات پہنا کر باہر کھلی ہوا میں  
نکانا چاہیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ موسم صاف ہو اور اگر سردی زیادہ ہو تو پھر  
باہر نہیں نکانا چاہیے۔ مبادا کہ بروز نکائیس نمونیہ وغیرہ کے امراض نہ آدباں۔  
بادام روغن کو جسم پر ملنا چاہیے۔ اس سے جسم کی گرمی اور جلد کی سختائی دور  
ہو جاتی ہے۔ قبض کی سورت میں بادام روغن کا ایک چمچ اندر بھی پلانا چاہیے  
ہاتھوں اور پاؤں پر ویسلیں ملنی چاہیے۔ مریض کو پینے کے لیے تازہ پانی۔  
دودھ اور لیمونڈ وغیرہ دینے چاہئیں۔

**مانع مرض ادویات** اگر پہلا نمبر ۳ کی خوراک بوقت صبح اور ایکونائٹ

نمبر ۳ بوقت شام بچہ کو پلائی جائیں تو بچہ خسرہ کی  
بیماری سے بچا رہتا ہے اور اگر مبتلائے مرض ہو بھی تو بھی بہت خفیف تکلیف  
ہوتی ہے۔

پلسا ٹیلا خسرہ کے زہر کو ہلاک کرنے میں خاص فوقیت رکھتی ہے۔

# پچھک - مائے سیلا

(SMALL-POX Variola)

یہ ایک قسم کا شدید متعدی بخار ہے۔ اس میں ایک قسم کے دانے نکل آتے ہیں جو کہ شفا یاب ہو جانے پر اپنے دائمی نشان چھوڑ جاتے ہیں۔

یہ بیماری جب ایک مرتبہ ہو جائے تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ہوتی یہ بیماری دوبارہ پھیلا کرتی ہے۔

**علامات**۔ ابتداء میں لرزہ سے بخار چڑھ جاتا ہے۔ سرور و بعض اوقات بے ہوشی۔ زبان پر گاڑھی سفید فرجی ہوئی چہرہ سرخ تھمتا ہوا۔ نبض بھری ہوئی بھدی اور تمام جسم میں درد خاص کر کمر اور سر میں زیادہ، فم معدہ میں بھی کم و بیش درد ہوتا ہے۔ اور قے آتی ہے۔ کمر میں درد اور قبضوں کا آنا ابتداء میں یہ خالص علامات ہیں۔ جب یہ دونوں علامات بڑی تیزی سے حملہ کریں تو سمجھنا چاہیے کہ مرض کا حملہ شدید ہے۔ تیسرے یا چوتھے روز بہت باریک دانے نکل آتے ہیں اور جسم کا چمڑہ سرخ ہو جاتا ہے ابتدا میں یہ دانے چہرہ گردن اور کلائیوں پر نکلتے ہیں۔ پھر جسم پر اور آخر میں ٹانگوں پر۔ اگر بغور ملاحظہ کیا جاوے تو منہ کے اندر تالو میں بھی یہ دانے دیکھنے میں آتے ہیں گلے اور ہوا کی نالی پر بھی یہ دانے نکل آتے ہیں جس سے گلے میں درد اور منہ میں زیادہ رال کا آنا اور کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ دانے روز بروز بڑھتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخار ہونے کے آٹھ یوم تک ان کے اندر پہلے جو شفاف پانی تھا۔ اب زردی مائل رطوبت بھر جاتی ہے اور ہر ایک دانے کے گرد ایک سرخ حلقہ بن جاتا۔ ہنہ اور دانے کی نوک اندر کی جانب دب جاتی ہے۔

بجائز نکلیں اور آپس میں ملے ہوئے ہوں تو اس کو گھنی چیمپک کہتے ہیں۔ اس

میں پوچھو اور چہرہ پر سوجن پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوجن اتنی ہوتی ہے کہ چہرہ کو بد صورت بنا دیتی ہے اس وقت مریض کے جسم سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی شروع ہو جاتی ہے۔ جو سوائے چیچک کے مرض کے اور کسی مرض میں پیدا نہیں ہوتی۔

ابتداء میں جب یہ دانے نکلتے شروع ہوتے ہیں تو بخار جو تین یوم سے شدت سے چڑھا ہوا ہوتا ہے بہت خفیف ہو جاتا ہے لیکن پھر جبکہ مرض کا زور ہوتا ہے تو بخار شدت سے حملہ کرتا ہے جس کی حرارت ۱۰۴ یا ۱۰۵ درجہ تک یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کو سینڈری فیور یا بخار ثنائی کہتے ہیں۔ مریض کو دم لینے اور نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اکثر ہڈیاں ہو جاتا ہے۔ دانے نکلتے سے آٹھویں روز کے بعد مرجھانے شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے تین چار یوم کے بعد ان پر بھورے یا سیاہی مائل بھورے رنگ کے کھرنڈ بن جاتے ہیں اور پھر اس سے پانچ چھ یوم کے بعد یہ کھرنڈ اٹھنے لگتے ہیں اور عموماً ایک یا دو ماہ تک یہ کھرنڈ اترتے رہتے ہیں۔ کھرنڈ اتر جانے کے بعد چہرہ پر سرخ بھورے رنگ کے داغ رہ جاتے ہیں۔ اگر شدت مرض کے باعث جلد جسم گل جائے تو شفا یابی کے بعد بجائے داغوں کے گٹھے پڑ جاتے ہیں۔

**تشخیص** یہ ضروری امر ہے کہ اس مرض کی تشخیص ابتداء میں ہی کی جائے تاکہ مریض کی حفاظت ہو سکے اور بیماری دو سروں تک نہ پھیل سکے کہ میں شدید درد (جو کہ واضح طور پر عضلاتی درد نہ ہو) اس مرض کی خاص علامت ہے۔

خسرہ اور چیچک میں یہ فرق ہے کہ چیچک کا دانہ چھوٹے سے بخوبی معلوم پڑتا ہے اور جلد کے نیچے گولی سی معلوم دیتی ہے۔ لیکن خسرہ کے دانوں کی ڈھیریاں عموماً ہلال کی شکل کی ہوتی ہیں اور چیچک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دو امراض کے اوائل کے علامات میں بھی نمایاں فرق ہوتا ہے۔ جس سے تشخیص میں بڑی مدد ملتی ہے۔ خسرہ میں زکام بہت تیز ہوتا ہے لیکن چیچک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تب محرقہ اور چیچک کے بخار میں یہ فرق ہے کہ چیچک کے بخار کا حملہ چانک ہوتا ہے یکا یک تیز چڑھ جاتا ہے۔ لیکن تب محرقہ کا بخار اندر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔

چیچک اور کا کڑا لا کڑا میں یہ فرق ہے کہ چیچک کا دانہ بھر جاتا ہے اور پیپ پڑ جاتا ہے اور بخار کی شدت ہوتی ہے لیکن کا کڑا لا کڑا کے دانے میں عموماً پیپ نہیں پڑتی اور نہ ہی بخار زیادہ شدت کا ہوتا ہے۔ کا کڑا لا کڑا کے دانے پہلے دن سے ہی نمودار ہو جاتے ہیں اور ابھرے ہوتے ہیں اور پھونکے سے ایسے سخت نہیں ہوتے جیسا کہ چیچک کے دانے ہوتے ہیں۔ لیکن چیچک کے دانے بخار آنے سے تیسرے چوتھے یوم نمودار ہوتے ہیں۔

**خطراتِ مرض** (سیکڈری فیور یا ثانوی بخار) کا حملہ اس مرض میں سخت ترین

زمانہ گزرتا ہے۔ یہ عموماً نویں اور بارہویں دن کے اندر ہوتا ہے۔ جس وقت چیچکے پکنے لگتے ہیں۔ تو بخار کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور طاقتِ زیست چونکہ پہلے سے ہی کمزور ہوتی ہے اس لیے اس وقت میں کئی ایک مہلک امراض کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ورم جنجرہ۔ پورسی۔ منونیہ وغیرہ۔ نیز آنکھ میں گھاؤ یا جھائی پڑ جاتی ہے اور آنکھ اپنی بنیائی کھو بیٹھتی ہے اور بعض اوقات آنکھ میں پھولا پڑ جاتا ہے۔ کبھی کانوں کی اندرونی ہڈیاں گل سر جاتی ہیں اور طاقتِ سماعت زائل ہو جاتی ہے کبھی جلد میں سوزش پیدا ہو کر خراب نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی معدہ اور انتڑیوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ اور دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹر مارین کا قول ہے کہ اگر یہ مرض ساٹھ سالہ آدمی یا اس سے زیادہ عمر والے میں ظاہر ہو تو مشکل سے کوئی بچتا ہے۔ سخت قسم کی چیچک میں ہڈیاں اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اگر بے ہوشی مرض کے ابتداء ہی میں پیدا ہو جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہوا کرتی ہے اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اس مرض کا حملہ بازاری مستورات پر یا ایسے اشخاص پر جن کی عادات عیاشانہ ہوتی ہیں۔ زیادہ خطرناک ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ ایسے اشخاص نشہ میں ہمیشہ غرق رہا کرتے ہیں۔ زیادہ اجتماعِ خون بے خوابی اور چڑچڑاہٹ اس مرض میں اچھی علامات نہیں سمجھی جاتی ہیں۔ برعکس اس کے خاموشی۔ طبیعتِ اور دل کا قرار ہچکے نشانات سمجھے جاتے ہیں۔ چھوٹے تنگ و تاریک مکانات تھوڑی اور کمزور غذا۔ ناکافی پارچاتِ عدم صفائی اور نشیات کا استعمال اس بیماری کو زیادہ خطرناک کر دینے میں مدد دیتے ہیں۔ کبھی آلاتِ بول متلا ہو کر پیشاب آتے وقت ٹیسس پڑتی ہیں اور کبھی خونی پیشاب



آنے لگتا ہے۔

**اسباب مرض** یہ مرض چھوٹے سے بوجھتا ہے۔ یعنی اس مرض کا باعث ایک خاص قسم کے خوردبینی جراثیم ہیں جو کہ مرض کو پھیلاتے ہیں۔ چیمپکوں کی رطوبت اور نیز مریض کے تنفس کے ذریعہ اس مرض کی چھوٹ دوسروں میں پھیلتی ہے۔ مریض کے پاس بیٹھنے اور اس کے پاس کو بچھونے سے تندرست اشخاص میں یہ جراثیم پھیل جاتے ہیں ہر ملک اور قوم میں یہ بیماری پھیل جاتی ہے۔ موسم بہار اور سرما میں یہ عموماً پھیلا کرتی ہے۔

## علاج

**ایکونائیٹ** - بخار یکایک تیز چڑھ جادے۔ پیاس اور بے چینی ہو یہ ایکونائیٹ کے خاص علامات ہیں۔

بعض ڈاکٹر صاحبان ابتدا میں ایکونائیٹ کی بجائے جلّی میم کو زیادہ مفید مانتے ہیں۔ مگر اور تمام اعضاء کا دکھنا اور سردی کے ساتھ مضبوط باندھے ہوئے کا احساس جب موجود ہو اور ساتھ ہی طبیعت میں کاہلی اور لا پرواہی بھی پائی جائے تو پھر جلّی میم کے مظہر ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۳۰ ہر نیم گھنٹہ کے بعد

**بیلادونا** - جب اجتماع خون بجانب سر ہو۔ سردی اور کمر میں درد شدید ہو۔ چہرے کا رنگ ارغوانی ہو۔ روشنی ناقابل برداشت ہو۔ تو بیلادونا دوائی زیادہ مفید ٹو اکرتی ہے۔

ڈاکٹر ہوگیس کا فرمان ہے کہ ابتدائہ بخار میں ایکونائیٹ کی نسبت بیلادونا اکثر زیادہ مؤثر ٹو اکرتی ہے۔ دونوں ادویات بار بار ۱۴ بار سے بھی دی جاسکتی ہیں۔

✽ خوراک - نمبر ۲۰ یا ۳۰ ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

**برائی اوینا** - یہ دوائی بھی ابتداء میں کام آتی ہے جبکہ آبکائیاں قیئیں شدید سردی

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

اور بنجارتیز ہو۔ چھیکے جلدی نمودار نہ ہوتے ہوں۔ بلکہ دیر ہو رہی ہو۔ پیاس کی شدت اور قبض موجود ہو۔ اور ملنے جلنے سے تکلیف ہرتی ہو۔ اس دوائی کے دینے سے چھیکے جلد اور کھل کر نکل آتے ہیں۔

✽ خوراک : نمبر ۳۰ یا ۳۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سمی سی فیوگا۔ جب کمزور شدید ہو اور وجع المفاصل کے درد ہوتے ہیں۔ تمام جسم دکھتا ہو۔ بستر سخت لگتا ہو اور عضلات ایسے معلوم پڑتے ہوں۔ گویا کہ کسی نے مار کوٹ کر دھردیل ہے۔

✽ خوراک : مدرٹنکچر کے ۲ سے ۵ قطرے یا نمبر ۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد

رٹاکس۔ بھی برائی آویا اور سمی سی فیوگا کے مانند اس وقت کام آتی ہے جب کہ سر درد اور بے چینی بہت ہو اور چھیکے نکلنے شروع ہو گئے ہوں اور چھیکے چھوٹے ہوں اور چھیکوں میں مواد پڑ کر سیاہ ہو گئے ہوں اور اسہال و خوان سے نت پت پاخانے آتے ہوں۔ زبان خشک اور چٹختی ہوئی اور اس کے سرے پر نکون کی شکل ہو اور لبوں پر میل جمی ہوئی ہو رات کو خاص کر نیم شب کو تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔

✽ خوراک : نمبر ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایپیس۔ چہرہ اور پوتوں پر بہت سوزش اور حلق میں جلن اور نیش زنی کا سا درد ہو جب خارش اور سوجن بہت ہو تو ایپیس دوائی کام آتی ہے۔

✽ خوراک : نمبر ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایٹیم طارٹ۔ چھیک کے مرض میں یہ دوائی کسیر کا حکم رکھتی ہے جب چھیک کے مرض کی تشخیص ہو جائے تو یہ دوائی دینی شروع کر دینی چاہیے۔ مگر میں درد قیئیں اور مدہوشی یہ اس کی خاص علامات ہیں۔ یہ دوائی معدان مرض میں ہر وقت دینی مفید ہوتی ہیں اور اگر کسی اور دوائی کی علامات آشکارا ہوں تو وہ دوائی اور یہ دوائی باری باری سے دینی چاہئیں۔ یہ دوائی مانع مرض بھی ہے۔

✽ خوراک : نمبر ۳۰ یا ۶۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

✽ دوائی کی مقدار ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

کیمفر۔ اگر چھپکے یکایک گرم ہو جائیں یا آٹا کا نا حالت نازک ہو جائے تنگی تنفس۔ جسم ٹھنڈا اور دماغ کے شل ہو جانے کے علاوہ آشکارا ہو جاویں تو اس دوائی کی مدد شکم کے دو دو تین تین قطرے نیم گرم پانی یا مصری یا تاشہ کے اوپر ڈال کر آٹھ آٹھ دس دس منٹ کے وقفہ پر دینے چاہئیں حتیٰ کہ جسم گرم ہو جاوے اور دسے بھی نکل آئیں۔

✽ خوراک: مدد شکم کے تین یا چار قطرے مصری کی ڈلی یا تاشہ پر ڈال کر منہ میں ہر پانچ یا دس منٹ کے بعد رکھتے جانا چاہیے اور اس طرح سے چار مرتبہ دوائی دینی چاہیے۔

سلفر۔ جب مرض بے قاعدہ دورہ اختیار کر رہی ہو جب چیمپکوں کے اندر چلے جانے کا دہ پیدا ہو گیا ہو یا جب چھپکے بجائے شفاف یا پپی رنگت کے سبز اور خونی اور سیاہ رنگ کے ہوں جب چھپکے سخت کھجلی گھریں اور کھرنڈا ترنے پر ہوں۔ یعنی جب بیماری کمی پر ہو تو یہ دوائی متواتر شفا پانے تک دیتے جانا چاہیے۔

✽ خوراک: نمبر ۶ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد آر سینکیم۔ جب مرض روز بروز خراب ہوتا جا رہا ہو یا خونی چیمپک ہو اور شدید صورت اختیار کر لی ہو۔ نقاہت بدرجہ کمال ہو۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے منہ سو جاتا ہو اور سرخ۔ اندو گہیں مزاج تنگی تنفس۔ تیز کمزوری بے قاعدہ نبض بکثرت ٹھنڈا پسینہ (تریلی) اور بے چینی بہت ہو۔

✽ خوراک: نمبر ۳۰ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد ہما ٹیس۔ جب کھرنڈوں سے خون نکلتا ہو تو یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک: مدد شکم پر یا ۱۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔ کروٹیس۔ لاکس اور بیپ ٹیشیا ادویات بھی کام آتی ہیں جب کہ مرض شدید صورت اختیار کیے ہوئے ہو اور تپِ محرقہ کی علامات بھی موجود ہوں۔ مرض کی روک تھام کی ادویات جن کو انگریزی میں پرو فیکلٹسکس کہتے ہیں۔ ویرولاکیم۔ یہ دوائی نمبر ۶ یا ۳۰ طاقت میں ایک خداک صبح اور ایک خوراک شام کو کچھ عرصہ استعمال کرنے سے رجید صبحہ میں بیماری موجود ہو اس

مرض کے حملہ سے بچاؤ رہتا ہے۔

ویکسی نائیم - نمبر ۳ اسی طرح صبح اور شام استعمال کرنے سے مرض سے بچاؤ رہتا ہے۔ دیگر ادویات سلفر - اینٹیم مارٹ اور تھو جا بھی اس مطلب کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ تازہ ہوا اور روشنی میں بود و باش بھی دافع چھوت مرض ہے۔

ترکیب جس سے جسم میں گڑھے پڑنے سے بچاؤ ہے چہرہ کو ڈھانپے رکھنا اور روشنی سے بچانا یہ ضروری امر ہے۔ دھوپ میں ایک خاص قسم کی کرنیں ہوتی ہیں جن کو انگریزی میں ایکٹنگ ریز کہتے ہیں۔ یہ کرنیں مریض چیچک کی جلد پر ورم اور کھجلا، کو زیادہ کرتی ہیں۔ اس لیے مریض کو ایسے کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ جس میں سرخ رنگ کے پردے لگے ہوئے ہوں اور سرخ رنگ کے شیشے دروازوں کو لگے ہوئے ہوں۔ ایسا کرنے سے سورج کی ایکٹنگ کرنیں اندر داخل نہیں ہو سکتیں اور اس ترکیب سے بیمار کے چیچکوں میں ورم اور کھجلا ہٹ میں زیادتی نہیں ہونے پاتی۔ چنانچہ ہندو پاک میں بیمار کو سرخ پارچاٹ پہنانے کا دستور جاری ہے اس سے بھی مذکورہ بالا مطلب حل ہو سکتا ہے۔ چیچکوں کے اوپر روغن زیتونی یا بالائی (ملائی) یا ایک حصہ گلیسرین اور دو حصہ پانی ملا کر اور روشن بنا کر وقتاً فوقتاً ملے رہنا چاہیے۔ نیز ملائی اور آٹے کا ٹٹنا بنا کر ملنا بھی مفید پڑتا ہے۔

کھڑک اترنے کے وقت - سلفر وائی کا استعمال ضروری ہے۔ گرم پانی سے چیچکوں کو دھونا اور صاف رکھنا۔ نیز آرنیکا لوش کی طاقت والے سے دھونا مریض کے لیے نہایت تسکین دہ ہوتا ہے۔ جبکہ کھجلا ہٹ ہو۔ ایک حصہ آرنیکا مدرکچر اور نو حصہ پانی۔

ضروری ہدایات - بیمار کو ٹھنڈے کمرے میں رکھنا چاہیے اور اس کے پارچاٹ بسترے زہنا چاہیے۔ تازہ ہوا کی آمد و رفت کا کافی انتظام ہونا چاہیے۔ خراب آب و ہوا یا زیادہ گرم اشیا کا استعمال جلدی شفا یابی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ سوں سر میں انگیٹھی کرے میں جلتی رہے اور بیمار کے اوپر ڈھانپنے کے لیے کافی پارچاٹ ہونے چاہئیں۔ لیکن ہوا کی آمد و رفت کے لیے کھڑکیاں اور دروازے کھلے رہنے چاہئیں۔ جب چیچکوں سے مواد بہتا ہو تو چادروں کا باریک ٹما کپڑا چھان

کو کے زخموں پر چھپرک دینا چاہیے۔ اس طرح سے چھپکے جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ درد کمر کے لیے مقام درد پر سینک کر دینا چاہیے۔ مریض کے ہاتھوں کو کپڑے سے باندھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ کھجلاہٹ کر کے اپنے آپ کو زخمی نہ کر سکے۔ مریض کے صحت یاب ہونے پر اس کے پارچات کو یا تو جلا دینا چاہیے اور اگر جلا دینے مطلوب نہ ہوں۔ تو ابلتے ہوئے پانی میں خوب صاف کر لینے چاہئیں اور کمرے میں گندھک جسلانی چلبیے۔ دیواروں اور فرش کو خوب دھلا کر صاف کر لینا چاہیے اور دیواروں پر سفیدی کرالینی چاہیے۔

**غذا**۔ دودھ اور دیگر نرم غذا دینی چاہیے۔ ٹھنڈے پانی کا استعمال ٹھیک ہوتا ہے۔ گرم پانی نہیں دینا چاہیے۔ بعض مستورات بعض اوقات گرم چیزیں کھانے اور گرم پانی پلانے پر ضد کرتی ہیں۔ ان کو ایسا کرنے سے باز رکھنا چاہیے۔ سرد پانی بڑا مفید پڑتا ہے۔

## چھپک کی ریسپرٹری یعنی علاج الامانات

(REPERTORY)

ابتلے مرض میں	ایکونائیٹ۔ سمی سی فیوگا۔ ایٹیم ٹارٹ
شدید درد کمر میں	سمی سی فیوگا۔ ہائیڈراسٹس
جلن اور دنگ مارنے کی سی دویں	ایپس۔ مرکوریس
آنکھوں کی خرابی میں	مرکوریس۔ سلفر
مالیں بہت آئیں	مرکوریس
گلا دکھتا ہو۔	ایپس۔ براٹشامیور۔ بیلاڈونا۔
کسی اور مخرج سے خون جاری ہو	مرکوریس۔ ہائیڈراسٹس
جب چھپکے نکل کر گرم ہو جائیں۔	آر سینیکم۔ لاکس۔ فاسفورس
	آر سینیکم۔ کیمفر۔ سلفر

# چھپک کا ٹیکہ

(VACCINATION)

پیدائش سے ۷ کرتین ماہ کے اندر بچے کو ٹیکہ کر دینا چاہیے۔ جس کو ابھی دانتوں کا نکلنا شروع نہ ہوا ہو۔ تندرست موٹے تازے بچوں کو مہینے یا ڈیڑھ مہینے کی عمر میں اور کمزور بچوں کو اڑھائی یا تین مہینے کی عمر میں ٹیکہ کر دینا چاہیے اور چھ ماہ کی عمر تک تو ضرور ٹیکہ لگوا دینا چاہیے۔ کیونکہ اس کے بعد بچے دانت نکلنے شروع کر دیتے ہیں اور وہ ٹیکے کے لیے موزوں نہیں ہوتا مگر خدا نخواستہ مرض چھپک پھیل رہا ہو تو پھر عمر کا کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے۔

چھپک سے بچنے کے لیے تمام عمر میں تین بار ٹیکہ لگوانا چاہیے مگر کم از کم دوبار تو ضرور لگوانا چاہیے ایک بار بچپن میں اور دوسری بار گیارہ یا بارہ برس کی عمر میں۔

## احتیاط

ٹیکہ لگواتے وقت بچہ پچیش یا اسہال یا بخار یا کسی جلدی مرض میں مبتلا نہ ہو۔ اگر مبتلا ہو تو پھر ٹیکہ نہیں کرنا چاہیے۔

ٹیکہ کو ان کے بعد بچے کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹیکہ شدہ مقام کو رگڑ میل کچیل اور سردی و گرمی سے محفوظ رکھنا چاہیے چونکہ بازو کے بالائی حصہ میں کیا جاتا ہے اس لیے گرتے یا قمیض کی آستین کو احتیاط سے باندھ دینا چاہیے اور دانوں کے اوپر صاف ستھری روئی کی پتلی سی گدی بنا کر اوپر سے ایک کپڑے کی پٹی باندھ دینا چاہیے اور بچے کے ہاتھوں پر صاف کپڑے کی تھیلیاں چڑھا دینی چاہئیں تاکہ وہ دانوں کو کھجلا کر پھیل نہ دیوے۔

درست ٹیکہ لگنے کے علامات - ٹیکہ شدید مقامات کس قدر سرخ ہو کر تیسرے روز ابھرتے ہیں۔ چوتھے روز دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پانچویں روز خفیف سا بخار ہو جاتا ہے۔ چھٹے روز دانوں میں شفاف رطوبت

بھر کر ان کی نوکیں دب جاتی ہیں اور دانے کے گرد سرخ ساحلقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب بخار بھی تیز ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اسہال آنے لگتے۔ ساتویں سے دسویں روز تک رطوبت پیپ میں بدل جاتی ہے۔ بارہویں سے پندرہویں یوم تک دانے خشک ہو جاتے ہیں اور بیویں سے بچیسویں دن کے اندر کھرنڈ بھر کر وہاں ہمیشہ کے لیے داغ رہ جاتے ہیں۔ اگر ٹیکا لگوانے کے بعد مذکورہ بالا علامات پیدا نہ ہوں۔ یعنی دانے وقت مقررہ کے آگے چھچک نکلیں اور بڑے بڑے ہوں اور نوکیں ان کی دبی ہوئی ہوں یا بچے کے جسم پر سرخ سرخ دانے نکل آئیں یا کچھ الی یا پھوٹے پیدا ہو جائیں یا ٹیکہ شدہ مقام پر بد نما زخیم بن جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ ٹیکا درست نہیں لگا۔

## علاج

ایکونائٹ اور بیلادونا۔ جب بخار ہو۔ دم اور سرخی بہت زیادہ ہو تو یہ دونوں ادویات باری باری سے ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ پر دہرائی جائیں۔  
✽ خوراک : نہر ۳

تھو جیا۔ جب جلی دار پھنسیاں جسم پر نکل آئیں اور کمزوری بہت زیادہ ہو تو یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔

✽ خوراک۔ (۵) مدرشکر کا ایک قطرہ صبح اور ایک قطرہ شام کو ایک گھنٹہ تازہ پانی میں ڈال کر۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۱۲۰

# کاکڑا - لاکڑا - موتیا - سیلا

(CHICKEN POX Vericella)

یہ ایک متعدی مرض ہے۔ پہلے خفیف بخار ہوتا ہے اور چوبیس گھنٹہ کے بعد نشت اور بھاتی پر سرخ سرخ دانے نکل آتے ہیں۔ عموماً چار برس سے کم عمر کے بچے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں چار برس سے لے کر بارہ برس سے اوپر تو شاید ونا دوسری یہ مرض ہوتا ہے۔ ہماری عمر میں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے۔

**علامات مرض** زمانہ خصانت مرض (مرض کے پوشیدہ رہنے کا زمانہ یا مرض کے سرایت کرنے کا زمانہ) اس کا دس سے بیس یوم تک گنا جاتا ہے

پہلے خفیف بخار ہوتا ہے اور پھر دوسرے دن سینہ پشت اور گردن پر سرخ سرخ دانے نکل آتے ہیں اور ایک روز کے اندر اندر ہی ان میں شفاف رطوبت بھر جاتی ہے۔ تیسرے روز دانے پختہ ہو کر پانچویں یا چھٹے روز خشک ہو جاتے ہیں اور ساتویں آٹھویں روز کھڑکڑا کر وہاں گلابی رنگ کے داغ رہ جاتے ہیں۔ اگر سب دانے ایک ہی بار نکل آئیں تو مرض ایک ہفتہ میں رفع ہو جاتا ہے۔ مگر دانے چونکہ اکثر بے قاعدہ طور سے نکلتے رہتے ہیں۔ اس لیے مرض کے رفع ہونے میں بھی دیر لگتی ہے۔ اس مرض کا انجام بخیر ہوتا ہے اور کسی قسم کی پیچیدگی نہیں پڑتی۔

## علاج

اس مرض میں عموماً دعائی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی۔ لیکن اگر بخار تیز ہو تو ایوینٹ ڈوائی دینے سے کمی واقع ہو جاتی ہے۔ بعد ازاں رسٹا کس کی چند خوراکیں دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔

**ضروری ہدایات** ٹھنڈی تھاسے بچاؤ رکھنا چاہیے۔ خاص کر جب کہ موسم سرما ہو لیکن کمرہ میں تازہ ہوا کی بندش نہیں ہونی چاہیے۔  
**غذا** - نرم ہونی چاہیے۔ خاص دودھ پختے کو دانے پھیلنے سے باز رکھنا چاہیے۔



# نمونیا

## یعنی

### پھیپھڑے کا ورم - پھیپھڑے کا پردا - ذات الریہ

#### Pneumonia

اس مرض میں پھیپھڑے کی ساخت میں ورم ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بڑا سخت بخار ہوتا ہے۔ یہ ایک متعدی مرض ہے۔ کبھی ایک پھیپھڑے میں ورم ہوتا ہے۔ اس کو سنگل نمونیا کہتے ہیں اور کبھی دونوں پھیپھڑے متورم ہو جاتے ہیں اس کو ڈبل نمونیا کہتے ہیں۔ اکثر پھیپھڑے کے نیچے کا حصہ بیمار ہوتا ہے اور کبھی سارا پھیپھڑا بھی دائیں طرف، کا نمونیا بہ نسبت بائیں طرف کے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ نمونیا کے تین درجے ہیں :-

**اول :** وہ جب کہ پھیپھڑے متورم ہو کر جلدی شفا پا جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں کامن فارم کہتے ہیں۔

**دوم :** اور اگر جلدی سخت نہ ہو تو سوزشی مادہ ہوا کے کیسوں میں جمع ہو کر پھیپھڑے کی ساخت کو جگر کی ساخت کی مانند کر دیتا ہے اور ہوا کی گذر پھیپھڑوں میں نہیں ہو سکتی اس کو انگریزی میں ریٹا پٹائی زیشن کہتے ہیں اور اگر ایسی حالت میں مرض رفع ہو جاوے تو دم فقہ ہو کر پھر پھیپھڑے اپنی اصلی حالت پر آ جاتے ہیں۔

**سوم :** لیکن اگر مرض رفع نہ ہووے تو پھیپھڑا کل کو مرنار پڑ جاتا ہے۔

## اقسام مرض

نمونیا کی موٹی موٹی قسمیں یہ ہیں :-

(CROUPOUS PNEUMONIA)

(LOBAR PNEUMONIA)

۱۔ کروپس نمونیا یعنی ذات الریہ اصلی

۲۔ لوبر نمونیا یعنی ذات الریہ فصلی

- ۳۔ کٹارل نمونیا یعنی ذات الرتہ نزلی (CATARRHAL PNEUMONIA)  
 ۴۔ براؤنکو نمونیا یعنی ذات الرتہ سعالی (BRONCHO PNEUMONIA)  
 ۵۔ کرائیک نمونیا یعنی ذات الرتہ مزمن (CHRONIC PNEUMONIA)  
 بعض اوقات نمونیا کے ہمراہ پلوریٹس بھی پیش آسکتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں پلوریٹس نمونیا کہتے ہیں۔

## علاماتِ مرض

نمونیا کی علامات دو تین یوم کے بعد درست طور پر معلوم ہو سکتی ہیں۔ ابتدا میں طبیعت میں بے چینی اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اور عموماً بخار آغاز میں روزہ کے ساتھ چڑھ جاتا ہے اور حرارت بخار ۱۰۳ سے ۱۰۵ درجہ تک ہو جاتی ہے۔ صبح ذرا حرارت کم ہوتی ہے اور شام کو بڑھ جاتی ہے۔ لیکن بخار متواتر آٹھ نو یوم تک چڑھتا رہتا ہے۔ جلد بڑی گرم ہوتی ہے۔ خاص کر پیلیوں اور بغل کے پاس اور دھیمادھیما درد بعض اوقات چھاتی کی سامنے کی ہڈی جس کو انگریزی میں سٹرنم کہتے ہیں کے نیچے۔ یا پستان کے زیریں اور یا بغل کے پاس کندھے کے نیچے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر نمونیا کے ساتھ پلوریٹس بھی شامل ہے۔ تو درد غضب کا ہوتا ہے اور بیمار کو سخت تنگ کرتا ہے۔ نبض تیز چلتی ہے۔ ایک منٹ میں ۱۲۰ سے ۱۴۰ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ چلتی ہے۔ سانس جلد جلد کھچا ہوا آتا ہے اور اصلی حالت سے دو گنی بلکہ گنی تیزی سے آتا ہے مثلاً صحت کی حالت میں تنفس کی رفتار فی منٹ ۱۸ ہوتی ہے۔ لیکن اس بیماری میں ۳۰، ۴۰ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ فی منٹ کے حساب سے چلتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی کھانسی خشک ہوتی ہے اور کھانستے وقت چھاتی میں درد ہوتا ہے۔ اگر نمونیا کے ہمراہ پلوریٹس بھی شامل ہے تو کھانسنے میں درد کی شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ بیمار درد کے خوف سے کھانسی کو روک دیتا ہے۔ مابعد میں کھانسی تر ہو جاتی ہے اور سبز رنگ یا زنگاری رنگ کی بلغم جس میں خون کی بھی آمیزش ہوتی ہے خارج ہوتی ہے۔ یہ بلغم ایسی لیسلا اور گاڑھی ہوتی ہے کہ جس برتن کے ساتھ لگ جائے خواہ آپ برتن کو اسٹ کر دیں۔ یہ نہیں گرے گی۔ اگر خون کی آمیزش زیادہ ہو تو مرض شدید

متصور ہوتا ہے۔ نہ آنکھوں میں تری اور نہ ناک میں تری بلکہ یہ خشک ہوتے ہیں اور ناس  
لیتے وقت نتھنے پھلتے ہیں۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے اور مریض صاف بات نہیں کر سکتا  
ہچک کہ بات منہ سے نکلتی ہے۔ پیشاب سرخ کم مقدار میں اور گوم جلا دینے والا ہوتا  
ہے۔ بیمار یا تو پشت کے بل سوتا ہے یا ماؤٹ پھیپھڑے کو دبا کر سوتا ہے۔ سر درد  
بے خوابی اور بے چینی کی شکایت بہت رہتی ہے۔ دونوں رخسارے سرخ ہوا کرتے  
ہیں جس طرف کا پھیپھڑہ متورم ہو وہ رخسارہ زیادہ سرخ ہوتا ہے۔

**نکمتہ** آتا ہے۔ نبض تیز مگر باریک چلتی ہے۔ زبان خشک، کھردی اور کانٹے دار  
ہو جاتی ہے۔ اعداس پر میل جم جاتی ہے۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے اور حرارت  
جسم تیز ہو جاتی ہے جسم ادا ملحقے پر سرد پسینہ (تریلی) بکثرت آتا ہے۔ بیمار  
کا چہرہ پھیکا اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں۔ بے ہوشی طاری رہتی ہے اعدا اگر  
ایسے موقع پر مناسب علاج کر کے مرض کو نہ روکا جائے تو مریض جاں بحق تسلیم ہو  
جاتا ہے۔

## فریکل سائیز یعنی علامات ظاہری

صحت کی حالت میں چھاتی پر سیٹے بقیس کوپ د سینہ کی حالت کو معلوم کرنا والا  
آلہ لگانے سے آواز صاف پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہوا گزر رہی ہے۔ لیکن بیمار  
پھیپھڑوں پر لگانے سے آواز بھاری پیدا ہوتی ہے اور سانس تیز آتا ہے اعدا سانس  
کے ہمراہ ایسی آواز سنائی دیتی ہے۔ جس کو انگریزی میں کرپی ٹیشن اور ویسی کولورمر  
کہتے ہیں۔ یعنی سانس کے ہمراہ شاں شاں کی سیٹی سنائی دیتی ہے۔ ماؤٹ پھیپھڑا  
ٹھکورنے سے سخت آواز دیتا ہے۔

## اسباب مرض

جب سخت مشقت اور تھکان کے ساتھ سردی شامل ہو جاتی ہے تو نمونیہ کی  
بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ جب یہ دیر تک اپنا حملہ کرتی رہے اور قوت

زبیت کو کمزور کر دیوے تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ بھگے ہوئے کپڑے دیر تک پہنے رکھنا یا مندر زمین پر عرصہ تک بیٹھے رہنا یا سرد ہوا میں گھنٹوں ہی کھڑا رہنا یا چلنا پھرنا یہ سب اسباب نمونیا کے ہیں۔

رہے کے جب گیند کھیتے کھیتے تھک جاتے ہیں اور سرد گھاس پر لیٹ جاتے ہیں یا فوراً ہی کپڑے اتار کر ٹھنڈی ہوا لیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا کرنے سے ان کو یہ مرض لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ کیونکہ سرد ہوا جب تھکے ماندے جسم پر حملہ کرتی ہے تو پھیپھڑوں میں ورم پیدا کر دیا کرتی ہے۔

ڈاکٹر صاحبان کا خیال ہے کہ یہ ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑے پر حملہ کر کے اس کو متورم کر دیتا ہے اس کو انگریزی میں نیوموں کا کس یعنی کورم نمونیا کہتے ہیں، جب ایک بار نمونیا ہو جائے تو پھر دوبارہ، سہ بارہ اس کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ کثافت و غلاظت مکانی و جسمانی بھی اس مرض کی ترقی میں مددگار ہوا کرتے ہیں۔ جن بڑے بڑے قصبوں اور شہروں میں صفائی کا انتظام خاطر خواہ نہیں ہوتا۔ وہاں یہ مرض وباد پھیلا کرتا ہے۔

بعض امراض کے دوران میں بھی نمونیا کی شکایت ہو جایا کرتی ہے مثلاً خضہ چیچک۔ انفلو اینزہ (زکام و بائی) امراضِ قلب۔ سوزشِ گردہ وغیرہ وغیرہ

## انجام مرض

اگر مرضِ صحت کی طرف رجوع ہو جیسا کہ ہو میو پٹیک علاج سے اکثر ہوا کرتا ہے۔ دیکھو کہ یہ ایک با اصول علاج ہے۔ اور اس کو ایسی مہلک امراض میں خاص فوقیت و برتری حاصل ہے، تو علامات میں تخفیف شروع ہو جاتی ہے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ درد موقوف ہو جاتا ہے اور رفتار نبض بھی روز بروز کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اسی سبب سے بخار گھٹتا جاتا ہے۔ رات کو بے چینی میں تخفیف واقع ہوتی ہے اور بیمار گاہے بگاہے سو جاتا ہے۔ تھک میں جو خون نکلتا ہے۔ اب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور تعین چار یوم علاج کرنے سے بخار بالکل اتر جاتا ہے اور تمام علامات میں آرام ہوتا جاتا ہے اور بخار اتر جاتے کے دو یوم بعد صحت کلی ہو

جاتی ہے۔

بعض اوقات غلط علاج کے باعث یا مرض کی سختی کے سبب سے مرض طول پکڑ جاتا ہے۔ دو ہفتہ بلکہ تین ہفتہ تک بیمار کی حالت مخدوش رہتی ہے کوئی گھڑی آرام میں گزر گئی اور کوئی تکلیف میں ایسی صورت میں نمونیا کا حشر پلمونری پھوڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی نمونیا پھوڑا بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ پھوڑا پھٹ جائے اور پیپ خارج ہو جاوے تو بیمار کو آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھوڑا پیدا ہو جانے کی حالت میں بھی ہومیو پیتھک علاج کی بیماری ڈوبتی ہوئی کشتی کو بسا اوقات ساحل علامت پہلے جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

اصل بات تو یہ ہے کہ غلط علاج کی نسبت نہ علاج کرانا ہی بہتر ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ ڈاکٹروں کا تجربہ بتاتا ہے کہ بلا علاج یک صد مریضوں میں تقریباً بیس اموات واقع ہوتی ہیں اور انہی فیصدی پنج جلتے ہیں۔ لیکن غلط علاج سے پچاس ساٹھ فیصدی اموات کی اوسط ہوتی ہے۔

جب مریض نمونہ موت کی جانب جا رہا ہو تو ہر ایک علامت میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ ساتویں روز کے بعد نبض فی منٹ ۱۲۰ سے اوپر چلتی ہے اور بخار ۱۰۴ یا ۱۰۵ تک پہنچ جاتا ہے۔ دم کشتی تیز ہو جاتی ہے نبض کمزور اور بے قاعدہ ہو جاتی ہے چہرہ کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے جسم ٹھنڈا اور بلغم کا اخراج بند اور سانس میں غرغ کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بیمار نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے تنفس کی راہ بند ہوتی جاتی ہے اور بیمار آٹھویں۔ نائویں یا دسویں روز جاں بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ۔ ابتدا میں یہ دعائی اکیر کا حکم رکھتی ہے اور بسا اوقات مرض کو ابتدا ہی میں روک دیتی ہے جہاں پھیپھڑوں میں اجتماع خون کے لیے دیگر معالج جو نکلیں لگواتے ہیں یا فصد کھولتے ہیں۔ وہاں اس دعائی کی موجودگی میں نہ فصد کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ جو نکلیں لگوانے کی علامات یہ ہیں:-

جاڑہ لگ کر یکایک بخار تیز ہو جاوے۔ نبض بھرپور۔ سخت اور تنی ہوئی خشک  
 ادرنی پر نہ ہو۔ کھانسی خشک سخت اور تکلیف دہ ہو۔ اور کھانسی کے ہمراہ درد ہوتا  
 ہو اور اگر کچھ تھوک بھی آتی ہو تو پستلی جھاگ سی آتی ہو۔ اس میں خون کی آمیزش  
 بھی ہو۔ لیکن تھوک گاڑھی نہ آتی ہو۔ توجیب تھوک گاڑھی نکلتی ہو تو پھر اکیونائٹ  
 دوائی کارآمد نہیں ہوا کرتی۔ ساتھ ہی سخت بے چینی۔ بے قراری۔ تشویش اور موت  
 کا ڈر بھی ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

دراٹرم و رائیڈ اور اکیونائٹ کے علامات کچھ کچھ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔  
 فرق یہ ہے کہ دراٹرم و رائیڈ میں بے چینی اور موت کا ڈر موجود نہیں ہوا کرتے۔  
 لیکن نبض بھرپور اور تیز چلتی ہے۔ آنکھیں چمکیلی ہوتی ہیں اور زبان کے میاں  
 میں سرخ لکیر سی ہوتی ہے۔

بعض ڈاکٹر صاحبان کا قول ہے کہ نمونہ کے ابتداء میں دراٹرم و رائیڈ بمقام  
 اکیونائٹ کے زیادہ مظہر ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فیرم فاس - یہ بھی اکیونائٹ کی مانند ابتدا میں کام آتی ہے۔ جبکہ رطوبتی جھلیوں  
 سے ابھی تک رس پھننا شروع نہ ہوا ہو۔ یعنی تھوک گاڑھی لمبی نہ شروع ہوئی  
 ہو۔ اگر تھوک آتی بھی ہو تو پستلی پانی کی مانند اور خون اس میں ملا ہوا آتا ہو  
 جب خون کا اجتماع پھیپھڑوں میں شدید ہو۔ خواہ مرض کے ابتداء میں اور خواہ  
 دوران مرض میں ادریہ آشکارا ہو کہ دم بڑھ رہی ہے۔ تو یہ دوائی کام آتی  
 پیر مرد اور کمزوروں کے نمونہ میں یہ دوائی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ علامات یہ ہیں  
 رشذت کا بخار۔ بوجھل اور میز سانس اور خون آمیز تھوک بہت ہی کم پیاس  
 بے حد بے چینی اور تشویش جو کہ اکیونائٹ کا خاصہ ہیں۔ اس دوائی میں بہت  
 کم ہوتی ہیں۔

✽ خوراک - نمبر ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایوڈین - یہ دوائی نمونہ کے درجہ ابتدائیہ اور ثانوی ہر دوا میں مفید ہوتی ہے۔ خاص

کر جبکہ کورس، نمونہ یعنی ذات الریہ اصلی ہو

ماند ایکونائٹ کے ایوڈین (۱۰) بھی بے چینی اور تیز بخار ہوا کرتا ہے اور خاص کر جبکہ پھیپڑہ پھوڑا میں بہرعت تبدیل ہو رہا ہو۔ کھانسی بہت ہو اور تنفس بہت دقت سے آتا ہو۔ ایسا معلوم ہوا کہ سینہ کافی پھیلتا نہیں اور خون آمیز تھوک آتا ہو۔ ایوڈین مرض کے آخری درجوں میں بھی کام آتی ہے جبکہ صحت جلدی جلدی ہوتی معلوم نہ دیوے اور پھیپڑہ کھایا جا رہا ہو اور ساتھ ہی تھوڑا تھوڑا بخار رہتا

ہو اور پھیپڑے میں پیپ ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۱ یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد

برائی اونیا - یہ نمونہ کی خاص ادویات میں سے ایک دوائی ہے اور یہ ایکونائٹ

فیرم فاس یا ورائٹم ورائٹ کے بعد میں استعمال میں آتی ہے۔ جب کہ بخار تو چڑھا ہوا ہو لیکن جسم نہ تو اتنا گرم ہو اور نہ اتنی بے چینی ہو۔ جتنی کہ ایکونائٹ میں موجود ہوتی ہے۔ بمقابلہ ایکونائٹ کے برائی اونیا کی کھانسی کسی قدر تری لیے ہوئے ہوتی ہے اور سینہ میں عموماً چھبکا دردیں ہوا کرتی ہیں۔ بعض اوقات برائی اونیا کی کھانسی خشک اور سخت ہوا کرتی ہے اور تھوک تھوڑی تھوڑی اور مانند رنگ نکلا کرتی ہے۔ زبان عموماً خشک اور مریض چپ چاپ رہتا رہنا چاہتا ہے مرض کا حملہ جب وائیں پھیپڑہ میں ہو تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

کھانسنے سے مریض خوف کھاتا ہو اور کھانسی کو روکنے کے لیے دم گھٹے رکھتا ہو کیونکہ کھانسنے سے اس کو درد ہوتا ہو اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ سینہ کی دیواریں پاش پاش ہو کر اڑ جائیں گی۔ حرکت کرنے اور سانس کھینچنے سے چھاتی میں درویں ہوتی ہوں۔ لیکن ایسا کرنے سے درد میں افاقہ ہوتا ہو جب کھانسی کے ساتھ جسم کے دور دور مقامات میں درد ہوتا ہو تو برائی اونیا دوائی مؤثر ہوا کرتی ہے۔

نونیہ کے مرض میں برائی اونیا کے بعد فاسفورس کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے کیونکہ اس مرض میں یہ اس کی معاون ہوا کرتی ہے۔

جب نونیہ اور پلورسی دونوں موجود ہوں تو برائی اونیا سے بڑھ کر کوئی دوائی نہیں ہے قبض پیاس کی زیادتی اور شدید سردی۔ یہ بھی برائی اونیا کی علامات ہیں۔

✽ خوراک: نمبر ۳ یا ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس: اس مرض کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ فاسفورس اور برائی اونیا باری باری دینے سے نونیہ کے مرض کو آرام ہو جاتا ہے۔

جب نونیہ کے ساتھ پلورسی بھی شامل ہو تو یہ دونوں ادویات نہایت ہی مفید ہوتی ہیں۔ علامات فاسفورس کی یہ ہیں:-

بیمار کو ایسا محسوس ہو کہ چھاتی چاروں طرف سے جکڑی ہوئی ہے خشک کھانسی کف میں خون کی قدرے آمیزش۔ یا خالص خون ہی آتا ہو۔ سانس وقت سے آتا ہو سلبے اور دُبے آدمی کے لیے یہ دوائی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جب کہ پاخانہ لمبا اور پتلا آتا ہو کھانسی رات کو زیادہ ہوتی ہو۔

جب نونیہ کے ہمراہ تپ محرقہ کے علامات بھی پائے جاویں تو فاسفورس نہایت مؤثر ہوتی ہے۔

ڈاکٹر فلیکس مین نے اکیسلی فاسفورس سے ۳۷۷ مریضوں کا علاج کیا ان میں سے صرف ۱۹-۱۰ موت ہوئیں۔ باقی سب صحت یاب ہو گئے۔

بورٹھے مریضوں کے لیے فاسفورس۔ ٹیٹم ٹارٹ اور کالی نائٹریکم ادویات مفید پڑتی ہیں۔

✽ خوراک: نمبر ۶ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ہائیڈروسیس۔ ڈاکٹر نیش کے قول کے بموجب ٹائیفاؤڈ نونیہ کی بہترین ادویات میں سے یہ ایک ہے بالفاظ دیگر ہائیوسائی مس اکثر مظہر ہوا کرتی ہے جب کہ نونیہ کے ہمراہ تپ محرقہ بھی شامل ہو۔ مختصر علامات مخصوصہ اس کی یہ ہیں۔

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵



رات کو کھانسی زیادہ تکلیف دہ ہو۔ جب بھی مریض لیٹے۔ کھانسی زیادہ ہو جائے مریض کو اس کرے اور بے حیائی کی باتیں کرے۔

✽ خوراک: نمبر ۳ یا ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد

سینک گونیہ یا۔ جب نونیہ کے مرض میں مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں تو سینک گونیہ یا دوائی منظر ہوا کرتی ہے بخار ہو جلی ہو اور سینک کے اوپر کا حصہ بھرا ہوا ہو خشک کھانسی ہو۔ تیز درویں ہوتی ہوں۔ سینک کے دائیں طرف میں زیادہ ہوتی ہوں۔ کوتاہ دمی ہو۔ تنوک رنگ سا نکلتا ہو۔ ایسی صورت میں یہ فاسفورس کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں خواہ بہت گرم ہوں۔ یا بہت ٹھنڈے دل کی حرکت کمزور اور بے قاعدہ ہو، علامات پھیپڑے بہت ماؤف ہوں اور ان میں اجتماع خون بہت شدید ہو۔ یہ علامات وراثم درائیڈ میں بھی ملا کرتی ہیں۔ جب مرض دیرینہ ہو گیا ہو اور پیپ دار اور بہت بدبودار بلغم نکلتی ہو اور بلغم مشکل سے خارج ہوتی ہو اور مریض گرامائس نہ لے سکتا ہو تو سینک گونیہ یا دوائی ضرور دینی چاہیے۔

✽ خوراک: نمبر ۱ یا ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد

ایٹیم ٹارٹ۔ یہ دوائی نونیہ اور پورل نونیہ کے آخری درجہ میں کام آتی ہے جب کہ پھیپڑے کے تمام ماؤف مقام پر نرم و تیز آواز سانی دیتی ہو اور تنفس بہت بوجھل ہو۔ خاص کر صبح کے وقت اور سانس لینے کے لیے مریض اکٹھ کو بیٹھنے کے لیے مجبور ہوتا ہو۔ نیز تیز چھین والی درویں اور تیز بخار مانند برائی ادنیہ کے موجود ہوں۔

ایٹیم ٹارٹ کے خاص علامات یہ ہیں۔

مریض کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ کھانسی کے ساتھ بلغم باہر نکلتے گی۔ لیکن بلغم خارج نہ ہوتی ہو۔ جب پیر مردوں اور بچوں کو آرام آنے میں نہ آتا ہو۔ تو ایسی حالت میں یہ دوائی خاص طور پر ہوا کرتی ہے۔ ترکھانسی میں دوائی نہ

دینی چاہیے۔

✽ خوراک - نمبر ۶ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کالی کاربونیکم - یہ دوائی برائی ادویا کے بہت مشابہ ہے جب کہ تیز چھین کی دروہیں سینہ میں ہوتی ہوں اور حرکت کرنے سے زیادہ ہوتی ہوں۔ لیکن برائی ادویا اور اس میں فرق یہ ہے کہ خواہ مریض حرکت کرے اور خواہ نہ کرے یہ دروہیں کالی کاربونیکم میں ہوتی رہتی ہے اور اکثر دائیں پھیپھڑے کے نچلے حصہ میں ہوا کرتی ہیں۔ کوتاہ دمی ہو اور سینہ پر بلغم بہت جمی ہوئی ہو جو کہ مشکل سے خارج ہوتی ہو۔ سانس میں سے سیٹی بجنے کی آواز پیدا ہوتی ہو اور کھانسی بہت تکلیف دہ ہو۔ جہاں اینٹیم ٹارٹ اور اپنی کاک سینہ کی بلغم خارج کرنے میں ناکام رہی ہوں۔ وہاں کالی کاربونیکم کارآمد ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۶ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد شیر گرم پانی کے ہمراہ

کالی بانی کرومیکم - جب مذکورہ بالا علامات موجود ہوں۔ لیکن بلغم سخت اور لیسدار نکلتی ہو۔ تو یہ دوائی زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۶ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد گرم پانی کے ہمراہ۔

سلفر - یہ دوائی نمونہ کے ہر ایک درجہ میں کام آتی ہے۔ اگر شروع میں دی جاوے

جبکہ یہ مظهر ہو تو ابتداء میں ہی مرض کو روک دیتی ہے۔ پھیپھڑے کا پھوٹا بننے

سے رک جاتا ہے اور سخت جلد ہی جلد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جب تب

محرکہ کی علامات پائی جائیں اور پھیپھڑا گھٹنا شروع ہو گیا۔ سینہ میں ساں ساں کی آوازیں

سنائی دیویں۔ پیپ دار بلغم ہو۔ گویائی سست ہو زبان خشک اور بخار ہو تو ان حالات

میں سلفر دوائی مظهر ہوا کرتی ہے تقاہت اور غشی اس کی علامات مخصوصہ ہیں۔

ڈاکٹر جی جے جونز فرماتے ہیں کہ کوتاہ دمی جو کہ رات کے بارہ اور دو بجے کے درمیان

شروع ہوا نہ مریض اٹھ کر بستر میں بیٹھنے پر مجبور ہو تو یہ سلفر کی بڑی قیمتی علامت ہے

یہ جب نمونہ کا علاج نہ کیا گیا ہو اور سل کے علامات شروع ہونے چاہتے ہوں۔ تو

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲

سلفر دوائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے ۔

جب پیپ دار بلغم اتنی بدبودار ہو کہ مریض بھی بدبو کی شکایت کرتا ہو تو ایسی حالت سینگو نیرو دوائی زیادہ مفید ہوا کرتی ہے ۔ لیکن اگر پھیپھڑا پھوڑا بن رہا ہو اور مریض کو رات کے وقت بخار اور بے چینی رہتی ہیں ۔ پھیپھڑے کے زخم کا ڈر ہو تو سلفر دوائی کارآمد ہوتی ہے ۔

✽ خوراک : نمبر ۱ یا ۳ یا ۴ ہر دو گھنٹہ کے بعد لائیکوپوڈیم ۔ جب علاج نہ کرنے یا غلط علاج کرنے کے باعث پھیپھڑے میں نقص رہ جائے اور پیپ نسا تھوک نکلے بخار تو نہ ہو لیکن کبھی کبھی ماؤنٹ پھیپھڑے میں درد کی شکایت دھیمی دھیمی ہو جاوے تو یہ دوائی بہت مفید پڑتی ہے ۔

ڈاکٹر ہوکس فرماتے ہیں کہ جب شدید سل کالیں بن رہا ہو تو یہ دوائی بہت ہی اعلیٰ ثابت ہوتی ہے ۔

✽ خوراک : نمبر ۶ ہر دو گھنٹہ کے بعد

چیسلی ڈونیم ۔ صغراوی نونیہ میں یہ دوائی شاید سب ادویات کی سرتاج ہے ۔ علامات اس کی یہ ہیں ۔

دائیں شانہ کی ہڈی کے زیرین حصہ پڑتی ہو ۔ تراور کھڑکتی ہوئی کھانسی ہو اور بلغم مشکل سے خارج ہوتی ہو ۔ سینہ پر بوجھ ہو ۔ جیسا کہ اینٹیم ٹارٹ میں ہوا کرتا ہے ۔ نیز نتھنے پنکھے کی مانند پھڑکتے ہوں جیسا کہ لائیکوپوڈیم میں بھی ہوتا ہے ۔

✽ خوراک : درشکچر کے ۵ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

مرکیورس ۔ صغراوی نونیہ ۔ سانس کی تکلیف ۔ کھانسی ۔ آغاز میں خشک اور بعد میں خون آمیز بلغم ۔ پیٹ اور جگر میں تکلیف ۔ بکثرت پسینہ آوے لیکن پسینہ کے آنے سے آرام نہ ہو ۔ بلکہ تکلیف بڑھے پسینہ بدبودار ہو ۔

✽ خوراک : نمبر ۳۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

آرٹھریٹکس۔ جب حالت بہت خراب ہو۔ نفاہت اور کمزوری کے باعث بیمار کی نبض کمزور ہو جاوے۔ شدت بخار میں ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ پیاس تھوڑی تھوڑی اور بار بار لگے۔ بیمار سخت بے چین اور کمزور ہو یا پھینچنے لگے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۰ یا ۳۱ ہر دو گھنٹہ کے بعد

بیپ ٹیشیا۔ جب تب محرقہ کی علامات پیدا ہو جائیں۔ زبان بھوری یا سیاہ منہ سے بدبو۔ پیشاب اور پاخانہ سے بدبو۔ مریض گھورم پڑا ہے جب کوئی بات پوچھی جاوے تو ٹھیک جواب دیوے لیکن پھر گھورم ہو جاوے۔ غرضیکہ تب محرقہ کی سی علامات پیدا ہوں تو یہ دوائی جلد نما اثر دکھاتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۱ یا ۳۲ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

رے فن کیوس۔ جب کالسی کے ہمراہ چھاتی میں درد ہو اور برائی دنیا مفید نہ بیٹھے تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۲ یا ۳۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پتوں کا نمونہ۔ سینہ میں بلغم کی کھڑکھڑاہٹ، متلی اور قے ساتھ ہوں اپنی کاک، بلغم پیدا تو بہت ہو لیکن نکل نہ سکے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۰ یا ۳۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

مریض کو مواد رکھے میں جس کی حرارت ۶۰، ۶۵ درجہ فارن ہیت ہو۔ لٹا چاہیے، سردی سے بالکل محفوظ رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر گرم اور ہلکا کپڑا دینا چاہیے۔ اسی کی ٹپس موٹی تہ جما کر چھاتی کے آگے اور پیچھے باندھ دینی چاہیے اور یہ اسی دن میں تین چار گھنٹہ کے بعد بدلتے رہنا چاہیے لیکن اگر ٹپس آرام نہ دیوے تو اس کو بند کر دینا چاہیے۔ بیمار کو اسٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

اسے بلا ضرورت بھانا چاہیے۔ بیمار کے کمرے میں آگ وغیرہ کا دھواں نہیں ہونا چاہیے۔ کمرہ ہوا دار اور روشن ہونا چاہیے۔ روشنی اور تازہ ہوا دونوں ہی مفید چیزیں ہیں۔ لیکن اس امر کی احتیاط ہونی چاہیے۔ کہ بیمار کو ہوا کے جھونکے نہ لگیں۔ ساگر کمرے میں زیادہ سردی ہو تو انگلیٹھی روشن کر دینی چاہیے۔ مریض کو فرش پر نہیں تھوکنا چاہیے۔ بلکہ تھوک دان یا کسی دیگر برتن میں تھوکنا چاہیے۔ بیمار کے پاس بہت سے آدمی نہیں بیٹھنے چاہئیں۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مریض کے پاس مستعدات بیٹھ کر آپس میں کانا پھوسی کرتی ہیں۔ جس سے بیمار کے دل پر بُرا اثر پڑتا ہے یا بیمار پُرسی کرتے وقت اپنے زغم میں وہ ہمدردی کے لہجہ میں ایسے کلمات بولتی ہیں جو کہ بیمار کے دل کو پست کر دیتے ہیں۔ یہ سب امور ممنوع ہیں۔ بھائے بیمار کو پست ہمت کرنے والے کلمات کہنے کے ہمیشہ اس کو تسلی دیتے رہنا چاہیے تاکہ اس کا دل کمزور نہ ہونے پڑے یہ ایک بڑا مجرب نسخہ ہے۔ بیمار جس کمرہ میں ہو اس میں فالتو سامان یا خوراک سامان نہیں رکھنا چاہیے ماؤف پھیپھڑے کو گرم رکھنا مطلوب ہوتا ہے۔ جب پٹس اتاری جاوے تو روئی رکھ کر اوپر سے پیٹی باندھ دینی چاہیے اور اس کے اوپر چھان اور منک ملا کر اور توتے پر گرم کر کے منگور کرنی چاہیے۔ بیمار کو گرم بنیان یا روئی دار کھداری پہنے رکھنا چاہیے اینٹی فلو جین کا لیپ ماؤف مقام پر کرنا بڑا مفید ہوتا ہے۔ اینٹی فلو جین کے بند ڈبے انگریزی دوا فروشوں کی دکان سے مل سکتے ہیں۔

## غذا

دودھ۔ ساگو دانہ۔ مونگ کی دال۔ چنے کا پانی۔ اسی قسم کی نرم غذا دینی چاہیے۔

# برانکو نمونیا - کھانسی کا نمونیا

(Broncho Pneumonia)

یہ ایک چھوٹ دار مرض ہے اور بچے بالعموم اس میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ اس میں ہوائی نالیوں کے آخری سروں میں ورم ہو جاتا ہے اور نیز ہوائی کیسوں میں بھی سوزش ہو جاتی ہے اور یہ اکثر ہر دو جانب کے پھیپھڑوں کی زیریں سطح پر ہوا کرتا ہے۔

(CATARRHAL PNEUMONIA)

۱۔ نزلہ کا نمونیا یعنی کنارل نمونیا

(LOBULAR PNEUMONIA)

۲۔ ڈبہ اطفال یعنی لوبولر نمونیا

(CAPILLARY PNEUMONIA)

۳۔ پپی چلنا یعنی کیپلری برانکائٹس

مندرجہ بالا تینوں نام بھی برانکو نمونیا کے ساتھ منسوب کئے گئے ہیں۔

**علامات مرض** شروع میں عموماً کھانسی ہوتی ہے اور تھوڑا بہت بخار بھی پڑھ جاتا ہے۔ لیکن پھر حرارت بخار تیز ہو جاتی ہے اور حرارت

۱۰۳ یا ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ اور یہ حرارت بخار ایک جیسی نہیں رہتی۔ کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ سانس جلد جلد اور وقت سے آتا ہے۔ کھانسی تکلیف دہ آتی ہے اور خشک ہوتی ہے۔

بعض اوقات زنگاری رنگ کی بلغم بہت کم مقدار میں خارج ہوتی ہے۔ لیکن بعض بچوں کو کھانسی بہت کم آتی ہے نبض تیز چلتی ہے اور باریک ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں ۱۵۰ بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ چلتی ہے اور پھیپھڑوں کی زیریں سطح پر سے ٹھسکوپ لگانے سے سال سال کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لیکن اگر ورم زیادہ ہو تو ٹھونکنے سے ٹھوس آواز پیدا ہوتی ہے۔ مریض کے نتھنے بہت حرکت کرتے ہیں اور زبان خشک اور میلی ہوتی ہے۔ بعض مریضوں کو قبضیں اور اسہال بھی آتے ہیں بے چینی ہوتی ہے اور اگر مرض کا حملہ شدید ہو تو مریض بچہ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اس کو ہڈیاں ہوتا ہے اور بچہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔

**اسباب مرض** - نزلہ اور کھانسی اس مرض کے اسباب ہوا کرتے ہیں اور امراض  
خسرہ، کالی کھانسی، انفلوائنزا، خناق و بانی کے ساتھ بھی یہ  
مرض ہو جایا کرتا ہے۔ کمزور بچے اور بالخصوص ایسے بچے جن کی ہڈیاں کمزور  
ہوتی ہیں اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ سردی لگنے سے بھی یہ مرض ہو  
جایا کرتا ہے۔

کمزور اشخاص اور بوڑھوں کو بھی کبھی کبھی برائگو فونیا ہو جایا کرتا ہے۔

## علاج

**فیرم فاس** - مرض کے درجہ ابتدائیہ میں یہ ایک نہایت بہتر دوائی ہے۔ بخار تیز  
ہو۔ میکن بے چینی نہ ہو۔ مرینس چپ چاپ اور سست پڑا رہتا ہو۔ چہرہ  
زرد یا خفیف تمٹمایا ہوا ہو۔ خشک۔ گرم یا گرمی قدر تر ہو۔ پیاس خفیف ہو اور  
چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی ہو۔  
✽ خوراک - ۲x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

**ایکونائٹ** - یہ دوائی اس مرض میں شاذ و نادر ہی کام آتی ہے۔ کیونکہ یہ دوائی  
موٹے تازے اور مضبوط بچوں کے لیے زیادہ کام آتی ہے اور ایسے بچے برائگو  
فونیا کا شکار بہت ہی کم ہوتے ہیں۔

ایکونائٹ کی علامات مخصوصہ یہ ہیں۔ سخت بے چینی۔ تشویش۔ پیاس اور چہرے  
پر خوں کے آثار نمایاں ہوں۔ چہرہ تمٹمایا ہوا ہو۔ میکن جب بچے کو اوپر اٹھایا  
جائے تو رنگ زرد پڑ جائے۔ کھانسی چھوٹی اور خشک آتی ہو اور ٹھنڈا پانی  
پینے یا پلو کے بل لیٹنے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہو مگر کے بل لیٹنے سے کھانسی کا آرام  
ہوتا ہو۔ سانس گرم آتا ہو اور تیز ہو۔ نبض بھرپور اور سخت ہو۔ نیند نہ آتی ہو۔  
پیشاب تھوڑا سیاہ اور گدلا آتا ہو اور پیشاب کرنے کے بعد بے چینی بہت ہو۔  
✽ خوراک - ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کیمو میلہ - یہ دوائی بھی اس مرض میں بہت نافع ہوتی ہے اس کی علامات مخصوصہ یہ ہیں۔  
 بچہ چڑچڑے مزاج کا اور مندی ہو اور اس کو جھٹ غصہ پڑھ جاتا ہو۔ اور بدیں  
 جب اس کی کھانسی اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہو کھانسی دن کے وقت تو  
 کسی قدر تر ہوتی ہو لیکن بوقت شب لمبی مسلسل اور خشک ہوتی ہو اور کھانتے  
 وقت حنجرو میں کھڑکتی ہو۔ نبض چھوٹی تیز اور باریک چلتی ہو۔ پیشاب زرد اور  
 تھوڑا ہوتا ہو۔

✽ خوراک: نمبر ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد

سائیا: جب مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں تو یہ دوائی دینی چاہیے۔ بچہ مرونی زرد ہو۔  
 اور جب اس کو چھوڑ جائے تو وہ چیخے چلائے۔ سانس چھوٹا اور رک رک کرتا ہو  
 اور چھوٹی خشک کھانسی ہو۔ کھانسی کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہو گویا کہ بچہ کچھ ٹپکل  
 رہا ہے پیشاب بکثرت اور بار بار آتا ہو۔ جلگے پر بچہ اکثر چیختا چلاتا ہو اور لائیں  
 مارتا ہو۔ سوتے سوتے بچہ چونک اٹھتا ہو۔

✽ خوراک: نمبر ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس - بعض اوقات سائیا کے بعد فاسفورس کام آتی ہے جب کہ بخار لگاتار  
 تیز ہو۔ نبض تیز اور تند ہو کمزور کرنے والی کھانسی ہو چہرہ زرد ٹھنڈا اور پانی  
 کی بہت پیاس ہو اور پینے کے بعد بعض اوقات تے آجاتی ہو۔ جب مریض بائیں  
 پہلو لیٹے تو اس کو یقیناً بہت تکلیف ہوتی ہے اور کھانسی بڑھ جاتی ہو۔ پچھلے  
 تیلے اور خود بخود ٹپکل جاتے ہوں گویا کہ مقعد کھلی پڑی ہے۔ سوکر اٹھنے کے بعد  
 آرام معلوم ہوتا ہو۔

✽ خوراک: نمبر ۶۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایٹم مارٹ - تمام سینہ میں بلغم کی آواز سنائی دیتی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہو کہ سینہ بلغم  
 سے پُر ہو گیا ہے اور دم گھٹنے کا درد ہو۔ نقاہت غنودگی اور جلد جسم سرد اور  
 تر ہو۔ اکثر اوقات ابکائیاں اور قہقہے بھی آتی ہوں اور تے میں سفید لیسیدار بلغم  
 خارج ہوتی ہو۔ گرم کمرے میں بچہ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہو چہرہ زرد اور آنکھیں

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵



اندردب گئی ہوں اور ان کے گرد نیلیوں ملتے پڑ گئے ہوں۔ سانس کی رفتار ایک  
بھسی نہ رہتی ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایپیکال - نیم ٹارٹ اور اپنی کاک کی علامات بہت کچھ آپس میں ملتی ہیں چہرہ زرد آنکھیں  
اندرونی ہوئیں اور ان کے گرد نیلیوں ملتے ہوں۔ آبکایاں اور قینیں اکثر آتی ہوں  
کھانسی تشنجی ہو اور دم گھٹنے والی ہو۔ نیم ٹارٹ میں نقابت بہت ہوتی ہے لیکن  
اپنی کاک میں اتنی نہیں ہوتی۔

✽ خوراک - نمبر ۳x یا ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلفٹ - کھانسی نیم شب کے بعد اور فکا ہونے سے یا ٹھنڈی اشیاء پینے سے زیادہ  
ہوتی ہو۔ تمام سینہ میں بھم بہت کھڑکتی ہو اور کھانتے وقت بچہ چیخا چلاتا ہو اور  
اس کا دم گھٹتا ہو اور بعد میں اس کو بکثرت پسینہ آتا ہو۔ آواز بھدی ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لایسکو پوڈیم - بعض اوقات یہ دوائی بہت ہی خراب کیوں میں جبکہ پھیپھڑوں کے  
نیل ہونے کا فائدہ پیدا ہو چکا ہو۔ مریض کی زندگی بچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔  
اس کی خاص علامت نتھنوں کا ہلکے کی مانند حرکت کرنا ہے اگرچہ یہ علامت نیم  
ٹارٹ، برومیم جیلی ٹونیم، فاسفورس پنچیا اور پائی رو جینیم میں بھی ملتی ہے۔  
لیکن لایسکو پوڈیم میں یہ علامت خاص ہوتی ہے بچہ جاگنے پر چیخا چلاتا ہو اور  
ضدی ہوتا ہو۔ پیشاب سرخ اور تھوڑا اور اکثر اس میں سرخ رنگ تہ نشین ہوتی  
ہو۔ پیشاب کرتے وقت بچہ چیخا چلاتا دایئیں جانب بھم زیادہ کھڑکتی ہو۔ تکلیف  
چار بجے شام سے شروع ہو کر رات کے آٹھ بجے تک بہت رہتی ہو۔ ایک  
پاؤں گرم اور دوسرا سرد ہو۔ شکم بھد لاٹھا اور تانا ہوا ہو۔ سرد کرے میں بچہ آرام  
محسوس کرتا ہو۔

✽ خوراک - نمبر ۶x یا ۳۰ دن میں چار مرتبہ

آرٹیمیک - بعض اوقات یہ دوائی بھی اس مرض میں کام آتی ہے جبکہ اس دوائی کی علامات

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

مخصوصہ موبور ہوں۔ یعنی بے چینی تشویش نقاہت اور پیاس بار بار لگتی ہو۔ لیکن مریض صرغ ایک آدھ گھونٹ پی کر بس کر دیتا ہو۔ تمام علامات میں نیم شب کے بعد زیادتی ہوتی ہو۔ نبض تیز اور کمزور چلتی ہو یہ دوائی اس مرض میں بہت کم استعمال ہوتی ہے۔

**برائی اونیا**۔ جب ہلنے چلنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو تو یہ دوائی مظہر ہوتی ہے جب بچہ کو اٹھایا جاوے یا بلایا جاوے تو وہ چیختے چلائے۔ لیکن جب چپ چاپ پڑا رہے تو اس کو آرام معلوم ہو۔ مریض ٹھنڈا پانی بہت مقدار میں پیتا ہو۔ لیکن دیر کے بعد کھانسی خشک اور سخت ہو لیکن تکلیف وہ بہت ہو۔ پینے کے بعد کھانسی ہوتی ہو۔ قبض ہو۔

**خوراک**۔ نمبر ۳۰ یا ۳۱ ہر دو گھنٹہ کے بعد

**سکفر**۔ جب مظہر دوائی استعمال کرنے کے بعد مرض میں مزید اضافہ ہو یا رک گیا ہو یا آرام ہونے کے بعد مرض عود کر آتا ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ پیاس زیادہ ہو جلد خشک اور چلتی ہو۔ سرد کمرے میں مریض کو آرام معلوم ہوتا ہو۔ مریض اپنے اڑھنے کولات مار کر پرے پھینک دیتا ہو۔ ہونٹ چمکیلے اور سرخ ہوں۔

**خوراک**۔ نمبر ۲۶ یا ۲۷ دن میں تین مرتبہ

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ چیلی ڈونیم۔ کلکیریا کارب۔ ٹیوبرکیولائٹیم۔ میڈھونیم اور پانی رد حنینیم بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

**ضروری ہدایات** مریض کو روشن اور ہمدار کمرے میں لیٹائیں اور وقتاً فوقتاً اس کا پہلو بدلتے رہیں تاکہ پھیپھڑے میں خون ایک ہی جگہ اکٹھا نہ ہو جائے۔ بچہ کو اٹھا کر گود میں تھوڑی دیر کے لیے لینا بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر مریض کا حلق اور ناک خشک ہوں تو چاہیے کہ کھلتے ہوئے پانی کی طرح ایک ڈچی یا کیتلی کرنے میں رکھیں۔ تاکہ کمرے کی ہوا گرم اور مرطوب ہو جائے یہ عمل موسم سرما میں کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

میٹھا تیل اور تارپین کاتیل ہم وزن ملا کر مالش مریض کے سینہ پر کریں یا اینٹی

دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

گلو جھین گرم کر کے اور کپڑے کے ٹکڑے پر پھیلا کر ماؤنٹ مقام پر لگا دیں اور اوپر اس کے روٹی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ مرنکا، اور چھان کو گرم کر کے اور پوتلی بنا کر درد والے مقام پر ٹکڑا کر کرنی چلائیے۔

## پلوریسی - ذات الجنپ

(PLEURISY)

اس مرض میں پھیپھڑے کے غلاف میں جس کو انگریزی میں پلورا کہتے ہیں۔  
درد ہو جاتی ہے یہ کبھی ایک طرف ہوتی ہے۔ کبھی دونوں طرف۔

**علامات مرض** پلوریسی کا حملہ یکایک ہو جاتا ہے بخار کے ہمراہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ پستان کے زیریں سخت چھب چھبنے لگتی ہے اور

ایسا تیز درد ہوتا ہے۔ مانو کہ کوئی برہنہ چھو رہا ہے۔ کھانسنے وقت زیادتی ہوتی ہے۔  
ماؤنٹ جگہ کو دبائے اور گہرا سانس لیتے وقت درد ہوتا ہے مریض مارے درد کے سینہ کو حرکت نہیں دے سکتا۔ تاکہ سانس لیتے وقت پھیپھڑے میں زیادہ حرکت نہ ہو

اس لیے بیمار سہی کر دیا جاتا ہے درد کی تمیز بغل بلکہ ہنسل کی ہڈی تک محسوس ہوتی  
ہیں۔ سانس تیز اور کھج کر آتا ہے اور تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی بھی ہوتی ہے۔ سہیوں  
کے درمیانی مقام پر دہانے سے درد ہوتا ہے۔ بیمار سانس پیٹ سے لیتا ہے۔ زبان

سلی اور پٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر سفید فرجی ہوئی ہوتی ہے۔ چہرہ سرخ۔ نبض بھری  
ہوئی اور تیز چلتی ہے۔ پیشاب کم اور سرخ رنگ کا آتا ہے اگر پلوریسی کے ہمراہ پھیپھڑہ  
بھی متوہم ہو گیا ہو تو بلغم بکثرت اور خون آلود آتی ہے۔ حرارت جسم بہت بڑھ جاتی  
ہے۔ یعنی ۱۰۲ سے ۱۰۵ تک ہوتی ہے۔ لیکن صرف پلوریسی کی حالت میں ۱۰۱ سے ۱۰۴

تک بڑھ کر رہتی ہے۔ یا تو غلاف پھیپھڑے کے دونوں پردے صحت یاب ہو کر اپنی اصلی  
حالت اختیار کر لیتے ہیں اور یا دونوں سخت ہو کر آپس میں جڑ جاتے ہیں اور یا ان کے  
درمیان آب خون بھر جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں ایمپیریم کتے ہیں۔

یا تو یہ آب خون جذب ہو جاتا ہے اور یا پیپ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھیپھڑوں اور دل پر دباؤ پڑ جاتا ہے اور ان کے فعل میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے لیکن جب پیپ بن جاوے تو ایسی حالت کو انگریزی میں ایم پاٹی ایما کہتے ہیں۔ یہ مرض کی خراب ترین حالت میں ہوتا ہے اور یا جبکہ پورسی چوٹ کھانے یا زخم کھانے سے پیدا ہو اس آب خون یا خون کی کمی بیشی سے دم کشی پر بڑا بھاری اثر پڑتا ہے کیونکہ دائم مہنے کی حالت میں پھیپھڑے دب جاتا ہے اور ہوا کا گزر اس میں اچھی طرح سے نہیں ہو سکتا اور بیمار جلدی جلدی سانس لیتا ہے۔

**اسباب مرض۔** ٹنڈر گنا یا پسینہ آتے آتے فوراً سردی لگ کر یا بھیگا ہوا کپڑا پہننے سے رک جانا۔ سینہ پر چوٹ آنا۔ یا زخم لگنا یا پریش کرنا یا پسلی کا ٹوٹ جانا۔ اس مرض کے اسباب ہیں۔ بعض اوقات اس مرض کا سبب ٹیوبہرکل (مادہ سل) ہوتا ہے جو کہ پھیپھڑوں کے غلاف میں سرایت کر کے اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جب یہ بیماری ذاتی طوع پر ہوتی ہے۔ تب اکثر اس مرض کا سبب مادہ سل ہوتا کرتا ہے۔ اکثر اوقات نمونیا کے ہمراہ پورسی بھی ہو جایا کرتی ہے۔ پھیپھڑے میں جو دم ہوتی ہے اس کے باعث غلاف میں بھی دم ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی اس پاس کے اعضاء کا دم بڑھ کر غلاف پھیپھڑہ تک پھیل جاتا ہے اور کبھی سوزشی مادہ یا پیپ پھیپھڑوں کے غلاف کے جوف میں جا کر اس مرض کا سبب بنا کرتی ہے۔

بعض دیگر شدید امراض مثلاً خسرہ چھچک۔ تپ محرقہ۔ سوزش گردہ۔ انفلو انزا۔ (دوبائی زکام) زچہ کا بخار۔ ریپرل فیور۔ شدید جمع المفاصل وغیرہ کے سبب سے خون میں زہر پیدا ہو جانے کے باعث پورسی کا مرض پیدا ہو جایا کرتا ہے۔

## فزیکل سائنز یا علامات ظاہری

آفانو مرض میں اٹھے تھکوپ (آلہ سینہ بین) ماؤن جگہ پر لگنے سے خشک متروم پھلوں میں رگڑ کی آواز سنائی دیتی ہے یا آب خون کے تراوش پانے سے یہ پردے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ٹھونکنے سے ٹھوس آواز پیدا ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں پسلیوں

درمیان جگہ یا تو ہمار ہو جاتی ہے یا اونچی دکائی دیتی ہے  
 ٹیمپرز۔ بعض اوقات بیمار کو سینہ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور پلورسی کا مرض نہیں  
 ہوتا۔ اس کی تیز یہ ہے کہ عضلاتی درد کے ساتھ بخار نہیں ہوتا لیکن مرض پلورسی میں  
 ہوتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ۔ آغاز مرض میں ایکونائٹ بڑی قیمتی دوائی ہے اور بعض حالتوں میں یہ  
 اکیلی ہی شانی ہوتی ہے اس کی خاص علامات یہ ہیں بخار کی تیزی خشک چلہ  
 پیاس کی زیادتی۔ بے چینی بے قراری اور تیز نبض اس کی دوائی کی دوہین خوراکیں  
 ہی فائدہ بتلا دیتی ہیں۔ یعنی جسم پر پسینہ آنے لگتا ہے اور پیاس و بے چینی میں  
 تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے اور اگر آب خون تراوش پا چکا ہو اور کھانسی  
 کے ہمراہ چھین پڑتی ہو تو برائی اونیا کسیر کا حکم رکھتا ہے۔  
 خوراک: ۳۰ یا ۳۰ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے یہ دوائی پلورسی کے علاج میں خاص اہمیت  
 رکھتی ہے۔ خواہ بیماری کتنی ہی کیوں نہ ترقی پا چکی ہو۔ اس کی علامات خاص یہ  
 ہیں۔ پلو میں ایسی چھین اور درد جیسا کہ کوئی برہمی چھو رہا ہے اور حرکت کرنے  
 یا سانس لیتے وقت درد میں زیادتی ہو۔ بعض اوقات کھانسی خشک ہوتی ہے۔  
 اور بعض اوقات چمکیلی ملغم کھانسی کے ساتھ خارج ہوتی ہے سانس بھرا ہوا تیز  
 اور کھج کر آتا ہے۔ چہرہ اندوہ گین نظر آتا ہے۔ چونکہ پیسوں میں سانس لیتے  
 وقت درد کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس لیے بیمار اس تکلیف سے بچنے کے لیے  
 سانس آلات شکم کی مدد سے لیتا ہے اور طبیعت میں بے چینی اور گھبراہٹ  
 معلوم ہوتی ہے اور بیمار حرکت کرنا پسند نہیں کرتا۔ بعض ڈاکٹر صاحبان ایکو  
 نائٹ اور برائی اونیا باری باری سے بھی دیتے ہیں۔

خوراک: ۳۰ یا ۳۰ x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

ایوڈیم۔ جب بیماری طول پکڑ جاوے اور مریض بہت کمزور ہو تو یہ دوائی اکیونائٹ یا برائی او نیا کے ساتھ باری باری۔ یہ بھی دیتے ہیں اور یہ دوائی مادہ سل کو ہلاک کرنے میں بڑا اثر رکھتی ہے۔

✽ خوراک۔ ۶x یا ۲۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم۔ جب آٹوف پھیپڑے کے غلاف میں سیرم یا آبِ خون تراوش پاکر جمع ہو چکا ہو اور بیمار کی حالت بہت خراب ہو۔ تنگیِ تنفس کے ساتھ چھاتی پر بوجھ معلوم ہو اور درد ہو اور گاہے بگاہے دم ٹوٹ جاوے جسم ٹھنڈا اور کمزوری غایت درجہ کی ہو۔

✽ خوراک۔ ۳x یا ۳۰x ہر تین گھنٹہ کے بعد

فاسفورس۔ جب پلوری کے ساتھ نمونہ بھی شامل ہو۔ تھوک خون امیز رنگاری رنگ کی آئے اور بیمار سخت کمزور ہو۔ جن بیماریوں کی چھاتی کمزور ہوتی ہے، اور رے پتے ہوتے ہیں اور جن کو تپ رق کا ڈر لگا رہتا ہے اُن کے لیے یہ دوائی بڑی مفید ہے۔

✽ خوراک۔ نمبر ۶x یا ۳۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایٹیم طارٹ۔ جب دم گھٹنے کا ڈر لگا رہے۔ مانس لیتے وقت بلغم آواز دیوے لیکن بہت کمزوری کے بیمار اس کو باہر نہ پھینک سکے۔ دل کی دھڑکن بہت ہو تو یہ دوائی بہت مفید پڑتی ہے۔

x خوراک۔ نمبر ۶x یا ۲۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد

آرنیکا۔ جب مرض کا باعث خارجی زخم یا محنت اور مشقت ہو جب کہ درد اور اب باقی رہ جائیں اور دست سا آبِ خون جمع ہو جائے تو یہ دوائی اس آب کو جذب کرنے میں خاص اثر رکھتی ہے۔ ✽ خود اک۔ نمبر ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر۔ جب کہ درد میں افاق ہو اور سینہ میں چھن پڑنی بند ہو جائے تو سلفر صحت کامل حاصل کرنے کے لیے بڑی مفید دوائی ہے۔ نیز درمیانی خوراک بھی اس کی دیتے ہیں جب کہ رفتار صحت کی سست پڑ جائے اور مانس اور بلغم میں بدبو ہو۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

✽ خوراک: ۶x یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ: علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے کینٹرس - ہیمپرسلف - ایپس - رے نن کیولس - کوپرم  
ماسکس - رسٹاکس - کالی کارب - کاربوئیجی - ایسٹینک وغیرہ اپنے اپنے  
موقعوں پر استعمال ہوتی ہیں۔

**ضروری ہدایات**  
بچے کا جائے ماؤف پر ماندھنا یا گرم پانی کی ٹکڑی فلائین کے  
ٹکڑے کے ساتھ کرنا بہت جلدی آرام دیتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا  
سر دباتی پلانے سے پیاس کی زیادتی میں افادہ ہوتا ہے۔ فصد کھونا یا جونکیں لگوانی  
منوع ہے۔ بیا س آرام سے پڑا رہے اور زیادہ حرکت نہ کرے نہ زیادہ بولے اور  
نہ ہی گہرا سانس بھرے۔ بعض اوقات ماؤف جگہ پر رائی کا پستر لگا دینا بھی مفید  
ہوتا ہے۔

**غذا**۔ خوراک ہلکی ہونی چاہیے۔ دودھ۔ مونگ کی دال۔ چنے کی پی اور چپاتی وغیرہ  
یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مریض کو زیادہ تیل اشیا نہ دی جائیں کہ جب بخار اُتر  
جائے اور سینہ میں پانی کی زیادتی ہو۔ تو خشک غذا دینی مناسب ہے۔

## خناق وبائی

(DIPHTHERIA)

یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں تالو، حلق اور حنجرہ کے اندر دم ہو کر ایک فاسد  
جھلی پیدا ہو جاتی ہے اور مریض نہایت کمزور ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض**۔ اس مرض کا باعث ایک قسم کا جرم یعنی خور و ہنی کیڑا ہے اور یہ  
جھوت کی بیماری ہے جو کہ بچوں میں بالعموم پائی جاتی ہے۔ ۲ سے ۵ برس کی عمر کے  
بچے بالخصوص اور ۲ سے ۱۵ برس کی عمر کے بچے بالعموم مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ مریض  
کا بوسہ لینے یا اس کے جوٹھے برتنوں میں کھانے پینے یا اس کے مستعملہ پارچات استعمال  
کرنے سے یہ مرض ایک مریض سے دوسرے کو چلا جاتا ہے۔ تھکاوٹ موسم سرما۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے ویکھو صفحہ نمبر ۲۵

درم گلو اور نزلہ اس کے اسباب مؤیدہ ہیں۔ گندگی۔ گندی نالیاں اور مردہ جانوروں کی سڑانداس مرض کے پھیلانے میں مددگار ہوا کرتے ہیں۔

**علامات مرض**۔ یہ مرض دو صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ (۱) نرم (۲) سخت۔

۱۔ نرم قسم کی علامات شدید صورت اختیار نہیں کیا کرتے ہیں۔ بگھٹتے وقت خفیف درد ہوا کرتا ہے۔ حلق میں درد ہوتا ہے۔ جلیں ہوتی ہے اور اعضاء شکنی ہوتی ہے اور یہ علامات یہاں تک ہی محدود رہتی ہیں اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔

۲۔ سخت قسم کے خناق کا حملہ یکا یک شروع ہو جاتا ہے۔ تیز بخار۔ لرزہ۔ قیئیں اور اسہال فوری نقارت عظیم اور بے چینی متفکرہ چہرہ۔ نبض باریک کمزور لیکن تیز جو کہ ایک منٹ میں ۱۲۰ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ چلتی ہے۔ مریض کی صورت دیکھنے سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی ظالم مرض کے پنجہ میں مبتلا ہے۔ جلد جسم گرم۔ چہرہ تہمتا ہوا گلے میں درد اور لعاب دار جھلی چمکیلی سرخ غدود گلو پھولے ہوئے اور ان پر خاکستری سفید دھجیاں پڑی ہوئیں۔ ابتدا میں چھوٹی چھوٹی۔ لیکن بتدریج ترقی پذیر۔ یہاں تک کہ ایک دھجی دوسری کے اوپر چڑھ جاتی ہے اور حلق میں ایک فاسد جھلی بن جاتی ہے۔ جس کے باعث نگلنا بلکہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ فاسد جھلی اصل جھلی کے درمیان ایک بدبودار خون آمیز مادہ رہتا ہے جو کہ مریض کے سانس کو نہایت ہی بدبودار بنا دیتا ہے۔ غدود گردن بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات کان میں بھی درد ہوتا ہے اور عموماً گردن اکڑ جاتی ہے چونکہ حلق کی جھلی منہ ناک۔ ہوا کی نالی۔ بلکہ پیپھڑوں کی ہوا دار نالیوں سے وابستہ ہوتی ہے اس لیے مرض کو بہت جلدی پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر مرض بڑھتا جاوے تو مریض کو ہذیان ہو جاتا ہے۔ نگلنا اور سانس لینا محال ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دل کی حرکت یکا یک بند ہو جانے کے باعث یا دم گھٹنے کے سبب سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر اوقات مریض بہ سبب کمزوری کے راہی ملک عدم ہوتا ہے۔ اگر موت نہ بھی واقع ہو تو بھی مریض بہت مدت تک کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور بعض اوقات خطرناک نتائج پیدا ہو جاتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک فالج ہے۔ یعنی ہاتھ اور پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔



**خطرناک علامات** - سانس کا بہت بدبودار ہونا - تیز دھیمی یا نبض کا بہت ہی سست چلنا - لگاتار قیوں کا آنا - غنودگی اور ہڈیان - ناک سے خون کا بہنا - ناک کی جھلی تک مرض کا پھیل جانا - کوتاہ دمی اور حبس بول یا پیشاب میں البومن کا خارج ہونا -

تھرمامیٹر اس مرض میں خوب رہنمائی کرتا ہے - خاص کر چھوٹے بچوں کی حالت میں جو کہ اپنی شکایات کا اظہار نہیں کر سکتے - کیونکہ مرض کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ ہی حرارت بھی بڑھتی جاتی ہے - اگر حرارت تیز ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مرض خراب صورت اختیار کر رہا ہے - برخلاف اس کے اگر حرارت کم ہوتی جاوے - خواہ اور کوئی علامت کمی پر نہ بھی معلوم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مرض کمی پر ہے -

## علاج

**بیلادونا** - یہ دوائی فوراً شروع کر دینی چاہیے نرم خناق میں یہ دوائی کافی دانی ثابت ہوتی ہے - ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد اس کی خوراک دہرائی چاہیے اگر اس دوائی کے دینے پر کوئی بہتری معلوم نہ ہو تو پھر مرکبوس سائیس  $6 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد دیتے جانا چاہیے اور گلیسرین ایک اونس میں ۱۰ قطرے فانی ٹولیکا اور ۱۰ قطرے ایکنیشیا مدد شکر کے ملا کر حلق کے اندرون میں تین چار مرتبہ لگانا چاہیے -

## تشریح الادویات

**بیلادونا** - حلق سرخ اور سو جاتا اور اس پر سفید دھجیاں - گلا خشک اور پیاس بہت -  
 \* **خوراک** -  $1 \times$  ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد -  
**مرکبوس سائیس** - یہ دوائی سخت قسم کے خناق میں کام آتی ہے فوری اور کمال کی نقاہت اور بڑی تیز نبض - شروع مرض میں ہی کمزوری غضب کی ہو جائے اور کو بیس (حالت کمال ضعف و نقاہت) کی حالت ابتدا ہی میں پیدا ہو جاوے  
 حلق میں اقل اقل سفید رطوبت پیدا ہو جو بعد میں سیاہی مائل ہو تنفس بدبودار ناک سے بڑیاں نکلن - بھوک ندارد اور لعاب دہن پیدا ہو -

\* دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

ڈاکٹروں کا تجربہ بتلاتا ہے کہ یہ دوائی نمبر ۶x سے کم طاقت میں استعمال کرنی اتنی مفید نہیں ہوتی جتنی کہ نمبر ۶x سے اونچی طاقت میں استعمال کرنی مفید ہوتی ہے۔ کیونکہ نمبر ۶x سے کم طاقت دوائی استعمال کرنے سے دل کے فیل ہو جانے کا ڈر لگتا ہے۔ نمبر ۳۰ طاقت زیادہ مفید گئی گئی ہے۔

سینٹ پیٹرز برگ کے ڈاکٹر ویرز صاحب نے خناق و بانی کے دو مریضوں کا علاج کیا۔ جن کو وہ نمبر ۶x سے لے کر نمبر ۳۰ طاقت تک دوائی استعمال کراتے رہے۔ ان میں سے ایک بھی موت واقع نہ ہوئی اور دیگر ڈاکٹروں کا تجربہ بھی اس امر کی تصدیق کرتا ہے۔

✽ خوراک۔ ۶x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی بانی کر ویکم۔ جب مرض نحتوں تک پھیل جاوے تو یہ دوائی کا سادہ ہوتی ہے اس کی موٹی موٹی علامات حسب ذیل ہیں :-

۱۔ زبان پر زرد و زنجی ہوئی ہو یا زبان خشک اور سرخ ہو۔

۲۔ گارڑھی گوند کی مانند لیسدار مادہ حلق میں پیدا ہوتا ہو۔

۳۔ درویں گردن اور کندھوں تک پھیلتی ہوں یہ دوائی مرض کے آخری درجہ میں کام آتی ہیں۔

✽ خوراک۔ نمبر ۱ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

ڈنفیتھر نیم۔ یہ دوائی خناق کے زہر سے تیار کی جاتی ہے شدید قسم کے خناق میں یہ کام آتی ہے۔ جب کہ غدد و بڑھ گئے ہوں اور پھونے سے روکتے ہوں۔

زبان سرخ اور متورم ہو۔ تمام مواد بدبودار خارج ہوتے ہوں نقاہت بدرجہ کماں ہو اور نکسیر آتی ہو۔ جب ڈنفیتھر یا کے بعد فایز ہو نہ کا ڈر لگ جائے تو یہ دوائی ضرور استعمال کرانی چاہیے۔ خناق کے عارضہ میں اس دوائی کی دو خوراکیں روزانہ ضرور دینی چاہئیں۔

✽ خوراک۔ نمبر ۳۰ ایک خوراک صبح اور ایک شام کو۔

کالی میور۔ ڈاکٹر شسلر کی بارہ ٹشور میڈیز میں سے یہ ایک دوائی ہے جو کہ خناق کے

دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

مریض میں خاص طبع پر مؤثر ہوتی ہے اور سلف یہ کہ جس شخص نے اس دوائی کو ڈیفیٹرہ کے مرض میں استعمال کیا ہے اور اس کے فوری اثر کا تاثر ہو گیا۔ موٹی موٹی علامات یہ ہیں۔ بھگتے وقت درد کا ہونا اور حلق میں سفید مادہ کی دھبیاں ہونا ڈاکٹر وین کا تجربہ ہے کہ اس دوائی کے استعمال سے کمزوری حلق کا کارٹھا مادہ اور بدبو دار سانس فوراً رفع ہو جاتا ہے۔

خوراک \* - ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کالی پر منگانیس کم - خناق کے مرض میں یہ دوائی بڑی مفید پائی گئی ہے جبکہ حلق میں زخم ہوں۔ متعفن مواد پیدا ہو چکا ہو اور بڑی سخت بدبو آتی ہو۔ گلا اندر اور باہر سے سوچ گیا ہو۔ ناک سے پتلا پانی بہتا ہو اور بھگتے وقت سخت تکلیف ہوتی ہو۔ اس دوائی کے غرارے بھی کراتے ہیں۔ ڈاکٹر وان لیپ خناق کے مرض میں اس دوائی کو اکیر مانتے ہیں۔

\* خوراک \* - ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

راکب ڈرام دوائی ڈیڑھ پاؤ پانی میں ملا کر غروں کیلئے لوشن تیار کیا جاتا ہے۔ ایپس ملی فیکا - ڈھیلا ورم اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ حلق میں ڈنگ مارنے کی سی دریں ہوتی ہوں اور زبان پر پھلے ہوں اور دھکتی ہوں۔ سبب ورم کے ٹکنا نہایت ہی دشوار ہو۔ حلق باہر سے سو جاتا ہو اور نقاہت بہت ہو خشک گرم جلد جسم ہو اور بے چینی ہو۔ اگر انقطاع ابول ریشاب کارک جانا بھی موجود ہو تو اس کو ایپس کی خاص علامت سمجھنا چاہیے۔

\* خوراک \* - نمبر ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

لاسس - خناق کے مریض میں یہ دوائی بھی بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ حلق آنا ذکی الحس ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کا چھونا یہاں تک کہ کپڑے کا چھونا بھی گوارہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری علامت یہ ہے کہ مرض حلق کے بائیں جانب سے شروع ہو کر دائیں جانب کو جاتا ہے۔ بھگتے وقت نہایت ہی سخت تکلیف، کمال کا ضعف اور بدبو بہت ہو اور بیمار مرض کی تیزی کے دوران میں سو جاتا ہو اور موکر

اٹھنے پر تکلیف بہت بڑھ جاتی ہو۔ کوتاہ دمی اتنی تیز ہوتی ہو کہ مریض کو سانس لینے کیلئے  
اسٹپ کر بیٹھا پڑتا ہو۔ حلق میں سرطان اور سمیت پیدا ہو گئی ہو۔ لاکس کی ایک یہ  
بھی خاص علامت ہے کہ خالی نکلنے وقت تکلیف بہت ہوتی ہے۔

✽ خوراک - نمبر ۱۲ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ایک نیشیا - خناق و بائی میں یہ دوائی نہایت ہی قابل قدر اثر دکھلاتی ہے اور سمیت کو  
دور کرنے میں اس دوائی کا اثر مسلمہ ہے گلے کے اندر بھی یہ دوائی لگاتے ہیں اور  
پلاتے بھی ہیں۔

✽ خوراک - نمبر ۵ (مد ٹنکچر) ایک سے دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد

میورامک ایسڈ - خاص علامت اس دوائی کی کمال کا ضعف ہے۔ نکسیر میں سیاہ اور  
ضعف خون کا آنا بھی اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔ سانس بدبودار۔  
اور حلق کا کوہبت سو جا ہوا ہو۔ زردی مائل خاکستری رنگ کا مادہ حلق۔ غدود  
گلہ۔ کوتا اور حلق کی دیواروں پر جما ہو۔ نبض رک رک کر چلتی ہو۔ زبان خشک اور  
ہونٹ خشک اور پھٹے ہوئے ہوں پشیاہ میں البومن خارج ہوتی ہو۔

✽ خوراک - ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فانی ٹولیکا - کمر اور اعضاء میں درد تمام جسم میں اعضاء شکنی اور کمزوری کلا بہت

سو جا ہوا اور اتنا درد کرتا ہو کہ نکلنا نامکن ہو۔ مدوی کانوں تک پھیلتی ہوں

زبان پر موٹی فرجی ہے۔ تنفس بدبودار۔ غدود متورم۔ نبض تیز لیکن کمزور۔ یہ

خاص علامات فانی ٹولیکا کی ہیں۔ حلق میں بہت جلن کا ہونا بھی فانی ٹولیکا کی

علامت ہے۔ اس دوائی کے دس قطرے چار اونس پانی میں ڈال کر غرغریے بھی

کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بار بار حلق کو بھی صاف کیا جاتا ہے۔

✽ خوراک - مد ٹنکچر ایک سے ۵ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیپیشیا - سمیت خون بدبودار۔ بخار سیاہی مائل سرخ حلق غدود متورم، کمزور اور اعضاء

میں ایسی دھن، مانو کہ کسی نے جسم کو کوٹ کر دھریا ہے۔ چہرہ سیاہ تپ محرقہ کی سی علامت

✽ خوراک - ۱ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵۔

کاربالک ایسڈ ہلکا بخار۔ درد ندارد۔ منہ میں لعاب کا بہت اکٹھا ہونا۔ بدبو کمزوری سرور۔ باریک نبض۔ متلی اور نفاہت اس دوائی کے علامات ہیں۔ سمیت کے وعدہ کرنے میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے۔ اور اسی لیے یہ دوائی اس مرض میں عام استعمال کی جاتی ہے۔

✽ خوراک :- ۱ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

لایسکو پوٹیم۔ جب مرض حلق کے دائیں جانب سے شروع ہو کر بائیں جانب کو جاوے تو یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔ ناک کا بند ہو جانا اور ناک کے راستے سانس نہ لے سکا اور مرض کام بجے سے لے کر ۸ بجے شام تک نفع دیکر نہا یہ سب اس دوائی کی مزید علامات ہیں۔ یہ دوائی بہت کم استعمال میں آتی ہے۔

✽ خوراک :- نمبر ۳ x ہر دو گھنٹے کے بعد۔

آر سینکیم۔ یہ آخری درجہ کی دوائی ہے جب اور کوئی دوائی کارگر نہ ہو تو یہ دوائی مریض کی دیکھتی ہوئی کشتی کو ساحل سلامت پر لے جانے میں بسا اوقات کامیاب ہوتی ہے۔ اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں۔ ہلکا بخار۔ نفاہت۔ بے چینی۔ پیاس۔ تنفس۔ بدبودار وغیرہ وغیرہ

✽ خوراک :- نمبر ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ بعض اوقات مندرجہ ذیل ادویات بھی اپنی اپنی خاص علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

رسٹاکس۔ نائٹرک ایسڈ۔ مونیٹ کارب۔ جلیسی میم۔ آیوڈیم۔ جیائنا۔ ہیلو نائٹرکونیم فاسفورس۔ برومیم اور ڈیجی ٹیلیس وغیرہ

**ضروری ہدایات** ابتدا میں ہی گلے کے گرد گرم گرم پٹش کی موٹی تہ باندھ دینی چاہیے۔ لیکن جب مرض بہت بڑھ چکا ہو اور خوفناک صورت اختیار کر چکا ہو۔ تو پھر پٹش کا استعمال منع ہے کیونکہ ایسی حالت میں الٹمرض کے ترقی پذیر ہونے کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔

ایک یا دو ڈیڑھ سیرا بلتا ہوا پانی لے کر اور اس میں دو یا تین چھٹانک تیز سرکہ ڈال کر

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲

اُس کے انجرات حلق میں پہنچانے چاہئیں۔ نیز ایک اونس گلیسرین میں دس قطرے فانی ٹو بیکامڈ ٹنکچر اور دس قطرے ایچی نیٹیا مد ٹنکچر کے ڈال کر اس کو گلے میں تین یا چار مرتبہ روزانہ روئی کے ساتھ لگاتے رہنا چاہیے۔

**غذا وغیرہ** ابتداء سے ہی غذا کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ مریض کی طاقت بنی رہے اور اس کو کچھ غذائیں کے لیے مجبور کرنا چاہیے۔ اگرچہ ٹھکے وقت درد کتنا ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔ غذا لطیف اور زود ہضم ہونی چاہیے۔ مثلاً دودھ۔ آتش جو۔ ساگودانہ اور اراروٹ وغیرہ۔ اگر نقابہت یکایک بڑھ جاوے تو براہ ڈی کا دینا بھی مفید ہوتا ہے۔ چنے کا شوربا دینا بھی مفید ہوتا ہے۔

جب مریض بچہ کسی حالت میں بھی غذا نہ لیتا ہو تو بامجبوری پچکاری کے ذریعے اس کے اندر غذا پہنچانی چاہیے۔

تھے آئے کی حالت میں برف کے ٹکڑے کا چوسنا مفید ہوا کرتا ہے۔ یوں بھی برف کا استعمال مریض کے دل کو تسکین دیتا ہے اور گردوں کے فعل میں مدد ملتی ہے۔ مریض کو ایک فراخ اور ہوادار کمرہ میں رکھنا چاہیے اور اُسے آرام سے بستر میں ٹٹائے رکھنا چاہیے۔ اس کی چار پائی کے پاس پانی کی ایک کیتلی ہر وقت کھولتی رہنی چاہیے تاکہ اس میں سے بنچا پ متواتر نکلتی رہے جس سے کمرے کی ہوا گرم اور مرطوب رہے۔

زیادہ احتیاط اس وقت لازم ہو جاتی ہے۔ جب کہ مریض یاری سے اٹھے کیونکہ ذرا سی بد پرہیزی یا بے احتیاطی کہنے سے مرض کے اندر کمر آنے کا خطرہ لگا رہتا ہے۔ طاقت بخش اغذیہ۔ آرام اور آب و ہوا کی تبدیلی یہ تینوں نہایت ضروری باتیں ہیں ان کا خیال رکھنا از بس ضروری ہوا کرتا ہے۔ یہ چھوت کا مرض ہے۔ اس لیے مریض کی تحویک و ٹنم اور مدد مال وغیرہ کو جلا دینا چاہیے۔ تاکہ دوسرے کو چھوت نہ لگ سکے۔

میڈیسیں کا } ہو میڈیکل ادویات کے خواص جاننے کیلئے بہترین  
مصنفہ ڈاکٹر دولت سنگھ } قیمت بارہ روپے صرف

# گلوٹے - کن پیرے

(MUMPS Parotitis)

یہ ایک قسم کا متعدی مرض ہے جس میں پیریوڈنٹ گلینڈز کان کے نیچے کا غدود (تورم) ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی بخار بھی چڑھ جاتا ہے۔ یہ مرض دباؤ بھی پھیلا کرتا ہے اور عموماً زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہوا کرتا ہے۔

**علامات مرض** ابتدا میں سردی لگتی ہے اور تھوڑے آتی ہے پھر تیز بخار چڑھ جاتا ہے نبض تیز چلتی ہے۔ پہلے ایک جانب کے کان کے سامنے درد ہو کر دم ہو جاتا ہے اور یہ سوزش اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کان کے نیچے اور گردن تک پھیل جاتی ہے۔ تورم غدود سخت ہوتے ہیں اور بعض اوقات غضب کا درد کرتے ہیں۔ جب مرض کا دورہ نرم ہو تو چوتھے روز کے بعد علامات میں تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے اور آٹھویں دسویں روز بالکل آرام آ جاتا ہے لیکن جب مرض کا دورہ شدید ہو تو پھر بخار تیز ہو جاتا ہے اور دوسری جانب کا غدود بھی تورم ہو جاتا ہے اور رخسار سے گردن سوج کر ایک سے ہو جاتے ہیں۔ منہ کھولنے اور جبرٹوں کو حرکت دینے میں سخت تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی زبان کی جڑ کے غدود بھی تورم ہو جاتے ہیں۔ سر میں شدت کا درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہڈیاں بھی ہو جاتا ہے۔

مرض کے رو بھت ہونے کی حالت میں آٹھویں دسویں روز آرام آ جاتا ہے اور سوزش زائل ہو کر مقام ماؤف پر سے خشک پھلکے اترتے ہیں۔ بعض مریضوں میں آرام ہو جانے کے بعد بھی یہ جگہ سخت رہ جاتی ہے اور اکثر یہ حالت خنازیری مزاج کے مریضوں میں واقع ہوتی ہے۔

بعض اوقات آٹھویں یا نویں روز ایک عجیب بات واقع ہوتی ہے کہ سوزش غدود ایک دم غائب ہو جاتی ہے اور مردوں کے خیموں میں اور مستورات کے پستان اور خدیہ ابرعمیں جانودار ہوتی ہے۔ جس اوقات مرض کے نقل مکانی کرنے کے قبل

بڑی خطرناک علامات ظہور میں آتی ہیں۔ مثلاً تیز بخار، ہڈیاں، درشتی وغیرہ ہو جاتی ہیں اور یہ حالت چند گھنٹوں تک بنی رہتی ہے اور بعد ازاں مذکورہ بالا مقامات میں درم جانو وار ہوتی ہے۔

کبھی کبھی مرض کا حملہ نرم ہوتا ہے۔ تو مرض کے ہمراہ بخار بھی نہیں ہوتا۔  
**اسباب مرض** دیگر متعدی امراض کی مانند اس مرض کا سبب بھی خاص قسم کے چھوٹے چھوٹے جراثیم مانے گئے ہیں۔

## علاج

**ایکونائٹ**۔ ابتدائے مرض میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے جبکہ بخار شدت کا پردہ صاف ہوا ہو۔

✽ **خوراک** : نمبر ۱ یا ۳ x ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

**بیلادونا**۔ بلاشبہ یہ ایک خاص دوائی اس مرض کی ہے۔ غدد متورم۔ گرم اور سرخ اور دبانے سے درد کریں۔ دائیں جانب زیادہ زور ہو۔ دریں ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی پھرتی ہوں۔ بھالامارنے کی سی ہوں اور کانوں تک جاتی ہوں۔ جب درم یکایک غائب ہو کر سروردا و ہڈیاں پیدا ہو جائے تو بھی یہ دوائی مظہر ہوا کرتی ہے۔

✽ **خوراک**۔ نمبر ۱ یا ۳ x ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

**مرکیورس سالو**۔ یہ دوائی اس مرض میں اپنا خاص درجہ رکھتی ہے اور اس مرض میں اس کے مفید ہونے کے بارے میں تمام ہومیوپیتھک ڈاکٹر متفق الرائے ہیں۔ موٹی موٹی علامات اس کی یہ ہیں۔

غدد وول کے شدید درم۔ منہ سے بو آوے اور رالیں بکثرت آویں۔ زبان گدلی اور سیلی ہو۔

✽ **خوراک**۔ نمبر ۳ یا ۶ x ۶ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

جب مرض منتقل ہو کر خصلتوں یا پستانوں میں جانو وار ہو۔ موٹی موٹی علامات

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵



ہیں :-

زبان پر موٹی موٹی فرجی ہوئی منہ خشک درد بوقتِ شام اور بیٹھنے کے بعد زیادہ ہو۔  
 جب درمِ خیمۃ الرحم میں چلی جاوے تو پسٹا دوائی خاص طور پر منظر ہوتی ہے۔  
 \* خوراک - درنیکھر (۵) یا ۱ یا ۳ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
 رشتا کس - جب درم سیاہی مائل سرخ ہو اور سرخ باد کا ڈر ہو۔ تب محرکہ کی علامات موجود  
 ہوں۔ اعضاء بہت دکھتے ہوں۔ مریض بے چین ہو اور تکلیف شب کو زیادہ ہوتی  
 ہو۔

\* خوراک - ۶ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ آیوڈیم - کو نیم - ہامیس - لاکس - کلیمینٹ  
 ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

**حفظِ ماتقدم** پروٹائینڈینم دوائی نمبر ۳ طاقت میں دن میں دو مرتبہ صبح اور  
 شام دینے سے مرض سے بچاؤ رہتا ہے۔ سو دورانِ مرض میں بھی  
 اس دوائی کی خوراک ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد بہرہی مناسب دوائی کے دینے  
 سے مرض کا جلدی آرام ہو جاتا ہے۔

**ضروری ہدایات** مریض کو سردی سے محفوظ رکھنا نہایت ضروری ہے اور بخار  
 ہونے کی حالت میں مریض کو ایک ہفتہ تک بستر پر سے نہیں  
 اٹھنا چاہیے۔ مقامِ ماؤف پر سرد چیزوں کا لیپ کرنے یا سرد پانی سے بھگونے  
 سے مرض دیگر مقامات میں انتقال کر جاتا ہے اور بعض اوقات بستر پر سے جلد اٹھ  
 کر باہر چلنا پھرنا بھی مرض کی نقل مکانی کا موجب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ان سب باتوں  
 سے بدبیز کرنا لازمی ہے۔ مقامِ ماؤف پر گرم پانی یا پختے کے پانی کی دن میں کئی  
 مرتبہ نکور کرنا مفید ہوا کرتا ہے۔ نکور کرنے کے بعد مقامِ ماؤف پر فلائین کی ہٹی  
 یا روٹی رکھ کر کپڑا باندھ دینا چاہیے۔ مریض کو آرام سے بستر پر پڑا رہنا چاہیے۔  
 اور کسی قسم کی جسمانی محنت نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کو قبض کی شکایت نہیں رہنی  
 چاہیے۔

\* دوائی کی مقدار و ترکیب استعفی کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵۵

غذا - مریض کو ایسی غذا دینی چاہئے جو کہ نہ ہی زیادہ مائع ہو اور نہ ٹھوس سا گودانہ - لارڈز  
پتل کچڑی یا دلیہ دینا چاہئے -

## سل - ٹیوبرکیولوسس

(Tuberculosis Consumption)

یہ ایک متعدی مرض ہے - جو کہ عمر کے کسی حصہ میں ہو سکتا ہے لیکن عام طور پر  
چودہ برس سے لے کر اکیس برس کے نوجوان مرد و مستورات زیادہ مبتلا کھاتے ہیں  
یہ ایک نہایت مہلک مرض ہے - دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں یہ مرض موجود نہیں  
دنیا میں جس قدر اموات واقع ہوتی ہیں ان کے دسویں حصہ سے زیادہ اموات سل سے  
واقع ہوتی ہیں اور کوئی ایسی قوم نہیں جو اس موزی مرض سے بچی ہوئی ہو - امیر غریب کالے  
اور گورے نوجوان اور بوڑھے مرد و زن سب پر اس مرض کا حملہ ہوتا ہے - البتہ شہری  
لوگ بہ نسبت دیہاتیوں کے اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں - اگرچہ یہ مرض دنیا کے ہر  
ایک ملک میں پایا جاتا ہے لیکن گرم ممالک میں بمقابلہ معتدل ممالک کے نسبتاً کم ہوتا ہے  
اور بلند پہاڑیوں پر جہاں ہوا نہایت لطیف اور صاف ہوتی ہے وہاں پر یہ مرض رونما  
نہیں ہوتا جو لوگ تنگ و تاریک مکانات اور گندی تھا میں بود و باش رکھتے ہیں اور قواعد  
حفظانِ صحت کی پابندی نہیں کرتے - وہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں - ہندو پاک  
میں مرض روز بروز ترقی کر رہا ہے - اس کی بھاری وجہ صفرسنی کی شادی ہے - جن  
نوجوانوں کی شادی اکیس برس سے اور بڑھیکوں کی شادی سولہ برس سے پہلے ہو جاتی  
ہے وہ اکثر بے اعتدالی کے باعث اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ وینج ورج  
ابھی ہلکے ہوئے نہیں ہوتے اس لیے ان کے زیادہ اخراج کے باعث جسم میں سوکھا ہو  
جاتا ہے اور مرض تپ و ق شروع ہو جاتا ہے - والدین کو لازم ہے کہ وہ اپنے لڑکوں  
کی شادی اکیس برس سے پہلے اور بڑھیکوں کی سولہ برس سے قبل نہ کریں -

### مرض سل کی چھوت کس طرح سے لگ جاتی ہے

۱- تنفس کے ذریعہ چھوت لگنا - مسلول کی شہوک اور بھگم میں اس کے لئے بیشمار

جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے مریض جب فرش یا دیوار پر قھوکتا ہے تو سل کے بے شمار کیرے ہوا میں آزاد ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کی چھوت تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے۔ چونکہ سل کے جراثیم خشک ہنم میں کئی ماہ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے کارخانوں یا سکولوں میں جہاں کہ بہت سے اشخاص اور لڑکے کام کرتے اور پڑھتے ہیں اور اس مرض کے پھیلنے کا برا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس ملک کے باشندوں کی عام عادت ہے کہ وہ فرش یا دیواروں اور کپڑوں پر قھوکتے رہتے ہیں۔ یہ عادت بد ہے اور مختلف امراض کے پھیلانے والی ہے اس لیے اس کو ترک کر دینا چاہیے۔

ایسے گھروں میں جہاں ایک ہی مکان یا کمرہ میں کئی آدمی رہتے ہوں اور ان میں سے کسی کو مرض سل ہو تو دوسرے کو اس مرض کی چھوت لگ جانے کا ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ نیز ایسے اشخاص جو کہ مسلول کی تیمارداری کرتے ہیں اور چھوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی چنداں احتیاط نہیں کرتے وہ عموماً اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

## ۲۔ زخم وغیرہ کے ذریعہ چھوت لگنا۔

اگر سل کا مواد یعنی ٹیوبرکل جسم کے کسی چھلے ہوئے یا زخمی جھتہ پر لگ جائے تو یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مسلول مریضوں کی نعشوں کو پھیر چھاڑ کرنے والوں کو ان کی انگلیوں پر سل کا مواد لگ جانے سے بیماری ہو جاتی ہے اور صوبی جو کہ سل کے مریضوں کے میلے کپڑے دھوتے ہیں ان کو بھی اس مرض کی چھوت لگ جاتی ہے۔ مسلول جانوروں کا دودھ دہنے والوں اور گوشت کاٹنے اور بیچنے والوں کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## ۳۔ دودھ اور گوشت وغیرہ کے ذریعہ چھوت لگنا

مسلول گائے کا پتھا دودھ پینے سے یا پتھے دودھ میں سے نکلا ہوا مکھن کھانے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ مسلول جانور کا کچا پکا گوشت کھانے سے بھی اس

مرض کے لگ جانے کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے کچا ڈودھ استعمال نہ کیا جائے۔

## ۴۔ ماں کے پیٹ میں چھوٹ لگنا۔

مسلول حاملہ کے خون کے ذریعہ جنین کو یہ مرض ہو جانا بہت اغلب ہے۔

## اقسام مرض

جس طرح سے کوئی ملک یا دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں یہ مرض نہ پایا جاتا ہو اس طرح انسان کے جسم میں کوئی عضو ایسا نہیں کہ جس میں یہ مرض سرایت نہ کر سکتا ہو۔ مثلاً پھیپھڑے۔ معدہ و امعاء پرودہ ہاسے و ماغ۔ گردے۔ مثانہ خصبہ۔ رحم غدود۔ جگر۔ تلی۔ جلد جسم اور ہڈیاں وغیرہ سب اعضاء اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پس مختلف اعضاء کے مآؤف کے لحاظ سے اس مرض کو مختلف نام دیے گئے ہیں۔ چند موٹی موٹی اقسام یہ ہیں۔

### ۱۔ سل عامہ یعنی جنرل ٹیوبریکولوسس

اس قسم کی سل میں جراثیم سل تمام جسم میں پھیل جاتے ہیں اور یہ مرض بہت جلدی تمام جسم میں پھیل جاتا ہے۔

### ۲۔ پلیمونری ٹیوبریکولوسس

یعنی پھیپھڑوں کا سل۔ جب سل کا مادہ پھیپھڑوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو پھیپھڑوں کا سل پیدا ہو جاتا ہے۔

### ۳۔ کلینڈریولہ ٹیوبریکولوسس یعنی سل غدودی

اس قسم کے سل میں گردن اور پیٹ وغیرہ کے غدود زیادہ تر ہٹا کرتے ہیں۔ جب گردن کے غدود مبتلائے مرض ہوں تو طب میں اس کو خنازیر اور اردو

میں کنٹھ مالا کہتے ہیں۔ لیکن جب شکم کے غدود مبتلائے مرض ہوں تو اس کو سل بٹنی کہتے ہیں۔ اس طرح سے جب کسی عضو میں مرض سل، سرایت کرتا ہے تو اس عضو کے نام سے اس کو نامز کہتے ہیں۔ مثلاً سل جنجری۔ سل گروہ۔ سل مثانہ وغیرہ۔

نوٹ: سل - دق - تھائی سس - ٹیوبرکیولوسس - آف دہا لنکس۔ یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ ان کو پھیپھڑوں کی سل ہی سمجھنی چاہیے۔

## علامات مرض

ابتدائی علامات اکثر مخفی رہتی ہیں اور عمر کے کسی حصہ میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ موٹی موٹی علامات یہ ہیں۔

فتور ہانمہ - بھوک کا مارا جانا۔ زبان سرخ یا اس پر فرجی ہوئی آبکائیاں قیئیں، شادوناور کیوں میں معدہ میں درد۔ کم و بیش کھانسی خصوصاً صبح کے وقت آواز بھاری یا کمزور۔ چھاتی میں درد۔ تھوڑی سی محنت سے۔ انس پھول جانا کمزوری نقابت اور دل کی دھڑکن۔ نبض متواتر تیز۔ حرارت جسم تیز شب کے پسینہ اور روز بروز بڑھتی ہوئی کمزوری۔

کھانسی - اس مرض میں ایک خاص علامت ہے۔ درجہ ابتدائیہ میں کھانسی خشک تھوڑی تھوڑی اور خراش دار ہوتی ہے۔ بوقت صبح یا محنت کرنے کے بعد زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ بلغم عموماً مقدار میں بہت تھوڑی نکلتی ہے اور گاڑھی چمکدار ہوتی ہے۔ کھانسی مہینوں تک اسی طرح سے چلی جاتی ہے۔ جب مرض بہت پڑھ جاتا ہے تو کھانسی دن کے وقت ہوتی ہے اور خاص کر تھوڑی محنت کرنے کے بعد کھانسی کی پہچان نہایت ضروری ہوا کرتی ہے۔ سل کی کھانسی خاص قسم کی ہوتی ہے کہ پیپھڑوں میں سل مادہ کی وجہ سے درم ہونے کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو دیگر اقسام کی کھانسی سے تمیز کرنا چاہیے صرف کھانسی کا موجود ہونا اس امر کا کافی ثبوت نہیں ہے کہ مریض میں مادہ سل موجود ہے کیونکہ کھانسی کئی ایک دیگر وجوہات سے بھی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہی کھانسی کا عدم وجود اس امر کی کافی دلیل ہے کہ مادہ

سل موجود نہیں ہے۔ جب متوک کا امتحان کرنے سے اس میں سل کے جراثیم پائے جائیں تو پھر شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

**خون تھوکتا۔** جب مریض کھانسی کے ابتداء میں یا کھانسی کے دوران میں خون تھو کے تو تپور کل یعنی مادہ سل کی موجودگی کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے خاص کر اس حالت میں جب کہ نہ تو مریض کو منہ میں چوت آئی ہو اور نہ ہی اس کو کوئی دل کی بیماری موجود ہو۔ ابتداء کے مرض میں جب مریض خون تھوکتا ہے تو بہت ہی قلیل خون تھوک میں ملا ہوا آتا ہے اور بعض حالتوں میں چند ہی قطرے خون کے آتے ہیں۔ لیکن آخری درجوں میں خون کی مقدار بہت زیادہ آتی ہے۔ اور بعض اوقات اتنی زیادہ کہ مریض بے چارہ نوراً راہی ملک بھا ہو جاتا ہے۔

**نبض۔** شدید سل میں نبض لگا آرتیزر ہا کرتی ہے۔ مثلاً ۹۰ سے لے کر ۱۱۰ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ فی منٹ بوقت شام نبض کی رفتار تیز ہو جایا کرتی ہے اور جوں جوں مرض بڑھتا جاتا ہے۔ تو توں زیادہ تیز اور کمزور ہوتی جاتی ہے۔

**حرارت جسم بھی** ایک بھاری علامت ہوا کرتی ہے۔ اگر شام کو ۹۹ یا ۱۰۰ درجہ حرارت ہوا کرے اور خاص کر تھوڑی محنت کرنے کے بعد حرارت تیز ہو جایا کرے تو اس کو خطرے کی علامت سمجھنا چاہیے۔

**تنفس** کو ۳۰ درجہ یا سانس کا وقت سے آنا یہ بھی مسلول کی ایک نام علامت ہے۔ مرض سل کے باعث چونکہ پیپٹروں میں ہوا کے بے جا کی کمی ہو جاتی ہے اس لیے کافی ہوا مریض اندر داخل نہیں کر سکتا۔ لہذا سانس چھوٹا چھوٹا اور دقت سے آتا ہے۔ جوں جوں مرض سل پیپٹروں میں بڑھتا جاتا ہے۔ تو توں سانس میں تکلیف بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے تنفس کی تکلیف کا گھٹنا بڑھنا مرض سل گھٹنے بڑھنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ تندرست شخص بوقت آرام ایک منٹ میں ۱۴ سے ۱۰ مرتبہ سانس لیتا ہے اور تنفس کی تناسب دل کی دھڑکن کے ساتھ تقریباً ایک اور پانچ کی ہے۔ یعنی جب ایک شخص ایک مرتبہ سانس لیتا ہے تو اس کا دل پانچ مرتبہ دھڑکتا ہے اور مرض سل میں تنفس کی رفتار چوبیس سے اسیائیس مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے اور مرض کے ترقی کرنے کے ساتھ ساتھ تنفس کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے۔ مسلول

جب سانس اندر کھینچتا ہے تو عموماً یہ چھوٹا ہوتا ہے اور جلدی رک جاتا ہے۔ جس سے مریض کو بے چینی ہوتی ہے یا کھانسی آتی ہے اور فوراً ہی اس کو سانس باہر نکالنا پڑتا ہے۔ مسلول سانس کی بڑی شکایت کیا کرتا ہے۔ تھوڑی سی مشقت کرنے۔ سیرتھیاں چڑھنے یا اترتے سے یا تیز رفتار چلنے سے وہ جلدی تھکا ماندہ ہو جاتا ہے اور اس کو اکثر آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

**نفاہت**۔ ابتدائی علامت میں سے یہ ایک علامت ہے جو کہ جسم کے ہر ایک حصہ میں عموماً آشکارا ہوتی ہے۔ اکثر اوقات مسلول ابتدائی مرض سے اخیر تک بتدریج کمزور ہوتا جاتا ہے۔ جب مریض بتدریج کمزور ہوتا جا رہا ہو تو اس کو سہل کی ایک بھاری علامت سمجھنا چاہیے۔ نفاہت کی پوری پوری جانچ پڑتال کرنے کے لیے مسلول کا گلہ بے بگلہ وزن کرتے رہنا چاہیے۔

**حمی وق**۔ (تپ وق) اسخوکار بخار آگھیرتا ہے۔ اور مندرجہ بالا علامات کے ہمراہ بخار کا ہونا سہل کی موجودگی مزید ثبوت ہوتا ہے۔ مریض بوقت صبح پسینہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ نبض چھوٹی اور باریک چلتی ہے۔ لیکن بہت تیز اور شام کو زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ میں ۱۲۰ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ چلتی ہے اور نبض چلتی ہوئی جھٹکا دیتی ہے۔ اسہال آتے ہیں خاص کر مرض کے ترقی کے دنوں میں اسہال اور پسینہ نفاہت کو زیادہ کر دیتے ہیں۔ زبان پر سفید یا براؤن فرمیانہ میں حمی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن زبان کی نوک اور اس کے کنارے غیر معمولی طور پر سرخ ہوتے ہیں اور اخیر وقت پر زبان چھاؤں سے پر ہو جاتی ہے۔ پیشاب میں سرخ ریگ یا گلابی پھٹ۔ نشین ہوتی ہے اور اس میں یورینس آف موڈا اور ایونیوپائے جلتے ہیں۔ جلد جسم چکنی ہوتی ہے۔ سولے شام کو جبکہ یہ جلتی ہوئی گرم ہے۔ چہرے کا رنگ بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ آنکھیں چمکتی ہیں اور آخری وقت میں نفاہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالآخر تمام علامات آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہوتی جاتی ہیں۔ کوتاہ دمی بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مریض تھوڑی سی مشقت بھی نہیں کر سکتا اور ایک چھوٹا سا پیراگراف پڑھتے وقت بھی اس کو سانس کے لیے روکنا پڑتا ہے۔ تھوک میں زیادہ پیپ کے گول گولے نکلتے ہیں۔ مرض سہل دیگر اعضا میں بھی پھیل جاتا ہے۔ مثلاً اعضاء وغیرہ میں اور وہاں مثل پھیپھڑوں کے مادہ سہل یعنی ٹیوبرکل اپنا

اڑا اجماعتے ہیں۔ پھر تمام انٹریوں میں پھیل کر زخم بن جاتے ہیں اور اسہال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات حلق میں یوہر کل (مادہ سل) آ جاتے ہیں جس سے آواز بھڑی پڑ جاتی ہے۔ اور لمبھڑ جاتی ہے۔ منہ اور حلق میں چھلے ہی پچاسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یا پاؤں میں سوج پڑ جاتی ہے۔ اس طرح سے مادہ سل صرف پھیپھڑوں تک ہی محدود نہیں رہتا۔ بلکہ موت واقعہ ہونے سے پہلے پہلے کسی ایک مقام میں جا پہنچتا ہے۔

مسلول کا دماغ و دل عموماً صاف ہوا کرتے ہیں اور اکثر دل مضبوط ہوا کرتا ہے اس بات کو دیکھتے ہوئے بھی کہ تمام اعضا کھل کر گھٹ رہے ہیں۔ مریض کے دل میں موت کا ذرا ڈر بھی نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ اگر اس کی کھانسی کو آرام آ جاوے تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ مگر موت ہونے سے پہلے بعض اوقات معمولی سا ہڈیان ہو جایا کرتا ہے۔

مختصراً مرض سل کی مخصوص علامات یہ ہیں۔ مشقت کے بعد کوتاہ دمی۔ کھانسی۔ خون تھوکانا۔ بتدریج۔ نقاہت۔ حرارت جسم کی تیزی تیز نبض حتیٰ دق اور اسہال وغیرہ۔ حرارت۔ مرض سل کی تشخیص میں مقرر میٹر ایک قیمتی چیز ہے۔ کیونکہ جوں جوں پھیپھڑوں میں یا دیگر اعضاء میں مادہ سل ترقی کرتا جاتا ہے۔ توں توں حرارت جسم بھی اسی تناسب سے بڑھتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ۱۰۲۔ ۱۰۳ بلکہ ۱۰۴ درجہ تک پہنچ جاتی ہے۔

اصلی سبب تو اس کا مادہ سل یعنی جراثیم یوہر کل ہی میں لیکن کئی اسباب مرض ایک دیگر باتیں بھی اس مرض کے پھیلانے میں مددگار ہوا کرتی ہیں۔ گرم سل غالباً جسم میں خاک اور دھول کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں اور یہ جرم پھیپھڑوں تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ورم پیدا کر دیتے ہیں۔

بعض اوقات نمونیا۔ بروڈنکائیٹس خون تھوکنے پھیپھڑوں میں اجتماع خون اور کئی ایک خارجی اشیاء مثلاً گولے۔ لوہے یا سلیٹ کے خاکہ کے ساتھ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلول والدین کے بچوں میں بھی یہ مرض چلا جاتا ہے۔ نیز ناکافی اور روزی غذا اور گندی ہوا نما۔ ارمکانات اور مفلسی وغیرہ ایک طرف اور عیاشی



وغیرہ دوسری جانب اس موذی کے پیدا کرنے میں معاون اور مددگار ہوا کرتے ہیں۔ سختی و نرمی اور عرصہ کے لحاظ سے مرض کی تین قسمیں ہیں۔

**اول شدید سل** - اس کا دورہ دو تین مہینوں کے اندر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مریض راہی ملک بچا ہوتا ہے۔

**دوم ورمیانہ** - اس کا دورہ دو سے چار سال تک رہتا ہے۔  
**سوم مزمن** - یہ سل کئی سالوں تک مریض و تنگ کرتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ دس سے بیس سال تک اس کا دورہ دورہ رہتا ہے۔

مزمن سل کی علامت تین درجوں میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔  
**درجہ اول کی علامات** : ابتدائے مرض میں تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی آتی ہے یعنی مریض کبھی کبھی ایک آدھ مرتبہ کھوں کھوں کرتا ہے خصوصاً صبح کے وقت یا کھانا کھانے کے بعد یا سوتے یا جاگتے وقت سینہ میں ہنسی کی ہڈی کے نیچے اور اوپر درد ہوتا ہے۔ اور تیس سالوں تک جاتی ہیں۔ کھانستے وقت درد کی تکلیف بڑھ جاتی ہے کبھی کھانا کھانے کے بعد کھانسی آنے سے قے بھی ہو جایا کرتی ہے۔ بد ہضمی کی شکایت رہا کرتی ہے۔ نبض تیز ہو جاتی ہے اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ سانس میں کسی قدر تیزی ہو جاتی ہے۔ ذرا سی غنت سے سانس پھول جاتا ہے اور مریض روز بروز لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ابتدا میں تو کھانسی خشک ہوا کرتی ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد بلغم خارج ہونے لگتی ہے۔ جس میں خون کی آمیزش بھی پائی جاتی ہے۔ کبھی کھانسی کے ہمراہ بہت سا خون خارج ہو جاتا ہے۔ عموماً شام کے وقت مریض کو خفیف سی حرارت بھی ہو جایا کرتی ہے۔

**درجہ دوم کی علامات** - کھانسی زیادہ آنے لگتی ہے اور صبح کو نیند سے بیدار ہونے پر کھانسی کے ہمراہ بلغم بھی بہت سی خارج ہوتی ہے۔ اگر اس بلغم کو پانی میں ڈالیں تو وہ تیرتی نہیں بلکہ تہ نشین ہو جاتی ہے۔ مریض کی بھوک ماری جاتی ہے اور سانس بھی تکلیف کے ساتھ آتا کرتا ہے۔ کمزوری بڑھتی جاتی ہے اور نبض بھی زیادہ تیز چلتی ہے اگر مرض بہت ترقی پر نہ ہو تو بخار بہ وقت نہیں

پڑھا رہتا۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سہولت لگ کر بخار ہو جایا کرتا ہے۔ اگر مرض ترقی پر ہو تو بخار ہر وقت پڑھا رہتا ہے۔ رات کو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اور صبح بخار اترنے پر بہت پسینہ آتا ہے۔

درجہ سوم کی علامات۔ مذکورہ بالا علامات میں ترقی ہوتی جاتی ہے۔ پھیپھڑوں میں غار پڑ جاتے ہیں۔ کھانسی صبح کے وقت بہت زور سے آتی ہے اور لمبے بکثرت خارج ہوتی ہے۔ جس میں پیپ بہت زیادہ نکلتی ہے۔ رات کو بخار تیز ہو جایا کرتا ہے۔ پسینہ اس کثرت سے آیا کرتا ہے۔ کہ مریض کے کپڑے تر ہو جاتے ہیں۔ کمزوری پڑھ جاتی ہے۔ چھاتی اور پیٹھ پر چھایاں پڑ جاتی ہیں۔ اشتہا ملتی جاتی ہے اور زبان اکثر صاف دسرخ ہوا کرتی ہے۔ بالآخر دست آنے لگتے ہیں۔ مریض سوکھ کر کانٹا سا ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر سوج پڑ جاتی ہے اور نہایت ضعف کی حالت میں آخر کار مریض انتقال کر جاتا ہے۔

## علاج

فاسفورس۔ ہومیو پتھی کے پرانے مصنف فاسفورس کو مرض سہل میں تمام ادویات کا بادشاہ مانتے آتے ہیں اور ان کے نزدیک اگر کوئی دوائی اکیر کا درجہ رکھ سکتی تھی تو وہ فاسفورس ہی تھی۔ لیکن اس دوائی کا انتخاب بڑی سوچ بچار سے کرنا چاہیے اور یہ بھی مسلمہ امر ہے۔ کہ فاسفورس دوائی کی خوراکیں بار بار نہیں دہرائی جائیں اور نیز آریسینیم۔ سلفر اور فاسفورس ادویات کا استعمال اندھا دھند نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کہ یہ ادویات پورے طور پر منظر نہ ہوں۔ فاسفورس زیادہ تر ایسے مسلول مریضوں میں کام آتی ہے جو کہ بہت جلدی بڑھ رہے ہوں۔ زندہ دل ہوں اور ان کے خاندان میں یہ مرض موروٹی چلا آتا ہو ان کے قلبیے اور گردن لمبی و پتلی ہو اور نیز ایسے اشخاص جن کو ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہو۔ علامات مخصوصہ حسب ذیل ہیں۔

گلا بیٹھا ہوا اور شام کو تکلیف زیادہ ہو جاتی ہو۔ چھاتی کمزور۔ کھانسی۔ تھوک بکثرت اور چھوٹا چھوٹا بخار (جس کو سلی بخار کہتے ہیں) رہتا ہو۔ تھوک میں

نوں ملا ہوا آتا ہو اور چھاتی کسی ہوئی معلوم دیتی ہو گٹے کے بیٹھ جانے کی شکایت دائمی ہو۔ اور ساتھ ہی حلق بھی دکھتا ہو۔ بونے سے گٹے میں زیادہ تکلیف ہوتی ہو بلکہ یہاں تک کہ آواز بالکل ہی بیٹھ جاتی ہو۔ بائیں پھیپھڑے کی چوٹی میں درد ہوتا ہو اور اس لیے مریض بائیں پہلو کے بل نہ لیٹ سکتا ہو۔ رات کے وقت چھاتی پر بہت دباؤ ہوتا ہو اور اس لیے مریض بیٹھنے پر مجبور ہوتا ہو۔ کھانسی تھوڑی تھوڑی خشک ہو اور گرم سے سرد ہوا میں جانے پر یا بائیں پہلو اور کمر کے بل لیٹنے پر زیادہ ہوتی ہو۔ بلغم بوقت صبح اکثر نکلتی ہو۔ جو کہ سفید اور سخت ہوتی ہو یا خوں آمیز ہوتی ہو۔ بخار متواتر ہوتا رہتا ہو اور بوقت شام چہرہ تھما جاتا ہو۔ اور گرم ہو خاص علامت یہ ہو کہ کندھوں کی چینپوں کے درمیانی مقام میں جلن ہوتی ہو۔

امونیم میور۔ میں کندھوں کی چینپوں کے درمیانی مقام میں ٹھنڈک ہوتا کرتی ہے اور مرض سل میں یہ علامت اس دوائی کے انتخاب میں مدد دیتی ہے۔

ہم جو دگی اسہال فاسفورس سل کے آخری درجہ میں بھی کار آمد ہوتی ہے۔ جبکہ مقعد پانمانہ کو روک نہ سکتی ہو اور فوراً باہر پھینک دیتی ہو۔ مرض سل میں جماعت کی بڑھی ہوئی خواہش کی موجودگی فاسفورس کی ایک اعلیٰ علامت ہے۔

✽ خوراک - ۶ x یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

## فاسفورس اور کلکیریا میں امتیاز

کلکیریا	فاسفورس
مریض خنازیری مزاج والا اور موٹا ہو گیا ہو اوپر والا ہونٹ موجا ہوا ہو۔ کھلی ہوا نا موافق پڑتی ہو۔ درد بہت بے قرار نہ کر دیتی ہو۔	مریض پتلا لمبا جو کہ بہت جلدی بڑھ رہا ہو اور سینہ تنگ ہو۔ کھلی ہوا بھاتی ہو۔ دردیں بیکار کر دیتی ہوں۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

**کلکیر یا کارب**۔ بلغمی مزاج والے مریضوں کے لیے جو کہ زور آور اور نرم مزاج ہوں مفید دوائی ہے۔ نیز ایسی مریضہ کی صحت بوجہ کثرت حیض و اخراج یا بار بار اسقاط حمل کے باعث گر گئی ہو۔ اس دوائی سے مستفیض ہوتی ہے۔ ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہو۔

جب دائیں طرف کے پھیپھڑے کا پنچلا حصہ قبلائے مرض ہو اور سینہ کی ہوا کی نالیوں میں سے خاص آواز آوے۔ خاص کر دائیں پھیپھڑے میں سے تو یہ دوائی خاص طور پر منظر ہوتی ہے۔ کھانسی تر ہو۔ اور کھڑکھڑکتی ہو یا چھوٹی چھوٹی اور خشک بوقت شام آتی ہو۔ سیرٹھیاں پڑھتے یا چڑھائی پڑھتے وقت تمام چپاتی دکھتی ہو۔ سانس پھول جاتا ہو اور بہت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ سینہ کو خوب کوٹا گیا ہے۔ اور گلا بیٹھا ہوا ہو۔ لیکن درد نہ کرتا ہو۔ بلغم پیپ دار زردی مائل سبز نکلتی ہو۔ یا ساق خون آتا ہو گوشت کھانے سے بہت نفرت ہو۔ اور گوشت شام کے اسہال میں بدول مضم ہوئے خارج ہو جاتا ہو۔ کمزور جوان لڑکیوں کو جبکہ حیض بند ہو۔ کمزوری بہت ہو۔ پسینہ آتا ہو۔ تو ایسے حالات میں کلکیر یا کارب منظر ہوا کرتی ہے۔

جب سل کے عارضہ میں مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں تو کلکیر یا کارب کو یاد رکھنا چاہیے۔

۱۔ نکیر کا آنا

۲۔ حلق میں خراش اور جلن کا ہونا

۳۔ جلد جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیوں کی موجودگی اور جھائیوں کا پڑنا۔

۴۔ خفیف سی محنت کرنے سے بھی پسینہ کا آجانا۔ بافراط اور نقاہت پیدا کرنے والا۔

۵۔ ٹھنڈ کا جلد لگ جانا۔ سردی سے علامات مرض کا ترقی پذیر ہونا کلکیر یا

کی طبیعت رکھنے والے مسلول مریضوں کو سرد جگہوں میں بھیجنے کی ہدایت

نہیں کرنی چاہیے۔

۶۔ پیرازامید ہونا۔

۷۔ بالوں کا جھڑنا

۸۔ سینہ پر معلوم ہونا اور خون تھوکانا

✽ خوراک - نمبر ۲۰ یا ۲۰۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد

کلکیریا فاسفوریکا - جب کمزوری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہو اور سبزی مائل پیپ رار تھوک نکلتا ہو - سر درد ہو اور سستی ہو تو کلکیریا فاس فوریکا بمقابلہ کلکیریا

کارب کے زیادہ موزوں ہوتی ہے -

✽ خوراک - نمبر ۲ یا ۶ ہر تین گھنٹہ کے بعد

کلکیریا آیوڈاٹا - جب نوجوان مریضوں کے (جو کہ بہت جلدی جڑھ گئے ہوں)

غذو متورم ہوں اور خراش دانتنگ کرنے والی کھانسی آتی ہو - نبض تیز ہو - بخار

زیادہ ہو اور پھیپھڑے جلدی چل رہے ہوں تو یہ دوائی بمقابلہ کلکیریا کارب

موزوں تر ہوا کرتی ہے -

✽ خوراک - نمبر ۲ یا ۶ ہر تین گھنٹہ کے بعد

یو برکیو لائیٹیم یا بیسی لائیٹیم - یہ ہر دو ادویات سالہا سال سے ہومیوپیتھک

ڈاکٹر مرضی سل میں اعلیٰ نتائج کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں - لندن کے مشہور

ڈاکٹر برنٹ صاحب نے لکھا ہے کہ ان ادویات کی برکت سے کئی ایک مسلول

مریض شفا پائے ہیں اور کئی ایک کو بہت فائدہ ہوا - ان ادویات کی علامات

عموماً پٹلا کی علامات کے مشابہ ہوا کرتی ہیں - ایک علامت تو یہ واضح ہوتی

ہے کہ مریض ہوا کو بہت پسند کرتا ہے -

✽ خوراک - نمبر ۳۰ یا ۲۰۰ ہفتہ میں ایک مرتبہ جب کوئی دوسری دوائی مظهر ہو

تو وہ بھی باقی ایام میں استعمال کی جاسکتی ہے -

نارٹریک ایسڈ - یہ اس مرض میں ایک مشہور دوائی ہے اور اگر پھیپھڑوں میں

پیپ بھرنے سے پہلے اس کو استعمال کیا جاوے تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے

علامات اس کی یہ ہیں -

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

خون کا یکایک سینہ کی جانب غلبہ کر جانا - تپ کا موجود ہونا - چھاتی کا دکھنا  
خون کا بمقدار کثیر اور سرخ چمکیلا آنا - کوتاہ دمی - آواز بھدڑی - خاص کر  
بوقت صبح بہت خراب ہو - اسہال صبح کو بہت آویں اور دائیں چھاتی سے لے  
کر سینہ تک چھین کا پڑنا - یہ سب اس کی علامات ہیں - دل کمزور اور دھڑکن  
زیادہ ہوا کرتی ہے - پسینہ رات کو زیادہ آیا کرتے ہیں اور خاص کر صبح کے وقت  
اور مریض کو بہت کمزور کر دیتے ہیں - صبح کے وقت جلد جسم ٹھنڈی ہوا کرتی  
ہے - خراشدار کھانسی رات بھر مریض کو تنگ کرتی رہتی ہے - بعض اوقات  
کھانسی خشک ہوتی ہے اور بعض اوقات تر اور کھڑکتی ہے - سینہ میں ہوا  
سائیں سائیں کرتی ہے - بلغم بدبودار نکلتی ہے اور گدلی سبزی مائل - خون  
آمیز اور خالص پیپ خارج ہوتی ہے -

دیگر ہر ایک دوائی کے مقابلہ میں نائٹرک ایسڈ کے مریض کو گلے کی شکایت زیادہ  
ہوا کرتی ہے - چونکہ نائٹرک ایسڈ کی تمام علامات گرمی سے ترقی پذیر ہوا کرتی  
ہیں - اس لیے ایسے مریض کو گرم آب دہوا میں نہیں رہنا چاہیے -

✽ خوراک - نمبر ۶ یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد -

نائٹرک ایسڈ کا مریض دہلا پتلا ہوا کرتا ہے - کلکیریا اور نائٹرک ایسڈ میں امتیازی  
نقشہ حسب ذیل ہے :-

نائٹرک ایسڈ	کلکیریا
مریض پتلا دہلا اسہال شام کو زیادہ تکلیف دہ کھانسی عموماً خشک گرم موسم غیر موافق گرم ہوا تکلیف دہ	مریض فربہ اسہال صبح کو تکلیف دہ کھانسی عموماً تر سرد موسم ناموافق گرم ہوا مرغوب

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

سلیشیا - جب پھیپھڑے پک چکے ہوں اور اُن میں پیپ بھر چکی ہو تو یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے۔ جب مریض میں حرارت غریزی کم ہو اور اُس کے لیے اپنے آپ کو گرم رکھنا مشکل ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ کھانسی پہلے تو خشک اور کھردری ہوتی ہے۔ بعد میں تر اور سینہ میں بڑی کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے اور بدبودار بلغم خارج ہوتی ہے۔ جب تھوک میں پیپ خارج ہو اور پھیپھڑے کے پکنے کا پتہ دیوے اور مشقت کرنے کے بعد بلغم بہت خارج ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ پھیپھڑے میں پھوڑے بن گئے ہوں بھرت شب کو پسینے آتے ہوں اور بخار رہتا ہو۔ شب کے کمزور کرنے والے پسینوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی مفید دوائی نہیں۔

✽ خوراک: ۶x یا ۳۰ یا ۲۰۰ دن میں دو مرتبہ

پھیپھڑے کی کم جب بہت ہی بدبودار بلغم خارج ہوتی ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے مرض کے آخری درجہ میں مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک: ۳x - درمیں کچھ کے پانچ قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ایوڈین - جب بلغم میں پیپ خارج ہوتی ہو اور خاص کر جبکہ مریض سل خنازیر کا نتیجہ ہو۔ تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب دست آتے ہوں۔ تو ایوڈین ایسی حالت میں مفید نہیں ہوتی۔

✽ خوراک: ۳x - ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سینٹنم میٹیلیک - اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں۔

تب دق ہو۔ دن کے دس بجے لرزہ ہوتا ہو۔ شام جسم گرم اور تمنا جانا ہو۔ خفیف سی حرکت کرنے سے بھی تکلیف ہوتی ہو اور رات کو بہت پسینہ آتا ہو خاص کر صبح کے چار یا پانچ بجے۔

نقاہت اس دوائی کی خاص علامت ہے اور یہ دوائی تب ہی منظر ہوتی ہے۔ جب کہ نقاہت بدرجہ کمال موجود ہو۔ مریض اس قدر کمزور ہوا کرتا

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵۔

ہے کہ وہ دو یا تین منٹ سے زیادہ دگاتا رکھتا گو نہیں کر سکتا آواز بھاری ہوا کرتی ہے اور کھانسی دورے کی ہوا کرتی ہے۔ بلغم بمقدار کثیر اور زردی مائل یا زردی مائل سبز میٹھی خارج ہوتی ہے۔ بلغم کا بکثرت اخراج اور سینہ میں خلا کا احساس۔ یہ سینہ کی دو خاص علامات ہیں۔

✽ **خوراک** - ۳۰ یا ۳۰۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد

**سلفر** - یہ دوائی درجہ ابتدائیہ میں مفید ہوا کرتی ہے جبکہ خون کا رباڈ سینہ کی جانب ہو۔ تمام جسم میں گرمی محسوس ہوتی ہو۔ ہوا کی طلب ہو۔ گرمی شعلے اٹھتے ہوں اور درد دائیں پستان سے شروع ہو کر کمر میں جاتی ہو لیکن جب مرض بڑھ کر جادے تو پھر سلفر استعمال کرنا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ کھانسی عموماً خشک ہو۔ شام کو زیادہ آتی ہو۔ بونے سے زیادہ ہوتی ہو گاہے بگاہے بلغم بہت نکلتی ہو۔ رات کو پسینے بہت آتے ہوں اور بدبودار ہوں۔ کمزوری۔ نفاہت اور کاہلی بہت ہو اور ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلتے ہوں۔

✽ **خوراک** - ۳۰ یا ۳۰۰ یا ۲۰۰ دن میں دو مرتبہ

**آر سینیکم** - یہ دوائی بھی مرض سل میں بڑی احتیاط سے استعمال کرنی چاہیے۔

اس کی علامات مفصلہ ذیل ہیں

بے حد کمزوری۔ نفاہت۔ پیاس۔ تپ دق۔ تنگی تنفس اور تیز بھالا مارنے کی سی درویں۔ جو کہ حرکت کرنے سے زیادہ ہوتی ہوں۔ رات کو لیٹتے وقت یا صبح اٹھتے وقت کھانسی زیادہ ہوتی ہو۔ کھانسی کے دورے لمبے ہوتے ہوں اور پھر کوتاہ دی ہوتی ہو۔ بلغم بکثرت سبزی مائل اور نمکین آتی ہو۔ اور دلی تشویش ہر وقت دامس گیر رہتی ہو

✽ **خوراک** - ۳۰ یا ۳۰۰ یا ۲۰۰ دن میں دو یا تین مرتبہ

**سینکونیرویا** - تپ دق ہو اور بخار چار بجے شام کو زیادہ ہو جاتا ہو۔ رخسارے چمکیے اور تمنا جاتے ہوں اور حلق میں خراش ہونے کے باعث خشک کھانسی آتی

✽ **دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵**



ہو۔ اس دوائی کی خاص علامت یہ ہے کہ سینہ کے اوپر کا حصہ جلتا ہو اور بھرپور محسوس ہوتا ہو۔ گویا کہ وہاں خون جمع ہو گیا ہے۔ دائیں پھیپھڑے میں پتان کے قریب تیز چھن والی دردیں ہوتی ہوں۔ عضلات درد کرتے ہوں اور کوتاہ دمی ہو۔ یہ دوائی مرض کے درجہ ابتدائیہ ثانوی ثلاثی ہر ایک درجہ میں کام آتی ہے مزمن خشک کھانسی ہو یا کھانسی تر ہو لیکن بلغم بڑی شکل سے خارج ہوتی ہو اور لیٹنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ مرض کے درجہ آخری میں یہ دوائی اس وقت مظہر ہوتی ہے جب کہ تھوک اور تنفس بدبودار ہوں۔ بلکہ یہاں تک کہ مریض کو بھی اُن سے بو آتی ہے۔ ایسی حالت میں اس دوائی کے دینے سے سانس ذرا سہولت سے آنے لگتا ہے۔ تھوک یعنی بلغم آسانی خارج ہوتی ہے۔ اطراف رٹانگوں اور بازوؤں کا لگاتار ٹھنڈا رہنا اور گرم ہونے میں نہ آنا اور سینہ میں جلن کا ہونا۔ یہ سینکونیریا کی خاص علامات ہیں۔

✽ خوراک : ۵ یا ۱۰ اہر دو گھنٹہ کے بعد

### برائی اونیا کی علامات یہ ہیں :-

تکلیف وہ خشک کھانسی گویا کہ سر اور پھاتی پھٹ جادے گی اور مانو کہ کھانسی معدہ سے نکل رہی ہے۔ مریض اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور ہوتا ہو۔ پہلوؤں میں تیز چھن کی دردیں ہوتی ہوں۔ گلا درد کرتا ہو۔ پسینہ آتا ہو اور پھیپھڑوں کے اوپر کے ریتوں میں دردیں ہوتی ہوں۔ مارے دردوں کے مریض گہرا سانس نہ لے سکتا ہو۔ یہ اس دوائی کی خاص علامت ہے۔

✽ خوراک : ۳ یا ۲۰ اہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی کاربوسیکم۔ برائی اونیا کی طرح کاربوسیکم میں بھی چھن کی دردیں ہوتی ہیں۔ کھانسی خشک ہوتی ہو اور بلغم بڑی شکل سے خارج ہوتی ہو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ بلغم تھوڑی اُدھر آتی ہے اور پھر نیچے چلی جاتی ہے یا کھانتے

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲

وقت بلغم کے گوبھرے منہ سے اڑ کر باہر نکلتے ہوں۔ بلغم بہت آتی ہو۔ پیپ ڈار بعض اوقات خون آمیز بھی ہوتا ہے۔ بچے سے لیسکر پانچ بجے صبح تک کھانسی زیادہ ہوتی ہو اور مریض کو سردی محسوس ہو تو دہرہ مٹی ہو خاص کر بارہ بجے رات کو سیٹی بجنے کی سی آواز نکلتی ہو۔ جس کے باعث نیند نہ آ سکتی ہو سینہ کی کمزوری اس کی خاص علامت ہے۔ چہرے کا وزنی ہونا اور آنکھوں پر سوچن کا ہونا اس دوائی کی علامت میں سے ہے۔

✽ خوراک: ۳x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ڈرامرا۔ یہ مرض سل کی ایک خاص دوائی ہے۔ ڈاکٹر جونسٹ صاحب اس کو اس مرض میں شافی بتلاتے ہیں۔ یہ درجہ ابتدائی کی دوائی ہے اور نوجوان لڑکیوں کی ابتدائی سل میں کام آتی ہے۔ کھانسی دورہ کے ساتھ آتی اور اکثر قے آنے سے کھانسی کا دورہ ختم ہوتا ہے۔ بوقت شب لیٹنے پر کھانسی زیادہ آتی ہو۔ بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو اور زرد اور کڑوی صبح کے وقت نکلتی ہو۔ اسہال آتے ہوں کلا گھٹتا ہو۔ معدہ میں خراش ہو اور کھانتے کھانتے قے آجاتی ہو گلے کی سل کے لیے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ ڈرامرا کی کھانسی خاص قہرم کی ہوتی ہے۔ بڑا گہرا آواز پیدا کرتی ہے بھدی اور گتے کھانسی ہوتی ہے اور کھانسنے سے سینہ میں دردیں ہوتی ہیں اور رات کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ کھانسی دورہ کی ہوتی ہے اور دورہ کے بعد بلغم باہر نکلتی ہے۔ یا قے آتی ہے۔

✽ خوراک: نمبر ۵ یا ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

لاراسی راسس۔ مسلول کو بوقت شب کھانسی خشک اور تکلیف سے آتی ہو۔ اور تھوک میں خون کی تھوڑی سی نس نکلتی ہو۔

✽ خوراک: نمبر ۵ یا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ڈلکا مارا۔ خفیف سردی لگنے سے بھی پہلوؤں میں دردیں ہونے لگ پڑتی ہیں مریض کی طبیعت ٹھنڈے جلدی متاثر ہوتی ہو اور مرطوب موسم میں تکلیف

بڑھ جاتی ہو۔ کھانسی عموماً تر آتی ہو اور سخت دہیزی مائل چھپی بلغم بکثرت خارج ہوتی ہو۔ نیز چھاتی میں بہت بوجھ معلوم ہوتا ہو۔ ڈسکا مالا کی کھانسی لیٹنے سے اور کمرے کی گرمی سے زیادہ زور پکڑتی ہے اور کھلی ہو میں کھانسی کم ہوتی ہے۔ خسرہ کے بعد مزمن کھانسی کے لیے ڈسکا مارا ایک مفید دوائی ہے۔

✽ خوراک: نمبر ۵ یا ۱۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد

لایسکو پوڈیم۔ ایک مفید دوائی ہے۔ جبکہ نمونہ کے علاج میں تغافل کیا گیا ہو اور اس کے بعد مرض سل شروع ہو گیا ہو۔ کھانسی لگاتار رات دن ہوتی ہو اور زرد پیپ بمقدار کثیر بلغم میں خارج ہوتی ہو جس کا ذائقہ تلکین اور بو دار ہو۔ یا زردی مائل بلغم نکلتی ہو اور سینہ میں درد ہوتا ہو۔ تھوڑا تھوڑا بخار رہتا ہو۔ شب کو پسینے آتے ہوں اور سانس میں کھڑکھڑکی آواز پیدا ہوتی ہو۔ اوپر کا دھڑ دہلا ہو گیا ہو۔

ڈاکٹر ہیوگس کا قول ہے کہ نوجوان آدمیوں کو جب مرض سل کا ڈر ہو تو لایسکو پوڈیم دوائی مضر ہو کر رہتی ہے۔

مسلل خشک کھانسی سے شکم کے دونوں پہلوؤں میں دریں ہونے لگ پڑتی ہوں۔ علی الصباح کھٹی بو والا پسینہ اور سہ پہر کو تھوڑا تھوڑا بخار ہاتھ گرم اور تلویں جلتے ہوں۔ قبض اور ناتاہت ہو۔ تر کھانسی میں جبکہ مریض بڑے بڑے تودے بلغم کے نکالتا ہو۔ تو لایسکو پوڈیم سے بڑھ کر اور کوئی دوائی نہیں ہے۔

✽ خوراک: نمبر ۳ یا ۲۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد

## ضروری ہدایات

نمبر ۱۔ غلیظ نمندار یا اندھیرے مکانات میں جہاں دھوپ نہ پڑتی ہو اور ہوا کا گزر

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

نہ ہو نہیں رہنا چاہیے۔ بلکہ ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں سورج کی روشنی اور تازہ ہوا کا بخوبی گزر ہوتا ہو اور زیادہ گنجان آبادی میں بھی نہیں رہنا چاہیے۔ سل کے مریض کو ایسی کھلی جگہ میں رکھنا چاہیے۔ جہاں کہ آب و ہوا بہت خوشگوار ہو اور ہوا تازہ بکثرت مل سکتی ہو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ وہ کسی اچھے پاڑ پر چلا جائے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکتا ہو تو کسی اچھے گاؤں کو چلا جائے اور وہاں کسی کھلی جگہ میں رہے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو شہر کے نزدیک کسی باغ میں جا کر رہے۔ اگر اتنا بھی نہ کر سکتا ہو تو مکان کی چھت پر سائبان لگا کر رہے۔ غرضیکہ جہاں تک ہو کھلی ہو اور کھلی جگہ میں رہے۔ صرف بارش اور دھوپ کی تیزی سے اور نیز زیادہ سردی سے بچنا لازمی ہے۔ مریض تپ و ق کے لیے اندھیرے اور بند کمرے میں سونا نہایت ہی مضر ہے۔

نمبر ۲۔ سلول کو نا کافی یا ناقص غذا نہیں کھانی چاہیے۔ بلکہ ایسی غذا کھانی چاہیے۔ جو کہ لطیف اور مقوی ہو اور نہ ہی کھانے پینے میں بے اعتدالی کرنی چاہیے۔ تاکہ ہانمہ خراب نہ ہو جائے۔ دودھ۔ بالائی بکھن۔ گھی وغیرہ اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کرنے چاہئیں اور مریض کو کوشش کرنے چاہیے۔ کہ وہ اپنی غذائیت کو بڑھائے تاکہ اس کا جسم اور وزن بڑھے۔

کوڈلیور آئیل (پھلی کاتیل) اس مرض میں مام طور پر مفید مانا گیا ہے کیونکہ اس میں غذائیت بہت ہوتی ہے۔ اس لیے اس سے جسم کا وزن بڑھتا ہے اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ سلول کے لیے دودھ سے بڑھ کر اور غذا نہیں ہے لیکن دودھ کو ہمیشہ جوش دے کر پینا چاہیے۔ دودھ میں پھیٹے ہوئے انڈے۔ بخنی اور شور باسب لطیف اور مقوی اغذیہ ہیں۔ تازہ سبزی ترکاریاں پکاٹی ہوئی مفید ہوتی ہیں۔ ثقیل اور ترش اشیاء وغیرہ سے پرہیز لازمی ہے۔

نمبر ۳۔ ہر قسم کی منشیات و نشہ دار اشیاء شراب وغیرہ سے پرہیز لازم ہے کیونکہ ایسی اشیاء کے استعمال سے صحت عامہ خراب ہو کر کمزوری بڑھتی جاتی

ہے۔ بچپن کی شادی کثرتِ مجامعت اور دیگر بدعادات مثلاً جلق وغیرہ سے قطعی پرہیز کرتا چاہیے۔ کیونکہ منی کا زیادہ اخراج ہو کر جسم سوکھتا ہے اور مرضِ سل کے غلبہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔

نمبر ۴۔ مسلول کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اگر شادی شدہ ہے تو مباشرت سے قطعی پرہیز رکھے۔ اگر مجروح ہے تو اس کی شادی نہ کی جائے۔

نمبر ۵۔ بارہا تجربہ میں آچکا ہے کہ جب کمزور اور نازک مزاج لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ مباشرت میں بے اعتدالی کر کے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کو مرضِ سل آگھیرتا ہے۔ چنانچہ کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس نامراد مرض سے موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں۔ اس لیے والدین اور رشتہ داروں کا فرض ہے کہ سولہ برس سے کم عمر کی لڑکی اور چوبیس سال سے کم عمر کے لڑکے کی شادی نہ کریں اور نیز اس امر کی بھی نگہداشت رکھیں کہ کہیں شادی شدہ جوڑا بے اعتدالی میں نہ پھنس جائے۔ کثرتِ مجامعت کے نقصانات نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں پر بخوبی روش کر دینے چاہئیں۔

نمبر ۶۔ ایک کمرہ میں بہت سے آدمیوں کو مل کر نہیں سونا چاہیے۔ اس سے کمرہ کی ہوا خراب ہو کر سونے والوں کی صحت پر بہت سا برا اثر پڑتا ہے۔ اور خاص کر کمزور اشخاص پر اس کا بہت مضر اثر ہوتا ہے۔

نمبر ۷۔ سونے کے کمرے کی کھڑکیاں اور روشندان کھلے رکھنے چاہئیں تاکہ کمرہ میں تازہ ہوا آتی جاتی رہے۔ نہ ہی سونے والے کمرے میں کسی قسم کا دھواں ہونا چاہیے۔ چراغ یا لیمپ کو کمرے میں جلتے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ اس سے ہوائیں مسموم ہوتی ہیں۔

نمبر ۸۔ بعض آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سانس منہ کے راستے پیتے ہیں۔ سانس ہمیشہ ناک کے ذریعہ لینا چاہیے۔ یہاں تک ہو سکے لمبا اور گہرا سانس لینا چاہیے تاکہ ہوا پھیپھڑوں کے ہر ایک حصہ میں بخوبی پہنچ جائے۔ منہ ڈھانپ کر نہیں سونا چاہیے خواہ گرمی ہو یا سردی۔ ہمیشہ منہ کھلا رکھ کر سونا چاہیے۔

نمبر ۹۔ دودھ کو ہمیشہ اچھی طرح جوش دے کر پھر نیم گرم یا سرد جیسا کہ دل چاہے۔

پینا چاہیے کیونکہ گائے کا کچا دودھ مرضِ سل کے پیدا کرنے والا ہے۔  
نمبر ۱۰۔ کچا یا نیم پخت گوشت کھانے سے بھی مرضِ سل کے ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گوشت خوب پکا کر کھانا چاہیے۔

نمبر ۱۱۔ کھانا کھانے کے قبل ہمیشہ ہاتھ دھو لینے چاہئیں اور کلی کر لینی چاہیے۔ باتھوں کے ساتھ کئی قسم کے گندے اجزاء لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر بغیر دھونے کے اس کے ساتھ کھانا کھایا جائے تو ان اجزاء کے کثیف کو جسم کے اندر جانے کا موقع مل جاتا ہے۔

نمبر ۱۲۔ مسلول کا جھوٹا حقہ پینا منع ہے۔ اس سے تندرست اشخاص میں بیماری پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یوں بھی حقہ پینے کی عادت کو ترک کرنا چاہیے کیونکہ حقہ کے ذریعہ کئی متعدی امراض پھیلتے ہیں۔ ایک دوسرے کا جھوٹا حقہ پینا نہایت ہی نقصان دہ ہے۔

نمبر ۱۳۔ مسلول یا مریض تبِ دق کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ لباس بھی اس کو صاف ستھرا پہننا چاہیے اور اسے غسل بھی روزانہ سرد پانی کے ساتھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ جیسا کہ طبیعت کو مرغوب ہو کرنا چاہیے اور نہانے کے بعد فوراً ہی خشک تولیہ سے جسم کو اچھی طرح دگر کر صاف کر لینا چاہیے اس سے دورانِ خون ذرا تیز ہو جاتا ہے مریض کا بستر وغیرہ ہمیشہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔

نمبر ۱۴۔ مسلول یا مریض تبِ دق کو فرش یا دیواروں پر نہ ہرگز نہ تھوکرنا چاہیے کیونکہ ان کی بلغم میں بے شمار جراثیمِ سل کے موجود ہوتے ہیں۔ جو کہ بلغم کے خشک ہو جانے پر ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں اور بذریعہ تنفس تندرست اشخاص کے پیپھڑوں میں پہنچ کر اس ملکِ مرض کا بیج بودیتے ہیں۔ مسلول و مدقوق کو ہمیشہ ایک خاص مخصوص برتن میں تھوکرنا چاہیے اور اس کا امدان کو صاف کر بلغم پر لکڑی کا برادہ اور مٹی کا تیل ڈال کر جلا دینا چاہیے اور پاتے پھرتے مریض کو اپنے رومال میں تھوکرنا چاہیے اور بعد اُس رومال کو جلا دینا چاہیے۔

مسلول کا جھوٹا کھانا تندرست اشخاص کو نہیں کھانا چاہیے اور نہ ہی مسلول کے ساتھ ایک ہی برتن میں دل کر کھانا چاہیے۔

مسلول یا مریض تب و دق کو لازم ہے۔ کہ وہ کسی قسم کی جسمانی مشقت یا دماغی محنت نہ کرے اور جہاں تک ممکن ہو سکے آرام کرے۔ اور ذرا بھی بخار ہو تو زیادہ چلنا پھرنا بھی منع ہے۔ کیونکہ بخار کی حالت میں چلنے پھرنے سے کمزوری بڑھتی ہے۔ البتہ مریض کو اس قدر ورزش یا سپر کرنی چاہیے کہ جس سے اسے تکان پیدا نہ ہو۔ کھلی اور تازہ ہوا میں بواخوری کرنا یا پیدل چلنا مفید ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر پیدل چلنے سے نبض تیز چلنے لگے۔ یا کھانسی زیادہ ہونے لگے یا اگر مریض کو تنگی نفس یا بد مضمی کی شکایت ہو تو ایسی حالتوں میں پیدل بواخوری نہیں کرنی چاہیے۔ مریض کو ہمیشہ اپنا دل خوش اور شاد رکھنا چاہیے۔ رنج و غم فکر و تردد سے پرے رہنا چاہیے۔ مریض کو ہمیشہ اپنا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ اور اس کے دل میں یہ خیال قائم رہنا چاہیے کہ روز بروز وہ اچھا ہو رہا ہے۔ دلی قوت کی مضبوطی مریض کو فائدہ بخش ہوا کرتی ہے۔

نمبر ۱۵ جب مرض خفیف ہو یا مزمن ہو تو کسی پرفضا پاٹ پر جہاں نمی کم ہو اور بارش زیادہ نہ ہو۔ مسلول کو چلا جانا چاہیے۔ بشرطیکہ وہاں ہر طرح آرام و آسائش میسر ہوں۔ اگر ایسا انتظام نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس کے لیے اپنے گھر پر ہی رہنا بہتر ہے۔

## کنٹھ مالا۔ خنزیر سکرافیولا

(SCROFULA, Struma)

اس مرض میں گردن کے غدود پھول کر مالا کی طرح ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو کنٹھ مالا کہتے ہیں اور چونکہ اس مرض میں گردن پھول کر سور کی گردن کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس لیے عربی میں اس کو خنزیر کہتے ہیں

## علامات

گردن کے غدد متورم ہو جاتے ہیں۔ ابتداء میں تو ان میں درد نہیں ہوتا اور وہ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ لیکن بعد میں وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ ان کے اوپر کی جلد جڑ جاتی ہے اور وہ درد کرتے ہیں۔ بالآخر ان میں مواد پیدا ہو کر وہ پھٹنے لگتے ہیں اور وہاں پر زخم و ناسور بن جاتے ہیں۔ جو مہینوں بلکہ برسوں تک اچھے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ روز بروز مریض کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں میں یہ مرض سرایت کر جائے تو ساتھ ہی ریل (تپیل) ہو جاتی ہے۔

## اسباب مرض

اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ مسلول یا آتشکی یا شرابی یا ضعیف والدین کے بچے جو پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کہتے ہیں۔ میلہ کچیلار ہنا۔ کثیف آب و ہوا نا کافی پارچات اور خرابی غذا۔ سیلان الرحم (سیکوریا) کا عارضہ نیز خسرہ۔ کالی کھانسی۔ سرخ بخار اور زکام وغیرہ اس کے اسباب مؤیدہ ہیں۔

## علاج

کلکیریا کارب : خازن یعنی کنٹھ مالا کی یہ خاص دوائی ہے۔ اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں :-

سر پر پسینہ آنا۔ کھٹی بو والا پسینہ، غدد جلدی متورم ہو جاتے ہوں اور ان میں مواد بھر جانے کا ڈر لگ جاتا ہو۔ چہرہ زرد۔ مریض سست اور بھتا۔ چند یا سر کے بالائی حصہ کا وہ مقام جو بچپن میں تڑپتا رہتا ہے (کی ہڈیاں کھلی ہوئیں شکم

م۔ چند یا جس کو تالو بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو فن ٹیل کہتے ہیں



بڑھا ہوا اور اوپر کا ہونٹ سوجا ہوا۔ یہ علامات گلیریا کی خاص ہیں۔ پاؤں سر اور ان پر چکنا پسینہ۔ قبض ہوا اور چاک نما پاخانے آتے ہوں۔ بوقت شب سر پر سر پینہ آنا یہ بھی گلیریا کی خاص علامت ہے۔

✽ خوراک : ۲x دن میں تین مرتبہ یعنی صبح۔ دوپہر اور شام  
گلیریا فاس : جب مذکورہ بالا علامات کے ہمراہ سلی کا ڈر زیادہ عیاں ہو تو گلیریا فاس دوائی دینی چاہیے۔

✽ خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ صبح۔ دوپہر اور شام  
سلفر : خنزیر کے عارضہ میں یہ سب ادویات کی ستراج دوائی ہے۔ علامات اس کی حسب ذیل ہیں۔

مریض بچہ مزاج زودرنج اور چالاک ہوا کرتا ہے۔ سر کے ارد گرد پسینہ کھردری اور خشک جلد جسم اور پھوڑے پھنسیوں کا نکلنا۔ سر ہلاتا لو کھلا ہوا ہڈیوں کی نشو و نما متناقص۔ اشتہا بہت۔ باوجود جھوک زیادہ ہونے کے ضعف و کمزوری بہت جلد جسم زرد۔ ڈھیلی ڈھالی اور گندی اور اس پر جھریاں پڑی ہوتیں۔ بچہ سوکھے ہوئے بوڑھے آدمی کی مانند نظر آتا ہے۔

✽ خوراک : ۳x یا ۴x صبح اور شام یعنی دن میں دو مرتبہ۔  
سلیشیا : خنزیری مزاج والے مریضوں کے لیے جن کے غدود متورم ہوں اور ان میں مواد بھر گیا ہو۔ یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک : ۳x یا ۶x دن میں تین مرتبہ یعنی صبح دوپہر اور شام  
برائٹ کارب : ضعف و کمزوری۔ شکم بڑھا ہوا اور جھوک زیادہ دماغی اور جسمانی کمزوری اور چھوٹی چھوٹی پھنسیاں۔ تھیر کی مانند سخت گٹھنیاں۔ یہ اس کی موٹی موٹی علامات ہیں۔

✽ خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ۔ یعنی صبح دوپہر اور شام  
مرکیورس : اس کی خاص علامات یہ ہیں۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

چکنا اور بدبو دار پسینہ - خاص کو سر کے پاس ٹھنڈے اور نمدار اعنہ دتوڑم  
غدد ان میں مواد بکثرت - تالو کھلا دانت ناکل - اسہال کے ہمراہ کو منتھنا  
بہت پڑتا ہو اور جلد جسم ٹھنڈی - اکثر اوقات یہ دوائی سلفر کے بعد بہت مفید  
ہوا کرتی ہے -

✽ خوراک : ۳x یا ۶x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ یعنی صبح - دوپہر اور شام  
ہمپر سلف : جب غددوں میں مواد بھرنا شروع ہو جائے تو یہ دوائی بہت  
مفید ثابت ہوتی ہے

✽ خوراک : ۳x یا ۶x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ یعنی صبح دوپہر اور شام -  
آرم : امراض استخوان میں اور نیز یسے کیسوں میں جن میں کہ پارہ نامناسب مقدار  
میں کھلایا گیا ہو - یہ دوائی کام آتی ہے -

✽ خوراک : ۶x صبح اور شام یعنی دو مرتبہ  
فیرم فاس اور چائنا : کمزوری کو دور کرنے اور طاقت کو بحال رکھنے کے لیے  
ان کا استعمال ضروری ہے -

✽ خوراک : ۳x صبح اور شام یعنی دن میں دو مرتبہ

## ضروری ہدایات

خنازیر کے علاج میں تین اُمور کا خیال رکھنا از بس ضروری ہے :-

۱ - مقوی غذا

۲ - تازہ ہوا

۳ - باقاعدہ ورزش

غذا کافی مقوی اور قابل ہضم ہونی چاہیے - لیکن مقدار سے زیادہ نہیں - دودھ  
روٹی - آلو چاول وغیرہ یہ سب مفید چیزیں ہیں -

کوڈ لیور آئیل کا استعمال بھی اس مرض میں نہایت مفید ہے - جب بخار بہت

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵ -

تیز نہ ہو۔ تو دن میں دو یا تین مرتبہ دینا چاہیے۔ جب کہ مریض دُلا ہوتا جا رہا ہو۔ ابتدا میں چائے کا چمچہ بھر دیویں ساگر موافق نہ پڑے تو نیم چمچہ کر دیں۔ درز رش؛ کھلی ہوا میں بیمار کو درزش کرنی چاہیے۔ مگر اتنی نہیں کہ جس سے تھکاوٹ پیدا ہو جائے۔ خنازیر کے مریضوں کے لیے پہاڑ یا سمندری ہوا نہایت صحت بخش ہوا کرتی ہے۔ اگر مریض کو کافی کپڑے پہنا سکے ہوں تو ایسی حالت میں سرد آب و ہوا نہایت اعلیٰ مانی گئی ہے۔ لیکن مرطوب آب و ہوا نقصان رساں ہوا کرتی ہے۔ مریض کے کمرے میں تازہ ہوا کی آمد و رفت بلا روک کے ہونی چاہیے۔ تازہ اور نمکین پانی میں غسل کرنا جسم کو تروتازگی بخشتا ہے۔

پارچات؛ بیمار کے پارچات موسم کے مطابق ہونے چاہئیں۔ گرم ہوں۔ مگر تکلیف دہ نہ ہوں۔ ٹانگیں اور بازو خاص کر گرم رہنے چاہئیں۔ فلائین کا استعمال مفید مانا گیا ہے۔

## پیٹ کی سل۔ سل۔ بطنی۔ سل۔ ساریقی

(CONSUMPTION of the Bowels)

(Tabes mesenterica)

اس مرض میں پیٹ کے غدودِ ماسارقی (مینٹرک گلینڈز) ماؤف ہوتے ہیں۔ یعنی مادہ سل ان میں سرایت کر جاتا ہے۔ مریض کا جسم نشوونما نہیں پا سکتا۔ اس کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ اور وہ آہستہ آہستہ سوکھتا جاتا ہے۔ اگر شافی علاج نہ ہو تو اخیر میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ مرض بالعموم آٹھ ماہ سے لے کر

سے مینٹرک گلینڈز وہ غدودِ مجاذبہ ہیں۔ جو امعاء کی دوتوں کے درمیان ہوتے ہیں۔

دس سال کے عموالے بچوں کو ہوا کرتا ہے۔ بڑی عمر کی عورتوں میں بھی یہ مرض دیکھا گیا ہے۔

## علاماتِ مرض

آنٹوں میں درد۔ مارے درد کے مریض مانگوں کو نمواً سکیڑے رکھتا ہے کبھی قبض کبھی دست یسکن عام طور پر دستوں کی شکایت زیادہ رہا کرتی ہے جس میں نہ مضم شکرہ غذا خارج ہوتی ہے یا مٹی رنگے پاخانے بہہ دار آتے ہیں ہونٹے گہرے سرخ اور پٹھے ہوئے بھوک کبھی کم بھی زیادہ۔ مرض کے آخری درجہ میں مریض کی شکل مانند بوڑھوں کے ہو جاتی ہے۔ بلد جسم پسلی اور ڈھیلی ڈھالی۔ نکتہ میں پھلے۔ تپ دق۔ ضدی اسہال۔ شب کو پسینے۔ بے حد پیاس ضعف اور بھوک کا مارا جانا وغیرہ وغیرہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ مریض کے پیٹ کو اگر احتیاط سے دبایا جاوے تو متورم غدود انگلیوں کے نیچے معلوم پڑتے ہیں۔

## علاج

مرض کے ابتدا میں ہی اگر سفر کی چند خوراکیں دے کر اس کے بعد کلکیریا کامب یا مرکبورس بن آلیو ڈائیڈ دوائی استعمال کرائی جاوے تو اتنا علاج ہی عموماً کافی ہوا کرتا ہے۔

آر سینکیم آلیو ڈائیڈ۔ ضعف و نقاہت اور پیاس کی زیادتی و اسہال کی بہتات یہ اس دوائی کی خاص علامات ہیں۔

✽ خوراک : ۳ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

آلیو ڈیم۔ اسہال۔ کھانسی۔ شب کو پسینے اور بھوک کی کبھی سی اور کبھی بیشی اور بڑی بھاری کمزوری۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

✽ خوراک: ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس بن آیو ڈائیڈ - ۱ سہال بہت - بھوک کبھی کم - کبھی بیش - شکم بہت  
تھا ہوا اور درد کرتا ہوا اور پیاس ہو۔

✽ خوراک: ۳x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب - خنازیری مزاج کے مریضوں کے لیے جب کہ وہ چپ چاپ  
پڑا رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کے غدود پھولے ہوئے ہوں - اور  
بڑھوں کی مانند کھائی پڑتے ہوں۔

✽ خوراک: ۳x یا ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد

پلم بم ایسی ٹیکم - جب قبض نہایت سخت ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

✽ خوراک: ۳x سفوف کے ۵ گرین ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

سلفر - مرض کے ابتدا میں اور نیز جب کہ مرض کی کمی پر ہو جاوے تو یہ دوائی دی  
جاتی ہے۔

✽ خوراک: ۱۲x یا ۳۰x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

بیسی لائینم - نمبر ۲۰۰ کی ایک خوراک یا دو خوراکیں ہر منہ میں ضرور دیتے رہنا چاہیے  
اور ساتھ ہی دیگر مناسب دوائی کا استعمال بھی جاری رکھنا چاہیے۔

## ضروری ہدایات

مفصلات کی یا ساحل سمندر کی ہوا مفید پڑتی ہے۔ گرم یا شیر گرم نمکین  
پانی میں غسل۔ گرم پارچات اور شکم پر فلائین کی پٹی اور عمدہ مقوی غذا کو ڈیورسٹیکل  
کا بھی استعمال مفید ہے۔ زیتون کا تیل شکم پر آہستہ آہستہ ملنا بہت مفید ہوا کرتا ہے  
اور جسم کو تروتازگی بخشتا ہے۔ اور خون کی حرکت میں مددگار ہوتا ہے۔

# درم پر وہ دماغی رمل دماغ میں پانی بھر جانا

## TUBERCULAR Meningitis Hydrocephalus

اس مرض میں مادہ رمل کی وجہ سے دماغ کے پردوں میں شدید درم ہو جایا کرتا ہے۔ اگرچہ عمر کے ہر ایک حصہ میں یہ مرض ہو سکتا ہے لیکن خنازیری مزاج کے بچوں میں یہ اکثر اوقات ملک ثابت ہوتا ہے۔

## علامات مرض

جب یہ مرض بچوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو مندرجہ ذیل علامات پائے جاتے ہیں :-  
تیز اور بے قاعدہ نبض - قہیں - قبض - اگر پاخانہ آدے تو مٹی رنگا سرخ زبان اور لگاتار تیز بخار - سر میں شدید درد - روشنی اور شور ناقابل برداشت - نیند میں خلل مزاج میں چوڑھڑاپن اور مریض دانتوں کو پٹیتا ہے - سر بڑا اور قدرے پھولا ہوا - سر میں چکر آنے کے باعث مریض کھڑا نہیں ہو سکتا اور چپ چاپ پڑا رہنے کی خواہش کرتا ہے - گاہے بگاہے اسے ہڈیاں بھی ہو جاتا ہے - ہیزا صورت اور یکایک چلا اٹھتا ہے - غنودگی عموماً اس پر طاری رہتی ہے اور وہ کمزور ہوتا جاتا ہے بعض اوقات عضلات جھٹکتے ہیں اور بھینگا پن ہو جاتا ہے جب مریض کی حالت خراب ہو تو ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے - چکنا پینہ - نبض غیر معمولی تیز - لیکن کمزور چلتی ہے اور مریض راہی ملک بقا ہوتا ہے۔

## اسباب مرض

اصل سبب تو اس مرض کا رمل کا مادہ ہے اور خنازیری مزاج کے بچے جن کی عمر ایک سال سے پانچ سال کی ہوتی ہے اور بعض اوقات مسلول الطبع نوجواں بھی اس مرض میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں - صدر دماغ - ذفعہ خوف طاری ہونا اور دانتوں کا ٹکلیٹ سے نکانا یہ سب اس کے اسباب مؤیدہ ہیں -

## علاج

ایکونائیٹ - بیلڈوونا اور برائی اونیا - یہ تینوں ادویات اس مرض میں خاص طور پر مؤثر ہوتی ہیں -

ایکونائیٹ - جب دیر تک سورج کی گرمی لگنے کے باعث یہ عارضہ ہو جائے - یا غصہ کے باعث دماغ میں اجتماع خون ہو جائے تو ابتدائے مرض میں یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے - خوف اس کی علامت ہے -

✽ خورال: ۱x ہر نیم گھنٹہ کے بعد -

بیلڈوونا: مرض کے ابتداء میں یہ دوائی بھی مفید ہوتی ہے - جب کہ جلد جسم جلتی ہو - نبض خوب بھری ہوئی جلتی ہو - چمکیلا - سرخ چہرہ اور ہڈیاں سر میں شدید درد سوتے سوتے چلا اٹھنا اور دانتوں کا پینا -

کلکیریا کارب اور بیلڈوونا اگر باری باری سے دیے جائیں تو خراب کیسوں میں یہ علاج شافی ہوا کرتا ہے -

✽ خورال: ۱x یا ۲x ہر نیم گھنٹہ کے بعد

برائی اونیا: اس کی خاص علامات یہ ہیں :-

منہ کو متواتر ہلاتے رہنا - گویا چیز چبا رہا ہے - حرکت کرنے سے مارے درد کے چلا اٹھنا - شکم تنا ہوا - زبان سفید - درویں تیز اور سوئی چھنے کی سی - پینے کے لیے بڑا سریں - تیز بخار اور کثرت پسینہ -

جب چھانٹ کے ذب جانے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہو جائے تو یہ دوائی خاص طور پر شافی ہوا کرتی ہے -

✽ خورال: ۳x یا ۴x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

وراٹرم ورائیڈ - دماغ میں شدید درم تیز نبض تشنج اور تشنج کے بعد سخت کمزوری -

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

ڈاکٹر الی آٹ کا بیان ہے کہ شدید درم دماغ میں یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔

✽ خورال: ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ہیلی بورس - دل کی کمزوری اس کی خاص علامت ہے۔ مرض کے آخری درجہ میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جب کہ رں چھٹنا شروع ہو گیا ہو۔ پیشانی پر جھریاں پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ ایک بازو اور ایک ٹانگ کا خود بخود حرکت کرتے رہنا اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ سر میں گولی مارنے کا سادرو۔ یکایک چلانا اور سر ہانے میں سر کا گھسیڑنا یہ بھی اس دوائی کی علامات ہیں۔ مریض بڑے دردناک لہجہ میں چلاتا ہے۔

✽ خورال: ۵ یا ۱x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

بیسی لائینم: اس مرض میں یہ دوائی کیسی ہی کافی ہوتی ہے۔ نمبر ۲ طاقت کے پانچ قطرے ایک چھٹانک پانی میں ڈال کر ہر چار گھنٹہ کے بعد ایک ایک چھوٹا چمچہ دیتے رہنا چاہیے۔

زنگم میسلی کم: جب مرض کا حملہ شدید نہ ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ خاص کر جب کہ چھانٹ دب گئی ہو اور مریض سول ہو۔ بخار یا تو بالکل ہی نہ ہو۔ اگر ہو بھی تو بڑا خفیف۔ عضلات کا جھٹکاؤ اور زیادہ احساس اور پاؤں کی کمزوری دماغ کا شل ہو جانا۔ بے ہوشی اور پلا ارادہ پیشاب اور پاخانہ کا خارج ہو جانا سب اس دوائی کے علامات ہیں۔ شروع مرض میں تیز بھالا مارنے کی سی رویا ہوتی ہوں اور عصبی کمزوری بہت ہو۔

✽ خورال: ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

سلفر - درم پردہ ہائے دماغ رسی میں یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ بچہ خواب غفلت میں پڑا رہتا ہو۔ پیشانی پر سرد پسینہ (تریلی) آتا ہو۔ اعضاء جھٹلاتے ہوں۔ تشنج ہو۔ اور پیشاب بند ہو۔ چھانٹ نکل کر جب

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵



گم ہو جائے تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

✽ خوراک : ۳۰ یا ۳۵ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ کوپریم - کیمفور - سائی کیوٹا - ایپس - جلیسی میم وغیرہ بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

سرور سرد پانی کی پٹی رکھنا۔ سادہ غذا۔ سرد یا شیر گرم پانی میں غسل کرنا اور فوراً ہی اس کے بعد جسم کو خشک تولیہ سے پونچھ دینا اور چپ چاپ پڑے رہنا یہ سب ضروری ہیں۔ بیمار کو ایسے کمرہ میں رکھنا چاہیے جس میں تازہ ہوا کا خاصا گزر ہو اور اس امر کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ مریض کے پاس شعد نہ ہو۔ پاشویہ کرنا بھی مفید ہے۔

# طاعون - پلگ

(PLAGUE)

یہ ایک قسم کا شدید متعدی مرض ہے۔ جس میں سخت بخار ہوا کرتا ہے اور جسم کے مختلف مقامات کی گلیٹیوں میں سوزش پیدا ہوتی ہے۔ عموماً جنگا سر یا بغل میں یا کان کے پیچھے گردن میں بدیں نکل آتی ہیں اور کمال درجہ کا ضعف ہوتا ہے۔

بعض اوقات یہ مرض نونیہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اس کو نونیہ پلگ کہتے ہیں۔ ایک اور قسم ایسی ہوا کرتی ہے کہ جس میں صرف بخار شدید چڑھ جاتا ہے اور پلگ کا زہر سارے خون میں سرایت کر جاتا ہے جس سے سلاخون زہر پلا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی طاعون بہت مہلک ہوتی ہے۔ اس کو عفونتی پلگ کہتے ہیں۔

✽ مقدار خوراک و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

## اسباب مرض

اصل سبب اس مرض کا ایک نہایت چھوٹا کرم ہے جس کو بیسی لس میں ٹس یعنی طاعون کا کیزر کہتے ہیں۔ یہ جراثیم تمام مریضان طاعون کی بدوں اور متورم غدودوں۔ نمونائی طاعون کے مریضوں کے تھوک اور بغم میں اور تمام مریضان خفوقی کے خون میں پائے جاتے ہیں۔

## یو بونک پلیگ

گھٹی دار طاعون جس کو انگریزی اصطلاح میں یو بونک پلیگ کہتے ہیں۔ بلاشبہ یہ مرض چوہوں سے آدمیوں کو لگ جاتا ہے۔ درحقیقت یہ مرض چوہوں کا ہے۔ اگر کسی گاؤں یا قصبہ میں چوہے نہ ہوں تو اس گاؤں یا قصبہ میں پلیگ نہیں پھیل سکتی۔

## طاعون کی بیماری کس طرح چوہوں سے انسانوں میں چلی جاتی ہے

جب کسی چوہے کو پلیگ ہو جاتی ہے تو اس کے خون کے چھوٹے سے چھوٹے قطرہ میں طاعون کے جراثیم یا تخم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ ہر ایک چوہے کے جسم پر پسو ہوتے ہیں۔ جو کہ اُن کو کاٹتے اور ان کا خون چوستے ہیں تو ساتھ ہی طاعون کے ہزار ہا جراثیم کو بھی چوس جاتے ہیں۔ جب پلیگ زدہ چوہا مر جاتا ہے تو پتو اسے چھوڑ کر دوسرے چوہوں کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ اگر انہیں چوہے نہ ملیں تو وہ آدمیوں پر جا بیٹھتے ہیں اور کاٹتے ہیں اس طرح سے طاعون کے جراثیم اُن آدمیوں کے خون میں چلے جاتے ہیں۔ اور اُن کو پلیگ کا مرض ہو جاتا ہے۔

## پلیگ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں کس طرح پہنچ جاتی ہے۔

جب ایک آدمی طاعون زدہ گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے جہاں کہ طاعون نہ ہو تو اس کے کپڑوں یا بستر میں ایسے پتو موجود ہوتے ہیں جو کہ طاعون زدہ چوہوں کے اوپر سے اُن کے مرنے کے بعد اُن کے جسم سے اترے تھے۔ جب وہ شخص دوسرے گاؤں پہنچ کر کسی گھر میں اپنا بستر رکھتا ہے تو وہ پتو اس کے بستر سے نکل کر اُس گھر کے چوہوں

کو کاٹتے ہیں اور پھر چوہے بھی طاعون زدہ ہو کر مرنے لگتے ہیں اور اس طرح سے اُس گاؤں کے لوگوں میں بھی یہ مرض پھیل جاتا ہے۔ اکثر مرتبہ اسی شخص کو جو اپنے ہمراہ چوہوں کے پتوے آیا تھا پلیگ ہو جاتا ہے۔ یا ممکن ہے کہ چوہوں کے پتو جن کے اندر پلیگ کے جراثیم موجود ہوں۔ اس کی روانگی سے پیشتر ہی اُس کو کاٹ چکے ہوں۔

## پلیگ سے بچنے کے طریقے

اول: چونکہ یہ بیماری چوہوں کے ذریعہ پھیلتی ہے۔ اس لیے جس گاؤں میں چوہے نہ ہوں وہاں یہ بیماری نہیں پھیلتی۔ لہذا جہاں تک ممکن ہو چوہوں کو بڑھنے نہ دیا جائے۔

دوم: پلیگ کے اجزاء جب تک ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں نہیں جاتے تب تک یہ بیماری دوسرے گاؤں کے چوہوں میں نہیں پھیل سکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ طاعون زدہ گاؤں کے لوگوں کو اجازت نہ دی جائے کہ وہ دوسرے گاؤں میں آکر بیماری پھیلائیں۔

سوم: چوہوں کے درمیان خواہ کتنی ہی بیماری کیوں نہ ہو پھر بھی جب تک اُن کے پتو آدمیوں کو نہ کاٹیں تب تک پلیگ ان کو نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کبھی چوہوں کے درمیان پلیگ پھوٹ نکلے اور وہ گھر میں مرنے شروع ہو جائیں تو چاہیے کہ گھروں کو چھوڑ کر لوگ میدانوں میں چلے جائیں اور جب تک بذریعہ حرارت وہ اپنے گھروں میں سارے پتوؤں کو نہ مار لیں۔ اپنے گھروں کو واپس نہ آئیں۔

چہارم: گھروں میں اناج اور ایسی چیزیں ذخیرہ نہیں کرنی چاہئیں کہ جن پر چوہے پرورش پاتے رہیں۔ حتی الامکان گھر کے کمرے کا فرش بچختہ ہونا چاہیے تاکہ چوہے اُن میں نہیں نہ بنا سکیں۔ گھر کی موریوں اور نایساں بھی بخوبی صاف رکھنی چاہئیں۔ گھر میں کسی جگہ بھی غلاظت نہیں پڑی رہنی چاہیے غرضیکہ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں کوئی چوہا نہ آئے اور نہ رہ سکے۔

پنجم: جس مکان میں پلیگ کی واردات ہو چکی ہو اُس مکان کو فوراً خالی کر دینا چاہیے اور اسے اچھی طرح سے پاک و صاف کروانا چاہیے اور کمرے میں آگ، ہلا کر

اُس میں گھی اور خوشبودار چیزیں جلانی چاہئیں۔ ہون سا گرمی میں اگر پستہ کوٹ کر ملایا جائے اور اُس کو گھی کے ساتھ جلایا جائے تو نہایت اعلیٰ دس ان فلیکٹ وائی بن جاتی ہے اور بجائے بڑے کمروں میں خوشبو بھی رہتی ہے۔ اس طرح حرارت پہنچانے سے چوہوں کے پتھر جاتے ہیں۔ دیواروں پر سفیدی بھی کرا دینی چکے ششم: تمام ایسی چیزوں کو جن کو پلگ کی پھوٹ یعنی اُس کے لگ جانے کا اندیشہ ہو۔ مثلاً مریض کا لباس۔ بستر اور چار پائی وغیرہ انہیں جلادینا چاہیے۔

ہفتم: پلگ کے بیمار کا پیشاب و پاخانہ۔ تھوک و بلغم اور بدوں کی آلائش وغیرہ میں کوئلے اور مٹی کا تیل ڈال کر جلوا دینا چاہیے۔

ہشتم: سرکاری ہسپتالوں میں طاعون سے بچنے کے لیے ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ اس سے بہت کچھ فائدہ ہے۔ اس ٹیکہ کا اثر قریباً چھ ماہ تک رہتا ہے۔ اس ميعاد کے بعد پھر ٹیکہ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

نہم: جس گاؤں یا شہر میں پلگ ہو۔ وہاں کے باشندوں کو لازم ہے کہ اپنے کپڑے اور گھر صاف ستھرے رکھیں اور بستر کے کپڑوں اور چارپائیوں کو دن کے وقت دھوپ میں رکھیں اور کھلی ہوا چلتی ہو۔ نیز مانگوں اور بازوؤں پر سرموں کے تیل کی مالش روزانہ کرنی چاہیے۔

دہم: اگنیشیا x کے تین قطرے صبح روزانہ تازہ پانی کے گھونٹ میں ڈال کر پیئے جائیں اور بیویائی نم نمبر ۳ کے تین قطرے ایک ہفتہ میں دو مرتبہ شام کے وقت استعمال کرنے چاہئیں۔ ایسا کرنے سے مرض کا بچاؤ رہتا ہے۔

## چوہے گھروں میں سے کس طرح دُور کئے جاسکتے ہیں؟

چوہے پنجروں میں پکڑ کر مارے جاسکتے ہیں یا ان کو زہر کھلایا جاسکتا ہے۔ سال بھر چوہے پکڑنے والے پنجروں کا استعمال کرنا چاہیے۔ جن قصوں اور شہروں میں میونسپل کمیٹیاں ہیں، وہاں یہ پنجرے کمیٹی کی طرف سے لوگوں کو ملتے ہیں اور کمیٹی کے ملازم خود

ہی اگر چہ ہے لے جاتے ہیں اور جو چوہے ان میں ہوتے ہیں ان کو باہر لے جا کر مار دیتے ہیں۔ لیکن جہاں میونسپل کمیٹیاں نہ ہوں یا پھرے دستیاب نہ ہو سکیں۔ وہاں لوگوں کو لازم ہے کہ خود پنجرے خرید کر اپنے گھروں میں رکھیں اور پنجروں میں چپاتی گھی۔ گڑ۔ سبزی۔ ترکاری وغیرہ کتر کر رکھنی چاہیے۔ چونکہ چوہا چالاک جانور ہے اس لیے ہر رات کو پنجرے میں ادل بدل کر غذا رکھنی چاہیے اور پنجروں کو تھوڑا سا میٹھا تیل لگا کر ہمیشہ صاف کر کے رکھنے چاہئیں۔ ویسا لائیوں کے اوپر سے فاسفورس کو لے کر آٹے اور گڑ میں ملا کر گوندھ لینے سے زہر کی گویاں بنائی جاسکتی ہیں۔

بازاروں میں بھی کئی قسم کی گویاں چوہوں کو ہلاک کرنے کے لیے فروخت ہوتی ہیں۔ شام کے وقت یہ گویاں چوہوں کے بلور، اور سناج کی کوٹھیوں اور تمام ایسی جگہوں میں جہاں چوہوں کی آمد و رفت ہو رکھی جاتی ہیں۔ گویاں رکھنے میں یہ احتیاط کر لینا لازم ہے کہ ایسی جگہ پر نہ رکھی جائیں۔ جہاں کسی بچے کا ہاتھ پہنچ سکے۔ ان گویوں کو کھا کر چوہے ہلاک ہو جائیں گے اور باقی گھر سے بھاگ جائیں گے۔

بعض اشخاص یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ یہ گویاں کھا کر چوہے ہلاک کرنے سے یہ نقصان ہے کہ جو چوہے اپنے بلور میں جا کر مر جائیں گے اور ان کے جسم سے پتو اتر کر گھر کے لوگوں کو کاٹیں گے اور نیز بوجھ بھی پھیلے گی ان کے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ایسے چوہوں کے پتو انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے وہی پتو نقصان پہنچاتے ہیں جو طاعون زدہ چوہے کے جسم پر سے اتریں۔ بوکے پھیلنے کی روک تھام اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ تمام بلور کو اچھی طرح سے بند کر دیا جائے اور گھر میں مون ساگری آگ میں ڈال کر جلادی جائے۔ اس سے کمروں میں خوشبو پھیل جائے گی۔

نوٹ ۱: جس گھر میں طاعون زدہ چوہے مر گئے ہوں۔ اس گھر کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے اور کم از کم دس یوم تک اس میں ٹود و باش نہ رکھنی چاہیے اور نہ ہی وہاں جانا

۱۔ مون ساگری تمام شہروں میں کئی ایک پنساریوں کی دکانوں سے تیار شدہ مل سکتی ہے بہتر ہوگا کہ اس ساگری میں ایک دو آنے کے پیپتہ کے بیج کوٹ کر ملا دیے جائیں۔ پیپتہ کے بیج پنساریوں سے مل سکتے ہیں۔

چاہیے۔ خصوصاً رات کے وقت اُس گھر میں جانا نہایت خطرناک ہے۔ کیونکہ پتہ دین کی نسبت رات کے وقت زیادہ کاٹتے ہیں ایسے گھر میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ تمام پتہ مار دیے جائیں۔ گھر کے فرش پر آگ جلانے اور دہکتے ہوئے کوئلوں و انگاروں کو سارے فرش پر اور کونوں اور اطراف میں بچھا دینے سے پتہ مرجائے ہیں۔

بعد ازاں چوہوں کے سب بِل بند کر کے کمرے میں پانی یا فرش کرا دینا چاہیے۔ اور اگر فرش پہلے سے موجود ہو تو اُس کو اچھی طرح سے دھو دینا چاہیے۔ ایسا کرنے کے بعد ہی وہ گھر رہنے کے قابل ہو سکتا ہے۔

نوٹ ۱: چوہوں کے سوا بلی، خرگوش اور گلری کو بھی مرض پلگ ہو جاتا ہے۔  
نوٹ ۲: اگرچہ مرض پلگ ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ لیکن جوانوں کو بچوں اور بوڑھوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ غریب و مفلس لوگ جو کہ بالعموم گندے مکانات میں رہتے ہیں اور جن کو مناسب غذا بھی دستیاب نہیں ہوتی وہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

نوٹ ۳: ایک ہی شخص کو یہ مرض زندگی میں کئی بار ہو سکتا ہے ایک مرتبہ کی ہوئی ہوئی بیماری باقی ماندہ زندگی کے لیے مدافعتی قوت پیدا نہیں کر سکتی۔

## اقسام مرض

بمطابق مرض کی شدت و خفیف کے یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے :-

۱۔ طاعون خفیف

۲۔ طاعون شدید

طاعون شدید کی بمطابق علامات و عوارض پھر تین قسم میں ہیں :-

۱۔ پیو بونک پلگ (بگلی و طاعون)

۲۔ نیو مونک پلگ (فونیائی طاعون)

۳۔ سپٹی سی بک پلگ (عفونی طاعون)

طاعون خفیف ۱۔ اس طاعون کی وہاں طاعون کے شروع یا اخیر میں ہوا کرتی ہے اس

کی علامات بہت خفیف نہ ہوا کرتی ہیں۔ بغل یا کنچ ران میں خفیف سی گتلیاں اُبھر آتی ہیں اور بعض اوقات خفیف سا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن مریض کو کوئی خاص تکلیف نہ محسوس نہیں ہوتی اور اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ وہ مرض پیگ میں مبتلا ہے۔ چند یوم کے بعد وہ گتلیاں خود بخود بیٹھ جاتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں پیپ پڑ جاتی ہیں۔ لیکن اگر گتلیاں پیدا ہوتے ہیں تو روایتی میس اور کالی میس کی چند خوراکیں مریض کو استعمال کرانی جائیں تو گتلیاں بہت جلد رفع ہو جاتی ہیں اور ان میں پیپ پڑنے کا ڈر بھی نہیں رہتا۔ اس قسم کی پیگ کبھی مہلک نہیں ہوتی۔

اس مرض کا تملہ یکایک ہوتا ہے۔ چنانچہ جاڑا لک کر تیز بخار چڑھ طاعون شدید ہوتا ہے۔ جس کی حرارت ۱۰۴ یا ۱۰۵ درجہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ۱۰۶ یا ۱۰۷ درجہ تک ہو جاتی ہے۔ شدید سرور ہوتا ہے اور سخت بے چینی ہوتی ہے۔ اگر بخار بہت شدید ہو۔ یعنی اس کی حرارت ۱۰۵ درجہ سے زیادہ ہو تو ہڈیاں یا بے ہوشی ہو جاتی ہے جو کہ خراب علامت ہے۔ پیاس کی شدت ہوتی ہے۔ بھوک ماری جاتی ہے۔ نبض بہت تیز چلتی ہے۔ آنکھوں میں خماری ہوتی ہے اور مریض کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ کسی سخت مرض میں مبتلا ہے کبھی تو بیمار کے ساتھ ہی اور کبھی دو چار روز بعد بغل۔ گردن یا جھگاسہ کے غدود متورم ہو کر بڑیں نکل آتی ہیں۔ جو میں بڑا سخت درد اور جلن ہوتی ہے۔ شروع مرض میں بخار تیز ہوتا ہے۔ لیکن جب بڑیں نکل آتی ہیں۔ تو بے رگھٹ جانا ہے۔ مگر بعد پھر بخار تیز ہو کر قائم رہتا ہے۔ کمزوری غایت درجہ کی ہو جاتی ہے۔ اور مریض کے چہرے پر مرمی چھا جاتی ہے۔ کبھی اک منہ یا متعدد سے خون جاری ہو جاتا ہے اور کبھی جلد کے زیریں جریان خون ہو کر کالے کالے داغ پڑ جاتے ہیں اور اگر یہ سیاہ داغ کثرت ہوں تو جلد کی رنگت سیاہ معلوم ہوتی ہے۔

دنپونک پیگ (اس قسم کی پیگ نہایت ہی مہلک اور نہایت نمونیاتی طاعون ہی چھوٹ وار ہوتی ہے۔ اس کی چھوٹ بذریعہ نفس مریض سے تندرست کو لگ جاتی ہے اور نہ برہمیچھوٹوں میں سرایت کر جاتا ہے اور طاعون نمونیا ہو جاتا ہے۔ بخار شدید ہوتا ہے اور بے چینی بہت ہوتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے

اول اول خشک کھانسی آتی ہے۔ پھر بغصہ خارج ہونے لگتی ہے اور بعد ازاں بلغم کے ہمراہ خون بھی بلا ہوا آتا ہے۔ جس میں پلیگ کے جراثیم لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں سینہ میں درد ہوتا ہے اور سانس بڑی تکلیف سے آتا ہے اور مریض سخت تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور آخر کار کمال کا ضعف ہو کر مریض انتقال کر جاتا ہے۔ نمونیا کی پلیگ نہایت ہی مہلک مرض ہے۔

نمونیا کی پلیگ کی چھوت ایک مریض سے بذریعہ تنفس تندرست اشخاص کو لگ جاتی ہے۔ لیکن کھٹی دار طاعون کی چھوت مریض سے تندرست اشخاص کو نہیں لگتی جب تک طاعونی چوہے کے پتوانہ من کو نہ کاٹیں۔ یہ طاعون جینہ ہوتی عفونی طاعون (سپی سی مک پلیگ) اس قسم کی پلیگ ہیں مرض کی سمیت محدود یا کسی خاص حصہ جسم تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ سارے خون میں سرایت کر جاتی ہے اس قسم کی طاعون نہایت مہلک ہوتی ہے۔ اس میں بے چینی۔ بے خوابی۔ درد ہڈیاں اور بے ہوشی بہت ہی شدید ہوتی ہے۔ ضعف قلب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دست اور قیئیں آتی ہیں۔ جلد جسم کی زیریں جریان خون ہو جاتا ہے اس مرض کا مریض عموماً چوبیس یا پچیس گھنٹوں کے اندر اندر انتقال کر جاتا ہے۔

## حفظ ماقدم

انگیشیا اور بیوبائی نم دو خاص ادویات ہیں جو کہ پلیگ کی روک تھام کے لیے بہت استعمال ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر سرکار ایم۔ ڈی انگیشیا کے بڑے مذاج تھے اور بہت سے ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ اگر انگیشیا نمبر ۱ یا ۳ کے تین قطرے صبح کے وقت نصف انس تازہ پانی میں ڈال کر پی لیے جاویں۔ اور ہفتہ میں دو مرتبہ بیوبائی نم نمبر ۳ کے دو قطرے بھی فی خوراک کے حساب سے استعمال کر لیے جائیں تو اس مؤذی مرض سے بچاؤ رہتا ہے۔ بیوبائی نم دوائی کے استعمال سے وہی مطلب حل ہوتا ہے جو کہ پلیگ کا ٹیکہ لگوانے سے ہوتا ہے بلکہ ایک صورت میں یہ ٹیکہ سے افضل مانی گئی ہے کیونکہ ٹیکہ لگوانے سے بخار اور بعض اشخاص میں دیگر امراض کے جاگ اٹھنے کا ڈر ہوتا ہے لیکن بیوبائی نم دوائی کے استعمال کرنے سے مندرجہ بالا تکالیف سے بچاؤ رہتا ہے۔ انگیشیا



کے بیج (پیتے) چسائیوں سے مل سکتے ہیں۔ بیج کو بازو میں باندھنا بھی مفید ہوتا ہے۔

## علاج

اس موذی مرض میں ہو میو پیٹیک علاج کو خاص فوقیت و برتری حاصل ہے۔ اگر ہر موقعہ علاج کرایا جاوے تو بڑی کامیابی ہوتی ہے۔

اگنیشیا - یہ اس مرض میں ایک خاص دوائی مانی گئی ہے۔ جب مرض کا شک ہو تو

یہ دوائی استعمال کرنی شروع کر دینی چاہیے۔ مریض کے حواس باختہ ہونے ہیں۔

اور وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بڑھتا ہے۔ گویا کہ کوئی شیل چیز پیے ہوئے

ہے۔ دل کی ہر ایک دھڑکن کے ساتھ سخت سر درد۔ متلی اور تھوہ۔ مریض

کو سخت آبکائیاں آتی ہیں۔ پیگ کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔

ڈاکٹر سرکار فرماتے ہیں کہ اگنیشیا x بطور حفظہ مقدم کے بھی کام آ سکتی ہے۔

اس کو بیماری سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور نیز اگنیشیا (پیتے) کے

دانے بازو یا گردن میں بھی باندھتے ہیں۔

بہ خورال: درٹنکچر یا x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائٹ: بخار کی تیزی۔ شدت پیاس۔ تمام حرکات میں منتخب۔ گھبراہٹ کا

انہار۔ موت کا ڈر۔ کوئی چیز یاد نہ رہے۔ سر میں درد اور پسینہ۔ چہرہ

زرد اور اندوگین۔ چہرے سے خوف کے علامات آشکارا ہوں۔ زبانی اور ہونٹ

سوجے ہوئے۔ احساس ہو کہ زبان اتنی بڑی ہوئی ہے کہ منہ میں نہیں سما

سکتی۔

زبان کی رنگت سفید یا پسلی۔ موٹی اور سرد۔ گلا اور منہ خشک۔ زبان۔ منہ

اور ہونٹ سرد۔ بیمار منہ سے اچھی طرح سے تلفظ نہ نکال سکتا ہو اور اس کی

آواز بخوبی نہ سنائی دیتی ہو۔

کھلی ہوا میں چلنے پھرنے سے متلی آوے۔ بیمار جبکہ کچھ پیوے۔ تو اس کو اباق

آویں اور شدت پیاں ہو۔ تے کردہ مادہ کی رنگت سبز ہو اور دست بھی ساتھ ہوں۔ اور اُن کی رنگت بھی سبز ہو تے میں پہلے خوراک نکلے پھر جھاگ آوے اور ساتھ ہی ہونٹوں مکہ حلق اور معدہ میں جلن شروع ہو جائے۔ معدہ سے لے کر مکہ تک خوراک کی تمام نالی میں جلن ہو۔ اسہال پانی پانی آویں۔ اور اسہالوں کی رنگت سفید اور پشیاب کی رنگت سرخ ہو۔ سانس بدقت گرم اور بدبودار آوے اور سینہ پر بوجھ محسوس ہو۔

دل کی دھڑکن تیز ہو اور نبض بھری ہوئی اور تیز ہو۔ تھوڑا سا ہٹنے جھلنے سے بھی ٹنڈک محسوس ہو۔ شام کے وقت مرض میں زیادتی ہوتی ہو اور سر اور چہرے میں گرمی معلوم ہو۔ رخسارے سرخ اور ایسا سرور و گویا کہ دماغ کھوپری سے باہر نکل جائے گا۔ شدت پیاں ہو۔ بخار تیز ہو جلد جسم خشک ہو یا سرد پسینہ (تریلی) سے تذبذب ہو۔

✽ خوراک : ۱۔ اہر نیدرہ یا میں منٹ کے بعد۔  
بیلہ ڈونا : سرگرم چہرہ سرخ۔ شکل وحشیانہ۔ ٹکٹکی بندھی ہوئی۔ نبض باریک اور تیز۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ سر اور گردن کی شریانوں کی تڑپ بخوبی نظر آوے وحشیانہ حرکات۔ کبھی بیمار منہس دیوے اور کبھی دانت پیسے۔ ہڈیاں سخت ہو اور یہ ہڈیاں کبھی تو دورے کے ساتھ ہو اور کبھی مسلسل ہو۔ بیمار کبھی تو خوش و غم معلوم ہو اور کبھی تندر۔ ہڈیاں کی حالت میں کبھی تو بیمار بستر پر سے اٹھ کر باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہو اور کبھی بستر کے کپڑے اکٹھے کر کے اُن کو چار پانی سے پرے پھینک دیتا ہو۔

سکتہ کی سی حالت ہو۔ بیمار چپ چاپ پڑا رہے اور اس کا کوئی عضو حرکت نہ کرتا ہو۔ مخمور ہو۔ مانو کہ نشہ پیئے ہوئے ہو۔ سر میں چکڑ گویا کہ ہر ایک چیز دائرہ میں سر کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور ساتھ ہی اُبکائیاں۔ تشویش اور غشی بھی موجود ہوں۔ خون کا جوش سر کی جانب ہو اور شریانوں کی تڑپ دماغ میں محسوس ہوتی

ہو۔ شدید سرور و گویا کہ کوئی شخص تیز چاقو کے ساتھ ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک چھید رہا ہے۔ آنکھیں سوجھی ہوئیں۔ ڈراؤنی وحشیانہ اور باہرنگلی ہوئی ہوں۔ آنکھوں میں سخت جلن ہو۔ روشنی اور شور برداشت نہ ہو سکتے ہوں۔

زبان اور گلا خشک اور سرخ ہوں۔ پیاس بھی ساتھ ہو۔ یسکن نگنا شکل ہو۔ زبان کانپتی ہوئی اور اس پر سفید پسی یا خاکستری سخت فرجی ہوئی ہو۔ بعض اوقات منہ سے سخت گاڑھی رالیں لڑیوں میں ٹپکتی ہوں۔ بات منہ سے نہ نکل سکتی ہو۔ اگر نکلتی بھی ہو تو صاف بات نہ نکلتی ہو بعض اوقات بولنے اور ننگنے کی طاقتیں نائل ہو کر بیمار بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہتا ہے۔ گلے کے غدود متورم اور سوجھے ہوئے ہوں۔ نگنا شکل اور تکلیف دہ ہو۔ ٹھوس غذا کا نگنا نہایت ہی مشکل ہو۔ کان کے نیچے کے غدود میں گولی مارنے کا سادہ ہو جو کہ بیرونی کان تک جاتا ہو۔ کئی اشتہا ہو اور ہر ایک قسم کی خوراک سے نفرت ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے کی بہت خواہش ہو یسکن چونکہ بیمار کے لیے نگنا شکل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی پیاس کو نہ بھاسکتا ہو۔ کھانے اور پینے کے بعد بیمار تھکے ہوئے ہوتا ہو۔ اور تھکے آتے وقت پسینہ سے تر ہوتا ہو۔ معدہ میں جلن اور درد ہو اور چھوٹے سے درد کرتا ہو۔ شکم میں گرمی ہو۔ اور سخت درد کرتا ہو۔ بائیں طرف کے جنگاسہ میں گولی مارنے کا سادہ ہو اور غدود جنگاسہ میں کمال کا درد ہو۔ بائیں طرف کے جنگاسہ میں ایسا معلوم ہو۔ جیسا کہ کسی سخت چیز نے اوپر سے دبایا ہوا ہے۔

اسہال چھوٹے چھوٹے آتے ہوں اور جلدی میں خود بخود نکل جاتے ہوں رنگت پسیلی یا سبز ہو۔ یا پیشاب اور پاخانہ بند ہو اور بیمار پسینہ سے تر ہوتا ہو۔ آواز بھدی اور بھاری ہو۔ کھانسی کا دورہ دس بجے رات کو زیادہ ہوتا ہو۔ سانس تھوڑی تکلیف سے اور گرم آتا ہو۔ نبض بھری ہوئی اور تیز چلتی ہو۔ گردن کے غدود متورم ہوں اور ان میں جلن ہو۔

سونے کی طرف رغبت زیادہ ہو۔ اگر نائیاں بہت آتی ہوں اونگھ زیادہ ہو

نیند نہ آتی ہو۔ مریض بڑا پٹا چونکنا اٹھتا ہو۔ پہلی رات کو بے چینی زیادہ ہو اور تشویشناک اور خوفناک آوازیں آتی ہوں۔ اقل نیم شب میں بخار کا زور زیادہ ہو۔ پیاس کی زیادتی اور گھبراہٹ ہو اور پسینہ کی طرف طبیعت کا رجحان ہو۔

✽ خوراک : نمبر ۱ یا ۲ ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

پیسٹی آگ : گٹھیوں کے نمودار ہونے کی صورت میں یہ دوائی اندرونی چاہیے۔ نیز کسی نرم برش سے اس دوائی مدد شکنچہ روزانہ تین یا چار مرتبہ دہن میں گٹھی کے اوپر بھی لگانی چاہیے۔

✽ خوراک : نمبر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کوہرا یا ناجہ : یہ دوائی کوہرا سانپ کے زہر سے تیار کی جاتی ہے اور اس مرض میں اس دوائی کو خاص قوتیت اور بدتری حاصل ہے۔ اس دوائی کا اثر خون کی نسبت نظام عصبی پر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دوائی اس وقت شروع کرنی چاہیے جبکہ نقاہت کمال درجہ کی مرض کے آغاز میں ہی ہو جاوے اور دل کی حرکت کے بند ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاوے۔ سر درد سخت ہو اور ہلنے جلنے سے درد میں زیادتی ہو۔ کھلی ہوا میں سر کو قدرے آرام ہوا دتبا کو پیئے۔ یا پیشاب کے رننے سے طبیعت کو قدرے آرام معلوم ہو۔ دل کی دھڑکن کے ساتھ پیشانی میں سخت درد ہو۔ یوں تو سر درد تمام دن ہوتا رہتا ہو لیکن بعد دوپہر اس کی شدت کمال درجہ تک پہنچ جاتی ہو۔ بیمار کے دل و جان نہایت کمزور اور گرتے جا رہے ہوں۔ آنکھوں کے اوپر سخت درد ہو۔ اور منہ خشک ہو۔ بیمار غشی میں آہستہ آہستہ کچھ بڑھتا ہو۔ بیمار کو یہ معلوم نہ ہو۔ کہ اس کے ارد گرد کیا گزر رہا ہے۔ چہرہ کی رنگت زرد اور ڈراؤنی ہو اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے ہوں۔ منہ اور زبان بڑے خشک ہوں۔ لیکن پیاس نہ ہو۔ غشیات کی خواہش بہت ہو۔ لیکن نیت سے اس کی تکالیف میں امانتہ ہوتا ہو۔ دل کی آہٹ بخوبی سنائی دیتی ہو۔ نبض تیز ہو۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

لیکن بے قاعدہ چلتی ہو۔

✽ خوراک : ۳۰۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کروٹیسس : جب مرض پورے زور پر ترقی یافتہ ہو چکا ہو۔ اور جریان خون کا خطرہ لاحق ہو گیا ہو۔ یا بالفاظ دیگر مرض کی خراب ترین حالت میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ اس دوائی کا تمام عروقی و نظام عصبی اور دیگر ہر قسم کے نظام پر اثر ہوتا ہے۔ مریض سخت بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہو۔ ضعف و تقاہت حد درجہ کمال ہوں۔ سر میں چکر شدید درد۔ خاص کر پیشانی۔ پوتوں۔ اور کنپٹیوں میں ہوتا ہو۔ چہرہ پر مرونی زرد آنکھیں تارے لگی ہوئیں اور نیم کشادہ ابکائیاں اور صفراوی تھے، زبان بہت سوچی ہوئی اور اتنی بڑی کہ منہ میں نہ آ سکتی ہو۔ پیاس زیادہ ہو۔ بے چینی اور تشویش بہت ہو اور تمام جسم میں جلن ہو۔

گلا بیٹھا ہوا ہو۔ کھانسی خشک اور تھوک خون آمیز آتی ہو۔ حنجرہ۔ خوراک کی نالی ہوا کی نالی اور پیپٹروں میں اجتماع خون ہو اور سوزش ہو۔ وٹ کی دھڑکن نہایت زیادہ ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ دل گرجا رہا ہے۔ ہاتھ کی تھیلیوں میں جلن اور خارش ہو اور تمام جسم میں آگ لگی ہوئی ہو۔ بخار تیز اور جلد خشک۔ زبان سوکھی ہوئی اور پیاس زیادہ ہو۔ نبض نہایت کمزور اور تیز چلتی ہو۔ سانس تیز اور تنگی سے آتا ہو۔ باوجود اس کے کہ بیمار سردی محسوس کرتا ہو جسم ٹھنڈا اور سرد پسینہ سے تر ہوتا ہو۔

انٹریوں۔ سوڑھوں پیپٹروں غرضیکہ جسم کے ہر ایک حصہ سے خون جاری ہو۔ گردن کے غدود متورم سو جے ہوئے ہوں۔

✽ خوراک : ۳۰۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

لاکس : عفونی طاعون میں یہ دوائی بڑی مفید ہوتی ہے۔ علامات حسب ذیل ہیں:-

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

بے ہوشی ہو اور بے ہوشی کے ہمراہ قے اور دست آتے ہیں۔ اعضاء کی حرکات بے قاعدہ ہوں اور مریض ٹھنڈے پینہ سے تر تہر ہو۔ نبض کمزور و رست اور تقریباً گم ہو۔ جب پاؤں سرد ہوں تو بے ہوشی طاری ہو اور جو ہنی کہ پاؤں گرم ہوں۔ بے ہوشی جاتی رہے۔ سرمانند شرابی کے چکراتا ہو۔ آنکھوں کے اوپر اور ناک کی بڑ میں درد۔ نیز کن پٹیوں اور سر کے پچھلے حصہ میں درد بینائی و منہ زلی اور آنکھوں کے آگے کبر۔ کانوں میں گھنٹی بجنے اور کیڑوں کیے جھنجھنے کی سی آواز سنائی دیتی ہو۔ ناک سے خون جاری ہو۔ چہرے پر مردنی اور بے ہوشی ہو اور منہ جھلسا ہوا اور خشک ہو۔ زبان سوجی ہوئی ہو۔ جلد خشک اور پیاس متواتر لگی رہتی ہو۔ آبکایاں قے اور پیاس عموماً قبض سے کچھ اوقات دست یا کبھی قبض یا کبھی دست پاخانہ کی بونا قابل برداشت ہو۔ خجھرہ اور گلا چھوٹے سے درد کرتے ہوں ایسا محسوس ہو کہ گلا اندر سے سو جا ہوا ہے اور بند ہو رہا ہے۔ نیند کے بعد کھانسی میں زیادتی ہو۔ بیمار ہمیشہ گہرا سانس لینے پر مجبور ہو۔ تنگی تنفس ہو۔ اونگھ آوے لیکن مریض پور ڈانید کرنے کے ناقابل ہو۔ لگاتار بے خوابی ہو اور ساتھ ہی نفاہت ہو۔ بے آرام نیند ہو۔ مریض ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہو۔ گڑ گڑاتا ہو اور بڑ بڑاتا ہو۔ عشیقہ خواہیں آتی ہوں۔ لہزہ کے ساتھ دانت یکے اوپر دانت بجتے ہوں۔ اور شام کو ایسا معلوم ہو کہ اختیاری عضلات تشنج ہو کر اینٹھ گئے ہیں۔ حرارت کے دوران میں بھی کپکپ ہٹے جاری رہے۔ پاؤں ٹخنوں اور پندھوں بلکہ گھٹنوں تک برف کی مانند سرد ہوں۔ ہر شام کو بخار تیز ہو اور ساتھ ہی بخوک ماری جاوے اور سرد ہو۔ اندرون کپکپ ہٹ ہو اور بیرون حرارت ہو۔ ہاتھوں کی تمچیلیاں۔ پاؤں کے تلوے اور شکم شام کو بہت گرم ہو۔ مریض کپڑا اور دھنا بندہ قمیض تک کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ گلا ایسا دکھے کہ اس کے ساتھ کپڑے تک کا چھونا ناقابل برداشت ہو۔

خوراٹ : ۱۲ یا ۲۰ برتن گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : نمونیا پیگ میں یہ ایک مفید دوائی ہے۔ ہڈیاں بے ہوشی میں مریض کو اس کرتا ہو۔ بے چائی بہت ہو اور ننگ دھڑنگ باہر بھاگنے کی کوشش کرتا ہو۔ دورانِ سر ہو۔ بستر پر سے اٹھتے وقت چکر زیادہ آتے ہوں۔ آنکھوں کے گرد نیلیوں جلتے پڑ گئے ہوں۔ اور سوج پڑ گئی ہو۔ آنکھوں میں درم ہو اور ساتھ ہی خارش اور جلن ہو۔ بینائی دھندلی پڑ گئی ہو۔

کانوں سے خالص خون نکلتا ہو۔ طاقت شنوائی کم ہو گئی ہو۔ بلکہ جاتی رہی ہو کانوں میں شور و غل بھنبھناہٹ اور گھنٹی بجنے کی سی آوازیں سنائی دیتی ہوں۔ نکیر چھوٹتی ہو۔ یا ناک سے خون آمیز مواد خارج ہوتا ہو۔ مسوڑھوں سے خون نکلتا ہو۔ زبان سوجی ہوئی خشک اور سیاہی مائل ہو یا اس پر سفید یا زرد فرجی ہوئی ہو۔ ذائقہ کڑوا یا کسلا۔ بونا مشکل ہو۔ آواز کمزور ہو۔ مریض سوال کا جواب مشکل سے دے سکتا ہو اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا۔ بھوک یا تو بہت زیادہ ہو یا بالکل ہی ماری گئی ہو۔ نہ بچھنے والی پیاس اور مریض ترشبات اور رسد راشیاد کی بہت خواہش کرتا ہو۔

اکثر اوقات چپکی اور خالی ڈکار آتے ہوں۔ جی متلاتا ہو۔ لیکن پانی پینے سے جھٹ آرام آ جاتا ہو۔ اُبکائیاں بہت آتی ہوں اور کھایا پیا مریض تے کر چھوڑتا ہو۔ قے میں صفرا سیاہ کڑوا مادہ جس میں کم و بیش خون کی آمیزش ہو یا سیاہ مادہ خارج ہوتا ہو۔

معدہ بہت پر ہو۔ معدہ میں جلن ہو۔ معدہ میں سخت درد ہوتا ہو اور آہستہ آہستہ تمام پیٹ میں پھیل جاتا ہو۔ قہیں آتی ہوں۔ پہلے سبز بعد میں سیاہ مادہ قیوں میں خارج ہوتا ہو۔

جگر بڑھ گیا ہو۔ شکم تنابھا ہو۔ سپیوں کے نیچے ہوا بھرتی ہو اور سینہ بوجھل ہو۔ شکم میں ہوا با آواز بلند گڑ گڑاتی ہو۔ اور بار بار ہوا خارج ہوتی ہو۔ شکم میں درد ہو۔ نیز درد قولنج ہوتا ہو۔ کنج ران کے غدد متورم ہو گئے ہوں بائیں جگہ سے میں دُکھن کا درد ہو۔ اسہال آبی و خونی آتے ہوں اور بعض اوقات بے اختیار نکل جاتے ہوں۔ پاخانے کے ساتھ خالص خون خارج ہوتا ہو۔ یا قبض ہو۔

ابتداء میں پاخانہ سخت نکلتا ہو۔

پیشاب خونی اور پیماز البیومن خارج ہوتا ہو۔ یا گدلا اور بہت رنگین آتا ہو۔ اور اس پر بال سے آتے ہوں یا سرخ رنگ تہ نشین ہوتی ہو۔ کوتاہ دمى اور کھانسی کے ساتھ پیپ وار یا خون آمیز بلغم خارج ہوتی ہو۔ پھیپھڑوں سے جریان خون ہو۔ تشویش کے ہمراہ دل کی دھڑکن بہت تیز ہوتی ہو اور کھانا کھانے کے بعد دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہو۔ دل نہایت کمزور ہو۔ بغیر بہت چھوٹی اور اکثر بے معلوم ہلتی ہو۔ بخار عموماً سہ پہر یا شام کو ہوتا ہو۔ پہلے بہت لہزدہ ہوتا ہو۔ اور اس کے بعد حرارت ہمراہ پیاس کہ ہو جاتی ہو۔ اور اندرون میں سردی معلوم ہوتی ہو۔ اور جب سردی محسوس ہونی بند ہو جاتی ہو تو تمام رات حرارت رہتی ہو اور پسینہ آتا ہو۔

فاسفورس کے بخار اکثر تپ محرقہ کی صورت اختیار کرتے ہیں اور ساتھ ہی نمونہ اور براؤنکائیٹس کے عوارضات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔

فاسفورس کی یہ خاص علامت ہے کہ مریض ہمیشہ دائیں پہلو کے بل لیٹا رہتا ہے۔ بائیں پہلو کے بل لیٹنے سے اس کو تکلیف معلوم دیتی ہے۔

✽ خوراک : ۶۰ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیپ ٹیشیا۔ محرقی طاہون کے لیے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ تمام جسم میں کمزوری و کاہلی کا احساس خاص کر نچلے دھڑ میں کمزور گھٹنے اور دوران سر کمال ثقاہت کا احساس اور ساتھ ہی گرمی کی لہریں۔ نپسلی کمرے اٹھ کر تمام اطراف کو پھیلتی ہوں۔ متفکر موت کا یقین۔ لگاتار زہم ہڈیاں۔ مریض ایسا خیال کرتا ہو کہ اس کا سر تمام بستر پر بکھرا ہوا ہے۔ اور ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تمام بستر کو ٹوٹتا ہو۔ سوال کا جواب دیتے وقت مریض سو جاتا ہو۔ دماغ میں بیچینی لیکن حرکت کرنے سے معذور ہو۔ شکل ایسی گویا کہ زہم میں غمزدہ ہے۔ دانتوں پر میل جمی ہوئی منہ میں چھالے اور سانس بدبودار زبان سفید خشک درمیان میں

✽ خوراک : دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵



زرد یا خشک سیاہی مائل سرخ چمکیلی - پھٹی ہوئی یا خشک - درمیان میں  
بھوری - بلکہ کنارے صاف اور سرخ -

منہ خشک - پیاس زیادہ جو سیال شے منہ میں ڈالی جاوے - مریض باہر نکال  
چھوڑے - لعاب دہن بکثرت اور کسی قدر لیس وار - منہ کا ذائقہ کڑوا اور  
بد مزہ ہو - غدود گلوں میں اجتماع خون ہو -

بھوک نمارد، جی متلائے اور ایسا محسوس ہو کہ قلیں آنے سے آرام ہو جائے  
گا - معدہ گرتا اور ڈوبتا جائے - ڈکار بکثرت آئیں - پانی کی لگاتار خواہش  
ہو - معدہ اور کلیجہ میں لگاتار درد ہو - خاص کر تپہ کے مقام پر شکم تناسل  
امعاء میں گڑ گڑ ہوتی ہو - بائیں جنگا سہ کے غدود متورم ہوں - دائیں جنگا سہ  
میں ہی دھیمی کچھاوٹ ہو -

پاخانہ نہایت بدبودار پیشاب سیاہی مائل سرخ بدبودار بہا ر خفیف و کم  
سانس تکلیف سے آتا ہو - دل کی دھڑکن بخوبی سنائی دیتی ہو - نبض یا تو تیز  
ہو یا سست لیکن بھری ہوئی - مدہوشی ہو اور آنکھیں نیم کشادہ ہوں یا ات  
کے پچھلے صحتہ میں بے خوابی رہے - خوفناک خوابوں کے ساتھ بے آرام  
رات گزرے - تمام جسم پر جلن کا احساس ہو اور بعد میں پسینہ قے اور سہل  
آویں - تمام جسم میں گرمی اور خشکی محسوس ہو اور سردی کبھی مکر کے اوپر دوڑے  
کبھی نیچے - گویا کہ تپ لہزہ کی آمد ہے -

✽ خوراک: ۵ یا ۱۰ یا ۲۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

آر سیٹیکیم - شدید نڈیان - خاص کر بوقت شب بعد بڑی بے چینی موت کا خوف  
خصوصاً جب کہ مریض اکیلا ہو - مایوسی بے ہوشی اور ساتھ ہی ہلکے خشک بندھن  
سروزی سا ہو - پلٹے پھرتے وقت دوران سر ہو - گویا کہ مریض دائیں طرف  
کو گرا چاہتا ہے - سروزی کھلی ہوا میں جانے سے آرام ہو - لیکن مکرے  
میں داخل ہونے سے سر پھر وزنی ہو جاوے - سرد و شدید ہوروشنی اور

شور سے سر درد میں اضافہ ہو حرکت کرتے وقت ایسا احساس ہو گویا کہ دماغ حرکت کر رہا ہے اور کھوپڑی کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔

صورت و حسیات ٹکٹکی بندھی ہوئی اور آنکھوں کے گرد نیلگوں حلقے روئی  
ناقابل برداشت ہو اور مریض آنکھیں بند کرنے کے لیے مجبور ہو چہرے کا رنگ  
مردنی زرد ہو اور ہونٹ نیلے کالے ہوں۔ سوڑھے سوچے ہوئے ہوں۔ اور  
اُن میں سے خون نکلتا ہو۔ زبان سوچی ہوئی۔ سفید زردی مائل بھوری یا ماند  
آتش سرخ ہو اور خشک ہو۔ منہ اور زبان خشک ہوں مکہ میں چھالے ہوں۔  
ذائقہ نکلین کبلا۔ کڑوا یا سڑاند دار ہو۔ تنجرہ اور معدہ جلتے ہوں۔ حلق  
اور خوراک کی نالی کی حالت مضبوط ہو۔ روئی مشکل سے نیچے اترتی ہو۔ مریض  
کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ قہر گڑ گڑا ہٹ اور شور کے ساتھ معدہ میں گرتا ہوا  
کسانی سے رہا ہو۔ ہر قسم کی غذا سے نفرت ہو۔ ناقابل تسکین پیاس ہو۔  
بہت دیر تک جی متلاتا رہتا ہو۔ اور ساتھ ہی غشی ہو۔ ہر مرتبہ پینے کے  
بعد مریض کھایا پیا صفراوی مادہ یا پت۔ یا بلغم یا خون قے کمر چھوڑتا ہو۔ آکلات  
انہضام میں شدت کی گرمی اور جلن ہو۔ مانند ہیضہ کے معدہ میں کڑیل  
پڑتے ہوں۔

کھانا کھانے کے بعد معدہ میں بوجھ معلوم ہو گویا کہ پتھر رکھا ہوا۔ شراب نامرغوب  
ہو۔ شکم تنا ہوا ہو۔ اور درد کرتا ہو۔ شکم میں جلن اور گرمی ہو۔  
جنگاسہ میں جلن چھین اور کچھاوٹ کی دریں ہوتی ہوئی۔ جنگاسہ کے غدود  
میں جلن ہوتی ہو۔ اسہال شدید ہوں۔ گدے دار آبی زرد یا سیاہی مائل  
سبز یا سیاہ۔ یا بدبو دار بے تحاشہ نکل جاتے ہوں۔ اسہال جلتے ہوں مانند  
پیمپش کے مروٹا اور جلن کے ساتھ آتے ہوں۔ پیشاب تھوٹا جلتا ہوا اور بے  
اختیار نکل جاتا ہو۔ خونی پیشاب آتا ہو۔ پیشاب رک رک کرتا ہو۔ یا جلن بول  
کا عارضہ ہو۔

مریض جس حالت میں بھی پڑا ہو۔ یا لیٹا ہو سانس چھوٹا چھوٹا اور کھنچ کر آتا ہو۔  
شب کو کھانسی ہو۔ لیٹنے کے بعد یا کھلی ٹھنڈی ہوا میں جانے پر یا کچھ پینے سے

کھانسی شروع ہو جاتی ہو۔

خشک کھانسی لگاتار آتی ہو۔ خاص کر نیم شب کے بعد بغم موٹی زرد یا سبز گڑوی یا نمکین جھاگ دار اور خون کی آلائشیں ہونے لگتی ہو۔ مریض خون تھوکتا ہو۔ دل بے قرار ہو۔ دل کی دھڑکن سخت ہو۔ دکھائی پڑتی ہو اور سمانی دیتی ہو۔ خاص کر بوقت شب ہر پاخانہ کے بعد دل دھڑکن اور کمزوری زیادہ ہوتی ہو مریض چھوٹی تیز بے قاعدہ اور اتنی مدہم ہو کہ معلوم بھی نہ پڑتی ہو۔

دوبلا پن ہو۔ چہرہ اور ٹانگیں پھول ہوئی ہوں اور استسقاء ہو۔ نقابت لگاتار مسلسل بڑھ رہی ہو۔

بے خوابی ہو ساتھ ہی بے چینی ہو۔ مریض ادھر ادھر پاؤں مارتا ہو اور بڑبڑاتا ہو۔ خاص کر نیم شب کے بعد اندوہ گیں۔ خوفناک اور تشویشناک خوابیں آتی ہوں۔ کپکپاہٹ ہو خاص کر کھلی ہوا میں بدوں پیاس سے ماتھا اور تپہ گرم اور ہاتھ ٹھنڈے ہوں اندرونی سردی اور بیرونی گرمی ہو اور رنسا رے سر ہوں بخار اور پیاس شدید ہوں۔ بخار رات کے وقت دوبجے شروع ہو۔ تمام جسم میں گرمی بڑھ رہی ہو۔ چہرہ اور پاؤں پر پسینہ آتا ہو۔ شکم کے پہلوؤں اور آلات انہضام میں تناوٹ ہو جس سے درد پیدا ہو۔ نیم شب کے بعد جسم کے اندرون میں جلن اور حرارت بڑھ جاتی ہو۔ ساتھ ہی تشویش بھی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور مریض کپڑا اتار دیتا ہو۔ تمام شب حرارت اور بے چینی رہتی ہو یا بدوں پیاس اور پسینہ کے تمام رات حرارت رہی ہو چکنا۔ سرد پسینہ (تریلی) آتا ہو۔ تمام جسم پر بدبودار پسینہ آتا ہو۔ پسینہ کے ہوا پیاس بہت لگتی ہو۔

✽ خوراک : ۳ یا ۲۰۔ ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

اوپر کیولائین : یہ بھی پلیگ کی اعلیٰ دوائی ہے۔ ہڈیاں ہو اور ساتھ ہی بے چینی بہت ہو۔ بستر پر سے اٹھ کر دوڑنے کی خواہش ہو۔ مریض کجواس کرتا ہو اور درد کے باعث غشی ہو جاتی ہو۔

✽ خورال: مدرٹسکچر (۵) کے تین قطرے ہر ایک یادو گھنٹہ کے بعد۔  
 فیرم فاس: نمبر ۳۷ بخار اور درد سردیہ کے لیے اور کالی میوز نمبر ۳۷ گٹلی کے لیے اور کالی فاس نقاہت۔ ہڈیاں اور اعصابی کمزوری کے لیے نہایت مفید ادویات ہیں۔ اگر ان تینوں ادویات کو باری باری سے دیا جائے تو بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ادویات جلدی جلدی دینی چاہئیں اور کئی خوراکیں دینی چاہئیں۔ اسی کی ٹپس پر تھوڑی سی کالی میوز نمبر ۳۷ پھر تک کر گٹلی کے اوپر دن میں تین چار مرتبہ باندھنی چاہیے۔  
 مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ رسٹاکس۔ مرکیورس۔ ہائیڈو سائیکس۔ سٹرا مونیم۔ اپی کاک۔ ایفٹم ٹارٹ۔ ہیرسلف اور سلیشیا وغیرہ ادویات بھی اپنے اپنے علامات کے ساتھ کام آتی ہے۔

## ضروری ہدایات

جب گھر میں کسی رشتہ دار کو طاعون ہو جائے تو اس کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ جانا سخت گناہ ہے بلکہ اگر اس کا باقاعدہ علاج کر دیا جائے تو اس کے بچنے کی بڑی بھاری توقع ہو سکتی ہے۔

بہت سے لوگ جنہیں پیگ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مرتے ہیں کہ ان کو اندھیری اور تنگ دھاریک کو ٹھڑیوں میں رکھا جاتا ہے اور اچھی طرح سے ان کا علاج نہیں کر دیا جاتا۔ طاعون کے مریض کو باہر کھلی ہوا میں چھت کے اوپر یا صحن میں چار پانی پر لٹانا چاہیے۔ روشنی اور تازہ ہوا اس کی جان بچانے میں مدد دیتی ہیں۔ اور اندھیرا مریض کو مار ڈالنے میں معلول ہوتا ہے۔ جب مریض باہر کھلی ہوا میں ہو تو اس کی تیمارداری کرنے والوں کے واسطے کچھ ڈرنہیں ہوتا۔ طاعون زدہ مریضوں کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ آرام سے چار پانی پر لیٹے رہیں اور اُسٹھنے بیٹھنے یا ہلنے چلنے سے پرہیز کریں۔ چونکہ اس مریض کا دل بہت کمزور ہوا کرتا ہے۔

اس لیے اٹھنے بیٹھنے سے اس کے دل کے بند ہو جانے کا بڑا ڈر رہتا ہے۔ مریض کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے اسے بہت دودھ اور شوربا پلانا چاہیے۔

نوٹ: یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گھٹی دار طاعون (یو بونک پلگ) جب تک پتو جو کہ طاعون زدہ چوہے پر اترتا ہوا نہ کاٹے تب تک کسی کو نہیں ہوتا۔ آدمی سے آدمی کو یہ پلگ نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اگر مریض طاعون کے کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ اس کا بستر بھی نیا اور صاف ستھرا ہو اور اس کی چارپائی کھلی ہو اور روشنی میں ہو تو اس کی تیمارداری کرنے والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ صرف احتیاط اس امر کی لازم ہے کہ طاعون زدہ چوہے کے پتو اس کے کپڑوں۔ چارپائی اور کمرہ میں نہ ہوں۔ اگر صفائی کی پوری احتیاط رکھی جاوے تو پھر اندیشہ نہیں رہتا وہ لوگ غلطی پر ہیں جو کہ پلگ کے مریض کے نزدیک نہیں جاتے اور اس کی تیمارداری نہیں کرتے۔

## نمونہ کی طاعون

جس کو انگریزی میں نیو مونک پلگ کہتے ہیں۔ اس کی چھوت مریض سے تندرست شخص کو لگ جاتی ہے کیونکہ مریض کی تھوک اور بلغم میں بے شمار طاعونی کیڑے ہوتے ہیں جو بذریعہ تنفس تندرست اشخاص کے اندر پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے پلگ کے پھیلائے میں سوؤں یا چوہوں کا کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ بلکہ اس کی چھوت براہ راست مریض سے تندرست اشخاص میں جاتی ہے۔ اس لیے ایسے مریض کی تیمارداری کرتے وقت بڑی احتیاط لازم ہے۔ کیونکہ مریض کے سانس سے براہ راست اس مرض کی چھوت لگ جانے کا ڈر رہتا ہے۔ نیز ایسے مریض کی تھوک و بلغم کو مٹی کا تیل ڈال کر جلا دینا چاہیے۔

## غذا

مرض کے ابتدا میں دودھ ایک عمدہ غذا ہے۔ دن رات میں اڑھائی تین سیر پلا دینا چاہیے۔ دودھ میں سوڈا وائٹ یا لائیم وائٹ بھی ملا کر دیا جاسکتا ہے۔ شوربا

بچہ بھی عمدہ غذا ہے۔ چند یوم کے بعد ساگودانہ یا اراروٹ یا چاول دودھ میں  
پکا کر دیئے جاسکتے ہیں اور رفتہ رفتہ مریض کو دودھ ڈبل روٹی یا شوربا چاول یا  
کھجور پکا کر دیوں

## ریپرٹری یعنی تشریح العلما

(Plague Repertory)

### پلگ کی ادویات عامہ

آرینکیم - انتھراکسیئم - ایلنٹیسیر - ایپس - بیپٹیشیا - بیڈی آگا - ہیلڈونا -  
ہیوبائیئم - کاربوویجی - چائٹا - کروٹیس - کوبرا - ایپس - ہیرسلف - اپی کاک  
اگنیشیا - کالی فاس - لاکس - مرکپورس - نائٹرک ایسڈ - فائی ٹوٹیکا - پائی روٹینم  
فاسفورس - رشاکس - سیل - سلیٹیا - ٹراننیم - سلفر - وراٹرم - فیرم فاس -  
نیرم سلف - کالی میور - ادپر کیولائٹا وغیرہ وغیرہ

### علامات کا علاج

کیمفر مائیو سائمس - ہیلڈونا - لاکس - لاراسی  
راس

بذیان

انیم ٹارٹ - اپی کاک - نکس وامیکا -

فتور ہاضمہ

سیل - وراٹرم - آرینکیم

اسہال ہضمہ

لاکس - فاسفورس - سیل - سلفورک ایسڈ

جریان خون

### بدیں (میو بو) یا متورم غدود

جب کان کے غدود متورم ہوں کاربوانی میس - کاربوویجی - میوٹلا

کوئیم - کروٹلیس - لاکس - آیوڈیم  
مرکیورس - رٹاکس - آیوڈیم  
آر سینیکم - زیرم ہوٹفا سفورس  
کاربو اینی ملیس

آرم میٹلیکم

سلیشیا

بیلادونا

آر سینیکم - بیلادونا - ہاٹا میور  
کلیریا کارب - کاربو اینی ملیس  
چائنا - کروٹلیس - آیوڈیم - کالی  
آیوڈائیڈ - زیرم میور - نکس ایکا  
فانی ٹویکا - سلیشیا - زینکم  
آرم ٹری فائلم - آرم میٹلیکم  
بیڈیاگا - بیلادونا - کاربالک ایڈ  
آیوڈیم - لاکس - لایکو پوڈیم  
مرکیورس - سلیشیا

بیلادونا - کلیریا - ڈسکا مارا -  
مرکیورس

انیتھراکیسی نم - سٹانیسی گیرا

انیتھراکیسی نم - ایپس - بیلادونا

جبکہ غدود سخت ہوں ۔  
جب غدود میں پیپ پڑ رہا ہو ۔  
جبکہ غدود میں شدید چھجھکن  
کی دردیں ہوتی ہوں ۔  
جبکہ غدود میں دباؤ  
کی دردیں ہوں  
جبکہ غدود آہستہ آہستہ بکنا ہوں  
بدوں درد کے  
جبکہ غدود میں گولی مارنے  
کی سی دردیں ہوتی ہوں ۔  
جبکہ غدود حلق متورم ہوں ۔

جبکہ غدود گہرے دن متورم ہوں ۔

جبکہ غدود زیریں زبان متورم  
ہوں

جبکہ غدود زیریں ٹھوڑی  
متورم ہوں

جبکہ بغل کے غدود متورم ہوں

کاربوائینی میلس۔ کونیم۔ کروٹلیس۔ آیوڈیم  
 لائیکوپوڈیم۔ مرکبوریس۔ سالو۔ بیٹریم سلف  
 فاسفورس۔ رسٹاکس۔ سلیٹیا۔ سلفر

## جریانِ خون

جریانِ خون پھیپھڑوں سے

ایکونائٹ۔ ایم ٹمارٹ۔ آرنیکا۔ آرسینیکم  
 بیلاڈونا۔ برائی اونیہ۔ کاربوجی۔ چائنا۔  
 کروٹلیس۔ ایپس۔ اپی کاک مرکبوریس۔  
 لاکس۔ نائٹرک ایسڈ۔ فاسفورس۔ سلفر  
 رسٹاکس۔ ٹیری بن تھینا۔

جریانِ خون مسدود سے

فیرم۔ کالی میور۔ سیکیل۔ فاسفورس۔ سلیٹیا  
 آرنیکا۔ آرسینیکم۔ بیلاڈونا۔ برائی اونیہ  
 کلکیریا کارب۔ کاربوجی۔ کروٹلیس۔  
 فیرم فاس۔ ہما میلس۔ ہائیوسائٹس۔  
 اپی کاک۔ لاکس۔ مرکبوریس۔ نائٹرک  
 ایسڈ۔ فاسفورس۔ سیکیل۔

جریانِ خون ناک سے

## جریانِ خون ازالہ مقعد

ادویات عامہ : ایکونائٹ۔ ایونیم کارب۔ آرسینیکم۔ بیپ ٹیشیا۔ چائنا۔ کروٹلیس  
 فیرم فاس۔ ہما میلس۔ لاکس۔ مرکبوریس۔ نائٹرک ایسڈ۔ میوراکم ایسڈ۔  
 فاسفورس۔ سلیٹیا۔

ایکونائٹ

رسٹاکس

ایم ٹیم

ہما میلس

چمکیلا سرخ خون

سیاہ خون

منجمد خون

دہبودار اور منجمد خون



کوئٹہ کی مانند خون کمزورت  
جب کہ غشی ساتھ ہو۔  
جب کہ خون کی رنگت براؤن ہو  
جب کہ خون متعفن ہو  
ہما میلز  
فاسفورک ایسڈ ٹیری بن تھینا  
برائی اونیا - کاربوویجی - رسٹاکس  
بیلادونا - برائی اونیا - کاربالک ایسڈ  
چائنا - فاسفورس - سی کیل  
کروکس - سی کیل  
جب کہ خون گاڑھا لیسدار ہو۔

## جریانِ خون ازالِ چشم

ایکونائٹ - بیلادونا - کروٹیلز - یوفوربی ام - ہما میلز - فاسفورس روٹا  
خونی وجہت: آرسینیکم - بیلادونا - کروٹیلز - نکس و امیکا - روٹا

## جریانِ خون ازالِ رحم

ایکونائٹ - بیلادونا - برائی اونیا - کیمومیل - اپی کاک - نکس و امیکا - پلائینا -  
پسٹلا - لاکس - سی کیل - سلفر - ٹری لیم

## جریانِ خون ازالِ آلاتِ بول

ایکونائٹ - آرنیکا - آرسینیکم - کیمف بکار بوویجی - کروٹیلز - ارکائیٹس -  
اری جیرن - ہما میلز - اپی کاک - لاکس - مرکبوریس - نائٹرک ایسڈ - فاسفورس - ٹیری  
بن تھینا -

## سردرد

ایپس - آرنیکا - آرسینیکم - بیڈیاگا - بیلادونا - کاربواینی - کروٹیلز - فیرم فا  
جلی میم - ہائیوسائی مس - لاکس - مرکبوریس - نائٹرک ایسڈ - نکس و امیکا - اوپیم  
پسٹلا - سیلینا -

کافیہ	ناقابل برداشت
{ اکیونائیٹ - بیلاڈونا - جلسی میم - سٹرامونیم	سرور کے ہمراہ ملن ہو سرچکوتا ہو گویا کہ غم سورا ہے -
{ بیلاڈونا	نہایت شدید سرور - گویا کہ کوئی چاقو کے ساتھ ایک کن پٹی سے دوسری کن پٹی تک پھیر رہا ہے
آرینیکم مرکیورس کار - لاکس	چشم کے اوپر سرور پیشانی میں درد
کوبرا آرینیکم کاربالک ایڈ	پیشانی میں شدید درد درد نیم سر سر کے پچھلے حصہ میں درد
{ رسٹاکس	سرور مانو کہ کوئی دونوں کن پٹیوں کے اوپر خوب دبا رہا ہے -
جلسی میم	سرور زنی ہو - دماغ دکھتا ہو
{ لائیکوپوڈیم	تپکن کا سرور چار بجے شام سے آٹھ بجے رات تک زیادہ تکلیف ہو
مرکیورس کار نائٹرک ایڈ سیلشیا	پیشانی کا شدید سرور سرور - گویا کہ سر شکنجہ میں کسا ہوا ہے سر میں شدید چاڑنے کا احساس

### سرچکر - دوران سر

ایکونائیٹ - آرینیکم - بیلاڈونا - کروٹلیس - کاربالک ایڈ - چائنا - گوپرم -  
جلسی میم - ہائیوسائٹس - اگنیشیا - لائیکوپوڈیم - نیرم - ہبونیکس فامیکا - اوسیم - پستلا  
فاسفورس - رسٹاکس - سٹرامونیم - سلفر  
دوران سر گویا کہ نشہ پایا ہوا ہو - ایکونائیٹ

دورانِ سرگویا کہ ارد گرد کی ہر ایک چیز  
 دائرہ میں گھوم رہی ہے۔  
 دورانِ سرمبہ درد  
 سرچکڑ بستر پر سے اٹھتے وقت زیادہ ہوں  
 سرچکڑ چلتے بھرتے زیادہ ہوں گویا کہ مریض  
 دائیں جانب گرا جاتا ہے  
 سرچکڑ ہوں اور ساتھ ہی ابکائیاں ہوں  
 شدید سرچکڑ ہوں اور میٹھے پر زیادہ ہوں۔  
 سرچکڑ کرسی پر سے اٹھتے وقت ہوں۔  
 سرچکڑ ہوں۔ اور کمٹی خون کے باعث  
 غشی ہو۔  
 سرچکڑ ہوں اور بصیرت دھندلی ہو۔  
 سرچکڑ اٹھتے وقت آویں

بیلادونا

کروٹیل

فاسفورس

آرسینیکم

کاربالک ایسڈ

ایپس

برائی اونیہ

چائنا

ہائیوسائمس

کالی فاس

آرنیکا۔ بیلادونا۔ کوپریم۔ ہائیوسائمس۔

ادپیم۔ زنجم

آرسینیکم۔ بیپٹیشیا۔ چائنا۔ ایپس۔ اگنیشیا

ہائیوسائمس۔ مرکوریس سالو۔ فاسفورس۔

ادپیم۔ سٹرامونیم

بیلادونا۔ جلیسی میم۔ سٹرامونیم۔ زنجم

بیپٹیشیا۔ کوپریم۔ لکس۔ نیٹرم میور۔

ادپیم۔ سٹرامونیم۔ ہیلی بوریس

بیلادونا

آنکھیں گڑی ہوئی ہوں

آنکھیں سرخ ہوں

آنکھیں چکیلی ہوں

آنکھیں نیم کشادہ

آنکھیں سوچی ہوئی۔ ابھری ہوئی۔

چمکتی ہوئی اور غضبناک ہوں۔

## کان

چائنا۔ ایپس۔ فیرم۔ ہائیوسائٹس۔ فاسفورس  
کاربالک ایڈ۔ لاکس

کردٹیل

فاسفورس

کاربووہی

شنوائی سخت ہو  
کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آواز ہو  
اور جھنجھٹا ہٹ ہو۔

لگاتار بہاؤ ہو اور کانوں میں  
گھنٹی بجتی ہو۔

کانوں سے خالص خون خارج ہو۔  
شور۔ جھنجھٹا ہٹ اور گھنٹی بجتی ہو  
کانوں سے گوشت کے رنگ کا  
بدبودار مواد بہتا ہو

## دانت

ایلم۔ آرینیکم۔ ایپس۔ بیپ ٹیشیا۔ کاربالک  
ایڈ۔ جلیسی میم۔ ہائیوسائٹس۔ لاکس۔ میکرویل  
کار۔ فاسفورک ایڈ۔ رٹاکس۔ سٹرامونیم

دانتوں پر میل جمی ہوئی ہو۔

## زبان

آرینیکم۔ ایپس۔ بیپ ٹیشیا۔ بیلاڈونا۔  
برائی اونیا۔ کاربالک ایڈ۔ کاربووہی  
چائنا۔ ہائیوسائٹس۔ نائٹریک ایڈ۔ فاسفورس  
رٹاکس۔ سٹرامونیم۔ زنک

زبان پھٹی ہوئی ہو۔

بیپ ٹیشیا  
رٹاکس

زبان درمیان سے نیچے کی طرف  
پھٹی ہو۔

زبان درمیان میں پھٹی ہو

زبان خشک ہو

آرینیکا۔ آرینیکم۔ بیپ ٹیشیا۔ برائی اونیسا۔  
 بیلا ڈونا۔ کاربووہیجی۔ چائنا۔ میل بورس۔  
 لاکس۔ میور آٹک ایڈ۔ نکس ماشکاٹا۔  
 فاسفورس۔ رٹاکس۔ سٹرمونیم۔ ایپس۔  
 ورائٹم ورائیڈ۔

زبان سیاہ ہو۔

آرینیکم کاربووہیجی۔ چائنا۔ لاکس۔ لائیگو  
 پوڈیم۔ مرکوریس۔ میور آٹک ایڈ۔ نکس  
 وامایکا۔ اوپیم۔ فاسفورس

زبان سفید ہو۔

برائی اونیسا۔ بیلا ڈونا۔ کاربووہیجی۔ حلیمی  
 ایکونائیٹ۔ ایٹم کروڈم۔ آرینیکم۔ ہائیو  
 سائس۔ اگنیشیا۔ لاکس۔ لائیگو پوڈیم۔  
 نکس ماشکاٹا۔ فاسفورک ایڈ۔ پٹاکا۔  
 ورائٹم ورائیڈ۔

زبان سوچی ہوئی ہو۔

ایپس۔ آرینیکم۔ بیپ ٹیشیا۔ کلیریا فاس  
 کینتھرس۔ کونیم۔ لاکس۔ مرکوریس سالو۔  
 نیٹرم میور۔ سٹرمونیم۔ ورائٹم  
 ایکونائیٹ

زبان سوچی ہوئی ہو اور منہ میں نہ سما سکے

زبان کانپتی ہو اور اس کے اوپر سفید

زرد یا مٹیالا فر ہو

زبان خشک سوچی ہوئی اور سیاہ ہو۔

زبان سوچی ہوئی سفیدی زردی مائل

ہر اون مانند آتش کے ہو اور خشک ہو

بیلا ڈونا

فاسفورس

آرینیکم

انہضام

بیلا ڈونا۔ بیپ ٹیشیا۔ کاربوہیجی میل

ذائقہ گم ہو

کار بو و بچی  
آر سینیکم

ذائقہ نکلیں - کڑوا - اور بدبودار

## جی پھلانا

ایکونائیٹ

کھن ہوا میں جی پھلائے

ایکونائیٹ

ابکائیاں اور شدید قہیں آویں اور  
سبز مادہ نکلے

لاکس

ابکائیاں اور ساتھ قہیں اور پیاس ہو۔

فاسفورس

ابکائیوں کو پانی پینے سے آرام ہو۔

کار بو اینی میل

ابکائیاں نہایت شدید ہوں

کار بو و بچی

ہر کھانا کھانے کے بعد ابکائیاں آویں

## تنفس

ایکونائیٹ

سانس وقت سے آئے - بدبودار

اور گرم ہو۔

ایکونائیٹ - مجلسی میم - اینیٹم مارٹ

سانس تیز ہو

کو برا

مریض سانس لینے کے لیے ہانپے

فاسفورس

کو تباہ دمی ہو۔

کار بو اینی میل

سانس تکلیف سے آوے - جب

مریض لیٹے یا بیٹھے سانس ٹھنڈا ہو۔

## نبض

اینیٹم مارٹ - ایپس - رنیکا - برائی ادنی  
کوڑھیاں - فیرم فاس - مجلسی میم - لاکس

نبض تیز ہو۔

نبض کمزور ہو۔

آرٹھریٹک - کاربوئیجی - کوبرا - طبی میم - زخم  
لاکس - رشاکس - سٹرا مونیم -  
آرٹھریٹک - ڈیجیٹلس - ناجا - رشاکس -  
ورٹرم ورائیڈ  
ایکونائٹ

نبض بے قاعدہ چلے

نبض مضبوط بھری ہوئی اور تیز ہو  
نبض چھوٹی تیز اور نامعلوم دھماکہ نما  
پہلے اور ایک منٹ میں ۱۲۰ مرتبہ چلے  
نبض چھوٹی اور بے معلوم ہو۔  
نبض چھوٹی تیز اور بے قاعدہ ہو۔

کروٹیل  
فاسفورس  
مرکیورس کار

## پانخانہ - اسہال

ادویات : الیوز - ایپس - آرٹھریٹک - بیپٹیشیا - کاربوئیجی - کیومیلا - سنکونا -  
فیرم - ہیلی بوس - اگنیشیا - لاکس - مرکیورس کار - مرکیورس آئیوڈائیڈ -  
فاسفورس - فاسفورک ایڈ - رشاکس - سیکیل - تھوجا - ورائٹرم  
شکم میں تناوٹ ہو

ایپس - ارنیکا - کاربوئیجی - چائنا - اوپیم  
لانیسکو پوڈیم  
ایپس - برومیم - کاربوئیجی - کروٹیل  
کوپریم - ہیرسلف - آیوڈیم - لاکس -  
کالی بانی کروٹیکم - مرکیورس - نائٹرک  
ایڈ - نکس و امیکا - اوپیم - ورائٹرم  
ایم - ارنیکا - برائی اوٹیا - ہما میل -

پانخانہ سیاہ ہو

پانخانہ سپاہی مائل ہو

میور آگک ایڈ - رشاکس  
ایم - ایپس - ارنیکا - سٹیک - بیپٹیشیا -  
کلکیریا - کاربوئیجی - کروٹیل - لاکس -  
مرکیورس - اوپیم - سیکیل

پانخانہ بدبودار ہو

آر سینکم - کاربووہی - لاکس - سٹرامونیم

{ لاکس

کوہرا

{ فاسفورس

کاربووہی

پاخانہ نہایت بدبودار ہو۔  
عموماً قبض ہو۔ مگر پھر اسہال شروع  
ہو جاویں۔

اسہال آنے کے بعد قبض ہو جاوے

اسہال پانی پانی اور خون آمیز آئیں  
پاخانہ ہمراہ خالص خون آوے

اسہال کے ہمراہ بدبودار ہو خارج ہو۔

## پیشاب

پیشاب مقدار میں تھوڑا آوے

ایپس - آر سینکم - بیلادونا - کینتھرس -  
کروٹیلس - کالی برومیٹم - مرکوریس کار -  
نائٹرک ایسڈ - اوپیم - رسٹاکس - ٹیری  
بن تھینا - ورائٹم - زنگم -

ایکونائٹ - ایپس - کیمفر - کاربووہی -  
کروٹیلس - کالی برومیٹم - مرکوریس کار - اوپیم  
سٹرامونیم - ورائٹم

ایٹم ٹارٹ - ایپس - ارنیکا - آر سینکم  
کلکیریا - کینتھرس - کاربووہی - کروٹیلس  
اپی کاک - مرکوریس کار - نائٹرک ایسڈ -  
نکس وامیکا - پمٹلا - ٹیری بن تھینا -  
تھوجا - زنگم - ہمامیس -

ایکونائٹ

{ کروٹیلس

پیشاب رک گیا ہو۔

پیشاب خونی آتا ہو۔

پیشاب سُرخ ہو۔

پیشاب گاڑھا اور اس میں سُرخ  
لمبھٹ ہو۔



پیشاب نونی ہو اور اس میں البیومن	{	: اسفودس
خارج ہو۔ گدلا اور اس کے اوپر		
سفید بادل ہوں اور سرخ ریگ کی	{	: اسفودس
تہمت ہو۔		
پیشاب مقدار خفیف اور جلتا ہوا نکلتے۔	{	: آرینیکم
پیشاب میں خون آوے۔ رک		
رک کر آوے	{	: آرینیکم
پیشاب سیاہی مائل ہو۔ تکلیف		
کے ساتھ قطرہ قطرہ خارج ہو	{	: مرکوریس کار
پیشاب سبزی مائل۔ براؤن۔ بدبودار		
اور اس میں یوریت سائیونیا اور	{	: کاربوائینی میلس
فاسفیٹ وغیرہ وغیرہ خارج ہوں		
پیشاب زرد یا نارنگی رنگ کا اور	{	: کاربوائینی میلس
گزرتے وقت گدلا ہو۔		
پیشاب سیاہی مائل سرخ ہو۔	{	: کاربو قہجی
پیشاب رنگین۔ گدلا اور گرم ہو۔		
	{	: رسٹاکس

## حرارت بخار

ادویات عامہ : آرنیکا۔ آرینیکم۔ بیلاڈونا۔ جلیسمیم۔ لاکس۔ پستلا وغیرہ وغیرہ

سر کی حرارت بہت بڑھی ہوئی ہو۔

جسم کے اندر اور باہر جلیں وار حرارت ہو۔

حریت خشک اور مریض کو کھاتے جارہی ہو۔

جسم بقیارہی کے ساتھ جاتا ہو اور مریض

کو بستر پر ٹھنڈی جانب کروٹ بدلتی پڑتی ہو { بیپ ٹیشیا

بخار کے ساتھ پیاس بہت ہو دو  
بچے رات کو بخار ہو۔

آرسینیکم { نیم شب کے بعد جلن وار حرارت ہو  
اور بے چینی ہو۔  
رات کو حرارت ہو اور پیاس لگتی ہو۔  
کاربوئیچی

## پسینہ

تمام جسم پر کھٹا - بدبودار پسینہ آوے۔  
ٹھنڈا پسینہ (تریلی) بکثرت آوے۔  
پسینہ آنے کی طرف طبیعت راغب آوے۔  
پسینہ یکایک آوے اور یکایک گرم ہو جاوے۔  
ہاتھوں پر ٹھنڈا پسینہ بکثرت آوے۔  
غیر میں پسینہ آوے۔

جلد جسم ٹھنڈی اور پسینہ میں تر تر ہو۔  
پسینہ بڑی آسانی سے اور بکثرت آوے۔  
پسینہ برنگ زرد اور اس میں لہسن کی بو آئے۔  
سطح جسم پر بہت پسینہ ہو۔

تمام جسم پر ٹھنڈا پسینہ (تریلی) بہت ہو۔  
حرارت اور پسینہ تمام رات رہیں۔  
پسینہ کے ساتھ پیاس ہو۔

مریض نیم شب کو پسینہ میں تو تر جاگ اٹھے۔ ٹھنڈا  
چکنا پسینہ چہرہ اور ہاتھوں پر آوے۔  
پسینہ بدبودار آوے۔

پسینہ سے بدبو مانند پیاز کے آوے  
پسینہ آوے لیکن پسینہ آنے سے آرام نہ ہو

ایکونائیٹ

ایکونائیٹ

بیلادونا

بیلادونا

بیلادونا

بیلادونا

کروٹیلس

سلفر

وکس

کوبرا

کروٹیلس

فاسفورس

آرسینیکم

کاربوائینی میس

کاربوائینی میس - کوئیم ہیر سلف

لائیکو پوڈیم

مرکبیرس مالو - لاکس - ہا سوڈ

## پیاس

عام ادویات: آرسینکیم - برائی اونیا - کلکیریا کارب - کیمومیل - چائنا - ہیرپرفل - ہائیو سائنس - نیٹرم میور - نکس و امیکا - سی کیل - سٹرامونیم ورائٹرم وغیرہ -

پیاس نڈارو -

پیاس بجھتی نہ ہو اور ساتھ ہی تشویش اور کپکپاہٹ ہو -

اسہال ساتھ پیاس کے ہوں -

نہ بجھنے والی پیاس ہو -

پیاس بار بار لگے - لیکن مریض تھوڑا تھوڑا پانی پئے -

پانی کی لگاتار خواہش ہو

شدید بخار اور پیاس ہو -

جلن دار نہ بجھنے والی پیاس ہو -

پیاس بہت ہو خاص کر ٹھنڈے پانی کی طلب ہو -

اندرونی ٹھنڈے ہو اور ساتھ ہی شدت کی پیاس ہو -

حرارت کے ساتھ پیاس زیادہ ہو -

## نیند

سونے کی طرف طبیعت کا بڑا رجحان ہو -

اونگھ بے خوابی اور اول نیم شب کی آرام نیند -

مریض سونے کے لگاتار - بخوابی ہو اور بے چین نیند ہو -

مریض سوال کا جواب دیتے دیتے سو جائے -

بے خوابی اور بے چینی ہو -

نیند اکھر جائے اور خوفناک خوابیں آئیں -

مریض نیند میں گڑگڑانے اور اونچی اونچی باتیں کرے -

کھانے کے بعد فوراً نیند آئے -

بیلادونا

بیلادونا

لاکس

پیپ ٹیشیا

آرسینکیم

مرکوریس کار

کاربوائینی

رسٹاکس

رستاکس

رستاکس

دن کے وقت مریض سویا رہے۔

متواتر چار رات تک مریض کو نیند نہ آئی ہو۔

## دل و دماغ

ایکونائٹ

بیل ڈونا

بیل ڈونا

کوبرا

بیپ ٹیشیا

آر سیٹیم

آر سیٹیم

رستاکس

ہائیوسائٹس

ایپس۔ آر سیٹیم۔ بیل ڈونا۔ ہائیوسائٹس۔

لاکس۔ فاسفورک ایسڈ وغیرہ

موت کا خوف ہو اور مریض کو کبھی صحت یابی  
کی امید بندھ جائے اور کبھی مایوسی ہو

دیوانگی کے دورے ہوں، مریض اُدنچاٹے اور دانت پیسے

تندہ زبان

مریض سخت پست ہمت ہو جائے۔

متفکر ہو اور موت کا پورا یقین ہو۔

شدید ہڈیان ہو خاص کر بوقت شب اور بے چینی ہو

بے ہوشی ہو۔ اور آنکھیں تارے لگی ہوتی ہوں۔

مریض ایسا تصور کرے کہ دشمن اُس کو زہر دینے کے ورے ہے

مریض اپنے دوستوں کو نہ پہچان سکتا ہو۔

ہڈیان ہو اور بڑ بڑاتا ہو

# کالی کھانسی۔ کوکر کھانسی۔ ہونپ کف

(WHOOPING Cough)

یہ ایک قسم کی چھوٹا رہ بیماری ہے۔ ابتدا میں زکام ہوتا ہے اور پھر فوٹی  
طور پر تشنجی قسم کی کھانسی ہوتی ہے۔ چونکہ دوران کھانسی میں اندر کی طرف دم  
کھینچتے وقت ہوب کی آواز نکلتی ہے۔ اس لیے اس کو انگریزی میں ہونپنگ  
کف کہتے ہیں۔ کھانسی کے دورہ کے خاتمہ پر یا تو مریض قے کرتا ہے۔ یا گاڑھی

تھک یعنی بغسم باہر پھینکتا ہے۔ چونکہ کھانستے کھانستے مریض کا رنگ نیلا کالا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو کالی کھانسی کہتے ہیں۔

یہ مرض بعض اوقات وباؤ پھیلا کرتا ہے۔ تندرست و توانا بچوں کو یہ مرض اتنا تنگ نہیں کرتا جتنا کہ خنازیری مزاج والوں کو یہ تکلیف دیتا ہے۔ ان کے لیے تو بعض اوقات یہ مرض مہلک ثابت ہوتا ہے۔ تین سال سے کم عمر والے بچے اکثر زیادہ مبتلائے مرض ہو ا کرتے ہیں۔ اور دس سال سے اوپر شاذ و نادر ہی ظاہر ہوتا ہے۔ عمر بھر میں یہ مرض صرف ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ دوبارہ نہیں ہوتا۔ اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا خورد بینی کیڑا مانا گیا ہے جو کہ مریض کی ناک اور منہ کی رطوبت میں پایا جاتا ہے۔ ابتداء میں معمولی کھانسی ہوتی ہے۔ لیکن بہ جلد یوم کے بعد کھانسی کے دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ دم اندر کھینچتے وقت مریض کو بہت محنت کمرتی پڑتی ہے۔ اور ساتھ ہی ہُوپ کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہُوپ کی آواز پیدا بھی نہیں ہوتی۔

کھانسی کا دورہ شروع ہونے کے قبل ہی مریض بچہ کو پتہ لگ جاتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر ماں یا دایہ کو چپٹ جاتا ہے۔ اور اگر بچہ بڑی عمر کا ہے تو وہ کسی چیز کو سہارا کے لیے پکڑ لیتا ہے۔ دورہ کے خاتمہ پر وہ پھر کھینچنے لگ جاتا ہے۔ چونکہ خوراک خوردہ تھے ہو جاتی ہے اس لیے مریض کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور وہ روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔

کالی کھانسی خود تو مہلک نہیں ہوتی۔ لیکن بد قسمتی سے دیگر امراض کو جگا دیتی ہے۔ کھانستے وقت زور لگانا پڑتا ہے۔ جس کے باعث آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ناک یا کان سے خون جاری ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے۔ اکثر حالتوں میں براؤنکائیٹس کا عارضہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ یعنی تنفس تیز بخار اور سینہ میں سیٹی کی آواز سنائی دیتی ہے۔

بعض حالتوں میں پھیپھڑوں میں ورم ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ زور کے ساتھ کھانسنے سے دمہ کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کمزور بچوں کو بعض اوقات استقاء الدماغ (سر میں پانی جمع ہونا) کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ وہ یکایک میند

سے چونک اٹھتے ہیں اور سر کو ادھر ادھر مارتے ہیں۔ تشنچ کا عارضہ بھی ہو جاتا کرتا ہے۔ جس کی آمد کا پتہ اس طرح لگتا ہے کہ مریض کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور انگوٹھا ہاتھ کی تھیلی میں مڑ جاتا ہے۔ آخری پچپیدگی دستوں کی ہے۔ جو کہ کالی کھانسی میں ہو جاتا کرتی ہے۔ کالی کھانسی کی معیاد چھ ہفتے گنی گئی ہے۔ لیکن بعض حالتوں میں چند یوم میں یا ایک دو ہفتوں میں ہی آرام آ جاتا کرتا ہے اور کبھی کبھی مہینوں بھی چلی جاتی ہے۔ صحت یابی کے بعد چھ ہفتوں تک مرض کی چھوت کا قدر لگا رہتا ہے۔ کھانسی عموماً رات کو زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ جب رات کو کھانسی کم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ مرض کمی پر ہے۔

## علاج

ڈرا سرا: اس دوائی کا درجہ کالی کھانسی میں سب سے اول ہے اور بہت سے کیسوں میں یہ دوائی کافی ووائی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی موٹی موٹی علامات درج ذیل ہیں:-

کتنے کھانسی بار بار ہو اور دم بھی نہ لینے دیتی ہو۔ شام کو کھانسی کا زور زیادہ ہو۔ بغم خارج کرتے وقت اُہاق اور قیئیں آتی ہوں۔ کھانسی کے دورے نیم شب کے بعد خصوصاً زیادہ تکلیف دہ ہوں۔ کھانستے وقت بچہ اپنی پسلیوں کو پکڑ لیتا ہو۔ ڈرا سرا کا مریض بہت چنچا چلاتا ہے۔  
بذخوال: x کھانسی کے ہر دورہ کے بعد۔

بیلادونا: ڈرا سرا سے اتر کر پھر بیلادونا۔ اپنی کاک چاٹنا اور کوپرم وغیرہ کا درجہ ہے۔ بیلادونا کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں:-

کھانسی کا شدید حملہ یکایک شروع ہو جاوے اور کھانسی خشک ہو۔ خون کا دورہ بجانب چہرہ اور سر زیادہ ہو۔ کھانستے کھانستے چہرہ سُرخ ہو جاوے مکیر بھوٹے رات کو تکلیف زیادہ ہو۔ مرض کے ابتداء میں یہ دوائی زیادہ کارآمد

ہے۔ اور اکثر مرض کی میعاد کو کم کر دیتی ہے۔ اگر دورہ کے بعد چھپکیں آویں۔ تو یہ علامت بیلادونا کی سمجھنی چاہئے۔

✽ خورال:  $1 \times$  یا  $3 \times$  کھانسی کے دورہ کے بعد اپنی کاک: تشنجی کھانسی جس سے بچہ نیلا پیلا ہو جاتا ہو اور دم توڑ دیتا ہو۔ متسلی اور تھے یہ اپنی کاک کی خاص علامات ہیں۔ بلغم لیسدار اور بمقدار کثیر نکلتی ہو۔ کھانسی کے دورہ کے بعد مریض بہت کمزور ہو جاتا ہو۔ جب کھانسی کے دورے اتنی جلدی جلدی ہوتے ہوں کہ مریض کو سانس لینے کی فرصت بھی نہ دیتے ہوں تو ایسے حالات میں اپنی کاک منظر ہوا کرتی ہے۔

✽ خورال:  $1 \times$  کھانسی کے دورے کے بعد سائٹا۔ کالی کھانسی کی یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ اس کی علامات اپنی کاک سے ملتی جلتی ہیں۔ سوتے سوتے دانتوں کا آپس میں رگڑنا یہ ایک خاص علامت سائٹا کی ہے۔ اگر مریض بچہ کو چرنوں کی شکایت بھی رہتی ہو تو سائٹا کے کارگر ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

✽ خورال:  $1 \times$  کھانسی کے ہر دورہ کے بعد۔ کو پرم: جب تشنج بھی ساتھ ہوتا ہو اور کھانسی کا دورہ دیر تک رہتا ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

✽ خورال:  $3 \times$  کھانسی کے ہر دورہ کے بعد۔ میگنیشیا فاس: یہ کالی کھانسی کی ایک آزمودہ دوائی ہے۔ ڈاکٹروں کا تجربہ ہے کہ اگر اس دوائی کو  $30 \times$  طاقت میں دیا جائے۔ تو اکثر اوقات جادو نما اثر دکھاتی ہے۔

✽ خورال:  $3 \times$  یا  $30 \times$  کھانسی کے ہر دورہ کے بعد اینیم طارٹ: سینہ میں بلغم کھڑکتی تو بہت ہو لیکن نکلتی بہت کم ہو۔ مریض کا مزاج چڑچڑا اور ضدی ہوا کرتا ہے۔ جب اس کو چھو جائے تو چھینٹا

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

چلتا ہے۔ ضعف اور زبان پر سفید فریہ سب اینیٹم ٹارٹ کی علامات ہیں نیز اسہال کا آنا اور ان کے ہمراہ ضعف و نقاہت شام کی خوراک خوردہ کو نیم شب کے بعد قے کر چھوڑنا یہ سب اینیٹم ٹارٹ کی علامات ہیں۔ گرم گرم نوش کرنے سے تکلیف کا بڑھ جانا اینیٹم ٹارٹ کی ضروری علامات سمجھی جاتی ہے۔

✽ خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد

کورالیم ریم : شدید کالی کھانسی میں یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے۔ کھانسی آنے سے پہلے مریض کو ایسا محسوس ہو کہ اس کا گلا گھٹنا جا رہا ہے۔ ہانپ ہانپ کر مریض کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہو۔ کھانسی کے دورے کے بعد مریض بالکل تھکا ٹوٹا جاتا ہو۔

✽ خوراک : ۶x کھانسی کے ہر دورے کے بعد۔

کاکس کا کٹی : جب کھانسی کے ساتھ مریض صفالیدار بغم قے کرے اور بغم کی موٹی اور لمبی تاریں (دورے) فرش تک پہنچ جائیں تو یہ دوائی منظر ہوتی ہے۔ موٹی لیدار بغم جو کہ ڈوروں میں اور ناک سے نکلے۔ اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔

✽ خوراک : مدرٹسکچر (۵) x کھانسی کے ہر دورے کے بعد

میپھاٹیس : کھانسی کے دوران میں بچہ کا پیشاب اور پاخانہ نکل جاتے ہوں۔ اسہال اور ہوا بڑے بدبودار خارج ہوتے ہوں۔ کھانسی کے دوران میں بچہ کو اٹھانا پڑتا ہو۔ اس کا چہرہ نیلگوں اور دم گھٹتا ہو۔ سوائے چند کیسوں کے میپھاٹیس دوائی شاذ و نادر ہی استعمال میں آتی ہے۔

✽ خوراک : ۶x یا ۳۰ کھانسی کے ہر دورے کے بعد۔

کولیول یا پریٹوبین : یہ دوائی کالی کھانسی کے اجزاء سے تیار کی جاتی ہے۔ لندن کے ڈاکٹر کلارک صاحب اور دیگر ڈاکٹر اس کے مداح ہیں۔ کھانسی کے ابتدا میں ہی یہ دوائی دینی شروع کر دینی چاہیے۔

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵



✽ خوراک: ۳۰ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

کھانسی کے دوران میں بچہ کی کمر کو ایک ہاتھ سے اور پیشانی کو دوسرے ہاتھ سے تھامے رکھنا چاہیے۔ بیمار کا منہ تھوک اور بلغم سے صاف کر کے اس کی کمر کو آہستہ آہستہ ملنا چاہیے۔ روزانہ بچے کی چھاتی اور کمر پر سرسوں کے تیل کے ساتھ صبح اور شام مالش کرنی چاہیے اس امر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کہ بچوں کو قبض نہ ہو۔ بڑے بچوں کو ایک ایک اونٹ پانی میں آدھا ڈرام یعنی قریباً دو ماشہ نمک ملا کر اس کی نسوار دینی چاہیے۔ ریڑھ کے ستون کو بھی آہستہ آہستہ ملنا مفید ہوا کرتا ہے۔ مریض کو ہوا دار کمرے میں رکھنا چاہیے۔ تازہ ہوا مریض کے لیے نہایت ضروری اور مفید ہے۔ سردی سے بچاؤ لازمی ہے۔

## غذا

مریض کو نرم اور نود مضم غذا تھوڑی تھوڑی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد دینی چاہیے۔ دودھ اور آتش جو یا چنا کا شوربا مفید غذائیں ہیں۔ جب کھانسی کا دورہ شروع ہونے والا ہو تو اس وقت غذا نہ دینی چاہیے لیکن جب کھانسی آنے کے ساتھ قے بھی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً بچہ کو ضرور غذا دینی چاہیے۔ تاکہ کھانسی کی دوسری نوبت آنے تک وہ مضم ہو جائے۔ وگرنہ قے کے ذریعہ غذا نکل جانے سے بچہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

## حفظِ ماتقدم

ڈرامہ نمبر ۶ کی ایک خوراک صبح اور ایک شام کو روزانہ دو مرتبہ دینے سے مرض کا روک تھام رہتا ہے اور بچہ مرض کے حملہ سے بچا رہتا ہے۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

# پیمیش مروڑ

(DYSENTERY)

اس مرض میں بڑی آنتوں میں ورم ہو جاتا ہے اور اکثر ان کی اندرونی سطح پر زخم ہو جاتے ہیں اور مروڑ کے ساتھ بار بار پاخانہ جلنے کی حاجت ہوتی ہے۔ پاخانہ کے ساتھ خون آمیز آؤں یا صرف خالص آؤں ہی آتی ہے۔ بعض اوقات بخار بھی ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اجابت کے ساتھ درد بھی ہوتا ہے اور کمزوری بڑھتی جاتی ہے۔ گرم ممالک میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اور بعض اوقات یہ وباؤں بھی پھیلا کرتی ہے۔ شدید حالت میں صرف آؤں اور خون ہی کی اجابت ہوتی ہے۔

## علامات مرض

مرض کی سختی و نرمی کے لحاظ سے علامات بھی مختلف ہوا کرتے ہیں۔ جب مرض خفیف ہو تو بدول کسی زیادہ نقص کے مرض کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مرض کا حملہ شدید ہو تو لوزہ ہو کر بخار چڑھ جاتا ہے۔ چہرہ تھما جاتا ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے۔ زبان پر فرجی ہوئی ہوتی ہے۔ اور آبکائیاں اور قئیں آتی ہیں بشکم میں کانٹے کی سی بے قاعدہ دریں ہوتی ہیں اور مریض کو ایسا معلوم پڑتا ہے کہ اس کی آنتوں میں کوئی مادہ پھنسا ہوا ہے۔ اس لئے اس کو بڑے زور سے کونٹھنا پڑتا ہے۔ تاکہ مادہ خارج ہو جائے۔ کونٹھنا پیمیش کی ایک خاص علامت ہے۔ یعنی پاخانہ خارج کرنے کے لیے بہت زور لگانا اور اگرچہ پاخانہ کی حاجت بار بار اور زور آور ہوتی ہے۔ لیکن سوائے تھوڑی سی آؤں اور خون یا چھچھروں کے اور کچھ خارج نہیں ہوتا اور بعض اوقات سکہ کی سخت گولیاں خارج ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات یہ تشنجی فعل مثلاً تک چلا جاتا ہے۔ جس سے پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ گرم ممالک میں مرض کا حملہ شدید اور سخت ہوا کرتا ہے۔ دریں ناف کے ارد گرد اور کمر کی ہڈی کے نیچے بڑی سخت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات شرائین میں زخم ہو کر خون جاری ہو جاتا ہے۔ ٹہلک

کیسوں میں مریض کی طاقت اور جسم گھٹتے جاتے ہیں۔ نبض چھوٹی اور تیز چلتی ہو چہرہ اندر گھس جاتا ہے۔ شکم تن جاتا ہے اور نچلی آنت میں بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جلن دار حرارت اور ہچکی پیدا ہو جاتی ہے۔ درد یکایک موقوف ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے پینے آتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتا ہے اور بالاخر موت واقع ہو جاتی ہے۔

رو بے تحت کیسوں میں طاقت مریض بہت زائل نہیں ہوتی۔ جلد نمی پر ہوتی ہے اور بہت سرد نہیں ہوتی۔ پاخانے قدرتی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں اور بالاخر صحت ہو جاتی ہے۔

## اسباب مرض

اس مرض کا باعث ایک چھوٹا سا کیرا ہے جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں امیبا ڈسٹریائی یعنی گرم پیش کہتے ہیں۔ یہ کیرا مریض کے براز میں پایا جاتا ہے اور پینے کے پانی یا بذریعہ غذا تندرست اشخاص کی آنتوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتا ہے۔ مکھیاں بھی اس مرض کو پھیلاتی ہیں۔ کیونکہ اس مرض کے زہر کو کھانے میں بلا دیتی ہیں۔

اس مرض کے اسباب مستعدی اور مؤیدہ یہ ہیں۔ موسم میں یکایک اور بہت تیز تبدیلی واقع ہونا۔ مثلاً دن کو بہت زیادہ گرمی اور رات کو بہت ٹھنڈک ہونا۔ گندہ پانی یا کچا دودھ پینا۔ کچے میوے یا کچی یا ثقیل غذا کھانا۔ باریک گوشت اور سڑی باریک مچلی یا زلیخہ اٹھ سے کھانا۔ غلیظ اور تنگ مکانات یا زیادہ گنجان آبادی میں رہنا۔ سردی اور نمی مثلاً رات کو زمین پر سونا اور پیٹ کو کافی نہ ڈھانپنے سے سردی لگ جانا۔ عیاشی یا گندی اور نا کافی غذا وقت بے وقت کھانا۔ سخت قبض ہونا یا بار بار تیز مسهل لینا۔ کبھی کبھی یہ مرض دماغ بھی پھیلا کرتا ہے۔ پاک و بند۔ مصر اور دیگر گرم ممالک میں یہ مرض زیادہ پھیلا کرتا ہے۔ جس شخص کو ایک بار یہ مرض ہو جائے دوبارہ وہ آسانی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔

پُرانی پیش۔ جس کو انگریزی اصطلاح میں کولک ڈی سنٹری اور طب میں نیچرل مین کہتے ہیں۔ عام بول چال میں اس کا نام سنگرنی بھی ہے۔ چونکہ یہ پیڑی عرصہ تک مریض کے سنگ یعنی ساتھ رہتی ہے اس لیے اس کو سنگرنی

رنگہ منی) کہتے ہیں۔

رنگہ منی کا مریض دن بدن کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے اور اس کے جسم سے ایک ناخوشگوار بو آیا کرتی ہے۔ کبھی تو اس کو خون آمیز پیپ دار متعفن دست آتے ہیں۔ اور کبھی اس کو ایک یا دو روز کے لیے قبض ہو جایا کرتی ہے۔ بھوک ماری جاتی ہے۔ اور مریض دن بدن کمزور ہوتا اور سوکھتا جاتا ہے۔

نوٹ: جب طیر یا بخار کا زور ہو تب تو اس کے ساتھ بعض اوقات پیش کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو طیر لی ڈی سنٹری یعنی طیریائی پیش کہتے ہیں۔ اور جب پیش کا مرض سکرو دی ہمراہ ہو۔ تو اس کو سکارمیوٹک ڈی سنٹری یعنی سکرو بونی پیش کہتے ہیں۔ جب پیش کے ہمراہ دانتوں کے علاوہ منہ اور ناک سے بھی جریان خون ہو تو اس کو ہیپوراجک ڈی سنٹری یا سیلک نینٹ ڈی سنٹری یعنی خونئی پیش و جنیت پیش کہتے ہیں۔ ایسی پیش عموماً ملک ثابت ہوتی ہے

پیچیدگیاں: مزمن پیش کے دوران میں کئی ایک پیچیدہ امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً (۱) آنت کے چھد جانے سے صفاق ریٹ کی جھلی پری ٹو نیم) میں سوزش ہو جاتی ہے۔ (۲) جگر کا پھوٹا (۳) ورم جگر (۴) ورم گردہ (۵) نمونیا۔ (۶) وجع المفاصل

نوٹ: بعض اوقات اس مرض کا دیگر امراض مشابہ سے تشخیص کرنا مشکل ہو جایا کرتا ہے کیونکہ ان میں بھی پیش کی سی علامات پائی جاتی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ پیش ایک متعدی مرض ہے۔ جو کہ ایک خاص قسم کے کرم سے جس کو کرم پیش کہتے ہیں پیدا ہوتا ہے لیکن دیگر مشابہ امراض میں جب کہ براز کا خوردبین سے امتحان کیا جاوے تو یہ کیرا موجود نہیں ہوتا۔ مثلاً

۱۔ انٹریوں میں سڈہ ٹمک جاتا ہے۔ اس میں مریض کو بہت کو منتھنا پڑتا ہے اور کو منتھنے سے تھوڑی سی آؤں اور لہو آتا ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ قے بھی آتی ہے اور درد و نوبت ہوتا ہے۔ لیکن بخار نہیں ہوتا۔

۲۔ بواسیر میں پاخانہ آنے کے قبل اکثر خون آیا کرتا ہے۔ نہ ہی موٹہ پڑتے ہیں اور نہ ہی بخار ہوتا ہے۔

۲۔ سرطانِ مقعد کی وجہ سے بھی مقعد میں درد ہوتا ہے۔ اور پاخانہ آتے وقت درد

زیادہ ہوتا ہے۔ سیاخانہ میں خون اور آفل ملے ہوئے ہوتے ہیں۔

زہیر کاؤب یعنی پیشہ سڈی: جب کہ آنت میں سڈہ آٹک جاوے اور اس کے باعث پیشہ کا غار منہ ہو تو سڈہ کو خارج کرنا ضروری ہوتا کرتا ہے۔ اس لیے اگر ضرورت پڑے تو مریض کو کیسٹر آئیل دے کر سڈہ کو خارج کر لیں اور پھر مناسب ہو میوٹیک دوائی استعمال کرائیں۔

## علاج

مرکیورس کار: اس مرض میں مرکیورس کار کا نمبر صف اول میں ہے۔ کیونکہ شدید کیوں میں اسی دوائی کی علامات اکثر موجود ہوتا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت شدید اور بچہ کو منتھنے کی ہے۔ جو کہ اس دوائی کی علامت مخصوصہ ہے مریض نو بی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو پاخانہ ابھی اور آئے گا اور اس کی حاجت رفع ہوئے میں نہ آتی ہو۔ کو منتھنے کے ساتھ درد بھی ہوتا ہو۔ پاخانے مقدار میں تھوڑے آؤں نیز بانٹونی ہتے ہوں اور مقعد میں جلن ہوتی ہو۔ پیشاب کم اور شانہ میں بھی مرور پڑتے ہوں اور باوجود اس کے کہ منہ میں لعاب بہت پیدا ہوتا ہو لیکن پھر بھی پیاس بہت لگتی ہو۔

✽ خوراک: ۳ x یا ۴ x جی: ۲ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد اس دوائی کی بہت خوراکیں

دینی چاہئیں

لیکن جب مرض کا نفع کم ہو جاوے یا مرکیورس کار کے دینے سے خون کا آنا رک جاوے۔ کو منتھنا بھی کم ہو جاوے تو مرکیورس سالو ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد دینی چاہئے مرکیورس ٹلس اس وقت زیادہ مفید ہوتی ہے جب کہ کو منتھنا بھی کم ہو اور درد بھی کم ہو ۱ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد دینی چاہئے۔

کیپ سی کم۔ جب کہ بار بار تھوڑے تھوڑے دست آتے ہوں اور ساتھ ہی

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

مروڑ بھی پڑتے ہوں اور مقعد میں جلن ہوتی ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ لیکن کیپ سی کم اس وقت منظر ہوتی ہے جب کہ کچھ پینے کے ساتھ ہی مریض ٹھٹھرنے لگ پڑے۔

✽ خورال: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم: مرض پیش میں یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے جبکہ پاخانے چھوٹے چھوٹے آتے ہوں۔ مقعد میں جلن ہوتی ہو۔ اور پیاس بہت ہو اور پاخانہ پھرنے کے بعد نفاہت بدرجہ کمال ہو جاتی ہو۔ لیکن شکم میں تناوت نہ ہوتی ہو جیسی کہ لائیکو پوڈیم اور کاربوئیکیل میں ہوا کرتی ہے۔ اگرچہ مریض بے چین ہوتا ہو اور بہت پیاسا ہوتا ہو۔ لیکن پانی اس کو خراب لگتا ہو جب پاخانے ناہضم شدہ غذا کے آئیں کیچڑکی مانند اور ٹوٹی آئیں۔ تو آر سینیکم دوائی منظر ہوا کرتی ہے سیاہی نائل براؤن اور نہایت ہی بدبو دار پاخانوں کے لیے یہ دوائی نہایت ہی مفید ہوتی ہے۔ مروڑ اور جلن مقعد پاخانہ آچکنے کے بعد بھی موجود رہیں۔ آر سینیکم کی خاص قسم کی پیاس یعنی مریض بار بار پانی پئے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا پئے اور بے چینی یہ ہر دو علامات ضرور موجود ہونی چاہئیں۔

✽ خورال: ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائٹ: ابتداء میں ایکونائٹ ایک مفید دوا ہوتی ہے اور خاص کر جب کہ دن تو گرم ہوں اور راتیں سرد ہوں۔ پاخانے بار بار تھوڑے اور درد کے ساتھ آتے ہوں۔ جلد جسم گرم اور خشک نہ ہو اور ایکونائٹ کی دیگر علامات مخصوصہ بھی موجود ہوں۔

✽ خورال: ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد

نوٹ: ایکونائٹ کے بعد مریض کا استعمال مفید ہوتا ہے۔

سلفر: جب پیش کا آرام ہو لے میں نہ آتا ہو یا مزمن عارضہ ہو گیا ہو تو سلفر دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔ مروڑ ہر وقت پڑتے ہوں۔ پاخانے کیچڑکی مانند آتے ہوں اور پاخانہ

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

جانے کی بار بار اور فوری حاجت ہوتی ہو۔ بعض اوقات مرود کے بغیر ہی دست آتے ہوں۔ زیادتی رات کے وقت ہوتی ہو۔ جب پیش کا عارضہ ایسے مریضوں کو ہوجن کو بواسیر کی شکایت رہ چکی ہو تو سلفراور بھی زیادہ مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک: ۳x سفوف کے ۵ گرین ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کالوسنتھ: شکم میں درد بہت زیادہ اور ناقابل برداشت ہو۔ پاخانہ میں آؤں اور خون آتے ہوں۔ ناف کے مقام پر درد ہوجس سے مریض دوسرا ہوتا ہوا اور دوسرا ہونے سے اسے آرام معلوم ہوتا ہو۔

✽ خوراک: ۱x یا ۳x ہر گھنٹہ کے بعد

ایلیوز: پاخانہ آنے سے پہلے پیڑ میں بوجھ معلوم ہو۔ مریض خیال کرے کہ ہوا خارج ہونے لگی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس کے پاخانہ بھی نکل جاتا ہو مقعد اور اس کے اوپر کے حصہ میں جلن ہو۔ پیٹ میں گڑ گڑاہٹ ہو۔ جب پیش کے ہمراہ بواسیر کی شکایت بھی ہو تو یہ دوائی بہت نافع ہوا کرتی ہے۔ آؤں بھٹی کی مانند آتی ہے اور اس کے اوپر خون لت پت ہو اور ساتھ ہی شکم میں بہت درد ہوتا ہو۔ آؤں بہت مقدار میں خارج ہوتی ہو۔ سلفر کی مانند دوائی بھی مریض میں زیادہ مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک: مدرشکیر یا ۱x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد

اپنی کاک: تلی اور تے کرنے کو ہر وقت جی چاہتا ہو۔ ناف کے گرد درد ہو۔ پاخانہ کا رنگ سبز اور آؤں بہت مقدار میں خارج ہوتی ہو۔ آبکائیاں آتی ہوں۔ اور تے بھی آتی ہو۔

✽ خوراک: ۱x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بکس و امیکا: صبح کے وقت مریض کا زور زیادہ ہو۔ آؤں کے ساتھ پاخانہ بلا ہوا آتا ہو۔ پیٹ میں مرود پڑتے ہوں۔ لیکن پاخانہ جب تھوڑا سا آجاتا ہو تو تھوڑی دیر کے لیے درد کا افادہ ہو جاتا ہو۔ لیکن پاخانہ کی حاجت متواتر نہ رہتی ہو جب

کہ مرض کی وجہ زیادہ شراب خوری ہو۔

✽ خوراک :  $3 \times 1$  یا  $3 \times 3$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

رستاکس : جب مروڑ کے ساتھ درد رانوں تک جاتا ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک :  $3 \times 3$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد

## ضروری ہدایات

بیمار کو چپ چاپ ایک کھلے ہوادار کمرہ میں آرام سے بستر میں پڑا رہنا چاہیے اور جب مرض کا حملہ شدید ہو تو پاخانہ کے لیے بار بار اٹھنے کی بجائے بستر پر ہی بیڈپین میں پھرنا چاہیے۔ اگر دردی بہت شدید ہوں تو گرم گرم پلٹس یا فلائین کے ٹکڑے کو گرم پانی میں بھگو کر اور نیچوڑ کر شکم کے اوپر رکھنا چاہیے اور جب فلائین کا ٹکڑا سرد ہو جائے تو دوسرا ٹکڑا اسی طرح سے نیچوڑ کر رکھ دینا چاہیے۔

اکثر اوقات پچکاری کرنے یا انیما کرنے سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مریض کو سرد پانی یا آتش جو پینے کے لیے دینا چاہیے۔ دودھ میں بلاٹوا سوڈا وائٹاراروٹ اور چنے یا مونگ کی دال کا پانی دینا چاہیے۔ مریض کے پاخانہ کو با احتیاط تمام دبا دینا چاہیے اور صفائی وغیرہ کی پوری احتیاط رکھنی چاہیے۔

## حفظ ماقدم

کچھ ترکاری مثلاً کھیرا، گلڑی وغیرہ اور کچے و گھے سڑے پھل نہ کھائیں۔ سردی سے محفوظ رہیں۔ خصوصاً رات کے وقت پیٹ کو سردی سے بچانا چاہیے۔ پینے کے پانی کو جوش دے کر اور فلٹر کرنے کے پینا چاہیے۔ جہاں تک اس ہو سکے لکھٹیوں کو کھانے پینے کی چیزوں پر نہ بیٹھنے دینا چاہیے۔ کیونکہ لکھٹیاں پاخانے پر بیٹھ کر پیش کے جراثیم اپنے ساتھ لے آتی ہیں اور ان کو کھانے کی چیزوں میں داخل کر دیتی ہیں۔

۷ بیڈپین چھینیا لوہے کا ایک برتن بنا ہوا ہوتا ہے جس میں مریض بستر پر ہی آسانی سے پاخانہ پھر سکتا ہے۔



مرض پیش کو ایک الگ کمرہ میں رکھنا چاہیے۔ جب یہ مرض وباؤ پھیلے تو ہر طرح سے صفائی کا انتظام رکھنا چاہیے اور خاص کر پانی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے اور پانی ہمیشہ جوش دے کر پینا چاہیے۔

## سرخ باد-حمرو مائٹرا

Erysipelas St. Anthony's Fire

یہ ایک متعدی مرض ہے۔ اس میں جلد پر ایک خاص قسم کی سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ مرض وباؤ بھی پھیلا کرتا ہے۔

### علامات مرض

پہلے لرزہ کے ساتھ بخار ہو جاتا ہے۔ جی ملتا ہے۔ قیئیں آتی ہیں اور سرد ہوتا ہے۔ اشتہا ماری جاتی ہے اور بار بار لرزہ ہو کر بخار تیز ہو جاتا ہے۔ زبان کیلے۔ قبض کی شکایت۔ نبض تیز اور دیگر علامات سوزشی بخار کی موجود ہوتی ہیں۔ بخار ہونے کے ایک دو روز بعد جلد پر سرخی اور دم ظاہر ہوتی ہے۔ اور اکثر اوقات یہ ورم کسی زخم کے گرد شروع ہو کر پھیلتی جاتی ہے۔ اگر ماؤف جگہ کو انگلی سے دبایا جائے تو سرخی غائب ہو جاتی ہے اور وباؤ ہٹا لینے سے پھر واپس آ جاتی ہے۔ بیاہی شکایت کرتا ہے کہ ماؤف جگہ سخت تنی ہوئی ہے اور گرم ہے اور اس میں نیش زنی کا سادہ ہوتا ہے۔ پوٹوں اور فوطوں کی جلد چونکہ پھیلی ہوتی ہے اس لیے ان مقامات پر ورم زیادہ ہوتا کرتی ہے۔ یہ سرخی پھیلتی جاتی ہے اور کبھی کبھی ایک جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ جا نمودار ہوتی ہے۔ جب اس مرض کا حملہ شدید ہوتا ہے تو جسم کے جن حصہ میں سرخی نمودار ہوتی ہے وہاں چھلے پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ چھلے پھٹ کر زخم بن جاتے ہیں۔ مریض شکل سے بڑا سخت بیمار ہوتا ہے اور حرارت جسم ۱۰۲ سے لے کر ۱۰۴ درجہ تک ہوتی ہے اور اس سے کم ہونے میں نہیں آتی۔ مرض سے رو بھت ہونے کی یہ علامات ہیں کہ سرخی ورم اور دم دیکھ کر ہی ہو جاتی جاتی

ہے اور جلد پر سے پھلکے چند یوم تک اترتے رہتے ہیں اور اگر یہ مرض میں ہو تو سر کے بال بھی گرنے لگتے ہیں اور کئی یوم تک گرتے رہتے ہیں۔ جب مریض کی حالت خراب ہو رہی ہو اور موت کے پنجے میں جا رہا ہو جیسا کہ اس مرض میں ہوا کرتا ہے تو اس کی علامات حسب ذیل ہوا کرتی ہیں۔

نقاہت بڑھ جاتی ہے۔ مریض چپ چاپ بے ہوش پڑا رہتا ہے۔ دانت پیتا ہے۔ زبان تھلائی ہے۔ لگتا مشکل ہو جاتا ہے اور پیشاب خود بخود نکلتا رہتا ہے۔ زبان خشک اور سیاہ پڑ جاتی ہے۔ جریان خون واقعہ ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے سرخ بادی دھتے قدر قدر فاصلہ پر نمودار ہوتے ہیں۔ بخار کم ہو جاتا ہے۔ اور سرخ بادی دھتے مسختے جاتے ہیں۔ نبض بالکل گم ہو جاتی ہے۔ جسم سرد پڑ جاتی ہے۔ اور بیمار بے ہوشی میں جاں بحق تسلیم کر دیتا ہے۔

یہ مرض اکثر سراسر گردن میں زیادہ پھیلا کرتا ہے اور عموماً اس میں ہڈیاں بھی کم و بیش ہوتا ہے۔ نیز قینیں آتی ہیں جب یہ مرض ان مقامات میں پھیلتا ہے جہاں کہ غدد واقع ہوتے ہیں تو یہ غدد بھی ساتھ ساتھ متورم ہوتے جاتے ہیں اور دلنے سے درد کرتے ہیں۔

## اقسام مرض

۱۔ سر کی کھوپڑی کا سرخاد۔ جب یہ مرض کھوپڑی پر سے شروع ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی تشخیص مشکل ہو جاتی ہے۔ البتہ کھوپڑی کے درد کرنے اور غددوں کے متورم ہو جانے سے یہ مرض بخوبی پہچانا جاتا ہے اور بخار اور ہڈیاں کا موجود ہونا اس شخص میں بے کار ہوا کرتا ہے۔

۲۔ دیگر مقامات کا سرخاد۔ اس میں ہڈیاں نہیں ہوتا لیکن اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ نزدیکی غدد پھول جاتے ہیں۔ یہ تین حالتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔  
اول۔ عام، دوم۔ خفیف، سوم۔ شدید

## اسباب مرض

یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ موسم بہار اور خزاں میں خصوصاً ہوا کرتا ہے۔ نوجوان

زیادہ مبتلا ہوتے ہیں اور خاص کر زچہ، زخم اور اپریشن اس مرض کے خاص اسباب ہیں۔ جب اپریشن کے نقص کے باعث یہ مرض پیدا ہو تو اکثر یہ مہلک ثابت ہوتا ہے۔ بعض ڈاکٹر صاحبان کے نزدیک یہ مرض جراثیم کے ذریعہ پھیلتا ہے جو کہ مریض کے زخم یا منہ میں داخل ہو کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔

## علاج

ایکونائیٹ : شروع بخار میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ علامات مخصوصہ یہ ہیں طبیعت میں بے چینی گھبراہٹ موت کا ڈر۔ بخار کی تیزی چہرہ سرخ اور نبض تیز۔

✽ خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد

بیلادونا : یہ اس مرض کی مشہور دوائی ہے علامات اس کی یہ ہیں جلد پر چمکیلی سرخ دم ہو اور پھپھولے نہ ہو۔ بلکہ مہوار سرخ باد ہو سخت سر درد۔ پیاس۔ قبض اور سرخ کارمہا پیشاب غدد متورم اور قہیں آئیں۔ دماغ زیر اثر ہو۔ دم دماغ کی جانب بڑھ رہی ہو۔

ایکونائیٹ اور بیلادونا باری باری سے بھی دیتے ہیں۔ بعض مہموں پتیک ڈاکٹر بیلادونا مسکن کچر میں استعمال کرتے ہیں۔ یعنی دن میں پانچ یا چھ قطرے بیمار کو پلاتے ہیں۔

✽ خوراک : ۱x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد

ایپس : جب کہ سوزش زیادہ ہو اور نیش زنی کا سادرو ہو لیکن یہ سوزش بیلادونا کی قسم کا نہ ہو بلکہ بہت زیادہ ہو اور بجائے چہرہ سرخ ہونے کے سیاہی مائل ہو۔ اور پھپھولے نہ پیدا ہوئے ہوں

✽ خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : جب جسم کے جوڑ زیادہ متورم ہوں اور قبلائے مرض ہوں تو بیلادونا کی بجائے برائی اونیا دوائی مفید ہوتی ہے۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

✽ خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا : جب مرض کبھی جسم کے حصّہ میں ظاہر ہوا اور پھر فوراً ہی دوسرے حصّہ میں جانموا ہو۔ تو ایسی حالت میں پسٹلا بڑی مفید دوائی ہے۔ نیز جبکہ مرض تنزل پر ہوا اور معدّے میں نقص ہو۔

✽ خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد

رسٹاکس : پھپھولے دار سرخ باد۔ خواہ منہ پر ہو۔ خواہ کسی اور حصّہ جسم پر رنگت چمکیلی سرخ ہو۔

بعض ڈاکٹر صاحبان رسٹاکس اور بیلادونا باری باری سے دیتے ہیں اور ان کے تجربہ میں یہ عمل زیادہ مفید ہوتا ہے۔

✽ خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد

چانتا : گھنا سرخ باد شدید ہڈیان۔ نقاہت بدن میں کپکپی ہو اور کولیس کا خطرہ لگا ہو۔

ڈاکٹر جوزسٹ ایم۔ ڈی لکھتے ہیں کہ کئی سالوں سے سخت نقاہت کی حالت میں چانتا دوائی کا استعمال کرتا رہا اور یہ نہایت مفید ثابت ہوئی

✽ خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لاس : بیماری کی خراب حالتوں میں جبکہ نبض کمزور جسم ٹھنڈا۔ بخار نرم ہو۔ اور نقاہت سخت ہو اور بیماری موت کے منہ میں جا رہا ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے۔ چانتا دوائی پہلے دینی چاہیے۔ اور اگر چانتا خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکے تو پھر لاس دینی چاہیے۔

✽ خوراک : ۱۲x یا ۳۰x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم : جب کہ مریض سخت کمزور ہو اور بیماری طول پکڑتی جائے۔ حالت مریض خراب ہو۔ وجہ ہٹ کر پھرنے نکل آئیں۔ دورہ مرض لمبا ہوتا جاوے تو یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جلن شدت پیاس نہایت بے چینی اندوہین طبیعت اور بے قرار

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

اس کی علامات مخصوصہ ہیں -

✽ خورال:  $38^{\circ}$  یا  $40^{\circ}$  ہر تین گھنٹہ کے بعد -

گریفائیٹس: جب کہ بخار تیز ہو سیکن غارش بہت ہو -

✽ خورال:  $40^{\circ}$  دن میں تین مرتبہ -

کاربوئیکی: کو لپس کی حالت میں جب کہ مریض کا جسم ٹھنڈا ہو اور اس پر نچکا کرانے

کی خواہش ہو اور سخت کمزوری ہو -

✽ خورال:  $38^{\circ}$  یا  $40^{\circ}$  ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد

## ضروری ہدایات:

درد کو کم کرنے کے لیے گرم تر کپڑے سے ٹکڑ کر کے چلہیے۔ گرم پانی میں تین چار

قطرے آرنیکا، مدرنک، پیرٹاکس، مدرنک، پیرٹاکس کے ملا لینے چاہئیں اور اس میں کپڑا تھام

کر کے زخموں پر رکھنا چاہیے -

زخموں کے اوپر سندھیا اور بورک ایڈاپٹ کر چھڑک دینے چاہئیں اور اوپر سوئی رکھ

دینی چاہیے۔ سردی پہنچانے سے بیماری زیادہ پھیلتی ہے - اس لیے زخموں کو سردی نہیں

پہنچانی چاہیے۔ ٹینکچر سیل ماؤف مقام پر لگانی چاہیے -

## غذا

سادہ پانی یا بانے واٹر آتش جو یا تھوڑا لیموں کا رس شامل کر کے دینا چاہیے۔ اس

سے پیاس کو تسکین ہوتی ہے - جوں جوں حالت مریض بہتر ہوتی جائے اس کو مقوی

غذا دینی چاہیے اس بیماری میں تانا ہوا دینی مزوری ہے جیسے دیگر شدید اور

حاد امراض میں تیمار دار اور معالج کو بیمار کی چھوٹ سے بچنے کے لیے صاف ستھرا

رہنا چاہیے -

~~~~~

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

# ہیضہ - کالرا

(CHOLERA)

جن امراض میں ہومیو پیتھی نے کمال کر دکھلایا ہے۔ ان میں سے ایک ہیضہ بھی ہے۔ ہیضہ اور دیگر ملک امراض کے روک تھام اور علاج میں ہومیو پیتھی کی فضیلت اور برتری کے باعث یہ طریق علاج تمام دنیا میں دفعۃً پھیل گیا ہے اور پھلتا جا رہا ہے۔ سرکار انگلشیہ کی پارلیمنٹ نے بھی ۱۱ مئی ۱۸۵۵ء کو یہ رپورٹ شائع کر کے کہ ہیضہ کے علاج میں ہومیو پیتھک علاج سے قریباً ۱۶ فی صدی اور ایلو پیتھک ہسپتالوں میں قریباً ۵۹ فی صدی موت ہوئیں۔ ہومیو پیتھک علاج کی برتری کی تصدیق کی ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر ممالک کی گورنمنٹوں نے بھی اس امر کی تائید کی ہے۔

یہ بیان کرنا بھی لطف سے خالی نہیں ہے کہ جب ڈاکٹر بنیمن کے روبرو اس کے شاگردوں نے ہیضہ کی علامات بیان کیں تو بنیمن اعظم نے بدوں ہیضہ کے کیس دیکھے۔ دوا بتلا دیں۔ محض اس اصول کی بنا پر کہ یہ ادویات فرداً فرداً زیادہ مقدار میں تندرست، اشخاص کو دی ہوئی اسی قسم کی مشابہ علامت پیدا کرتی تھیں۔ جب بنیمن صاحب کی بتلائی ہوئی ادویات کو شاگردوں نے آزمایا تو ان کو بالکل ٹھیک پایا۔ ہومیو پیتھک اصول کی یہ ایک بڑی بھاری فتح تھی۔ پس ہومیو پیتھک ڈاکٹر کو اگر دوائی کے اثر سے پوری قنیت ہو اور وہ جانتا ہو کہ فلاں دوائی کے علامات فلاں فلاں ہیں۔ تو اگر ایسے علامات ایک بیمار میں پائے جائیں خواہ اس قسم کے مریض کا علاج اس ڈاکٹر نے پہلے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ تو بھی اس دوائی کے دینے سے مریض کو شفا ہو جائے گی۔ یہ ہومیو پیتھک اصول کی شاندار برتری اور فضیلت ہے۔

## اسباب مرض

یہ مرض چھوت سے پھیلتا ہے۔ سبب اس کا جراثیم ہیضہ ہیں جو کہ تندرست اشخاص کی انتڑیوں میں پہنچ کر اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ جراثیم بذریعہ اشیاء خوردنی و نوشہدنی تندرست اشخاص کے جسم میں پہنچتے ہیں۔ بعض اوقات کنوئیں یا چشمہ یا تالاب

کاپانی ان جراثیم سے پرہیز ہوتا ہے اور مرض کے پھیلائے کا باعث ہوتا ہے۔ یہ مرض اس طرح سے وباؤ پھیلاتا ہے۔ موسم گرما اور برسات میں اس مرض کا زیادہ زور ہوتا ہے۔ جن اشخاص کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے یا جو نازک مزاج اور قد پوک ہوتے ہیں۔ ان کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ دیگر تکان۔ خوف زدہ ترس۔ بے خوابی۔ ایام ہیضہ میں تیز جلاب لینا۔ گندگی اور ناپاکیزگی غذا کی بد پرہیزی مثلاً کھانا گوشت یا مچھلی یا پھل کھانا اور اسی طرح سے تربوز۔ آم۔ کھیرے۔ لکڑیاں۔ تربوز۔ زیادہ کھانے اور نیم بختہ مرغن اشیا رطائی دار برف یا قلعی یا زیادہ برف پینا یہ سب اس بیماری کے اسباب مؤیدہ ہیں۔

## علاماتِ مرض

ہیضہ کی علامات مختلف درجوں میں مختلف ہوا کرتی ہیں اور بیماری کے ہر ایک درجہ کا جہاں آگے چل کر علاج درست کیا گیا ہے۔ وہاں اس درجہ میں علاماتِ مرض بھی بیان کی گئی ہیں۔ مختصراً علامات یہ ہیں :-

شدید قہقہیں اور اسہال اکثر چاروں کی پیچھے کی مانند اسہال بے حد کمزوری۔ آنکھیں اندر گھسی ہوئیں۔ مرونی چہرہ۔ بھاری آواز۔ کٹل۔ تشنچ۔ جسم سرد اور سرد پینہ (رتیلی) سے تربتر۔ نبض نہایت ہی باریک اور کمزور۔ بعض اوقات نبض معلوم ہی نہ پڑے۔ شدتِ پیاس۔ بے چینی۔ پیشاب تھوڑا یا بالکل بند۔ بڈیان تینگی تنفس وغیرہ وغیرہ۔

## علاج کی سہولت کیلئے ہم مرض کو مندرجہ ذیل درجوں میں تقسیم کرتے ہیں

درجہ اول یا ابتدائے مرض جب مرض کی ابتدائی علامات آشکارا ہوتی ہیں

درجہ دوم یا ترقی مرض جب مرض کی تمام علامات آشکارا ہوتی ہوں

درجہ سوم یا درجہ ضعف و نقاہت (کوئیس سٹیج)

درجہ چہارم یا درجہ انحطاطِ مرض (سٹیج آف دی ایکشن) مرض کے گھٹنے کا زمانہ

درجہ پنجم یا عوارض و نتائجِ مرض کا زمانہ (سٹیج آف سی کوئیس)

جب مرض شدید قسم کا ہوتا ہے تو درجہ ابتدائی کا اظہار پورے طور سے ہونے

نہیں پاتا کہ مرض کا دوسرا درجہ شروع ہو جاتا ہے لیکن عام حالتوں میں درجہ اول کا اظہار

واضح طور پر ہوتا ہے۔ اس درجہ میں علاج کرنا مفید ہوا کرتا ہے۔ تاکہ مرض ترقی نہ پائے۔ جب مرض شدید قسم کا نہیں ہوتا۔ تو پانچویں درجہ تک نوبت نہیں پہنچتی۔ سچ پوچھو تو تیسرا اور پانچواں دونوں ہی خوفناک درجے ہیں اور موت عموماً ان دونوں درجوں میں واقعہ ہوتی ہے۔

۱۔ درجہ اول یا ابتدائے مرض۔ اس کی بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ عموماً یہ حالت چند گھنٹے رہتی ہے۔ بعض حالتوں میں چند دن بھی رہتی ہے۔ اس کی میعاد اور سختی مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ باضمہ میں نقص واقع ہوتا ہے اکثر اوقات پہلے روتی رہتی ہے اور بھوک نہیں لگتی۔ یہ علامات مرض کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں۔ خاص کر جب کہ ہیضہ کی بیماری اس مقام میں موجود ہو۔ اکثر ان علامات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ مریض اپنے کام کاج میں لگا رہتا ہے اور وہ خوراک وغیرہ بدستور کھاتا رہتا ہے۔ مرض کا باعث صرف بُری خوراک ہی نہیں ہوتی بلکہ خوراک کی کم و بیش مقدار بھی ہوتی ہے۔ درجہ ابتر یا تھک کے اختتام پر چاول کی پیچھ کی طرح دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی درجہ اول وہ زمانہ ہے جبکہ معدہ میں فتور واقع ہو اور پیٹ میں کم و بیش درد ہو۔ اور اس درجہ کا اختتام اس وقت سمجھنا چاہیے جبکہ چاول کی پیچھ کی طرح کے دبیت آنے شروع ہو جائیں۔ اس مرض کے موٹے موٹے اسباب یہ ہوا کرتے ہیں۔ کھٹے کچے بعض اوقات اگلے سڑے پھلوں کا کھانا۔ ہندو پاک میں غریب آدمیوں میں نئے چاولوں کا استعمال اس مرض کے پیدا کرنے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تیل یا چربی کی بنی ہوئی چیزیں کچی یا سڑی یا باسی غذا کم نمک والی یا زیادہ نمک والی غذا بے وقت غذا کا کھانا۔ زیادہ شراب کا پینا۔ یہ سب اس بیماری کے اسباب مؤبدہ ہوا کرتے ہیں۔

مرض کے ابتداء میں علاج زیادہ مشکل ہوا کرتا ہے۔ اسی علاج پر تو آئندہ مرض کی حالت اور دورہ منحصر ہے۔ ہمارا یہ دعوئے نہیں ہے کہ خواہ مرض کسی حالت میں ہو۔ اس کا آرام ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا دعوئے پورے وثوق سے ہے کہ ہومیو پتھک ادویات سے ہیضہ کا قرار واقعی علاج ہو سکتا ہے اور اموات کی تعداد بہت ہی کم ہو سکتی ہے۔ اس بات کا معلوم کرنا نہایت ضروری ہوا کرتا ہے کہ کونسا سبب ہوا



ہے جس سے مرض پیدا ہوا ہے یعنی خور و نوش میں کیا غیر معمولی غلطی واقع ہوئی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ مرض ہے۔

ہومیو پیتھک ڈاکٹر کا فرض اقل یہ ہے کہ وہ بیمار کی پہلی بہترین کواچھی طرف سے جانے تاکہ اس کو معلوم ہو سکے کہ مرض کے پیدا ہونے کا کیا سبب واقع ہوا ہے اور سبب کو دریافت کرنے سے کبھی نہیں چوکتا چاہیے۔ لیکن اگر سبب معلوم نہ ہو۔ تو ڈاکٹر کو وہاں نہیں ہونا چاہیے اور سبب کے دریافت کرنے پر سوال کرتے جانا چاہیے اور اس کو نہ چوکتا چاہیے جب تک کہ وہ سبب نہ دریافت نہ کرے۔ کیونکہ سبب کا معلوم کرنا ایک ضروری امر ہوا کرتا ہے اور اس کے علاج میں مدد دلا کرتی ہے۔ ابتدائی درجہ میں علاج کرنے کا یہ فائدہ منظور ہے کہ معدہ و امعاء کی خراش کو دور کرے اور جسم کو کمزور ہونے سے بچائے۔

## علاج

کیمفر۔ درجہ ابتدائیہ میں کیمفر ایک نہایت ہی مفید دوائی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں۔ بیمار کی طاقت آنا فنا زائل ہو جاتی ہے۔ وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ آنکھیں اندر گھس جاتی ہیں۔ چہرہ ٹھنڈا ٹھار اور نیگیوں ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کی بھی چہرہ کی مانند حالت ہوتی ہے اور باقی بھی تمام بدن ٹھنڈا ہوتا ہے۔ بیمار سخت پست ہمت اور غمگین ہو جاتا ہے۔ اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دم گھٹنے لگا ہے۔ نیم بے ہوشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کوئی خاص شکایت بیماری کے متعلق نہیں کرتا۔ صرف اس قدر کہتا ہے کہ معدہ اور خوراک کی نالی میں جلن ہے اور پنڈلیوں میں کڑل پڑتے ہیں۔

حالت ابتدائیہ میں کیمفر ایک بڑی مطلب کی چیز ہے۔ بیماری کا اظہار ہوتے ہی یہ دوائی دینی چاہیے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو نئی یہ علامات آشکارا ہوں۔ فوراً ہی یہ دوائی دینی چاہیے۔ اکثر اوقات یہ ابتدائی حالت ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی یا تو درجہ دوم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یا موت لاحق ہو جاتی ہے۔

یہ دوائی بہ ایک گھبر میں موجود رہنی چاہیے۔ تاکہ ابتدائی حالت میں فوراً دی

جاسکے کیونکہ جب مرض دوسرے درجہ میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کیمفر کارآمد چیز نہیں رہتی۔ اگرچہ ڈاکٹر روبینی صاحب کا قول ہے کہ کیمفر سراسر ایک درجہ میں کارآمد چیز ہے۔ اگرچہ کئی فاکٹر صاحبان اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب مرض ابتدائی درجہ سے گزر جائے تو پھر دو تین خوراکیں کیمفر سے آرام آجائے تو اچھا وگرنہ اور کوئی مناسب دوائی دینی چاہیے۔

البتہ جب مرض کا ایوینٹیک ڈاکٹر علاج کر رہا ہو اور پھر وہ مریض ہو میوینٹیک ڈاکٹر کے زلم علاج آدے تو پہلے دو تین خوراکیں کیمفر کی دینی چاہئیں۔ اگر حالت بہتر نہ ہو تو اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ وگرنہ اور مناسب دوائی دینی چاہیے۔ مناسب دوائی سے وہ دوائی مراد ہے جس کی علامات بیماری کی علامات سے مشابہ ہوں۔

✽ خوراک: مدر شکم ۱۰ x ۱۰ استعمال کرنی چاہیے اور یہ کیمفر ہو میوینٹیک طریقہ بہ تیار کی گئی ہو۔ بازاری کافور کے عرق کے نام سے لئی ادویات فروخت ہوتی ہیں۔ لیکن ہو میوینٹیک مدر شکم لینا چاہیے۔

تین بوندیں مدر شکم یا نمبر ۱ کی تھوڑی سی کھانڈ پر ڈال کر دینی چاہئیں۔ اور اسی طرح سے دس دس بیس بیس منٹ کے وقفہ کے بعد دینی چاہیے۔ ڈاکٹر روبینی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے پانصد ہیفیہ کے مریضوں کا علاج کیا اور ایک میں بھی ناکامی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے دوسرے ڈاکٹر صاحبان بھی دعوے کرتے ہیں۔

حفظِ التقدیم کے طور پر کیمفر کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے۔ ہیفیہ کے موسم میں اس کو استعمال کرنا بیماری سے اکثر بچائے رکھتا ہے۔ اس مطلب کے لیے روبینی صاحب کی بنائی ہوئی کیمفر پلنڈ یا عرق کیمفر استعمال کرنا مفید ہے۔

اگر کیمفر دینے کا وقت گزر گیا ہو یا کیمفر کی علامات موجود نہ ہوں تو مندرجہ ذیل

ادویات میں سے کوئی دوائی جس کی علامات بیماری کے مشابہ ہوں دینی چاہیے۔  
ایکونائٹ : ہیفنہ کے علاج میں یہ بھی بڑی کارآمد دوائی ہے بیماری کی حسب ذیل  
علامات میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔

اُباق بھی آویں اور سپینہ بھی آوے خواہ دست آنے سے پہلے آویں خواہ پیچھے۔  
دستوں کی رنگت سفید ہو۔ لیکن پیشاب کی رنگت سرخ ہو۔ مریض کو ایسا معلوم  
ہو کہ صرف ہوا خارج ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ہمراہ پتلا پاخانہ بھی خارج ہو  
جائے۔ جب اسہال پانی ہی پانی آتے ہوں۔ جب اسہال سبز یا سیاہ یا مٹیالے  
رنگ کے بڑے بدبودار آتے ہوں۔ پاخانہ اور پیشاب بے اختیار نکل جاتے ہوں  
جب پیٹ چھونے پر درد کرے جبکہ مہلات کے باعث انتہائی کمزور ہو چکی  
ہوں اور بار بار دست آتے ہوں جب پاخانہ کے راستہ گرم گرم پانی نکلتا ہو۔ تو  
یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

ایکونائٹ میں دل کی حالت بھی قابل غور ہے۔ سخت بے چینی و ترو و  
موت کا ڈر۔ دماغی کام کی طرف بے توجہی۔ ایکونائٹ میں یا تو غضب کی  
پیاس ہوتی ہے جو کہ بجھنے میں نہیں آتی۔ یا نہ ٹھنڈا اور خشک رہتا ہے۔ اور  
پیاس نہیں لگتی۔ ایکونائٹ ترقی مرض میں بھی استعمال ہوتی ہے یعنی درجہ دوم  
میں بھی اس موقع پر اس کا مناسب ذکر کیا جائے گا۔

✽ خود اٹ : ۱ x یا ۳ x ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد

اپنی کاک : زبان کی رنگت سفید ہو اور خالی اُباق بہت آویں۔ ایسا محسوس ہو کہ معدہ  
بجاری ناقابل ہضم غذا سے لدا ہوا۔ دست آتے وقت پیٹ میں درد اور  
مروڑ پڑیں اور بار بار کو منتھنا اور زور لگانا پڑے پاخانے کا رنگ گھاس کی مانند  
سبز یا خٹل لیموں کے زرد ہو اور ایسا معلوم ہو جیسے خمیر اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔  
پاخانہ بدبودار اور خون آلودہ ہو۔ اپنی کاک اور کمیلا دونوں ہی مفید ادویات

لے اُبلانی

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

ہیں جب کہ بچوں کو مہینہ کی شکایت ہو کمیو میلا خاص کر زیادہ مفید ہے جبکہ اسہال دانت نکلنے کی وجہ سے آتے ہوں۔

✽ خوراک : ۳x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم : جب میوہ جات کھانے کی وجہ سے معدہ میں خرابی واقع ہو۔ اسہال بڑے ٹکڑے۔ بدبودار اور پانی ہی پانی آویں اور جس حصہ جسم میں سے گزریں اس کو ہلاتے جاویں۔ رات کو بیماری میں زیادتی ہو اور خاص کر نیم شب کے بعد جب معدہ میں جلن ہو۔ معدہ اور چھوٹی انٹریوں میں خرابی واقع ہو۔ پیاس کی شدت تو ہو لیکن بیمار بار بار اور گھونٹ گھونٹ پانی پیوے۔ بہت پانی نہ پیوے۔ جب باسی خوراک کھانے یا قلعی یا ملائی دار برف یا برف پینے کے باعث مرض پیدا ہوا ہو۔ تو آر سینکیم بڑی اکسیر دوائی ہے۔ معدہ میں جلن، سخت بے چینی، بیمار ہی پکارے، میں مر گیا۔ موت کا خوف و انگیز ہو اور نبض بہت کمزور چلے۔ یہ آر سینکیم کی خاص علامات ہیں، آر سینکیم درجہ دوم و سوم میں بھی بڑی کارآمد دوائی ثابت ہوتی ہے۔ ان موقعوں پر اس کا مناسب ذکر کیا جائیگا۔

✽ خوراک : ۳x یا ۴x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پہانتا : جب میوہ جات کے کھانے سے معدہ میں خرابی واقع ہو جائے۔ اسہال بڑے ٹکڑے۔ بدبودار اور پانی ہی پانی آویں یا باخانہ کے ساتھ کچی غذا باہر نکلے اور اپھارہ ہو دست آنے سے پہلے اپھارہ بہت ہو۔ لیکن جب دست آچکے تو اپھارے کو آرام ہو جائے جب کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مریض جریان منی یا سیلان خون کے مرض کا شکار رہ چکا ہے۔ جب کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آواز سنائی دیوے تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

✽ خوراک : ۱x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پلٹلا : جب اسہال مرغن اور تر چیزوں کے کھانے سے پیدا ہوں۔ جبکہ خسرہ کے مرض کے بعد اسہال شروع ہوں۔ جبکہ اسہال رات کو بہت آویں جبکہ اسہال

پھٹکی پھٹکی آویں۔ دستوں کی رنگت پہلے سبز ہو۔ پھر آنوں آوے۔ مستورا اور نرم مزاج آدمیوں کے لیے پستلا بڑی مفید دوائی ہے۔ مریضوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے۔ کہ جب اپنی بیماری کا ذکر ڈاکٹر کے روبرو کرتے لگتے ہیں۔ تو رور و کر ذکر کرتے ہیں۔ پیاس کا نہ لگنا اور تازہ ہوا کی خواہش کا رہنا پستلا کی خاص دو علامات ہیں۔

✽ خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک گھنٹہ یا دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : جبکہ قبل ظہور مرض مریض نے نشہ استعمال کیا ہو۔ خواہ خالی پیٹ یا ہمراہ غذا کے جبکہ معدہ میں کھٹائی کا زور ہو۔ خاص کر جبکہ پہلے قبض رہی ہو۔ پھر دست آنے شروع ہو گئے ہوں۔ جبکہ اسہال صبح کے وقت آویں یا دوپہر کی خوراک کے بعد آویں۔ جب کہ اسہال بدبودار اور صفراوی ہوں۔ جبکہ پاخانہ کی حاجت بار بار ہو۔ لیکن پاخانہ کھل کر نہ آوے یہ دوائی چرچ چڑی طبیعت کے آدمیوں کے لیے زیادہ موزوں ہوا کرتی ہے۔

✽ خوراک : ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد

فا سفورس یا فاسفورک ایسڈ : جب مزمن اسہال سے ہیفہ کا مرض پیدا اور اسہال کے ہمراہ درونہ ہوتا ہو۔ جب ایسا محسوس ہو کہ جائے پاخانہ کھلی ہے اور اس میں سے پاخانہ متواتر نکل رہا ہے۔ جب مریض بوڑھا ہو۔ اور اس کے جگر اور دیگر اعضاء میں چربی کی کمی واقع ہو تو ایسی حالت میں فاسفورس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جب مرض کے حملہ آور ہونے سے پہلے یہ یقین ہو جائے کہ مریض نے جماع میں بے اعتدالی کی ہے تو ایسی حالت میں فاسفورک ایسڈ مفید پڑتی ہے۔ فاسفورس کا مریض دہلا اور پتلا ہوتا ہے۔ لیکن فاسفورک ایسڈ کا مریض وہ نوجوان مریض ہے جو کہ قدمیں بہت جلد بڑھ گیا ہو۔ جب مریض بائیں پہلو نہ لیٹ سکے اور ایسا کرنے سے مرض میں زیادتی ہو تو فاسفورس اور جب دائیں پہلو سونے سے مرض کی

زیادتی ہو۔ تو فاسفورک ایسڈ دینا مفید ہوتا ہے۔ مشترکہ علامات دونوں ادویات کی یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد مرض کی زیادتی ہوا کرتی ہے۔ لیکن فاسفورس کے مریض میں زیادتی مرض گرم غذا کھانے سے ہوتی ہے۔

✽ خوراک : ۶x یا ۳۰x ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

کار بوویجی ٹیمپلس مرض شروع ہونے سے پہلے جب مریض کو دھوپ یا اس کی گرمی دیر تک برداشت کوئی پڑی ہو تو کار بوویجی ٹیمپلس مفید ہوتی ہے۔ جیسے باور چیموں۔ معمروں۔ لوہاروں اور ان تمام پیشہوروں کے لیے جن کو دھوپ یا آگ کی گرمی میں کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک مفید دوائی ہے۔ بعض اوقات انتڑیوں سے خون بہنے کی وجہ سے مرض ہیضہ آدبانا ہے۔ ایسی حالت میں کار بوویجی ٹیمپلس نہایت ہی کارآمد دوائی ثابت ہوتی ہے۔ جب اسہال کے ہمراہ اچھارہ غضب کا ہو۔ تو یہ ایک بڑی مفید دوائی پڑتی ہے۔ نیز جب اسہال کی رنگت نیم گلابی رنگ کی ہو اور بالکل خونی نہ ہوں کار بوویجی ٹیمپلس کی خاص علامت یہ ہے کہ جسم کی حرارت غریزی کم ہو جاتی ہے۔ زبان اور سانس ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔

✽ خوراک : ۳x یا ۶x یا ۳۰x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیلا : جب غم اور غصہ کی وجہ سے مرض پیدا ہو۔ کیمومیلا کے اسہال کی یہ علامت ہے کہ رفع حاجت کے بعد درد کا آرام آجایا کرتا ہے۔ بیمار شکایت کرتے کرتے کبھی نہیں تھکتا اور وہ پرانے عوارض کا لمبا چوڑا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اسہال بدبودار جلن پیدا کرنے والے اور گرم آتے ہوں۔ بچوں کے اسہال آنے میں جب کہ دانت نکل رہے ہوں بہ بڑی کارآمد دوائی ہے۔

✽ خوراک : ۲x یا ۳x ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد

کالوسنتھ : جب غم اور غصہ کے مشترکہ اثر سے مرض پیدا ہو۔ جب رفع حاجت کے بعد بھی درد بدستور رہے۔ درد سے مریض دوہرا ہوتا جاتا ہو اور دوہرا

ہونے سے کسی قدر آرام معلوم دیتا ہو۔ اسہال بدبودار۔ جلن کرنے والے اور جھاگ کی مانند آتے ہوں۔ کالوشنتھ میں وروناف کے ارد گرد ہوتا ہے۔ اور درد بڑا سخت ہوتا ہے۔ جب دست بہت سارے آچکے ہوں۔ تب درد کا افاقہ ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔  
 ✽ خورال : ۱x یا ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : درجہ ابتدائیہ میں سلفر نہایت کارآمد ہوتی ہے۔ اسہال علی الصبح آتے ہوں اور اتنی فرصت نہ لینے دیتے ہوں۔ کہ بیمار بستر سے اٹھ سکے۔ سخت گرم دست یا صرف پانی پانی آتے ہوں یا کچھ پانی اور کچھ غذا ساتھ نکل جاتی ہو۔ دست بدبودار آتے ہوں۔ اچانک زور سے نکل جاتے ہوں۔ سلفر کی خاص علامت یہ ہے کہ پیشاب آتے وقت راستہ میں جلن پیدا ہوتی ہو اور اسی طرح سے آنسو بھی جس حصہ جسم سے گزرتے ہیں جلن پیدا کرتے ہیں اور اسہال جھاگ کی مانند آتے ہیں اور پاخانہ آتے وقت یا بعد پاخانہ کا نیچ کا نکلنا بھی سلفر کی خاص علامت ہے۔

✽ خورال : ۳x یا ۳۰ ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد۔

ایلووز : ایلوز اور سلفر کی علامات بہت سی مشترکہ ہیں۔ یعنی اسہال علی الصبح آتے ہیں اور بستر سے اٹھنے کی فرصت نہیں لینے دیتے۔ گرم ہوتے ہیں۔ لیکن اتنے گرم نہیں ہوتے جتنے سلفر کے۔ سلفر کے اسہال جس جگہ کو لگتے ہیں جلا دیتے ہیں۔ لیکن ایلوز کے جلاتے نہیں ہیں۔ گرم ہوتے ہیں۔

ایلووز کے اسہال کی خاص علامت یہ ہے کہ ایلوز کے اسہال زور سے نکلتے ہیں۔ پیشاب یا عموماً کے خارج ہونے کے وقت خود بخود نکل جاتے ہیں۔ زور بالکل لگانا نہیں پڑتا اور دست نکل جاتا ہے۔ اس طرح سے نکلتا ہے۔ گویا کہ جائے پاخانہ سے کسی نے گرا دیا ہے۔ پیاس

کی زیادتی۔ سپرائزیشنل ہاتھ کا درد۔ ٹھنڈے پانی سے نفرت خوراک کا ذائقہ بے ہوئے۔ ڈکار قبل از دست پیت میں گڑگڑ کی آواز یہ علامتا عامہ ہیں۔  
\* خوراک : ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پوڈوفائلیم۔ یہ بھی درجہ ابتدائیہ میں ایک قیمتی دوائی ہے بر محل استعمال کرنے سے بیماری کی ترقی سدود ہو جاتی ہے۔ ایلوڑ اور سلفر کی مانند گرم اور آبی دست ہوتے ہیں۔ صبح کو تو دست آتے ہیں لیکن شام کو تندرستوں کی مانند ٹھیک پاخانہ آتا ہے۔ سلفر کی مانند اس کے دست جھاک دار ہوتے ہیں اور کانچ بھی نکلتی ہے پوڈوفائلیم کی خاص علامت یہ ہے کہ اس کے اسہال ہی گرم نہیں ہوتے۔ بلکہ تھے بھی گرم ہوتی ہے اور ماسوائے فاسفورس کے باقی ادویات میں یہ علامات نہیں پائی جاتیں۔ عام خاصہ اس دوائی کا پیاس کی کمی ہے۔ مندرجہ بالا علامات کے ہمراہ جب پیاس نہ ہو تو یہ دوائی بڑی اعلیٰ کام کرتی ہے۔ بیمار کی ٹانگوں پاؤں۔ پنڈلیوں اور رانوں میں کٹل پڑتے ہیں۔ یہ دوائی ان اشخاص کے لیے زیادہ مفید ہے جن کو صفراوی سر درد ہوتا ہو اور جب سر درد کی شکایت دور ہو تو دست آنے شروع ہو جائیں اور اسی طرح سے جب دست آنے بند ہو جائیں تو پھر سر درد شروع ہو جائے۔ جب کھٹے پھل کھانے کے بعد دودھ پیا جائے تو اسہال جاری ہو جائیں ایسی حالت میں یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے بچوں کے ہیضہ میں جبکہ دانت نکلنے کا زمانہ ہو آبی اسہال اور تھے شروع ہو جائیں بچہ بڑ بڑائے اور بے چین ہو۔ گھوم پڑا رہے اور سوتے وقت آنکھیں نیم وا رہیں کھلی ہیں۔ دانت پیسے، سرانے پر سر کبھی ادھر مارے کبھی ادھر تو یہ کار آمد دوائی ہے۔

\* خوراک : ۱x یا ۳x ہر ایک یا دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔  
کاپچی کم۔ جب لگاتار کھلے آبی اسہال عموماً پیلے اور پلادرد۔ بعض اوقات خود بخود اور یہاں تک کہ بیمار کو معلوم بھی نہ ہو اور دست نکلتے جاویں تو یہ دوائی بڑی مفید



پڑتی ہے۔ دست بد بودار ہوتے ہیں اور اس حصہ جسم کو جلانے والے ہوتے ہیں۔  
جس حصہ ہڈی سے گزرتے ہیں

✽ خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کینتھرس : ہیفہ کے درجہ ابتدائیہ میں یہ بھی ایک کارآمد دوائی ہے۔ اگرچہ یہ استعمال  
بہت کم موقعوں پر ہوتی ہے۔ لیکن جب اس کی علامات موجود ہوں تو یہ  
حیرت انگیز اثر کرتی ہے اس کی خاص علامات یہ ہیں۔

اسہال کی زیادتی۔ جلنے پاخانہ میں غضب کی جلن۔ اسہال جھاگ دار سپانی پانی۔  
بہت مقدار میں اور کمزور کرنے والے ہوتے ہیں۔ کینتھرس کی خاص علامت یہ  
ہے کہ اس کے اسہال میں انٹریوں کے ٹکڑے آتے ہیں اور اگر ان علامات  
کے ساتھ شیب کی حاجت بار بار ہو تو پھر یہ دوائی جادو کا اثر کرتی ہے اور کبھی  
مایوسی نہیں ہوتی۔

✽ خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

آئرس ورسی کولر۔ اسہال دونوں قسم کے ہوتے ہیں۔ صاف لمبہ بھی ہوتے  
ہیں اور پانی پانی بھی ہوتے ہیں۔ مقدار بہت زیادہ جیسے ندی چل پڑی ہے۔  
اسہال کے ہمراہ ناہضم شدہ غذائیں نکل جاتی ہیں اور اسہال کی زیادتی صبح اور  
شام کے کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ زیادہ خصوصیت یہ ہے کہ دست آتے  
وقت مقعد میں غضب کی جلن ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی  
ہے۔ یہ جلن بعض اوقات خوراک کی تمام نالی میں یعنی مقعد سے گلے تک محسوس  
ہوتی ہے۔ پاخانہ موچکنے کے بعد بھی مقعد میں جلن رہتی ہے۔ اگرچہ حاجت کے  
بعد یہ کم ضرور ہو جاتی ہے۔ پاخانہ آنے سے پہلے انٹریوں میں غضب کی دردادہ  
گھبراہٹ ہوتی ہے۔ آئرس ورسی کولر میں تے غضب کی آتی ہے اور تے میں  
ناہضم شدہ غذائی ہوئی ہوتی ہے۔ جس میں سے بہت بر آتی ہے۔ یہ مادہ گلے  
میں سے گزرتے وقت اس کو جلاتا جاتا ہے۔ آغاز میں ہی نفاہت اور کمزوری

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب : استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

غضب کی ہو جاتی ہے۔ اعضاء اور جسم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ دوائی ہیفہ کے ابتدائی درجہ میں بہت ہی مفید ہے  
 ✽ خوراک : ۱x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

## درجہ دوم یا ترقی مرض کا زمانہ

اس کی علامات یہ ہیں۔ تھے اور دستوں کی زیادتی۔ پیاس کی شدت۔ ادھر پانی پیا اور ادھر تھے آئی۔ سخت گھبراہٹ اور بے چینی۔ آنکھیں اندر کو گھسی جاتی ہیں اور کمزوری از حد بڑھ جاتی ہے۔ نبض کی کمزوری سخت بڑھ جاتی ہے۔ آواز بھاری اور جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ بدن اٹیٹھا ہے۔ کٹل پڑتے ہیں اور پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے۔

## ادویات جو اس درجہ میں بالعموم مستعمل ہوتی ہیں

۱۔ ورائٹرم ایلیم، ۲۔ آر سیکم، ۳۔ کوپریم، ۴۔ سیکل کارنیوٹم، ۵۔ ایکو نائٹم،

۶۔ کیمر۔  
 ورائٹرم ایلیم۔ غضب کے اُباق اور قہیں۔ قے کے ہمراہ غذا باہر نکلے۔ جب قے شروع ہو تو ایک ہی دم تین تین چار چار مرتبہ قے کا دورہ ہو اور قے آنے سے پہلے غضب کے اُباق آویں قے میں بدبودار مادہ خارج ہو پہلے کچھ کی مانند صفراوی مادہ خارج ہو۔ پھر سیاہ پت اور اخیر میں خون۔ قبل از قے تمام جسم میں کپکپی اور سہال بمقدار کثیر اور بہت زور کر کے آویں اور اسہال آتے وقت پینہ بہت آوے۔ خاص کر پیشانی پر سرد پینہ (تریلی) بہت آوے اور بعض اوقات خونی دست آویں۔ پینہ آتے وقت نہایت سخت پیاس لگے اور ٹھنڈے پانی کی طلب بہت ہو۔ زرد، مردنی چہرہ اور کچی تریلی منہ پر بدن ٹھنڈا، ناخن نیلے، اعضاء میں کٹل پٹلیوں میں کٹل۔ نبض بڑی سست۔ ایسی سست جیسے کہ چلتی نہیں ہے۔ ورائٹرم ایلیم کی موٹی موٹی چھ علامات یہ ہیں :- ۱۔ دست آنے سے پہلے شکم

میں دروہو، ۲۔ دست بمقدار کثیر اور نہایت زور سے خارج ہوں، ۳۔ دست آنے کے بعد نقابت بدرجہ کمال، ۴۔ اندر جلن کا احساس ہو، ۵۔ ٹھنڈا پسینہ (رتیلی)، آدے، ۶۔ جلد جسم ٹھنڈی ٹھار ہو۔

بخ: خوراک: ۳x یا ۶x ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔  
آر سینکیم کی علامات یہ ہیں:

غضب کی پیاس۔ پانی پینے کو دل کرے۔ لیکن پانی پینے سے تسکین نہ ہو۔ بیمار پانی پیے۔ لیکن تھوڑا تھوڑا پیوے۔ بعض اوقات اتنی پیاس کہ پانی بہت بہت اور ٹھنڈا پیوے۔ دس دس منٹ کے بعد صبح سے شام تک پانی پیتا جائے۔ لیکن رات کو پیاس نہ ہو۔ ادھر کھانا کھایا اور ادھر قے آئی۔ بغیر باقی آنے کے جو کچھ کھایا پیاس باہر نکل گیا اور منہ کا ذائقہ سخت کڑوا رہ گیا۔ جب قے بند ہوئی تو بے تحاشہ دست شروع ہو گئے۔ بعض اوقات دست اور قے دونوں ہی ایک ساتھ آتے ہیں۔ اندر غضب کی جلن اور پیاس اور نوت کا زبردست ڈر دست پانی پانی پیے رنگ کے اور تھوڑی مقدار میں آتے ہیں۔ دست آنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی اور دست آئے گا۔ معدہ میں غضب کی جلن جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ سخت بے چینی اور شکم میں دروہو، ڈاکٹر اکین صاحب کی انسائیکلو پیڈیا میں مزید علامات حسب ذیل ہیں:-

پانی پینے کے بعد قے آدے بعض اوقات فوراً ہی قے آجاوے۔ بعض اوقات پانی پینے سے قے کو آرام آجاوے سخت ضعف و نقابت نبض تیز کمزور اور بے قاعدہ چلے بعض اوقات نبض اتنی کمزور چلے کہ معلوم ہی نہ ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو۔ دست آنے کے بعد کمزوری محسوس ہو۔ دم کھچکر آوے اور اس سے فکر اندیشہ زیادہ ہو۔ ٹھنڈا پسینہ (رتیلی) تمام جسم پر آوے۔ مروہ کی مانند جسم۔ بے چینی فکر و تردد بیمار بار بار پہلو بدے۔ تھوڑے سے دروہے غضب کی نقابت پیدا ہو۔

اکثر وراثہ پہلے دیتے ہیں۔ اگر وراثہ ناکام رہے تو آر سینکیم دیتے ہیں۔ ہیفہ کی ان دونوں کی علامات ایسی مشترکہ ہیں کہ یہ تمیز کرنا بڑا مشکل ہے کہ وراثہ کا استعمال

درست ہے یا آر سینکیم کا۔ بعض ڈاکٹر صاحبان دونوں کو باری باری دیتے ہیں اور یہ علاج بڑا مفید پڑتا ہے۔

✽ خوراک : ۳ یا ۴ برہندہ یا بیس منٹ کے بعد۔

ورٹرم اور آر سینکیم۔ ایسی قیمتی ادویات ہیں کہ جب دیگر ڈاکٹر وید صاحبان مرض ہیفنہ کو لا علاج سمجھ کر چھوڑ جاویں تو اکثر اوقات ان دوائیوں کی برکت سے جان بچ جاتی ہے۔ جو صاحبان ہو میوہ تھک ادویات کی تھوڑی مقدار کا مضحکہ اڑاتے ہیں ان کو کالہ کے واقعہ پر ان دوائیوں کی عظمت کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے تھوڑی مقدار کی ایک دو خوراکیں تھے، دست، ڈانجھا اور گھبراہٹ کو دور کر دیتی ہیں۔ ہمیں اس موقع پر ایک کیس یاد آگیا ہے۔ جس کا ذکر ناظرین کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔

۱۹۱۶ء میں ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ اُس کے چہرہ پر اُدا سی تھی میں نے اس سے سبب پوچھا۔ اُس نے کہا کہ میری بہن جو کہ شادی شدہ ہے پر رسول سے ہیفنہ میں مبتلا ہے۔ بڑے چھوٹے سب ڈاکٹر علاج کر چکے ہیں اور اب اس کو لا علاج کر کے چھوڑ گئے ہیں۔ ایک سادھو کی تلاش میں جاتا ہوں شاید اس کی دُعا سے آرام ہو جائے میں نے اس سے دریافت کیا کہ اب اس کی کیا حالت ہے۔ اس نے کہا کہ دو دو منٹ کے بعد دست آتے ہیں اور خود بخود چار پانی پر نکل جاتے ہیں۔ پانی کی پیاس اس قسم کی ہے کہ کٹورہ منہ سے لگا تو ادھر پانی پیا اور اُدھرتے اور باقی آئے اور پانی باہر نکل گیا۔ گھبراہٹ غضب کی ہے۔ بے چینی از حد درجہ ہے۔ ہائے میں مر گئی، ہائے میں مر گئی۔ یہی آواز آتی ہے۔ پیشاب بالکل بند ہے۔ لیکن دست پانی ہی پانی آ رہے ہیں۔ گھبراہٹ کا یہ حال ہے کہ کبھی اس پہلو ہوتی ہے اور کبھی اس پہلو زیادہ جو خطرے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ دست بے تحاشہ آ رہے ہیں۔ گھر پر مایوسی کا عالم طاری ہے۔ زندگی کی کوئی اُمید نہیں۔ شاید کوئی اللہ کا پیارا ل جاوے اور دعا جان بخشی کر ا دیوے۔

میں نے اس سے کہا کہ اگر یہ علامات ایک گھنٹہ کے اندر اندر ہٹ جاویں تو پھر کیا۔ اس نے کہا کہ پھر ہماری قسمت کھل جاوے وہ میرے گلے کا ہار ہو گیا کہ آپ ضرور

چلیں۔ اس نے مہری دوائیوں والی چھوٹی صندوقچی کو اٹھا لیا اور میں بیمار کے مکان پر پہنچ گیا۔ میں نے جلتے ہی وراڑم کی خوراک دی پھر آرٹھینکیم کی۔ یہ سب میں نے نصف گھنٹہ کے اندر اندر دے دیں۔ اسے لو نہ دست نہ قے نہ ڈانچہ نہ اُباق نہ گھبراہٹ نہ بچپنی نہ فکر نہ تردد، مہینہ آرام میں ہو گئی اور سونے لگی۔ یہ ہے جادو ہو میو پیٹھک ادویات کا۔

## مقروض آویں اور ذرا ملاحظہ فرماویں

ایک واقعہ نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ہیں جبکہ ان ادویات نے آپ حیات کا کام کیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ بیمار کی علامات کا سمجھنا اور ادویات کی علامات کا علم ہونا۔ یہ ضروری ہیں۔ پھر دوائی جادو کا اثر کرتی ہے اور اگر یہ سمجھ میں نہ آوے تو خواہ ساری شیشیاں خالی کر دو کچھ نہیں بنتا اور اگر سمجھ میں آگیا تو ایک دو خوراکیں دوائی کی بیمار کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل سلامتی پر لے جاتی ہیں۔ مطالعہ کرو! مطالعہ کرو! مطالعہ!! پھر کامیابی کا سہرا آپ کے سر پہ ہے اور یقین جانو کہ بیمار کی زندگی کی کشتی جو کہ موت کی چٹان سے ٹکرا کر چکنا چور ہو چکی ہے۔ آپ صحیح سلامت ساحل پر لے جاسکتے ہیں۔

ہو میو پیٹھک علاج کو آسان مت سمجھو بلکہ مشکل ترین ہے لیکن ہے سائنٹیفک بے ضرر اور زوداثر۔ زندہ جاوید مہنی من کا نام طبی دسیا میں سورج کی مانند چمک رہا ہے اور جوں جوں سائنس کا راج ہوگا اور جہالت کا خاتمہ ہوگا یہ سورج پوری روشنی سے چمکے گا۔ بے اصولے علاج غائب اور خدائی اصول پر قائم علاج درختاں ہوگا۔

کو پیرم۔ جب تشنج شروع ہو جائیں اور کڑول پڑنے لگیں اور کیمفر کے دینے سے جلدی جلدی کوئی آرام آتا نظر نہ آوے تو کو پیرم ایک بڑی مفید دوائی ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں کو پیرم کا استعمال جاری کرنا چاہیے۔

ڈاکٹر مہنی من صاحب کا قول ہے کہ اگر کیمفر جلدی آرام دینے میں قاصر رہے کو پیرم بیماری کو جلدی شفا دیتی ہے۔ ڈاکٹر آل اور ڈاکٹر ڈورسیدیل اس کے زبردست مداح ہیں کیونکہ ان کے تجربہ میں آیا ہے کہ یہ بڑی مفید دوائی کالرا کے دوسرے درجہ میں ہے۔ ڈاکٹر پراپر صاحب بھی تشنج کے علاج میں اس کی تعریف کرتے ہیں ان کا قول ہے کہ کڑول میں یہ سب دوائیوں کی سرتاج دوائی ہے۔ ضعف

اور نقاہت میں بھی یہ دوائی بڑے کام کی چیز ہے۔  
 منہ کا زائقہ جیسا تا بنا گھلا ہوا ہے۔ گلے میں جلن اور ایسا معلوم ہو جیسے گلا گھٹا  
 جا رہا ہے۔ منہ سے رال ٹپکے۔ معدہ و معار میں شدید درد، اُبکائیاں اور قے اتنے  
 شدید کہ بند ہونے میں ہی نہ آئیں۔ اسہال بڑے کھلے کھلے بہ ہمراہی کڑل تشنچ اور بزیان  
 چہرہ زرد نیلگوں۔ مونٹ نیلے تمام جسم سرد ہونکھیں دبی ہوئیں۔ قوت گویائی بند۔ سرد  
 پانی پینے سے قے میں کسی قدر آفاقہ ہو یہ موٹی موٹی علامات کو پریم کی ہیں۔  
 خوراک: ۳۰ یا ۳۰۰ ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

سکیل۔ یہ دوائی بھی درجہ دوم میں دی جاتی ہے۔ جبکہ پیاس کی شدت۔ سخت  
 نقاہت اور چہرہ پر زردی چھائی ہوئی۔ اور چہرہ اندر کو گھسا ہوا۔ پیٹ میں  
 جلن اور پانی کی مانند تیلے تیلے اسہال، ہاتھ پاؤں برف کی مانند سرد لیکن بیمار اُن  
 کو ڈھانپنا پسند نہ کرے۔ شدید تشنچ ہاتھوں کی انگلیاں گویا کہ ہتھیلی میں  
 گھسی جا رہی ہیں۔ پیٹ میں گڑگڑاہٹ پانی گلے سے نیچے اُترتے وقت  
 جب معدہ میں جاتا ہے تو گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے ٹھنڈے  
 پانی کی بجائے بیمار گرم پانی پینا پسند کرتا ہے۔

خوراک: ۳۰ یا ۳۰۰ ہرنیم گھنٹہ بلکہ اس سے بھی پہلے۔

ایکونائٹ: جیسا کہ ہیضہ کے ابتدائی درجہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ایکونائٹ  
 بڑی کارآمد دوائی ہے۔ اسی طرح درجہ دوم میں بھی ایکونائٹ بڑی مفید  
 پڑتی ہے۔ جبکہ مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں۔ معدہ میں جلن اور ٹھنڈک  
 بلکہ ایسی جلن جو کہ معدہ سے شروع ہو کر خوراک کی تمام نالی میں منہ تک محسوس ہو  
 قے آوے اور قے کے بعد پیاس لگے۔ جب بیمار پانی پیوے تو پھر فوراً قے آکر  
 پانی باہر نکل جاوے پھر دوبارہ پیاس لگے پھر فوراً قے آوے اسی طرح سے  
 قے اور پیاس کا سلسلہ بند ہو جائے۔ بیمار کو سخت گھبراہٹ ہو۔ بعض اوقات  
 قے اور آبی دست دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ بعض اوقات بیمار خون کی

تے کرتا ہے اور قے کرنے کے بعد سپینے سے تر ہوتا ہے۔ چاول کے پانی کی مانند سہال بغیر کسی تکلیف کے آتے ہوں۔ بیمار کی شکل ڈراؤنی معلوم ہوتی ہے۔ اور ہونٹ سیاہ لاتھ پاؤں۔ ٹھنڈے۔ ناخن میلے، زبان سرد۔ پیشاب یا تو بالکل بند یا تھوڑا تھوڑا خارج ہوتا ہے اور جل کو تکلیف کے ساتھ آتا ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب ایکو نائٹ کی علامات کا اظہار ہو۔ خواہ درجہ دوم میں تو یہ دوائی کبھی خطر نہیں کرتی

یہ بیان کو نا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ کہ ۱۹۱۶ء کے موسم برسات کے اخیر میں آدمی رات کے وقت مجھے ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے بلایا گیا۔ بیمار ایک ۱۷، ۱۸ سالہ نوجوان تھا اور انٹرنس کلاس میں پڑھتا تھا۔ بیماری کی شکایت نوجوان کو صبح آٹھ بجے سے شروع ہوئی تھی اور قریباً ۱۶ گھنٹے کے بعد جب مجھے اس کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو اس میں خاص علامات یہ تھیں۔ بیمار بار بار پانی پیتا تھا اور پانی پینے کے ساتھ ہی فوراً قے آجاتی تھی قے آنے کے بعد فوراً ہی پھر وہ پانی پیتا تھا۔ ادھر پانی پیا اور قے گویا پانی پینے اور قے آنے کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ گھبراہٹ سخت تھی۔ بے چینی کی کوئی حد نہ تھی۔ گھر میں مایوسی کا عالم طاری تھا اور موت کا ڈر لگا ہوا تھا۔ صبح ۸ بجے سے حکیموں ڈاکٹروں اور ویدوں کا علاج شروع تھا۔ کئی علاج بدلے اور ادویات تبدیل کی گئیں۔ غرضیکہ جب سب اطراف سے مایوسی ہی مایوسی نظر آئی تو لواحقین کے دل میں ہومیو پیتھک علاج کا خیال آیا اور یہی سبب تھا کہ مجھے آدمی رات کو بلایا گیا تھا۔ علامات بغور ملاحظہ کرنے کے بعد میں نے ایکو نائٹ ۳۷ کی چند چھوٹی چھوٹی گویاں بیمار کی زبان پر رکھ دیں۔ بیمار نے پانی مانگا جو اس کو دیا گیا۔ پانی پیتے ہی قے آگئی۔ پھر بیمار نے پانی مانگا۔ میں نے پھر پانچ گویاں خورد بیمار کی زبان پر رکھ دیں اور بعد میں پانی دیا گیا۔ اب کی دفعہ قے نہیں آئی۔ اگرچہ گھبراہٹ زردوں پر تھی۔ غرضیکہ اسی طرح سے پانچ پانچ منٹ کے وقفہ کے بعد چار خوراکیں ایکو نائٹ کی بیمار کو دی گئیں۔ اب نہ بیاس رہی نہ قے نہ گھبراہٹ نہ بے چینی، لواحقین اور دیگر حاضرین ننھی ننھی گولیوں کا جادو نما اثر دیکھ کر حیران رہ گئے غرضیکہ بیمار سو گیا اور میں واپس اپنے مکان پر چلا آیا۔

میں اسی قسم کا ایک کیس میرے دوست ایک ایو پیتھک ڈاکٹر سب اسٹنٹ

بحرین نے بتلایا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک سب ڈویژنل آفیسر کی دختر اسی عارضہ میں مبتلا ہو گئی۔ بار بار پانی پیتی تھی اور تھے، کھچوڑتی تھی۔ گھبراہٹ اور بے چینی بہت تھی۔ جب پھوٹے بڑے ڈاکٹر صاحبان اس کے علاج میں ناکامیاب رہے تو والدین کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا موت دروازے پر کھڑی ڈاکٹروں کی ادویات پر منہس رہی ہو میرے دوست ہو میو پیچی سے قلعے واقف تھے۔ آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ ایسی حالت میں اگر ایکو نائیٹ دی جائے۔ تو جادو کا اثر کرتی ہے۔ چنانچہ جب لڑکی کو ایکو نائیٹ کی تین چار خوراکیں کھلائی گئیں تو بالکل تندرست ہو گئی۔ تب سے ہی یہ سب اسٹنٹ سرجن صاحب ڈاکٹر ہنری مین کے مداح بنے ہوئے ہیں۔

✽ خوراک : ۳ ہر پاؤ یا نیم پاؤ یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

کیمفر: جیسا کہ درجہ ابتدائے کے علاج میں کیمفر کا ذکر کیا گیا ہے۔ درجہ دوم یعنی ترقی مرض میں بھی یہ ایک کارآمد دوائی ہے۔ یہاں ہم پھر اس کے علامات کو دہراتے ہیں۔ طاقت زبیت سخت کمزور اندو گھین اور بے چینی۔ بیمار بستر پر پڑا ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پھر گر پڑتا ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں گرتا ہے اور چنچیں لگاتا ہے۔ گرد و نواح میں ایسا دیکھتا ہے۔ جیسے کوئی نشہ میں مخمور دیکھتا ہے۔ سر میں ایسا چکر کہ بیمار بیٹھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مبادا کہ وہ گر پڑے، چہرہ زرد اور اندر کو گھسا ہوا۔ نیلگوں بولنے میں سخت دقت۔ گفتگو متلی۔ پیاس کی زیادہ اور بیمار بدوں اشتہا کے پانی پیتا ہے اور تھے کر دیتا ہے۔ خاص کر یہ حالت صبح کے وقت ہوتی ہے۔ معدہ میں ٹھنڈک بعض اوقات معدہ میں سخت جلن چاول کے پانی جیسے پتلے اسہال۔ پیشاب یا تو قطرہ قطرہ آتا ہے۔ یا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور نبض کمزور پڑ جاتی ہیں اور رک رک کر حرکت کرتی ہے۔ بعض اوقات نبض ایسی کمزور ہو جاتی ہے کہ مشکل سے معلوم پڑتی ہے۔ تمام جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور توبلی سے تر بتر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں کیمفر مدرٹسکچر کے تین تین چار قطرے پتاشہ یا مصری پر



ٹال کر دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے وقفہ کے بعد بیمار کو کھلانے چاہئیں۔

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے (جن کا ذکر اُدپر آچکا ہے)

ترقی مرض کے زمانہ میں مندرجہ ذیل ادویات بھی بڑی مفید ہوتی ہیں۔ جب کہ

آن کی علامات موجود ہوں۔ جڑوفہ۔ اینٹیم مارٹ الاسٹرم۔ کروٹن ٹیکسیم۔ اپی کاک  
یوفوربیا۔ مرکبوریس کار وغیرہ

۲۔ تیسرا درجہ۔ یعنی زمانہ ضعف و نقاہت۔ ہیفنہ میں سب سے خطرناک

حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ مریض کو یس کی حالت میں جو اموات کی  
زیادہ تعداد اسی درجہ میں ہوا کرتی ہے۔ اس درجہ کا آغاز معلوم نہیں ہو سکتا۔

لیکن بیمار جب رو بخت ہونے لگے۔ یا موت واقع ہو۔ تب اس درجہ کا اختتام

سمجھنا چاہیے۔ معالج کو اس درجہ میں کامیابی تب ہی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ کو یس

کی حالت کا پورے طور سے نگراں رہے اور اس کے شروع ہونے اور اس کے اسباب

کو پورے طور سے دھیان میں رکھے۔ اس درجہ میں طاقت زسیت نہایت پست ہو

جاتی ہے اور جسم کے تمام اعضاء تحلیللی غذا اور اعضاء رطوبتی اپنا فعل چھوڑ

بیٹھتے ہیں اور اعضاء ریسہ مثلاً جگر۔ گردے۔ دل اور پھیپھڑے وغیرہ اپنا کام

چھوڑ جاتے ہیں۔ دل کی حرکت توقائم رہتی ہے۔ لیکن وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ

خون کو جسم میں نہیں دھکیل سکتا۔ یا قلت خون کے باعث خون کا اجرا خاں دل سے

نہیں ہو سکتا پھیپھڑے اپنا فعل سکرٹنے پھینکے کا تو کرتے ہیں۔ لیکن خون کو پورے

طور پر صاف ہوا سے مصفی نہیں کر سکتے۔ یعنی خون اچھی طرح سے شریخ نہیں ہو

سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجزائے خون میں آکسیجن جذب کرنے کی جو طاقت ہوتی

ہے وہ پست پڑ جاتی اور طاقت زسیت نہایت ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ نبض کے

چھوٹنے سے تپہ نہیں چلتا۔ تنفس یا تو بالکل دھیا چلتا ہے۔ یا اکثر حالات میں وقت

اور تنگی سے آتا ہے۔ بلکہ بیمار سسکیاں بھرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ دم کشی زیادہ

مشکل ہو۔

جسم جو پیلے گرم تھا اب برف کی مانند ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور خوبصورت

رنگت جسم جو کہ صحت کی حالت میں ہوا کرتی ہے۔ اب اس کی بجائے مرنی چھایا

ہوا نیلگوں رنگت جسم پڑ جاتا ہے۔ چہرہ ڈراؤنا اور ایسا مردہ سا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس میں خون نہیں ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں، ہتھیلیاں اور تلوے ایسے ٹھنڈے مانو کہ عرصہ سے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آنکھیں اندر کو گھس جاتی ہیں اور بے نور ہو جاتی ہیں۔ آواز تو بالکل بند ہو جاتی ہے اور یا سخت دھیمی پڑ جاتی ہے درجہ دوم میں تو گھبراہٹ اور بے چینی زوروں پر تھی۔ لیکن اسے لو اب مریض کو دکھ درد محسوس کرنے کا احساس تک نہیں رہا۔ قوائے احساس سست پڑ چکے ہیں۔ نہ اب پانی کی مانگ ہے اور نہ ٹھنڈی ہوا کی طلب۔ اسہال بھی بند ہو چکے ہیں اور اگر آتے ہیں تو خود بخود تھوڑی تھوڑی مقدار میں نکل جاتے ہیں۔ پیشاب قطعی بند ہے۔ سوائے اس امر کے کہ تنفس نہایت کمزوری کے ساتھ چل رہا ہے اور بیمار میں زندگی کا پتہ دے رہا ہے۔ باقی تمام قوائے جسمانی حالت مردنی میں پڑے ہیں۔

## علاج

اس درجہ میں تقریباً وہی ادویات کام آتی ہیں جو کہ درجہ دوم یعنی ترقی مرض میں استعمال ہوتی ہیں۔ علاوہ ان ادویات کے چند ایک اور بھی ہیں جو کہ ایسے وقت میں پوری پوری مدد کر سکتی ہیں۔ تمام ادویات جو کہ اس موقع پر مستعمل ہوتی ہیں یہ ہیں :-

- ۱۔ کیمفر ۲۔ اکیونائٹ ۳۔ ورائٹرا ۴۔ آرسینک ۵۔ کوپرم
- ۶۔ سکیل ۷۔ کاربوویکی ٹیبلٹ ۸۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ
- ۹۔ کوپرا ۱۰۔ لاکس ۱۱۔ کروٹیل

حالت کو لپس میں علاج کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو علاج اس کے پہلے کیا جا چکا ہے اس کو خیال میں رکھا جاوے کیونکہ جو ادویات پہلے مستعمل ہو چکی ہیں اگر باوجود ان کے استعمال کے حالت مریض خراب ہوتی گئی ہے تو اب پھر ان کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ لیکن اگر وہ پہلے استعمال میں نہیں آئیں۔ یا ان کے استعمال میں کچھ کسر باقی رہ گئی ہے تو اب پھر ان کو استعمال میں لانا چاہیے۔

ڈاکٹر، نہی مین کا قول ہے کہ اگر مرض کے آغاز میں ہی کوپیس کی حالت ظہور پذیر

ہو جائے تو کیفردوائی سے علاج شروع کرنا چاہیے نیز اگر بیماری درجہ دوم میں سے گزر کر کو لیس کی حالت میں پہنچتی ہے اور خاص کر اس وقت جبکہ دیگر افعیات کی کافی خوراکیں دی جا چکی ہوں اور بے سود ثابت ہوئی ہوں تو یہ دوائی بڑی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایکونائٹ بھی کو لیس کی حالت میں جب کہ دل اپنا فعل چھوڑ جاتا ہو مفید پڑتی ہے۔ باقی علامات مخصوصہ جو ایکونائٹ کے بیان میں پہلے مذکور ہو چکی ہیں ان کا بھی پورا لحاظ رکھ لینا چاہیے کیونکہ اگر ایکونائٹ کی علامات مخصوصہ موجود نہ ہوں۔ جب کہ اسہال زیادہ آنے کے باعث کو لیس کی حالت طاری ہو گئی ہو تو درازم مفید پڑتی ہے۔ بشرطیکہ درازم کی دیگر علامات مخصوصہ جن کا ذکر اوپر آچکا ہے موجود ہوں اور اسی طرح سے آرسینکم۔ کوپرم اور مسکیل بھی استعمال میں آتی ہیں جب کہ ان کی علامات موجود ہوں۔

کاربودیجی ٹیبلس جب کہ سانس سرد پڑ گیا ہو۔ زبان گلا اور دانت ٹھنڈے ہو چکے ہوں۔ ہاتھ اور پاؤں برف کی مانند سرد۔ مریض رات کے وقت ہاتھ اور پاؤں سرد ہونے کے سبب کٹی بار چونک پڑتا ہو۔ اگرچہ چھوٹے سے تمام جسم سرد محسوس ہو لیکن مریض اندرونی گہمی بہت محسوس کرتا ہو اور ٹھنڈی ہوا کا طالب ہو اور ٹپکھا ہلانے کی خواہش ظاہر کرتا ہو۔ نبض نہایت کمزور اور رُک رُک کر چلتی ہو اور دل کی دھڑکن کڑھی ہوئی ہو۔ جب کہ کو لیس کی حالت بتدریج ظہور میں آتی ہو اور آرسینکم درازم۔ سیل وغیرہ ادویات حالت بحال کرنے میں ناکامیاب ثابت ہوتی ہوں تو کاربودیجی ٹیبلس ان حالات میں بسا اوقات اپنا جادو نما اثر دکھلاتی ہے۔ یہ بھی نیاں رکھنا چاہیے۔ کہ کاربودیجی ٹیبلس اسہال بدبودار ہوتے ہیں اور کثرت زیادہ ہوا کرتا ہے کاربودیجی ٹیبلس میں مفید پڑے گی جب کہ جسم کٹی طور پر ٹھنڈا پڑ چکا ہو اور سرد پسینہ (تہلی) سے تہتر ہو۔ یہاں تک کہ سانس اور زبان بھی سرد ہوں۔ اگر چھاتی اور دیگر دھڑ گرم ہوں۔ تو کاربودیجی ٹیبلس پر سکتی۔ کاربودیجی ٹیبلس اس وقت بھی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ آرسینکم کے بعد استعمال کی جائے یا جب کہ آرسینکم کا غلط استعمال کیا جا چکا ہو۔ جو کہ میفہ کے مرض میں اکثر اوقات وقوع میں آتا ہے۔

خوراک ۱ یا ۲ یا ۳۰ نیم گھنٹہ کے بعد۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ: جب نبض کم ہو۔ جسم ٹھنڈے پسینہ (تریلی) سے تو ہو  
اسہال خود بخود خارج ہو رہے ہوں۔ آنکھیں گڑی ہوئیں۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں تنفس کمزور  
اور سانس کبھی آدے اور پھر رُک جاوے۔ ایسا معلوم ہو کہ بیمار مَرده پڑا ہے اور پھر  
سانس آدے ایسی حالت میں اگر کوئی معائی جادو کا اثر رکھتی ہے تو وہ ہائیڈروسیانک  
ایسڈ ہی ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ مَرده جسم میں یہ دوائی از سر نو روح بھونک دیتی ہے  
ڈاکٹر سرکار لکھتے ہیں۔ کہ جب بیمار مَرده پڑا ہو۔ شفا کی اُمیدیں منقطع ہو چکی  
ہوں تو یہ دوائی از سر نو زندہ کر دیتی ہے اور تمام لواحقین و حاضرین حیران و ششدر رہ  
جاتے ہیں۔

بخورال: ۳x یا ۶x ہر پاؤ یا نیم گھنٹہ کے بعد  
کوہرا: کوہرا سانپ کے زہر سے یہ دوائی تیار کی جاتی ہے۔ اس کی موٹی  
موٹی علامات مندرجہ ذیل ہیں۔

طاقتِ زیست کی نہایت کمزوری اور سستی۔ اُداسی نامستقل مزاجی۔ اندوگینی  
حافظہ کی پریشانی۔ بے ہوشی دماغ میں جکڑ اور باوجود آنکھیں کھلی ہونے کے بیمار دیکھ  
نہیں سکتا۔ چہرہ نہایت زرد۔ ڈراونا اور ناتواں۔ طاقت گویائی ندارد۔ منشیات کی  
خواہش اگرچہ منشیات کا استعمال تکلیف کو دو بالا کر دیتا ہے۔ ابگائیاں۔ معدہ میں جلن  
معدہ گرتا جاوے۔ تمام شکم میں درد اور گرگڑا ہٹ۔ اسہال آبی اور صفراوی جو کہ یکایک  
خارج ہوتے جاتے ہیں۔ تنگیِ تنفس مریض گہرے سانس لیتا ہے۔ دل کی دھڑکن غیر  
معمولی سنائی دیتی ہے۔ دم بند ہو جانے کے بعد بھی دل حرکت کرتا رہتا ہے۔ نبض اتنی  
کمزور کہ مشکل سے معلوم پڑتی ہے۔ ٹانگیں اور بازو تمام کے تمام ٹھنڈے جیسے مَرده جسم کے  
ہوتے ہیں۔

بخورال: ۳ یا ۲ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
لاس: یہ آخری درجہ کی دوائی ہے۔ جب کہ جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہو کبھی جسم  
کے ایک حصہ میں حرارت محسوس ہو۔ لیکن پھر گم ہو جاوے اور پھر دوبارہ ظاہر ہووے

دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

دل کی حرکت بند ہو جانے میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

اسی طرح کروٹیس دوائی بھی کام میں آتی ہے۔ جب کہ اس کی علامت موجود ہوں یہ دوائی بھی کوبرا اور لاکس کی مانند آخری حالت میں دی جاتی ہے۔ جب کہ زندگی کی امید ظاہر حالات میں بہت کچھ منقطع ہو چکی ہو۔  
 \* خوراک ۱۲ یا ۲۰ ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

۴۔ درجہ چہارم : یعنی درجہ انحطاط مرض (اسٹیج آف ری ایکشن) یعنی مرض کے گھٹنے کا زمانہ یہ درجہ حالت کو لپس کے بعد ہوا کرتا ہے۔ جب کہ پھر نبض اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی ہے۔ جو نبض کمزور اور بے معلوم تھی۔ اب آہستہ آہستہ اپنی طاقت پکڑتی جاتی ہے اور تنفس پہلے جو وقت سے آتا تھا۔ اب ذرا آرام سے آنے لگتا ہے۔ جسم جو پہلے برف کی مانند سرد تھا۔ اب دوبارہ گرمی پکڑنے لگتا ہے اور چہرے پر تروتازگی کی علامات ظاہر ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور بیمار کے ہوش و حواس درست ہوتے معلوم پڑتے ہیں۔ اسہالوں اور قیوں کی رنگت پھر سفراوی ہو جاتی ہے اور اسہال ذرا رقیق ہوتے جاتے ہیں اور گردے پیشاب : یا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات پیشاب خود بخود آ جاتا ہے۔ اور اگر نہ آوے تو شانہ کے بوجھل ہو جانے سے پیشاب کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ جب یہ علامات آشکارا ہو جائیں، تو ایسی حالت میں غذا ہی دوائی کا کام کرتی ہے۔ چونکہ انحطاط مرض میں قے اور دست پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر یہ خفیف ہوں تو ان کے روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر بہت تکلیف دہ معلوم ہوں تو پھر مناسب دوائی استعمال کرانی چاہیے۔ ایسی ادویات کا ذکر درجہ دوم کے علاج میں شروع طور پر کیا جا چکا ہے۔ لیکن دوائی بہت ہی کم استعمال کرانی چاہیے ترقی مرض اور کو لپس کی حالت میں اگر کوئی چیز بطور خوراک کے دی جاتی تھی تو وہ سادہ پانی کے دو چار گھونٹ تھے۔ لیکن جب درجہ ری ایکشن شروع ہو جائے تو معالج کو غذا دینے کا خیال کرنا چاہیے اگر گردوں نے پیشاب فلٹر کرنا شروع کر دیا ہے۔

تو پھر ساگو دانہ دینا مفید پڑتا ہے۔ جب اسہال صفراوی رنگت پکڑ آویں۔ تو آتش جو یا تھوڑا دودھ یا کسی چیز کا رس دینا مفید پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں غذا کا تجویز کرنا معالج کی ہوشیاری اور تجربہ کاری پر منحصر ہے کیونکہ بعض اوقات تھوڑی سی غلطی سے مرض پھر عود کو آتا ہے اور بیمار کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ معالج کے لیے اس بات کا یاد رکھنا ضروری ہے کہ بیمار کو بھوکا رکھنا مفید ہے۔ یہ نسبت اس کے کہ نا تجربہ کاری سے غذا دے کر کیس کو خواب کیا جائے اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ یا تو معالج کی نا تجربہ کاری کے باعث اور یا بیماری کے غلط راستہ اختیار کر کے صدمہ سے کئی قسم کے عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن کو عوارض و نتائج مرض کہتے ہیں۔

**عوارض اور نتائج مرض** جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ کو لیس کی حالت سے جب مریض ری ایکشن کی حالت میں آتا ہے تو یا آہستہ آہستہ باقی عہدہ صحت حاصل کر لیتا ہے یا اور کئی عوارض اٹھرتے ہیں۔ ان کو انگریزی میں 'سی قیولی' کہتے ہیں۔

ایسی حالت میں معالج کی ہوشیاری اور تجربہ کاری درکار ہوتی ہے۔ کیونکہ جب ری ایکشن شروع ہوتا ہے تو لواحقین مریض اور معالج بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کو امید بندھ جاتی ہے۔ لیکن اب اگر بیمار کی ڈوبتی مہرئی کشتی جو بھور سے نکل چکی ہو اور کنارے پر پہنچا چاہتی ہے۔ غلطی یا اور کسی وجہ سے چٹان سے ٹکرا کر ساحل کے نزدیک ڈوب جائے تو اس سے زیادہ افسوس ناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ عین اسی طرح بیمار کا حال ہے۔ جو کہ کو لیس کی سٹیج سے نکل کر صحت یابی کی سڑک پر سوار ہو چکا ہے۔ لیکن معالج کی غلطی یا تیماردار کی سستی کے باعث یا مرض کی کج روی کے سبب سے پھر مریض پیچیدہ عوارضات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ حالت پہلے سے بھی افسوس ناک ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ معالج ری ایکشن کے شروع ہونے پر بیمار کے تمام اعضائے رئیسہ اودان میں جو نقائص موجود ہیں۔ ان کا پورا پورا علم رکھے۔ تاکہ اگر کوئی عارضہ بعد میں ظہور پذیر ہو تو وہ حیران و ششدر نہ رہ جائے۔

ان عوارضات کا اظہار ان اعضاء پر ہوتا ہے۔ جو ماؤت ہو چکے ہوں۔ مثلاً اگر دماغ زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو ان عوارضات کا شکار یہ دماغ ہوگا۔ اسی طرح

سے پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء کا حال ہے۔ اگر نشیات کا استعمال بیماری میں زیادہ کرایا گیا ہے۔ تو پھیپھڑوں میں اجتماع خون یا درم کا عارضہ لاحق ہو جائے گا اور اگر قابض ادویات زیادہ استعمال کی گئی ہیں تو امعاء مقعد اور گردوں کے فعل میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اگر نیند آور ادویات زیادہ استعمال کرائی گئی ہیں تو ان کا بذاثرہ دماغ پر ہوگا۔

جب خون سے سیرم (پانی) خارج ہونا شروع ہو جائے تو اس کو خطرناک عارضہ سمجھنا چاہیے۔ اس سے جسم میں نمکین اجزاء کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور خون گاڑھا ہو جاتا اس لیے باریک عروق شرعیہ جن کو انگریزی میں کیپیلریز کہتے ہیں۔ یہ گاڑھا خون گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ اجتماع خون یا درم ہوا کرتا ہے۔ جب یہ درم گردوں میں واقع ہوتا ہے تو گردے اپنا فعل پیشاب فلٹر کرنے کا چھوڑ بیٹھتے ہیں اور جگر میں اجتماع خون ہو جانے سے جگر اپنے فعل کو سرانجام دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اس سے خون میں ایک اور خرابی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کو سمیت خون کہتے ہیں۔ کیونکہ خون میں سے جو زہریلا مادہ بذریعہ پیشاب خارج ہوتا تھا۔ وہ خون میں ہی رہ جاتا ہے اور اجتماع خون اور سمیت خون سے کئی ایک دیگر عوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان عوارض کا زیادہ اثر دماغ گردوں معدہ امعاء جگر۔ پھیپھڑوں۔ منہ۔ آنکھوں جلد اور اعضائے ولادت پر ہوتا ہے۔ لیکن دماغ اور گردوں کا مبتلا سے مرض ہو جانا زیادہ عام اور خطرناک ہوا کرتا ہے۔

دماغ اور گردوں سے اکثر دوسرے درجہ پر قوائے باضمہ پہاڑ ہوتا ہے۔ جس کے باعث جھپکی۔ آبکایاں صفراوی۔ دست و قے تناوے شکم، پیچش وغیرہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر ہیضہ کا علاج ایو پیٹک طریقہ سے کیا گیا ہے تو یہ عوارضات لاحق ہوتے ہیں اور اگر ہومیو پیتھک طریقہ سے کیا ہے تو ان عوارضات کا سامنا نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ری ایکشن کے بعد اکثر بخار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دوران خون میں نقص واقع ہو جانے کے سبب سے بخار کا پیدا ہو جانا لاحق ہوتا ہے۔ اس بخار کا علاج کرتے وقت یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ تمام اعضاء کا امتحان باریک بینی سے کیا جائے تاکہ یہ پتہ لگ سکے کہ کس عضو میں

درم یا اجتماع خون واقعہ ہے جس کا نتیجہ یہ بخار ہے اور بھی کسی قسم کے عوارضات مثلاً آنکھ کے پردہ قریبہ میں گھاؤ یعنی زخم منہ میں چھالے گلیٹیاں جسم پر جابجا پھوڑے اور پھنسیاں وغیرہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں۔

اب ہم ان عوارضات کا علاج بھی بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں جن کا ذکر اوپر آیا ہے۔

**حبس بول :** اگر مریض کا علاج ابتداء سے ہی ہو میو پیٹیک طریقہ پر کیا جائے تو جو ادویات ترقی مرض یا کو لیس کی حالت میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کا ایک یہ بھی اثر ہوا کرتا ہے کہ پیشاب بھی لاتی ہیں اور اس لیے حبس بول کا عارضہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ یہ خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مرض شدید قسم کا ہے۔ یا ابتدا میں کوئی اور علاج کرایا گیا ہے اور ہو میو پیٹیک ادویات مستقل نہیں مہر ہیں تو حبس بول کا عارضہ لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی حالت میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ثابت ہوتی ہیں۔

**کینتھرس :** اس دوائی کا اثر گردوں اور شانہ ہرود پر ہوتا ہے۔ یعنی گردے اپنا فعل پیشاب فلٹر کرنے کا شروع کر دیتے ہیں اور شانہ پیشاب خارج کرنے لگ پڑتا ہے۔ پس اگر سمیت خون کے باعث مدہوشی تشنچ وغیرہ ساتھ ہوں تو یہ دوائی بڑی مفید پڑتی ہے۔ اس دوائی کی تیسری چھٹی یا ساتویں طاقت استعمال کرتے ہیں اور ہر گھنٹہ کے بعد اس کی ایک ایک خوراک پلاتے ہیں۔

**ٹیری بن تھینا :** جب کینتھرس ناکامیاب ثابت ہو تو یہ دوائی بڑی کارآمد ہوا کرتی ہے۔

✽ **خوراک :** اس دوائی کو ۶ x ۱۲ یا ۳۰ پوٹینی میں ہر ایک ایک یا دو دو گھنٹہ کے بعد پلاتے ہیں۔ دیگر ادویات جو پیشاب لانے میں مفید اثر رکھتی ہیں۔ یہ ہیں ایکونائیٹ۔ ایپس۔ ایپوسائینم۔ آرسینیکم۔ کینالیں سائڈیکا۔ سائنا کالجیکم کوہم۔ میٹیلیم۔ کوہم ایسی ٹیٹ۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ۔ ہائیڈروسیائیٹس۔

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵



کالی بانی کارب - مرکبیس کار - اوپیم سوسی نس - سٹرامونیم - ٹیکیم وغیرہ۔

## دماغ کے عوارضات کے واسطے مندرجہ ذیل ادویات مفید پڑتی ہیں

بیلادونا:  $\times 3$  یا  $\times 4$  جب کہ دماغ میں نقص بوجہ اجتماع خون واقعہ ہوا ہو اور آنکھیں سرخ خون آلودہ ہوں اور کن پٹی کی شریان بھری ہوئی تیز چپکتی ہوں چہرہ سرخ تھمتا ہوا ہو۔

ہائیوسائی نسس:  $\times 4$  یا  $\times 30$  یا  $\times 200$  جب کہ دماغ میں نقص بوجہ اعصابی خرابی کے ہو۔ اجتماع خون کی وجہ سے نہ ہو اور دیگر علامات ہائیوسائی نسس کی موجود ہوں۔

سٹرامونیم:  $\times 4$  یا  $\times 30$  جب کہ بیمار بے ہوشی میں کبواس کرے اور پگلا پن کی باتیں کرے اور کاٹنے کی کوشش کرے۔ سٹرامونیم کا استعمال بیلادونا اور ہائیوسائی نسس کے درمیانی حالت میں ہوتا ہے۔ یعنی نہ تو بیلادونا کی پوری علامات موجود ہوں اور نہ ہی ہائیوسائی نسس کی مکمل علامات موجود ہوں۔

اوپیم:  $\times 4$  یا  $\times 30$  یہ دوائی اس وقت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ دماغ میں سستی ہو مریض کبواس نہ کرے یا کم کرے۔

کینابلس انڈیکا: جب کہ بے ہوشی میں خاموشی بھی ہو اور کبواس کی حالت بھی کسی قدر ہو۔ بدن پر کھجلا ہٹ ہوتی ہو۔ خاص کر کھجلی اعضاءے تناسل پر ہو۔

خفہ رات:  $\frac{1}{2}$  کے دس قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔



دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

## ہچکی

سب سے زیادہ تکلیف دہ عارضہ ہچکی کا ہے جو کہ اس سلسلہ میں پیدا ہو جاتا ہے اور خوش قسمتی سے ہومیوپیتھی میں ہچکی کا علاج بڑا خوش اسلوبی سے بیان کیا گیا ہے اور بہت سی ادویات اس مرض کے لیے موجود ہیں۔ چند ادویات کا بیان ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

بیلادونا  $\times 3$  یا  $\times 6$  جبکہ ہچکی کا دورہ بار بار ہو اور بڑا سخت ہو۔ جب کہ مریض ہچکی کے سبب بے بتردد سے اُٹھنے پر مجبور ہو اور دوسرے دورے کے بعد سر اور اعضاء میں تشنج واقعہ ہوتا ہو۔

سائی کیوٹا  $\times 3$  یا  $\times 4$  جب کہ ہچکی کے ہمراہ چھاتی میں آواز خرخر کی پیدا ہو۔  
ہائیوسائی مس  $\times 3$  یا  $\times 20$  جب کہ ہچکی کے ہمراہ شکم میں گرگڑا ہٹ کی آواز ہو اور شکم میں پیچ و تاب پڑیں۔ یا بے تحاشہ اخراج بول ہوتا ہو اور منہ میں جھاگ آتی ہو۔

کاربوویچی  $\times 3$  یا  $\times 20$  جب کہ فزاسی حرکت کرنے سے ہچکی شروع ہو جائے۔  
پسٹلا  $\times 6$  یا  $\times 30$  جب کہ ہچکی کا دورہ رات کے وقت سونے کے بعد یا پانی پینے کے بعد زیادہ تکلیف دہ ہو جائے یا حقہ پینے کے بعد ہچکی کا دورہ شروع ہو۔

سٹانی سیکریا  $\times 6$  یا  $\times 30$  جب ہچکی کے ہمراہ آبکائیاں بھی آتی ہوں۔ عدم پیاس بے شمار ڈکار اور بے ہوشی ہو۔

فاسفورس  $\times 6$  یا  $\times 30$  جب کہ ہچکی کا دورہ دن کے وقت زیادہ ہو اور آبکائیاں آئیں۔ کھانا کھانے کے بعد تکلیف زیادہ ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے تھوٹا عرصہ آرام رہے یا ہچکی کے باعث فم معدہ میں درد ہوتا ہے اس سے ہچکی کو آرام آجائے۔

✽ دعائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

اگنیشیا : \* ۶ یا ۳۰ جب کہ کھانے اور پینے کے بعد ہچکی کا دورہ شروع ہو۔ ہچکی شام کو ہو۔ رنج و غصہ کے سبب سے ہچکی ہو۔

سلفر : ۶ یا ۲۰ یا ۲۰۰ جب کہ ہچکی کے ساتھ تالو کے پیچھے درد ہو۔

دیگر ادویات جو ہچکی میں کارآمد ہوتی ہیں وہ یہ ہیں :-

ایکونائٹ - ایتھیوزا - اگاریکس - امونیم کارب - امونیم میوہ - ایماٹل  
اسٹریٹ - انیم کرورٹم - انیم ٹارٹ - آر سینکیم الیم - امارم - آرنیکا - برائی  
اونیا - کلیریا کارب - کینتھرائیڈس - کاربالک ایسڈ - کیومیلڈ - سائنا - کائیولس  
کالچی کم - کالوسنتھ - کروٹن - کوپریم - آر سینکیم - کوپریم میٹلیکیم - سائی کلیمن - ڈایا  
سکوریٹ - گبوجیا - گریفائیٹس - ہائیڈروسیانک ایسڈ - اپی کاک - آئرس  
ورمی کور - کالی بائی کارب - ایوراسی رسس جو بیلیا - لائیو پوڈیم - میگنیشیا کارب  
میگنیشیا فاس - مرکوریس کار - مرکوریس سالو - نیرم میور - نائٹریکیم ایسڈ - نکس  
وامیکا - آگسالیکم ایسڈ - روٹینیا روٹا - سیکل - سیپا - سٹرامونیم - ٹیوکری ایم -  
ڈرائٹم - ڈرائٹ - بیسکم -

ابکائیاں اور تھے یہ بھی تکلیف دہ عارضہ ہے جو کہ ری اکشن کے بعد پیدا ہو جاتا ہے۔ معدہ میں غیر معمولی اکساہٹ ہونے کے سبب سے یہ غوارض پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نکس وامیکا - اپی کاک دو مشہور اور تجربہ ادویات ہیں۔ اس لیے ان دونوں کے استعمال سے فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان دونوں کے استعمال سے فائدہ نہ بھی ہو تو پوڈوفائیلیم کو استعمال کرنا چاہیے لیکن جب ٹھنڈا پانی پینے کے بعد فوراً ہی تھے آجائے تو پوڈوفائیلیم دوائی مفید پڑتی ہے۔ اگر پانی پینے کے بعد تھوڑے عرصے کے وقفہ پر تھے آجائے تو فاسفورس مفید پڑتی ہے۔ جب مریض کی حالت نہایت خراب ہو چکی ہو۔ تو ہائیڈروسیانک ایسڈ دینی چاہیے اور اگر ابکائیاں اور تھے بوجہ ورم معدہ کے ہوں تو اس کا علاج اسی کے مطابق کرنا چاہیے۔ ان ادویات کا مفصل ذکر ترقی مرض اور کولیس کے

بیان میں آچکا ہے۔

اسہال - جب ری ایکشن شروع ہو جائے تو اس کے بعد اسہال خطرناک صورت اختیار نہیں کرتے۔ خفیف اسہال کا ری ایکشن کے بعد جاری رہنا مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ جب تک گردے پیشاب فلٹر کرنا شروع نہ کر دیں۔ تب تک پیشاب کا زہریلا مادہ بذریعہ اسہال خارج ہوتا رہتا ہے۔ پس جب اخراج پول شروع ہو جائے تو پھر اسہالوں کے علاج کی طرف توجہ کرنی لازمی ہوتی ہے۔ یا جب کہ اسہال اس مقدار میں نکل رہے ہوں کہ ان سے ضعف کا خطرہ پیدا ہو جائے، تو اسہالوں کا بند کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں ادویات وہی کارآمد ہوتی ہیں۔ جو کہ ترقی مرض میں بیان کی گئی ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس حالت میں یہ ادویات اونچی پوٹنسی میں دینی مفید ہوتی ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ کہ پیشاب آور ادویات کے استعمال سے جہاں ایک طرف پیشاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں دوسری طرف اسہال بھی خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ جو ادویات عام طور پر ایسے حالات میں استعمال کی جاتی ہیں وہ یہ ہیں :-

ایسڈ فاس - چائنا - فیرم - پوڈوفالکیم - مونرالڈکروڈائی اس وقت مفید پڑتی ہے۔ جب کہ جگر میں خرابی ہونے کے سبب سے اسہال میں پت زیادہ خارج ہوں۔

**تناوٹ شکم :** یہ بہت تکلیف دہ مرض ہے اور اگر اس کا جلدی علاج نہ کیا جائے تو پرہ شکم جس کو طب میں حجاب عاجز اور انگریزی میں ڈایا فرام کہتے ہیں اس کے فعل میں نقص واقع ہو کر بڑے بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں جب کل یا جزو امعاء میں گیس بھر جانے کے باعث بھبھلاوٹ ہو جائے تو اس کو تناوٹ شکم کہتے ہیں۔ انٹریوں میں جو کچھ مادہ ہوتا ہے۔ جب وہ گل سڑ کر گیس بن جاتا ہے اور اس میں دیگر گندے رطوبات امعاء بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو انٹریوں میں اس گندی گیس سے پڑ ہو جاتی ہیں اور بیمار کے لیے سخت بے چینی اور تکلیف کا سبب ہوتی ہیں۔ اس لیے تناوٹ شکم کا علاج ضروری نہا کرتا ہے۔ اس عارضہ میں مندرجہ ذیل ادویات کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔

**ہکس و امیکا :** ۶ یا ۳۰ یا ۲۰۰ پیٹ میں تناوٹ - چھوٹے سے درد -  
دم کھینچ کر آوے - پیٹ تنا ہوا - ڈکار لینے کی خواہش لیکن ڈکار نہ لے  
سکے دل کی حرکت زیادہ ہو اور معدہ ڈبو جاوے اور پت کا اجتماع زیادہ  
ہو تناوٹ انٹریوں کے سست فعل کے سبب سے پیدا ہوتا ہے کہ نقص  
رطوبت کے باعث -

**مرکیورس :** ۶ یا ۳۰ معدہ میں درد دبانے سے درد بڑھے درد کے ہمراہ  
تھے اور تکلیف وہ ابکائیاں آئیں معدہ میں گرمی اور جلن رات کے وقت  
درد کی زیادتی ہو اور تناوٹ زیادہ ہو - منہ میں بدبو ہو -

**سلفر :** ۳۰ یا ۲۰۰ فم معدہ میں بوجھ - جلن معلوم ہو - لیکن باقی معدہ میں  
تھنڈک محسوس ہو - تناوٹ شکم صبح کے وقت ہو - شکم میں تپنے والا  
درد اور گرد گردا ہٹ ہو - مرکیورس کے استعمال کے بعد سلفر کا استعمال مفید

**پرتا ہے :**  
**کاربودیجی ٹیمپلس :** ۶ یا ۳۰ معدہ پر اور تنا ہوا اور پھوٹا جا سکے -  
جب ہوا خارج ہو جائے تو آرام معلوم ہو اور ہوا خارج ہوتے وقت آواز  
کرے - نفخ بہت ہو - گویا پیٹ پٹا جاتا ہے - کاربودیجی میں مریض کو  
قبض کی شکایت نہیں ہوتی بلکہ اسہال کی شکایت ہوتی ہو -

**لایسکو پوڈیم :** ۶ یا ۳۰ پیٹ میں ہوا بھری ہوئی ہو اور بائیں طرف زیادہ  
زور ہو - ڈکاریں با آواز بلند آئیں اور ہوائیچے سے زیادہ خارج ہو یہ دوائی  
اس وقت مفید ہوتی ہے - جب کہ قبض ہو -

**دیگر ادویات :** پائنا - ایسا فوٹیڈا - کیپی کم - کیفروغیرہ متعل ہوتی  
ہیں - جب کہ ان کی علامات موجود ہوں - بعض ڈاکٹر صاحبان ایسے موقعہ  
پر انیما (تحقنہ کرنا) مناسب خیال کرتے ہیں - گرم پانی میں تھوڑا سا بن  
گھول کر اور اس میں چند قطرے تارین کے اور دو چار قطرے عرق ہینگ

رٹنکچر ایسا فوٹیڈا) بلا کر پچکاری کرتے ہیں حسب ضرورت کسٹرائیل بھی شامل کر لیا کرتے ہیں۔ اس پچکاری کا یہ فائدہ ہوا کرتا ہے کہ انٹریوں سے فاسد مادہ خارج ہو جاتا ہے اور بیمار کو بہت جلدی آرام آ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیمار نحیف اور کمزور ہو تو انیما کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ تب انٹریوں میں پانی کو باہر نکالنے کی طاقت نہیں ہوتی تو اس سے بیمار کی جان کے لئے پڑ جاتے ہیں اور زیادہ نقصان ہوا کرتا ہو۔ نفخ کے کم کرنے کے لیے سرد پانی سے کپڑا تر کر کے پیٹ کے اوپر رکھنا بڑا مفید ہوا کرتا ہے۔ لائم جو اس مفید اور چینی کا استعمال نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔

چونکہ ورم امعاء کے باعث بخار بھی ہو جایا کرتا ہے اسلئے  
بخار کا علاج بھی یہاں درج کیا جاتا ہے۔

بخار کا علاج : بخار بعض اوقات تو خفیف سا ہوتا ہے۔ جو کہ خود بخود ہی دور ہو جاتا ہے لیکن عموماً یہ بخار تپ محرقہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بخار کا علاج کرنے سے پہلے اسباب کی تشخیص ضروری ہوا کرتی ہے۔ اگر دماغ زیر اثر ہے تو ہلا ڈونا۔

اگر سینٹروں میں اجتماع خوں کے باعث بخار ہے۔ تو برائی اونیا اور فاسفورس اور اگر حصہ میں نقص ہو تو مرکب سالو اور برائی اونیا اگر جگر پکڑا ہوا ہے۔ تو مرکب ورس برائی اونیا۔ نکس واما کا اگر بڑی انٹریوں میں ورم ہے تو مرکب ورس۔ نکس واما کا۔ اپنی کاک۔ کاربو ویکسی۔ اگر اعضاء بول مبتلا ہیں تو کینتھرس اگر بخار ابتدا میں تیز ہو تو ایکونائٹ سے علاج شروع کیا جاتا ہے۔ عموماً ساوہ بخار میں جب کہ کوئی پیچیدگی ساتھ نہ ہو تو رسٹاکس اور فاسفورک ایڈ ہر دو ادویات کافی ودانی ہوا کرتی ہے۔

## مرض ہیضہ میں قیمتی ٹوٹکے

۱۔ جب مرض ہیضہ میں افاقہ ہونے میں نہ آئے اور قیئیں و اسہال لگتا رہے

جاری ہوں اور ساتھ ہی دماغ میں بھی نقص ہو چکا ہو تو یاد رکھو کہ مرض سخت ہے ایسے حالات میں، اگر کسی دوائی مفید ہوتی ہے۔

(۲) دل کے فیل ہو جانے کے خطرہ سے بے خبر نہ رہو۔ خواہ مریض اچھا بھلا ہی کیوں نہ نظر آتا ہو۔ جب دل کے فیل ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے تو ایسے حالات میں کلکیریا آرس  $3 \times$  کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے۔

(۳) مریض ہیفہ کے ظاہرِ شفا یاب ہو جانے کے بعد بھی اگر دست جاری رہیں تو ایسے حالات میں پوڈوفائیلیم کو استعمال کرو۔

(۴) کوئیس کی حالت میں جب عضلات تنفس میں تشنج ہونے کے باعث کوتاہ دمی شدید ہو تو ایسی حالت میں ڈاکٹر تو صاحب ار جینٹل نائٹریکیم استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

(۵) جب کوپرم۔ سیکیل کا راسد دیگر ادویات کو متوں میں آرام دینے میں ناکام ثابت ہوں تو اکیونائٹ ریڈکس خیال میں لاؤ۔

(۶) جب ہیفہ میں خونی دست آتے ہوں تو ایسی حالت میں اکیونائٹ سب ادویات کی سرتاج دوائی ہے۔ نیز کاربودیجی کالچی کم اپنی کاک فاسفورس اور پائی رو جینٹل کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔

(۷) شفا یابی کے بعد مریضوں کا چہرہ ٹانگیں اور بازو سوج کر پھل جلتے ہیں ایسی حالت میں چائنا بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔

(۸) جب مرض کمی پر ہوا مریض رو بصحت ہو رہا ہو۔ لیکن ایسی حالت میں پیشاب رکارہے تو اس کو خراب علامت سمجھنی چاہیے۔

(۹) ہیفہ کے آیام میں تانبے کی انگوٹھی پہننا مفید ہوا کرتا ہے۔

(۱۰) جب شک کا فور کے استعمال سے کوئی نقص واقع ہو۔ تو اس کی اصلاح کے لیے فاسفورس ۷۰ دینی چاہیے۔

(۱۱) ڈاکٹر سنز کی رائے ہے کہ حالت کوئیس میں جب کہ نفخ قیئیں اور تنگی تنفس موجود ہوں تو اداپیم ۷۰ کے دینے سے فوراً شفا یابی ہوتی ہے۔

(۱۲) جب پچھنپ کے بعد ہیفہ کا مرض ہو جائے تو کالچی کم دینی چاہیے۔

(۱۳) ڈاکٹر سرکار فرماتے ہیں کہ اگر اپنی کاک قیوں کو بند کرنے میں ناکامیاب ثابت ہو تو پوڈوفائیلیم سے آرام ہو جاتا ہے۔ جب قیوں رکتی نہ ہوں اور تمام ادویات ناکامیاب ثابت ہو چکی ہوں تو ہائیڈروسیانک ایسڈ بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

نوٹ: دودھ اور سوڈا واٹر مساوی مقدار میں ملا کر دینے سے قیوں رُک جاتی ہیں برف کا ٹکڑا چوسنے سے بھی قیوں کا آرام آ جاتا ہے۔

بیمار کو بستر پر چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے اور } **ضروری ہدایات**

جب سے اسہال آنے شروع ہو جائیں۔ تب سے چلنا پھرنا بند کر دینا چاہیے مریض کا دل خوش رکھنے کے ذرائع عمل میں لانے چاہئیں اس کے دل میں یہ خیال جاگزیں نہیں ہونے دینا چاہیے کہ اب موت نزدیک ہے۔ بلکہ برعکس اس کے اس کو حوصلہ اور صحت یابی کی امید ہر وقت دلاتے رہنا چاہیے۔ بیمار کا کمر گرم اور خوب ہوا دار ہونا چاہیے اور بوقت ضرورت جسم کے کسی حصہ کو گرم رکھنے کے لیے اسپرٹس کرنی یا گرم پانی کی بھری ہوئی بوتلیں جسم کے ٹھنڈے حصہ پر لگائی رکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ بیمار کو پینے کے لیے برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی دیتے رہنا چاہیے اور پانی کبھی بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ پانی نہ دینے سے خون گاڑھا ہو کر زیادہ کھرا بست اور پریشانی کا موجب ہوا کرتا ہے۔

غذا: مریض ہیضہ کو ہر قسم کی غذا سے پرہیز لازم ہے۔ منشیات کا استعمال نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ صرف برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ پلاتے رہیں چونکہ ایسے حالات میں کسی قسم کی غذا ہضم نہیں ہو سکتی تھے اور آبکامیاں تلک کیا کرتی ہیں تو ایسی صورت میں سوائے پانی ٹھنڈے کے اور کوئی چیز نہیں دینی چاہیے البتہ اگر تھکے اور آبکامیوں کا آرام ہو اور حالت مریض آہستہ آہستہ رونقوت ہوتی جائے تو آٹل جو میں سرودودھ ملا کر تھوڑا تھوڑا دینا چاہیے اور صحت یاب ہونے پر تدریج بخنی ڈل روٹی دودھ پتلی کھڑی خوب گلے ہوئے چاول تھوڑا تھوڑا کر کے دینے چاہئیں اور آہستہ آہستہ معمولی غذا پر لانا چاہیے دودھ اور سوڈا واٹر مساوی مقدار میں ملا کر دینا مفید ہوتا ہے۔ مکتہ مریض کے سر پر آہستہ آہستہ پنکھا کریں۔ تاکہ خنک آ جاوے اگر مریض سو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ مریض بچ گیا۔



## مرض ہیفہ سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں

۱۔ ایام ہیفہ میں کیمفر مد ٹنگچر ۵ یا روہنی صاحب کا کیمفر استعمال کرنا چاہیے دو قطرے صبح اور دو قطرے شام کو مصری یا پتاشہ پر ڈال کر کھا چھوڑنے چاہئیں۔ یا کیمفر کی گویاں صبح اور شام استعمال کرنی چاہئیں دو گویاں صبح کو اور دو شام کو منہ میں رکھ چھوڑنی چاہئیں حتیٰ کہ وہ گھل کر اندر چلی جاویں۔

۲۔ ڈاکٹر کلارک صاحب لکھتے ہیں کہ مرض کا بہت زود ہوا اور ایک آدمی ہیفہ کے مریضوں کے درمیان رہتا ہوتا اس کو چاہیے کہ کوہوم ایسی ٹیٹ ۳۵ کی ایک خوراک صبح اور ایک شام کو تھوڑے سے پانی کے ہمراہ کھایا کرے۔ نوٹ: مذکورہ بالا ادویات ہر ایک ہو میو پیٹیک شفابخانہ سے مل سکتی ہیں۔

۳۔ کچے اور دیر سے ہضم ہونے والے پھل مثلاً گکڑی۔ خربزہ۔ کھیر۔ تربوز۔ امروہ۔ آڑو۔ کیلا وغیرہ نہیں کھانے چاہئیں۔ مٹھائی جیسی ثقیل غذا سے بھی پرہیز لازم ہے۔ کچے پھل اور کچی سبزی ترکاری کھانے سے دستوں کا اندیشہ ہوتا ہے اور جس کسی شخص کو دستوں کی تھوڑی بہت بھی شکایت ہو تو خطرہ ہوتا ہے کہ اسے ہیفہ نہ ہو جائے۔ اکثر ہیفہ کے جراثیم پھل اور سبزی ترکاری کے اوپر پائے جاتے ہیں کیونکہ بے علم لوگ عموماً ان کو غلیظ پانی میں دھوتے ہیں جب تک پھل اور ترکاریاں اچھی طرح سے پکائی نہ گئی ہوں کبھی نہیں کھانی چاہئیں۔

۴۔ پانی پینے کے کنوؤں اور چشموں یا بنانے دھونے کے تالابوں کے نزدیک غلاظت نہیں چھینکنی چاہیے اور ان کو بالکل صاف اور ستھرا رکھنا چاہیے پس اگر کہیں مرض ہیفہ پھوٹ نکلے اور اندیشہ ہو کہ کسی کنوئیں میں اس کے جراثیم داخل پا چکے ہیں تو اس کنوئیں کے پانی کو پریسٹنٹ آف پوٹاش کے ساتھ صاف کرنا چاہیے۔ ۵۔ گندے پانی کی نالیاں اور بدرویل اچھی طرح سے صاف رکھنی چاہئیں۔ اور ڈس انفیکٹ ادویات خاصی مقدار میں استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ فینائل وغیرہ خوب پھڑک دینی چاہیے۔

۶۔ چونکہ یہ مرض پینے والے پانی کے ذریعے زیادہ پھیلتا ہے۔ اس لیے پانی کو جوش دے کر اور ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے مناسب ہے کہ پانی کو ابالا دے کر صراحی یا کسی صاف ستھرے برتن میں بھر کر اور خوب ڈھانپ کر رکھا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔

۷۔ کچا دودھ ہرگز نہیں پینا چاہیے بلکہ جوش دے کر اور ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے۔  
۸۔ ہیفہ کے دنوں میں گھر کی اور گرد و نواح کی صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔  
خاص کر جو سونے کے کمرے ہوں۔ ان میں تھوکی آمد و رفت بخوبی ہونی چاہیے اور کمرے مرطوب نہیں ہونے چاہئیں۔ بلکہ خشک اور صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔

✽ اللہ تعالیٰ نے دودھ ایک بے مثل نعمت ہم کو دی ہے۔ یہی ایک چیز ہے کہ جس میں انسانی جسم کے نشو و نما پانے کیلئے ہر ایک قسم کے جز و موجود ہیں۔ لیکن یہ نازک بھی اتنا ہے کہ فدا سی گندگی یا لاپرواہی اس کو امرت کی بجائے زہر بنا دیتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں گندے دودھ کی طفیل بہت سے امراض پھیل رہے ہیں۔ دودھ کے خراب ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔

دودھ دینے والے جانور مثلاً گائے بھینس۔ بکری اگر گندہ پانی پی لیں یا گندے پارہ کھائیں تو اس کا بد اثر دودھ پر پڑتا ہے اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ گائے بھینس گندے جوہروں تالابوں میں وبائی و متعدی امراض کے مریضوں کے کپڑے لوگ دھوتے ہیں اور ان امراض کے جراثیم اس پانی میں پھیل جاتے ہیں اور وہ اجزاء ان جانوروں کے اندر جلتے ہیں۔ اور لیزر استھنوں پر بھی لگ جاتے ہیں دودھ دہنے والے بھی چونکہ ان پڑھ اور بالعموم گندے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھتے ہیں اور نہ ہی جانوروں کے استھنوں کو دھو کر صاف کرتے ہیں اس لیے بیماری کے اجزاء جو کہ استھنوں پر لگے ہوتے ہیں۔ دودھ میں دخل پا جاتے ہیں اور کچا دودھ پینے والوں میں امراض کو پھیلاتے ہیں۔ دودھ دہنے والے بھی ایک جانور کے استھنوں کے اجزاء دوسرے جانور کے استھنوں پر پہنچا دیتے ہیں اور اس طرح سے امراض کے پھیلانے کا موجب ہوتے ہیں۔ دودھ بیچنے والے بھی دودھ کو خراب اور گندہ کرنے میں کوئی کم حصہ نہیں لیتے اکثر آپ نے

کئی قسم کی غلاظت یا فضلہ گھروں کے نزدیک نہیں پھینکنا چاہیے اور اگر پہلے سے موجود ہو تو اس کو فوراً اٹھوا دینا چاہیے۔

۹۔ ایام ہیفہ میں غذا صاف زود ہضم اور لطیف کھانی چاہیے اور معینہ وقت پر کھانی چاہیے اور نہ ہی خوب پیٹ بھر کر غذا کھانی چاہیے بلکہ تھوڑی بھوک رکھ کر کھانی چاہیے اور کھانا اس وقت کھانا چاہیے۔ جب بھوک لگی ہوئی ہو۔ بدولت اشتہا کھائے ہوئے کے اوپر اور کھالینا مناسب نہیں ہوتا اور نہ ہی باسی غذا کھانی چاہیے۔  
۱۰۔ اشیائے خوردنی و نوشیدنی خوب ڈھانپ کر رکھنی چاہئیں۔ تاکہ مکھیاں نجاست کے اجزائے خوراک میں نہ ڈال دیں۔ کھانے پینے کی اشیاء پر مکھیاں ہرگز ہرگز نہیں بیٹھنی چاہئیں۔

دیکھا ہوگا کہ دودھ میں کئی مکھیاں مری ہوئی ہوتی ہیں اور ہر قسم کے اجزاء دودھ منگا رکھنے کی وجہ سے اس میں پڑتے رہتے ہیں۔ غرضیکہ دودھ جیسی امرت چیز کو گندہ اور مضر صحت بنانے میں سب ہی کم و بیش حصہ لیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں دودھ کی مٹھیل بے شمار امراض پھیل رہے ہیں۔

مکھیاں بھی دودھ کو خراب اور مضر بنانے میں بڑا بھاری حصہ لیتی ہیں ایک وقت تو وہ ہیفہ کے مریض کی تہ اور دست پر بیٹھتی ہیں اور وہاں سے ہیفہ کے اجزاء اپنے ساتھ لے کر بھٹے دوسرے وقت دودھ پر جا بیٹھتی ہیں اور وہاں اجزاء داخل کر دیتی ہیں پس وہ قطعاً اگر کچا استعمال کیا جائے تو استعمال کنندگان میں وہ اجزاء داخل ہو کر مضر ہیفہ کے پھیلانے کا موجب ہوتے ہیں اسی طرح سے دیگر امراض کے اجزاء کو مکھیاں دودھ میں پنپا دیتی ہیں اور یہی سبب ہے کہ گندہ دودھ بجائے مفید ہونے کے امراض کے پھیلانے کا موجب بن رہا ہے اور بجائے فائدہ مند ہونے کے ضرر رساں ہو رہا ہے۔ لہذا لازم ہے کہ کچا دودھ ہرگز ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔

یورپ و امریکہ کے ملک میں دودھ کی بڑی بھاری احتیاط و حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن انیسویں صدی کے ہندو پاک میں جہاں ادبے پدا ہی کے باعث دودھ کو مضر سمجھا جاتا ہے۔ چاہیے کہ اہل علم اس امر کی طرف کافی توجہ دیں

۱۱۔ ہیفنہ کے دنوں میں بھیگے ہوئے کپڑے یا بھیسگی ہوئی جرابیں یا گیلی جوتی پہنے رہنا ممنوع ہے نیز ان ایام میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکھوں سے بچنا مناسب ہے کیونکہ جب پسینہ آیا تو ہوا اور ٹھنڈی ہوا لگے تو پسینہ رک جاتا ہے اور اس بیماری میں گرفتار ہو جانے کا موجب ہوا کرتا ہے ۔

۱۲۔ ایام ہیفنہ میں ہر ایک شخص کو ایسے اوقات سے کپڑے پہننے چاہئیں کہ جس سے جسم دھانپا رہے اور جسم کی گرمی قائم رہ سکے ۔

۱۳۔ ایام ہیفنہ میں خالی پیٹ کام پر چلے جانا مناسب نہیں ہوتا اور نہ ہی سخت محنت و مشقت کرنی چاہیے کیونکہ خالی پیٹ ہونے سے اس مرض کے جراثیم بہت جلدی اثر کرتے ہیں ۔ تھوڑا لطیف ناشتہ کر کے باہر نکلنا چاہیے ۔

۱۴۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ جو غذا اور اشیاء خوردنی طبیعت کے موافق نہ ہوں یا جس کے استعمال سے پہلے کبھی طبیعت خراب ہو چکی ہو اس کے کھانے سے پرہیز کرنا واجب ہے ۔ خواہ وہ اشیاء دیگر اشخاص کے لیے کیسی ہی مرغوب کیوں نہ ہوں ۔

۱۵۔ ہیفنہ کے مریض کو اس خوراک یا پانی کے نزدیک نہیں رکھنا چاہیے کہ جو اور لوگوں کے استعمال کے لیے ہو ۔

۱۶۔ جس کمرہ میں ہیفنہ کا مریض ہو ۔ اس کمرہ میں کوئی خوراک نہ تیار کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی شخص کو وہاں کھانی چاہیے ۔

۱۷۔ کوئی شے جسے ہیفنہ کے مریض نے چھوا ہو یا استعمال کیا ہو یا اس کے نزدیک پڑی رہی ہو ۔ کسی کھانے کی چیز یا پینے کے پانی کے نزدیک جو دوسروں کے استعمال کے لیے ہو کبھی نہ رکھنی چاہیے ۔

۱۸۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہیفنہ کے مریض کے پوشیدنی کپڑوں یا بستر کو کسی گوش یا تالاب یا جوہر یا نالے یا چٹھے میں یا کسی اور پانی کے نزدیک جو پینے یا کھانا پکانے کے واسطے استعمال کیا جاتا ہو ۔ ہرگز ہرگز نہیں دھونا چاہیے ۔

۱۹۔ جو لوگ مریض ہیفنہ کی تیمارداری کرتے ہوں ان کو لازم ہے کہ اپنی خوراک کو چھونے یا اس کو کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں بڑی احتیاط سے دھویا کریں ۔

۲۰۔ مریض ہیفنہ کے بول و براز اور تھوڑے کو بڑی احتیاط سے زمین میں گڑھا کھدوا کر

دبوا دینا چاہیے۔

لیکن یہ احتیاط رہے کہ کہیں پانی کے چشمہ کے نزدیک نہ گڑوایا جائے۔

۲۱۔ مریض ہیفہ کے پارچات بستر اور چار پائی کو خواہ مریض مرگیا ہو اور خواہ صحتیاب

ہو گیا ہو۔ کئی روز تک باہر تیز دھوپ میں ڈالنا چاہیے تاکہ سورج کی گرمی اور روشنی سے ہیفہ کے جراثیم جو اُن میں ہوں مر جائیں۔

۲۲۔ جب مریض ہیفہ کا کمرہ خالی ہو جائے تو اس کے فرش اور دیواروں کو

خوب دھو کر صاف ستھرا کر لینا چاہیے۔ اور دیواروں پر سفیدی کو ادینی چاہیے دھونے اور سفیدی کرانے سے پہلے گندھک جلا کر جراثیم ہیفہ کو ہلاک کر دینا چاہیے۔

۲۳۔ ہیفہ کے دنوں میں اگر اسہال آتے ہوں تو ایسی حالت میں مریض کو نہانا

منع ہے۔ اجابتوں کے بعد نہانا خطرناک ہوتا ہے۔

۲۴۔ ہیفہ کے دنوں میں دل کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے اور نہ ہی دل

میں ہر وقت مرض کا خوف لگے رہنا چاہیے۔ کمزور اور ڈرپوک طبیعتوں پر اس مرض کا بڑا بھاری گہرا اثر ہوا کرتا ہے۔ اور کمزور دل اشخاص بہت جلدی اس مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔

۲۵۔ آیام ہیفہ میں کوئی تیز جلاب نہیں لینا چاہیے

۲۶۔ ہیفہ کے دنوں میں ہر قسم کی سخت محنت و مشقت جسمانی و دماغی سے پرہیز

کرنا لازمی ہے۔ کیونکہ زیادہ نکان ہو جانے کے باعث کمزور اشخاص اس مرض میں آسانی مبتلا ہو جاتا کرتے ہیں۔

۲۷۔ مریض ہیفہ کو دیگر ممبرانِ خانہ سے علیحدہ رکھنا چاہیے جب تک کہ وہ مکمل

صحت یاب نہ ہو جائے۔

۲۸۔ مریض ہیفہ کے پاس بہت سے آدمی یا مستورات نہیں بیٹھنی چاہئیں ایک

وقت میں صرف ایک بیمار دار بیٹھنا چاہیے۔

۲۹۔ ہیفہ کے دنوں میں پیاز، ترشی اور سرکہ وغیرہ کا استعمال مفید بتلایا گیا ہو۔

۳۰۔ آیام ہیفہ میں خصوصاً رات کو چاول نہیں کھانے چاہئیں۔ کیونکہ چاول بھی

ہیفہ پھیلانے کا موجب ہوا کرتے ہیں۔

## ہیضہ کے بحس

بڑے بڑے ہومیوپیتھک دوائی خانوں میں ہیضہ کی موٹی موٹی ادویات کے بنے بنائے کبھی فروخت ہوتے ہیں۔ اُن میں بالعموم مندرجہ ذیل ادویات ہوتی ہیں۔ جن کا طریقہ استعمال اس طرح ہے۔

کیمفر: ابتداء میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ جب کہ جسم ٹھنڈا ہو۔ اس کی تین یا چار پونڈیں مصری یا پتاشے پر ڈال کر ہر پانچ یا دس منٹ کے بعد دیتے جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ جسم گرم ہو جائے۔ کیمفر کی تین سے لے کر چھ خوراکیں دی جاتی ہیں اور بیمار کو کبیل میں پٹیں اور اس کی ٹانگوں یا بازوؤں کو گرم پانی کی بوتلوں سے گرم کرنا ضروری ہے۔ اگر قہییں آتی ہوں تو اپنی کاک ۳x دینی چاہیے۔

اگر اسہال آتے ہوں تو آرسینکیم ۲x اور ورٹرم ایٹم ۳x باری باری سے نصف یا ایک گھنٹہ کے وقفہ کے بعد دینی چاہئیں۔

اگر قہییں اور اسہال دونوں آتے ہوں تو اپنی کاک ۳x آرسینکیم ۳x اور ورٹرم ایٹم ۳x باری باری سے نصف نصف یا گھنٹہ گھنٹہ کے بعد۔

پیشاب بند ہونے کی حالت میں بیلادونا ۳x  
کوئل پشنے کی حالت میں کوپریم ۳x

## مقدارِ دوائی

نوجوان کو دو یا تین قطرے بڑے بچے کو ایک قطرہ اور شیر خوار بچے کو نصف قطرہ چھ بھر پانی میں ڈال کر دینی چاہیے اور دوائی کی ایک خوراک دینے کے بعد دوسری خوراک تک دینی چاہیے۔ اس کا فیصلہ تجربہ اور بیماری کی سختی نرمی اور بیمار کی طبیعت پر منحصر ہے۔ اگر مرض کا زیادہ زور ہو دوائی کی خوراکیں جلدی جلدی دی جاتی ہیں لیکن جب ذرا آرام ہو۔ تو تین تین چار چار گھنٹہ کے وقفہ پر دوائی دی جاتی ہے۔

# ہلکاؤ

(HYDROPHOBIA RABIES)

یہ مرض دیوانے جانور کے کاٹنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خاص علامات یہ ہوتی ہیں۔

حلق میں سخت کچھاوٹ۔ ڈایا فرام میں تشنج۔ نگھنے میں خاص قسم کی تکلیف اور اس لیے مریض کو اشیاء کھانے سے خوف آتا ہے۔ تشویش اور بے چینی اور اخیر میں نقاہت و ہریان سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

نوٹ: ہائیڈروفوبیا دو لفظوں سے مرکب ہے۔ ہائیڈرو بمعنی پانی اور فوبیا بمعنی خوف پس اس کے معنے ہیں پانی سے ڈرنا چونکہ اس مرض کا مریض پانی سے بہت خوف کھاتا ہے۔ اس لیے اس مرض کو ہائیڈروفوبیا کے نام سے نامزد کیا گیا ہے۔

## کتنے میں ہلکاؤ کے علامات

بقول ڈاکٹر ریچٹ صاحب ابتدائی علامات یہ ہوتی ہیں۔

مریض کتا ترشرد ہوتا ہے اور بے آرام ہوتا ہے بھوک اس کی ماری جاتی ہے۔ اور اپنے پیشاب کو چاٹتا ہے۔ ٹھنڈی اشیاء چاٹنے کو اس کی طبیعت چاہتی ہے اور کوڑا کوٹ گندگی وغیرہ کھاتا پھرتا ہے اور اپنے پنجوں سے اپنے ہی منہ کی باچھیں چیرتا ہے اور ابتداء میں ایک بھاری علامت یہ ہے کہ اس کی ہر ایک آواز میں تھوڑی بہت تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ہلکا کتا اگر رستی یا زنجیر سے بندھا ہوا ہو تو بار بار آخری سرے تک مدھمکھڑکھاتا ہے اور اگر کھلا ہو تو جو بھی اس کے سامنے آئے اس کو کاٹتا پھرتا ہے مثل انسانوں کے ہلکے کتوں کو پانی سے ڈر نہیں لگتا بلکہ برعکس اس کے اس کو پیاس بہت لگتی ہے اور اس کی لعاب دہن یعنی رال گاڑھی اور حکمتی ہوتی ہے اور منہ کے ساتھ چھٹ جلتی ہے۔ مرض کے آخری درجہ میں آنکھیں سست پڑ جاتی ہیں۔ پچھلی ٹانگیں اور بلا ٹخمرے کے عضلات مفلوج ہو کر کمزوری سے چار سے چھ دن کے اندر کتا مر جاتا ہے۔

کئے سے دوسرے درجہ پر بھڑپا، نرگوش - گیدڑ اور بلی ہلکاؤ میں مبتلا ہوتے

ہیں -

## انسان میں ہلکاؤ کے علامات

دیوانے کئے وغیرہ کے کاٹنے سے اُسی وقت یہ مرض پیدا نہیں ہو جاتا بلکہ کئی ہفتوں اور مہینوں کے بعد یہ مرض ظاہر ہوا کرتا ہے - ابتداء میں مندرجہ ذیل علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں -

جس مقام پر دیوانے جانور نے کاٹا ہو اُس مقام پر پہلے تھوڑی سی جھنجھلاہٹ اور خارش ہوتی ہے - اور زخم میں درد ہونے لگتا ہے بعض اوقات زخم از سر نو تازہ ہو جاتا ہے مریض کی بہت پست ہو جاتی ہے اور اس کے سر میں خفیف درد رہتا ہے - نیند نہیں آتی اور مریض کو پریشان کرنے والے خواب دکھائی دیتے ہیں - پھر اس کا احساس اتنا بڑھ جاتا ہے - کہ تیز روشنی اور بلند آواز کی برداشت بھی نہیں ہو سکتی - پانی پیتے وقت گلا گھٹا جاتا ہے - اور آواز بھدی ہو جاتی ہے اور خفیف بخار ہو جاتا ہے چند گھنٹوں سے لے کر دو تین یوم تک ایسی حالت رہ کر پھر درجہ دوم کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں -

دوسرے درجہ میں بے چینی بڑھ جاتی ہے اور مریض کا چہرہ خوف زدہ ہو جاتا ہے - وہی تباہی باتیں کرنے لگتا ہے - اور اتنا ذکی الحس ہو جاتا ہے کہ روشنی اور آواز کی برداشت تک نہیں ہو سکتی - خفیف آواز سے یا ذرا سی ہوا لگنے سے تشنج ہونے لگ پڑتے ہیں اور خاص کر حلق اور نرخرے کے عضلات میں جس کے باعث گردن اکڑ جاتی ہے - نکلنے وقت تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے - اس لیے مریض پینے سے پرہیز کرتا ہے - اور یہی سبب ہے کہ پانی دیکھتے ہی یا پانی کا نام سنتے ہی اس کے حلق اور جسم میں تشنج ہونے لگتے ہیں - پیاس کی تشددت بہت ہوتی ہے لیکن مریض پانی سے خوف کھاتا ہے بلکہ پانی کا نام تک بھی نہیں کہہ سکتا - لعاب دار بلغم سے منہ بھرا رہتا ہے - اور اس کو خارج کرنے کے لیے مریض کھٹوں کھٹوں کرتا ہے - جب مریض کھٹوں کھٹوں کرتا ہے - تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ مریض کتے کی مانند بھونک رہا



ہے بخار بھی تیز ہو جاتا ہے اور مریض پر ہڈیاں طاری ہو جاتا ہے اور فہ زور زور سے  
چینیں مارتا ہے اور کبھی دیوانہ وار دوسروں کو کاٹنے دوڑتا ہے۔ کبھی عضلات تنفس میں  
سخت تشنج ہو کر دم بند ہونے لگتا ہے۔ ایک دو روز ایسی حالت رہ کر درجہ سوم کی  
علامات شروع ہو جاتی ہیں۔

درجہ سوم میں تشنج ہو کر دم بند ہونے لگتا ہے۔ عضلات دھیلے پڑ جاتے ہیں۔  
اور مریض بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے اور آخر کار بے ہوشی کی حالت میں دم توڑ دیتا  
ہے۔ یہ حالت بالعموم چھ سے لے کر اٹھارہ گھنٹوں تک رہتی ہے۔

## علاج

پہلا علاج : جب کوئی دیوانہ کتا یا کوئی اور پاگل جانور کاٹ کھائے تو مریض کو  
چاہیے کہ جتنی طاقت سے ہو سکے وہ اس زخم کے زہر کو چوس لے چوتھے وقت زخم کے  
گردا گرد انگلیوں سے زخم کی جانب دبائے رکھنا چاہیے اور جب زخم سے خون نکل چکے  
تو گرم گرم لہے یا جلتے ہوئے کوئلہ سے زخم کو گرمی پہنچانی چاہیے مگر یہ یاد رہے کہ  
جلنے نہ پائے صرف اس جگہ گرمی پہنچانی مقصود ہے جلانا مطلوب نہیں ہے اور اتنی  
دیر تک گرمی پہنچانی چاہیے۔ کہ جتنی دیر تک مریض برداشت کر سکے۔ اگر بوجہ خاص  
یا کسی اور سبب سے مریض خود ایسا نہ کر سکے تو اس کا دوست زہر کو چوس کر تھوک  
دے۔ اگر گلاس یا کوزہ زخم پر لگایا جائے تو بھی یہ مطلب حل ہو جاتا ہے۔

دوسرا علاج : جب دیوانہ کتا یا کوئی اور پاگل جانور کاٹ کھائے تو مقام زخم  
سے اوپر ٹانگ یا بازو کو خوب مضبوط باندھ دیں۔ تاکہ زہر اوپر دل کی جانب جلدی  
تھراؤ نہ کر سکے۔ پھر فوراً تیز پھری۔ یا چاقو یا اترے سے مقام زخم پر دو یا تین  
گہرے شگاف دیکر اور گرم پانی سے دھو کر اوپر میٹکے نیٹ آف پوٹاش زخموں پر

۱۔ زہر کو چوس کر تھوک دینے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ چوسنے والے کے منہ میں زخم یا  
چھالانہ ہو۔ اگر زخم یا چھالانہ موجود ہو تو پھر زہر کے سراپت کو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔  
۲۔ یہ ایک سیاہی بالی سرخ رنگ کی دوائی ہے۔ جو کہ انگریزی دوا فروشوں سے مل

لی دیں۔ بعض زخموں پر نائٹریٹ آف سلور یا شورے کا تیزاب لگانے کی سفارش کرتے ہیں۔ زخم کو باندھ کر مقام ماؤن کو چیرا دے کر کاسٹک لگانا از حد مفید ہوتا ہے۔ تیسرا علاج جس کا ہندوپاک میں پرچا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کسی کو دیوانہ کتا کاٹتا ہے۔ اس کو ایک ہفتہ کے اندر اندر کسولی (بجارت) میں لے جاتے ہیں وہاں اس کو پاسٹیور صاحب کا ایجاد کردہ ہکاؤ کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے وہاں بجاسی انتظام اس ٹیکہ لگانے کا کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ دیوانے کتے کے کاٹنے کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر یہ علاج شروع کر دیا جائے۔ اب لاہور میں بھی باؤلے کتے کے کاٹنے کا علاج مثل کسولی کے کیا جاتا ہے۔

حفظہ ماتقدم : ڈاکٹر مہنی مین صاحب فرماتے ہیں کہ بیلادونا کا استعمال کرنے سے مرض کا حملہ رک جاتا ہے۔ ڈاکٹر گرین ہیرنگ اور ہاروس فرماتے ہیں کہ ہائیڈرو فوبی نم یا لاسین دوائی کی اونچی طاقت میں ایک ایک یا دو دو خوراکیں روزانہ یا ایک آدھ دن پنج میں چھوٹے کو دینے سے یقیناً مریض مرض سے بچا رہتا ہے۔ ڈاکٹر کلارک صاحب اس طرح سے لکھتے ہیں کہ زخم میں سے خون نکلنے اور صاف کرنے کے بعد جیسا کہ اوپر مفصل ذکر آچکا ہے۔ ہائیڈرو فوبی نم دوائی ۳x طاقت میں تین مرتبہ روزانہ ایک ہفتہ تک دینی چاہیے اور اس کے بعد بیلادونا ۲ صبح اور شام دو مرتبہ روزانہ کم از کم چھ ماہ تک استعمال کرانی چاہیے۔ اس سے مریض پر ہکاؤ کا حملہ نہیں ہوگا۔ اگر باوجود ان تمام احتیاطوں کے پھر بھی کسی مریض میں ہکاؤ کی علامات آشکارا ہونے لگیں تو مریض کو فوراً ترکی تمام میں لے جانا چاہیے اور وہاں اس کو

سکتا ہے۔ یہ ایک سستی دوائی ہے۔ میوپی دالے اکثر اس دوائی کو کنوؤں میں ڈالتے ہیں تاکہ کنوؤں کا پانی مختلف امراض کے جراثیم سے پاک و صاف ہو جائے۔ یہ دوائی جراثیم کو ہلاک کرنے میں خاص اثر رکھتی ہے۔

نوٹ : یہ معمولی کام ہیں۔ جو یدپ میں اور نیز ہندوپاک کے بڑے بڑے شہروں مثلاً دہلی۔ لکھنؤ۔ پشاور وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے حمام میں متحدہ کمرے

رکھنا چاہیے۔

بیلادونا ۶۰ بذریعہ پکاری ہرنیم گھنٹہ کے بعد مریض کے جسم میں پہنچانی چاہئے اور اگر بیلادونا کامیاب نہ ہو تو سٹراونیم ۶۰ ہرنیم گھنٹہ کے بعد اسی طرح سے دینی چاہئے اگر مریض کے احساسات بہت تیز ہو چکے ہوں اور مریض اپنے بدن کے کپڑے پھاڑنا چاہتا ہو تو لاکس ۶۰ ہرنیم گھنٹہ کے بعد دینی چاہئے۔

پانی کے پینے یا اس کی آواز سننے یا چمکیلی اشیاء دیکھنے یا ہوا کے جھونکے سے حلق میں خاص قسم کے تشنج ہونے لگیں تو دعائی ہائیلند فوبی نم ۳۰x ہرنیم گھنٹہ کے بعد دینی چاہئے۔

## تشریح خواص الادویات

بیلادونا - بلاشبہ اس مرض کی یہ خاص دعائی ہے۔ اس کی موٹی موٹی

علامات یہ ہیں -

بڑی کوتاہ دم - بھاری نقاہت - ٹانگوں اور بازوؤں میں کڑل - ہڈیاں - گویا کتوں نے اس کے گردا گرد گھیرا ڈالا ہوا ہے - یہ آواز بلند چنچتا اور بار بار سنو کنا یہ اس دعائی کی خاص علامات ہیں -

✽ خورال : ۱x یا ۳x ہرنیم گھنٹہ کے بعد -

ہائیدروفوبی نم (اس کو لائی سین بھی کہتے ہیں) ڈاکٹر ہیرنگ صاحب اس دعائی کی بڑی تعریف کرتے ہیں - وہ اس کو مرض سے محفوظ رکھنے والی نیز شفا دینے

بداہتہا مہتے ہیں - جس میں نیم گرم اور تیز گرم پانی کے حوض ہوتے ہیں - جس کا اعتبار سے وہ سرد و گرم کرے کہلاتے ہیں - اس جسم کے تمام میں غسل کرنے سے جلد صاف ہو جاتی ہے اور مسامات کھل جاتے ہیں اور خوب کھل کر پسینہ آتا ہے - ایسے حمام کی حرارت ۱۰۰ سے ۱۲۰ فارن ہیٹ تھرمامیٹر کے درمیان ہونی چاہئے -

(منقول از مخزن البواہر)

✽ دعائی کی مقدار و ترکیب است - کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

والی بتلاتے ہیں۔ بھاری سرچکڑ۔ ابکائیاں۔ شدید سرور و جبروں کی سختائی۔ ہاتھ اور پاؤں کا لڑکھڑانا۔ زرد چہرہ۔ بیدار گاڑھی تھوک سے اندر منہ مہرا ہوا۔ پینے کی خواہش لیکن مریض پی نہ سکتا ہو۔ بار بار تھوکتا۔ تھوک اندر نہ نگلی جاسکے۔ سانس بیتیے وقت رقت اور تشنچ۔ تالو اور نرخرہ کا اکرٹ جانا۔ یہ اس دوائی کی خاص علامات ہیں۔

✽ خوراک : ۳ یا ۲ ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

کینتھرس : کبھی مریض تند ہو جائے اور کبھی معنوم ہو جائے۔ حلق کو چھونے اور پیٹ دبانے سے تشنچ ہوں۔ منہ جلتا ہو اور خشک ہو۔ مجامعت کے لیے ایستادگی اور خواہش ہو۔ عورت کے اندام نہانی میں خارش ہوتی ہو اور جلن ہوتی ہو۔

✽ خوراک : ۱ ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں ہائیوسائیس لاکسس سٹرا مونیم ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

نوٹ : یہ ایک بڑی ملک بیماری ہے اس کا علاج بڑی احتیاط سے کرنا لازم ہے۔

## ضروری ہدایات

غلبہ مرض مریض کو اندھیرے کمرے میں نرم فرش پر ٹائے رکھیں۔ چونکہ خفیف سے خفیف آواز یا ہوا کا جھونکا یا روشنی کی چمک مریض کی تکالیف کو بڑھا دیتی ہیں۔ اس لیے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ مریض کو ذرا سی آہٹ بھی سنائی نہ دیوے یا ذرا سی روشنی بھی اس کو دکھلائی نہ دیوے۔ پس جب بیمار دار یا کسی رشتہ دار کو مریض کے پاس جانا مطلوب ہو تو بڑے دبے پاؤں آہستہ آہستہ جانا چاہیے تاکہ پاؤں کی آہٹ نہ ہو اور بولنا بالکل نہیں چاہیے۔

جب کسی کو دیوانہ کتا کاٹے تو ابتدائی علاج کے بعد جس قدر جلدی ہو سکے فوراً مریض کو لاہور یا کسولی لے جانا از حد ضروری ہے۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

# انگاره خبیث پستی

(MALIGNANT Pustula Anthrax)

یہ ایک متعدی مرض ہے جو کہ خاص کر بھیرموں میں ٹہا کرتا ہے اور ان سے قصابوں - چمڑنگوں، گڈریوں اور اون دھننے والوں کو ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض کا سبب بھی ایک خاص قسم کا خوردبینی کیڑا ہے۔ جسے ڈاکٹری اصطلاح میں بیس لس (این تقریس) کہتے ہیں۔

## علامات مرض

یہ بیماری عموماً چہرہ گردن - یا بازوؤں پر ہوتی ہے۔ مقام ماؤت پر ایک آبلہ پیدا ہوتا ہے۔ جس میں درد اور سوزش ہوتی ہے اور اس کے گرد ایک سرخ حلقہ بن جاتا ہے۔ نیز اس پر مثل باجرے کے دانوں کے چھوٹے چھوٹے آبلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آبلے پھٹ جاتے اور مثل سرخ باد کے یز خم پھیل جاتا ہے۔ بخار بے قاعدہ طور پر رہتا ہے۔ کمال درجہ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور آخر کار بحالت ہذیان مریض چل بستا ہے۔

## علاج

این تقریسی خم : یہ دوائی ۳ طاقت میں ہر ایک یا دو گھنٹہ کے وقفہ پر دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔

لاسس : جب ماؤت مقام بڑا ذکی الحس اور ارغوانی رنگ کا ہو اس کے چھوٹے یا اس کے نزدیک انگلی کرنے سے مریض کو ڈر لگے۔ طبیعت بے چین ہو۔

خوراک : ۶x کے دو قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد اور اسی دوائی کا لوشن

ناکرواد اس پر کپڑے کا ٹکڑا تڑکے ماؤف مقام پر رکھنا چاہیے۔  
 لوشن بنانے کا طریقہ: لاکس ۶x ایک ڈرام - پانی دواؤس -  
 آرٹینیکم ایلیم: جب کہ ماؤف مقام پر اس طرح جلن ہو گیا کہ دیکھتے ہوئے کوٹھے اس  
 پر رکھے ہیں اور پیاس بار بار لگتی ہوئے چینی اور تشویش موجود ہوں  
 \* خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 انکونائٹ: جب کہ بخار کے ساتھ ہڈیاں ہواؤد چہرہ سرخ ہو۔  
 \* خوراک: ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 بیلادونا: جب کہ بخار کے ساتھ ہڈیاں ہواؤد چہرہ سرخ ہو۔  
 \* خوراک: ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

مقام ماؤف کو اچھی طرح سے صاف کر کے اس کے اوپر کاشک لگانا از حد  
 مفید ہے۔

## کورہ جدام

(LEPROSY)

یہ ایک مزمن متعدی مرض ہے۔ جس میں مریض کے ہاتھ پاؤں اور انگلیوں  
 وغیرہ کے جوڑوں میں درد ہو کہ ہیپ پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات ہاتھ پاؤں اور  
 انگلیوں کے پورے جھڑ کر مریض سنگڑا، لولا ہو جاتا ہے اور مریض کی شکل بڑی  
 گھناؤنی ہو جاتی ہے۔

نوٹ: ہندو پاک اور چین میں اس بیماری کا بٹا زور ہے۔ ہندو پاک میں کوڑھیوں  
 کی تعداد ۵ لاکھ ہے۔

\* دعائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲

## اسباب مرض

اس مرض کا باعث بھی ایک خاص قسم کا کرم مانا گیا ہے جسے ڈاکٹری اصطلاح میں ریسیس لیپری (یعنی جرثومہ جذام (کوڑھ کا کیرا) کہتے ہیں۔ یہ کیرا مریض کے زخموں میں پایا جاتا ہے۔ اس مرض کی چھوٹ بیمار سے تندرست کو لگ جاتی ہے۔ درحقیقت یہ ایک نہایت چھوٹ واری بیماری ہے مریض کے کپڑوں کے ذریعے بھی اس بیماری کے پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آتشکی مریض اس مرض میں اکثر مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ غریب اور مفلس لوگ جو غلیظ اور کثیف رہتے ہیں اکثر اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض محققین کی یہ بھی رائے ہے کہ جو لوگ خشک اور سردی ہوئی مچھلی کھاتے ہیں وہ اس مرض میں اکثر مبتلا ہوتے ہیں۔

## علامات مرض

مریض کے جسم پر بعض مقامات پر سرخ دھتے یا داغ پڑ جاتے ہیں۔ آخر ان مقامات پر چھوٹی چھوٹی گھٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں یہ گھٹیاں چہرہ پر زیادہ پیدا ہوتی ہیں۔ ابروؤں۔ پلکوں اور مونچھوں کے بال گر جاتے ہیں پھر رفتہ رفتہ یہ گھٹیاں نرم ہو کر بھوٹ پڑتی ہیں اور ان میں سے بدبودار مواد نکلتا رہتا ہے جس سے مریض کی شکل بڑی مہیب ہو جاتی ہے۔ جب مرض کا بہت زور ہو تو ناک کی ہڈی گل کر ناک بیٹھ جاتی ہے گلے میں زخم پڑ کر کھانا پینا اور بات کو نامشکل ہو جاتا ہے اور بالآخر نمونیہ یا کھانسی وغیرہ کے امراض میں مریض مبتلا ہو کر انتقال کر جاتا ہے۔ مندرجہ بالا علامات ٹیوبریکیولوسس لیپری کی شکل دار کوڑھ کی ہیں۔

## اسٹیک لیپری کی ابتدائی علامات

جوڑوں میں دردوں کا ہونا اور مآؤف مقام کا بے حس ہونا ہے۔ عموماً چہرہ۔ سینہ۔ ہاتھ پاؤں پر بھورے رنگ کے چھوٹے چھوٹے دھتے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ مقامات بے حس ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پر سوئی چھوئیں یا انگاری رکھیں تو وہ

بھی مریض کو کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ پھر ان مقامات پر آبلے پڑ جاتے ہیں اور وہ آبلے پھوٹ کر زخم بن جاتے ہیں اور مریض سے سخت بدبو آتی ہے۔ آخر کار مریض مرض اسہال وغیرہ میں مبتلا ہو کر راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

## علاج

اس مرض میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہوتی ہیں۔

بیسی لائیم ۱۰-۱۱ وکیسی نائیم ۳-۳۰۰ مینڈرینم ۳-۳۰۰ تھارڈیم-۱۱ اناکارڈیم۔ آر سینکم آیوڈائیڈ-آرم-گریفائٹس۔ یہ سب ادویات کام آتی ہیں۔ لیکن شاید سب سے اعلیٰ دوائی اس مرض میں ہائیڈروکوٹائیل مسکچر (H) ہے۔ یہ دوائی براہی بوٹی سے حاصل کی جاتی ہے۔ ویدک گرنہوں میں بھی کوڑھ کے لیے یہ بڑی اعلیٰ دوائی مانی گئی ہے۔ دس قطرے اس دوائی کے صبح اور دس قطرے شام کو نصف چمٹانک پانی میں ڈال کر پلانے چاہئیں اور اس کا استعمال کئی ماہ تک متواتر جاری رکھنا چاہیے اور ہائیڈروکوٹائیل کی مرہم زخموں پر روزانہ ایک مرتبہ لگانی چاہیے۔

## ضروری ہدایات

۱۔ کوڑھی کو تندرست اشخاص سے بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے۔ اور کھلی ہوا میں اس کی بود و باش ہونی چاہیے۔

۲۔ کوڑھی کے پیشاب، پاخانہ اور دیگر مواد کو جو کہ زخموں سے خارج ہو ایسی جگہ پھینکوانا چاہیے جہاں کہ دوسرے اشخاص میں چھوت کے لگنے کا ڈر نہ رہے اور بہت گندے کپڑوں کو جلادینا چاہیے۔

۳۔ کوڑھی کے زخموں پر پی پٹی باندھے رکھنی چاہیے تاکہ مواد اُدھر اُدھر گرنے نہ پائے۔  
۴۔ کوڑھی کو کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور نہ ہی بیچنی چاہئیں اور اسے ایسا پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے اس کو تندرست اشخاص میں غلط فطرت ہونا پڑے مثلاً حجام۔ دھوبی کا پیشہ۔

۵۔ تمام کوڑھیوں کو آبادی سے دور کوڑھی خانوں میں رکھنا چاہیے تاکہ ان کے میل



جول سے دوسروں میں یہ مرض نہ آجائے اور کوڑھیوں کو وہاں کھانے پینے پھینے وغیرہ کے لیے سب اشیاء مہیا کی جایا کریں تاکہ مانگنے کے لیے اُن کو شہروں یا قصبوں میں نہ جانا پڑے۔

۶۔ کوڑھی والدین کے بچوں کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے۔ تاکہ والدین سے چھوت بچوں کو نہ لگ جائے۔

# کوزاز چاندنی

(TETANUS— lockjaw)

یہ ایک متعدی مرض ہے جس میں جسم کے اختیاری عضلات متشنج ہو کر ٹیٹھ جاتے ہیں اور بدن اکڑ کر مانند تیر کے بالکل سیدھا یا مثل کمان کے ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔

## اسباب مرض

یہ ایک خاص قسم کے کرم سے جس کو انگریزی میں (بیسس آف ٹینس) یعنی کرم کوزاز کہتے ہیں، یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ یہ کرم باغوں اور کھیتوں کی زمین میں اور خاص کر اصبطل کی کھا دیں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اور اکثر زخم کے راستہ میں سرایت کر جاتا ہے۔ زخم کو غلاظت لگنے سے یہ کرم بھی غلاظت کے ہمراہ جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔

جسم میں اس کا زہر نشوونما پاتا تھا جب نخاع کے اعصابی مرکوزوں پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس مرض کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی گیلی زمین پر ننگے بدن سونے یا بھینکنے اور سردی لگنے سے بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کو کوزاز ذاتی کہتے ہیں اور کبھی گرم ممالک میں یہ مرض نوزائیدہ بچوں میں وباؤ پھیلا کرتا ہے۔

## علامات مرض

ابتدائی علامات دل میں خوف کا پیدا ہونا یا باضمہ میں فتور واقعہ ہونا۔ لیکن اصلی علامات مرض کی اس وقت آشکارا ہوتی ہیں جب کہ مریض منہ نہیں کھول سکتا اس کو انگریزی

میں (لاک جا) کہتے ہیں۔ منہ اور چہرہ کے عضلات میں متواتر تشنج ہونے لگتے ہیں اور منہ کی باجھیں کھل جاتی ہیں اور ایسا دکھائی دیتا ہے گویا کہ مریض منہ رہا ہے۔ رفتہ رفتہ جسم کے تمام عضلات میں تشنج ہونے لگتے ہیں۔ چونکہ جسم کے ایک جانب کے عضلات زیادہ اینٹھتے ہیں اس لیے جسم اکڑ کر آگے کی طرف یا پیچھے کی جانب یا ایک پہلو پر خم کھا جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم اکڑ کر بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ بھوئی اُوپر کو چڑھ جاتی ہیں اور آنکھیں باہر کو نکل آتی ہیں۔ سینہ کے عضلات میں تشنج ہونے کے باعث دم لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور سانس باکاز بند آتا ہے۔ اس مرض میں تشنج نہایت شدید ہوتا ہے اور اس کا دورہ بھی لمبا ہوتا ہے اس لیے مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور غیہ نہیں آتی۔ بخار ۱۰۵ یا ۱۰۶ درجہ کا چڑھ جاتا ہے اور پسینہ بکثرت آتا ہے۔ مریض بول نہیں سکتا لیکن اس کے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں۔ ابتدا میں تو مرض کا دورہ جلد ہوتا ہے لیکن رہتا دیر تک ہے۔ بالآخر مریض اتنا ذکی الحس ہو جاتا ہے کہ مریض سے بات چیت کرنے سے یا اُسے چھونے سے یا پاؤں کی آہٹ سے اُوچھا بولنے سے یا روشنی یا ہوا لگنے سے مرض کا دورہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں عموماً دو تین روز کے بعد دم بند ہو کر یا دل کی حرکت بند ہو کر یا نقاہت عظیم کے باعث جاں بحق تسلیم ہو جاتا ہے۔

## اقسام مرض

اس مرض کے کئی ایک اقسام ہیں۔

۱۔ ٹیٹے نس اڑ پو پے تھک۔ جبکہ بدوں زخم کے پیدا ہو، طبت میں اس کو کوناز زخمی

کہتے ہیں۔

۲۔ ٹیٹے نس اڑ پو پے تھک۔ جب کہ بدوں زخم کے یہ مرض خود بخود ہو جائے۔

طبت میں اس کو کوناز ذاتی کہتے ہیں۔

۳۔ ٹیٹے نس نیونے ٹورم۔ جب کہ نوزائیدہ بچے کو یہ مرض ہو جائے۔ طبت میں اس

کو کوناز صیبانی کہتے ہیں۔

۴۔ آر تھو ٹوئاس۔ جب کہ جسم اکڑ کر بالکل سیدھا رہے۔ طبت میں اس کو کوناز

مستقیم کہتے ہیں۔

۵۔ ایمر اس تھوٹو ناس۔ جبکہ جسم اکڑ کر سامنے کی طرف خم کھا جائے۔ طبت میں اس کو کوناز امامی کہتے ہیں۔

۶۔ آپس تھوٹو ناس۔ جبکہ جسم اکڑ کر پیچھے کی جانب خم کھا جائے۔ طبت میں اس کو کوناز حلفی کہتے ہیں۔

۷۔ پورو تھوٹو ناس۔ جبکہ جسم اکڑ کر ایک پہلو کی طرف خم کھا جائے۔ طبت میں اس کو کوناز جانبی کہتے ہیں۔

نوٹ: مذکورہ بالا اقسام میں زیادہ تر کوناز زخمی ہوا کرتی ہے اور اس سے کم کوناز طفلی اور اس سے کم کوناز ذاتی۔

## علاج

نکس و امیکا: اس مرض کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔

\* خوراک: ۳x یا ۲x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ نکس و امیکا سے اثر کر کے یہ دوائی دوسرے درجہ پر ہے جسم کا نیلا پیدا ہو جانا اور منہ میں جھاگ کا آنا۔ یہ اس کی موٹی موٹی علامات ہیں۔

\* خوراک: ۳x ہر بیس منٹ یا آدھ گھنٹہ کے بعد۔

سانی کیوٹاوائی روسا: دفعتاً جسم کا اکڑ جانا اور جھٹکانا اور بعد میں نقاہت کا پیدا ہو جانا۔ سانس کا بہت بوجھل ہو جانا۔ اور چھوٹے سے مرض کا دورہ کر آنا یہ اس کی علامات ہیں اور خاص علامت اس دوائی کی یہ ہے۔ کہ مریض کی آنکھیں ایک ہی لفظ پر ٹکسکی باندھے رہتی ہیں۔

\* خوراک: ۲x ہر بیس منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد۔

فانی سوٹنگما: نخاع اور ٹانگوں میں اکڑاؤ۔ چلیوں کا باری باری سے پھیلنا اور سکڑنا اس کی خاص علامت ہے۔

\* خوراک: ۵x یا ۳x ہر بیس منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد۔

\* دوائی کی تدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

سٹرامونیم : جبکہ روشنی یا چھونے سے مرض میں زیادتی ہو۔ حلق اور سینہ میں تشنچ پڑتے ہوں تو یہ دوا ڈی مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک : ۳x ہر میں منٹ یا نصف گھنٹہ کے بعد۔

پسی فلورا : گرم ملکوں میں یہ دوائی بڑی مفید پڑتی ہے۔

✽ خوراک : مدرٹنکمر کے ساتھ قطرے نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر دینے چاہئیں اگر ایک خوراک کافی نہ ہو۔ تو اسی طرح سے نصف گھنٹہ کے بعد دوسری خوراک دینی چاہیے۔ علیٰ ہذا قیاس۔

ہائی پریکیم : جب اعصاب کو چوٹ لگنے یا زخم کے باعث یہ مرض پیدا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ خاص کر جب کہ نخاع میں چوٹ آنے کے باعث یہ مرض پیدا ہوا ہو۔

✽ خوراک : ۳x یا ۳ یا ۳۰ ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

کو پریم : ہرے کارنگ زرد اور جسم پیچھے کی جانب خم کھا گیا ہو۔ مریض ہر ایک تشنچ کے ساتھ بے ہوش ہو جاتا ہو۔

✽ خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

بیلا ڈونا : شیر خوار بچوں کے کوزا میں یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے جبڑوں کا اکڑاؤ ہو۔

✽ خوراک : ۱x یا ۲x پندرہ منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے ایکونائٹ میگنیشیا فاس۔ کاربالک ایسڈ اور اگنیشیا ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

انجام مرض } جب ترارت جسم ۱۰۰ درجہ سے زیادہ ہو۔ یا دل نہایت ضعیف ہو جائے یا علامات تنفس تشنچ ہو کہ دم بند ہونے لگے اور مرض کے حملے پے در پے ہونے لگیں تو نتیجہ عموماً خراب ہوا کرتا ہے۔ کبھی کبھی تو مریض چند گھنٹوں میں ہی انتقال کر جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ساتویں روز یا گیارہویں روز کے اندر موت واقع

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ ۲۵

ہوتی ہے۔ اگر گیارہ دن گزر جائیں تو شفا کی امید بندھ جاتی ہے۔

**ضروری ہدایات** { علامات مرض کے شروع ہوتے ہی مریض کو سردی سے محفوظ کر کے ایک اندھیرے کمرے میں آرام سے

رٹائے رکھیں اور ایسا انتظام کریں کہ وہاں پر شور و غل نہ ہو۔ اگر زخم ہو تو کیلنڈرولا سے اس کو صاف کرنا چاہیے۔ ۴ ڈرام کیلنڈرولا مدرٹیکچر میں ۸ اونس پانی ملا کر دوشن تیار کیا جاتا ہے۔ اگر علامات زیادہ شدید نہ ہو تو مریض کو گرم پانی میں غسل دیں اور اینما کرنا بھی مفید ہوا کرتا ہے۔

**غذا** { غذا مریض کو سیال دینی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے نگل سکے مثلاً دودھ شوربا بخنی ہوئے اندھے وغیرہ۔ غرضیکہ غذا لطیف اور زود ہضم ہونی چاہیے۔

## بچوں کی کزاز

(NEONATORUM Tetanus)

نوزائیدہ بچہ کی ناف کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اگر اس کو پاک و صاف نہ رکھا جائے تو مرض کزاز کے جراثیم اس میں سرایت کر کے اس مرض کو پیدا کر دیتے ہیں۔ ننھے بچوں میں یہ مرض پیدائش کے تیسرے روز سے لے کر دسویں روز تک ہو جایا کرتا ہے۔ بعض اوقات شدت کی سردی یا خراب آب و ہوا یا خراب غذا۔ یا پیٹ میں کسی ناسد مادہ کا ہونا بچوں میں کزاز کا مرض پیدا ہونے کا موجب ہوتا ہے۔

**علامات مرض** { ابتدا میں بچہ بے چین ہوتا ہے اور رُوں رُوں کرتا رہتا ہے رات کو سوتے سوتے چونک اُٹھتا ہے۔ آخر کار بچہ دودھ پینا بند کر دیتا ہے اور اس کے جبرٹے کے عضلات تشنج ہو کر اس کے منہ میں جانتی لگ جاتی ہے اور بعض اوقات سارے جسم میں تشنج ہو کر بچہ مرجاتا ہے۔

**علاج** : کے لیے دیکھو کزاز کا بیان صفحہ ۲۹۳۔

# امراضِ حبیثہ

## سوزاک

(GONORRHOEA)

یہ ایک متعدی مرض ہے۔ پیشاب کی نالی میں جن کو طبت میں نائیزہ اور انگریزی میں یوڈی قرار دیتے ہیں شدید درد ہو جاتا ہے اور اس میں سے پیپ آنے لگتی ہے بھوت لگنے سے چوبیس گھنٹے سے لیکر پانچ چھ یوم کے اندر مرض ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی دیر میں۔

## علامات مرض

ابتداء میں آلم تناسل کے سرے میں ایک خاص قسم کی خواش ہوتی ہے اور انتشار کے وقت درد ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت درد بڑھ جاتا ہے۔ اور جوں جوں ترقی کرتا ہے درد ناقابلِ برداشت ہوتا جاتا ہے۔ اس کے دو تین یوم بعد پیشاب کی نالی کا منہ سرخ۔ متورم اور تر ہو جاتا ہے۔ خصیہ کی ڈوری فوطہ اور مقام جنگاں میں کھجھوٹ اور درد ہوتا ہے۔ پیشاب آنے کے بعد مریض کو جلن اور درد ہوتا ہے اور جوں جوں سرخی اور درد بدرجہ بڑھتی ہیں تول تول درد اور جلن میں بھی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ ابتدا میں پیپ مقدار میں تھوڑی اور محدود نکلتی ہے اور نائیزہ کے منہ میں سمپٹ جاتی ہے اور کپڑے میں لگنے سے داغ پیدا ہوتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے دونوں سرے یعنی مردوں میں سپاری کا منہ اور بچھلا حصہ دونوں ہی سرخ متورم اور درد کرتے ہیں اور رات کے وقت کثرت انتشار ہونے کے باعث ایسا غضب کا درد ہوتا ہے کہ بیمار کی چیمچی نکل جاتی ہیں اور اس کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔

ایک ہفتہ کے بعد پیپ بہت زیادہ آنے لگتی ہے اور گاڑھی سفید زردی مائل

ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات اس کے ساتھ خون ملا ہوا ہوتا ہے۔ پیشاب کرتے وقت اور نیز بوقت انتشار نہایت ہی غضب کا درد ہوتا ہے اور یہ درد تمام قصب میں ہوا کرتا ہے۔ بوجہ سوزش پیشاب کی نالی تنگ ہو جاتی ہے اور چیر کر آتا ہے اور اکثر بخار بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ایک ہفتہ تک رہتی ہے۔ جب سوزش کم ہونے لگتی ہے تو اس کے ساتھ دیگر علامات میں بھی تخفیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی پیشاب کرتے وقت اور بوقت انتشار درد کم ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات درد بالکل ہی موقوف ہو جاتا ہے لیکن پیپ آتی رہتی ہے اور یہ سفید لیس مار چھپی ہوتی ہے۔

## اسباب مرض

اکثر یہ مرض ان مستورات سے پھیلتا ہے جو کہ مرض سوزاک میں مبتلا ہوں یا جن کی اندام نہانی میں سوزاک کی مادہ موجود ہو۔ اگرچہ ان مستورات پر ابھی تک سوزاک نے اثر نہ کیا ہو۔ ایسی مستورات کے ساتھ مجامعت کرنے سے یہ بیماری مردوں میں بھی پھیل جاتی ہے اور پھر یہ مریض جب اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے جس سے ان بیویوں کی زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی یہ مرض مردوں میں اس وقت بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب کہ وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جماع کرے جس کو خون حیض جاری ہو یا جس کو لیکوریا (رحم سے سفید گندی رطوبت کا اخراج) کی بیماری ہو جن کے اندام نہانی گندے ہوں یا جن کے بہائے رحم پر شدید قسم کے زخم ہوں۔ گاہے بگاہے کثرت مجامعت کے باعث بھی یودی تھرا (نائزہ پیشاب کی نالی) میں درد ہو جاتا ہے۔ اور اس میں پیپ آنے لگتی ہے۔ پیشاب درد و جلن سے آتا ہے۔ اصلی معنوں میں اس کو سوزاک نہیں کہتے بلکہ اس کا نام درد نائزہ سادہ اور انگریزی میں بے زرد جیا یا سخیل بیسی تھریٹس کہتے ہیں۔ شراب کا زیادہ استعمال کرنے یا آلات بل کو ٹھنڈی ہوا لگنے کے باعث یا جھابی کمزوری یا خنازیری مزاج یا نقرس یا پتھری وغیرہ کے سبب سے پیشاب کی نالی میں درد ہو کہ پیپ آنے لگتی ہے۔ اس کو سوزاک فاسد یا چھوٹا سوزاک کہتے ہیں۔ اس کا منسل ذکر آگے آئے گا۔

مختلف مریضوں میں اس مرض کی سختی اور دورہ مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ایک کیس میں شروع سے اخیر تک مرض کا

## درجات مرض

حملہ ایسا نرم ہوا کرتا ہے کہ سوائے پیپ آنے کے اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی لیکن دوسرے کیس میں ہر دو ابتدائی ادبہ کی علامات نہایت تکلیف دہ ہوا کرتی ہیں۔ اور بعض کیس ان ہر دو حالتوں کے مابین ہوتے ہیں۔ عموماً اس مرض کے چار درجے ہوتے ہیں۔

پہلا یا ابتدائیہ درجہ: اس کا دورہ ۲ گھنٹہ سے لے کر دو روز تک رہتا ہے۔ اس میں نائیزہ کے سرے پر خفیف خراش ہوتی ہے اور تپلا شفاف یا مثل دودھ کے پانی بمقدار قلیل نکلتا ہے۔

دوسرا درجہ: اس کے بعد دوسرا درجہ شروع ہوتا ہے یعنی درجہ سوزش لبہائے نائیزہ سرخ اور متورم ہو جاتے ہیں اور مواد بکثرت اگاڑھا۔ سفید زرد یا سبز خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کوتے وقت درد اور جلن ہوتی ہے اور بوقت شب آلت ناسل کی خیرش کے باعث مریض تکلیف میں رہتا ہے۔ اس درجہ میں نہایت تکلیف دہ عوارض مثلاً خراش مثانہ۔ سوزش۔ فوطہ۔ غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ) شامل مرض ہو کر وبال جان ہو جاتے ہیں۔

تیسرا درجہ: اس درجہ میں مندرجہ بالا علامات کی سختی رو بہ تخفیف ہونے لگتی ہے۔ بوقت اخراج بول تھوڑی خراش ہوتی ہے اور پیپ زرد آتی ہے۔ یہ حالت اگر عرصہ تک قائم رہے تو مرض کا چوتھا درجہ شروع ہو جانے کا ڈر دامگیر ہو جاتا ہے۔

چوتھا درجہ یا قرحہ: گاہے بگاہے بمقدار قلیل شفاف پانی یا عموماً دودھ یا رطوبت خارج ہوتی رہتی ہے۔ قرحہ میں عموماً درد اور جلن نہیں ہوا کرتے اور سوائے اس کے کہ کپڑا پر مواد گلنے سے داغ پڑ جاتے ہیں اور کوئی علامت باقی نہیں رہتی۔ یہ بات مشہور ہے کہ جب مرض اس درجہ پر آ جاتا ہے۔ تو اس وقت چھوٹ کا ڈر جاتا رہتا ہے لیکن چونکہ یہ معلوم ہونا بہت مشکل ہے کہ کب چھوٹ کا مادہ زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقل مند آدمی وہی ہے جو کہ نفسانی خواہش کو روکے رکھتا ہے اور اپنی بیوی کو اس مرض کے خطرہ میں نہیں ڈالتا۔

بعض اشخاص کی طبیعت قدرتی طور پر اس قسم کی نبی ہے کہ ان کو سوزاک کا مرض خدا آداتا ہے۔ ذرا بد پرہیزی ہوئی اور وہ بیچارے مبتلائے مرض ہو گئے اور دوسری



طرف ایسی بھی طبیعتیں بنی ہیں کہ کئی بار انہوں نے بیمار مستورات کے ساتھ مجامعت کی۔ لیکن بیماری سے بچے رہے یہ مختلف طبیعتوں کے قدرتی میلان پر منحصر ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ مرض بڑا خبیث ہے۔ بھولے سے بھی بازاری عورتوں کے نزدیک مست جاؤ اور اپنی قیمتی اور انمول زندگی کو خطرہ میں نہ ڈالو اور نہ ہی اپنے خاندان کا ہیڑا ڈبو کے کا سبب بنو۔ جو اشخاص خود مبتلائے مرض ہو کر اپنی پاک دامن بیویوں کو بھی مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں اور ان بیمار یوں کی زندگیاں تلخ کر دیتے ہیں ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گنہگار نہیں ہے۔

**انجام مرض** { رپراگ نوسس } سوزاک کے متعلق یہ بتلانا بہت مشکل ہے کہ مرض کا وعدہ کتنا لمبا ہوگا۔ کیا صحت اختیار کرے گا اور نتیجہ کیا ہوگا۔ بعض اوقات چند ناریدہ اسباب کے باعث مرض ایسی صحت اختیار کر لیتا ہے کہ جو کچھ مرض کے متعلق خیال ہوتا ہے۔ سب غلط ہو جاتا ہے ایک کمیس تو چند یوم میں ہی درست ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا باوجود علاج کاملہ کے زیادہ ترقی پکڑ جاتا ہے اور ہر قسم کی پیچیدہ اس میں شامل حال ہو جاتی ہے اور مہینوں تکلیف بنی رہتی ہے عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ خنازیری مزاج والے زود رنج اور عصبی طبیعت والے مریض اس مرض میں زیادہ تکلیف پاتے ہیں۔

## علاج

اس مرض کا علاج کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ علاج ایسے طریقہ پر کیا جائے کہ جس سے مرض کا بڑے سے قلع قمع ہو سکے اور کئی قسم کے پیچیدہ امراض سے بچاؤ رہے۔ ہمارے ملک میں عام قاعدہ ہے کہ جب مریض کسی ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جاتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کوئی ایسی دوائی دو کہ پہلی خوراک سے ہی آرام ہو جائے یا ایک روز میں ہی بیماری بڑے سے جاتی رہے۔ ڈاکٹروں اور حکیموں نے بھی مریضوں کی خواہش کے مطابق ایسے نسخے تیار کر رکھے ہیں کہ دوائی دی اور مریض کو کہہ دیا کہ آج ہی آرام ہو جائے گا کہ مریض نے دوائی استعمال کی اور اس کو ایسا معلوم ہوا کہ اس کو آرام ہے۔ لیکن مریض بیچارہ نہیں جانتا کہ بیماری کی شکل بدل دی گئی ہے۔ مرض کو دبا دیا گیا

ہے۔ اب یہ مرض کسی اور طریقہ پر سخت ترین اور خوفناک حملہ کرے گا چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کہ بیمار کی ساری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ دوائیاں تو ختم نہیں ہوتیں لیکن زندگی تمام ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارے ملک میں جہالت بہت ہے اس لیے مریضوں کا کیا قصور۔ اور ڈاکٹروں اور حکیموں نے اپنی روزی کمانی ہے اس لیے ان کو بھی مریضوں کی خواہش کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ بیمار پیچاڑے پیچ در پیچ بیماریوں کا شکار ہوئے مارے مارے پھرتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہومیو پیتھک ادویات ان نقائص سے متبر ہیں۔ یہ بیماری کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے اور ان کا اثر دائمی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر شروع سے ہی ہومیو پیتھک علاج کروایا جائے تو پھر مریض کو قرحہ وغیرہ کا بہت کم قدر ہوتا ہے۔ اور پیچ در پیچ امراض کا شکار بھی شاذ و نادر ہی ہونا پڑتا ہے۔ چونکہ یہ ادویات بے ضرر زود اثر اور کھانے میں خوش ذائقہ ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کے کھانے سے نہ بے آرامی اور نہ ہی صحت بگڑنے کا ڈر ہوتا ہے اور مریض ان ادویات کو کھاتا جہاں اپنا کام کاج حسب معمول کرتا رہتا ہے۔

یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے ایلو پیتھک بھائی بھی امراضِ خبیثہ کے علاج میں کچھ ہومیو پیتھک علاج کے ساتھ آٹے ہیں۔ اب بڑا فرق یہ ہے کہ د. بیمار کو دوائی کی خوراکیں بہت زیادہ مقدار میں دے کہ مریض کی طبیعت کو بگاڑ دیتے ہیں۔ مرض سوزاک کا تو آرام آ جاتا ہے۔ لیکن مریض کا جسم کئی ایک پیچیدگیوں کا مسکن بن جاتا ہو برخلاف اس کے ہومیو پیتھک علاج سے جہاں ایک طرف سوزاک کا آرام ہو جاتا ہے۔ وہاں جسم میں اور کوئی پیچیدگی پڑنے نہیں پاتی۔ دوسری فوقیت ہومیو پیتھک کو یہ ہے کہ اس طریقہ علاج میں کئی ایک ادویات ایسی بھی ہیں کہ جن کا ایلو پیتھک ڈاکٹر کہتے بھی نہیں ہے۔

ڈاکٹر یلڈہم صاحب ایل آر سی بی (ایڈنبرا) اور ایم آر سی ایس (انگلینڈ) تحریر فرماتے ہیں کہ میں بے شمار سوزاک کے مریضوں کا ایلو پیتھک اور ہومیو پیتھک ہر دو طریقوں سے علاج کیا ہے۔ یہ یں مانتا ہوں کہ ایلو پیتھک طریقہ سے بھی مرض سوزاک کو آرام آ جاتا ہے۔ لیکن مریض کی طبیعت بگڑ جاتی ہے اور ہومیو پیتھک علاج سے مریض سوزاک کو نسبتاً بہت جلدی مستقل اور طبیعت میں بدوں کسی خرابی

پیدا ہونے کے صحت کئی حاصل ہوتی ہے۔

ایکونائٹ : یہ دوائی مرض کے ابتداء میں نہایت ضروری ہے۔ جب کہ خارش نہایت سرعت سے پھیل رہی ہو جلن شدید ہو۔ مواد بکثرت خارج ہوتا ہو بوقت شب آلہ تناسل کی خیزش بکثرت اور تکلیف دہ ہوا و ان علامات کے ہمراہ بخار بھی ہو تو یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے۔ اس دوائی کے ۱x یا ۲x ڈائی لیوشن کے ۵ قطرے فی خوراک ہر چار گھنٹہ کے بعد دیتے ہیں اور اگر کوئی اور دوائی بھی منظر ہو۔ تو ایکونائٹ اور دوائی باری باری سے دیتے جائیں۔ بیماری کے دوران میں اور دیگر پیچیدگیوں میں بھی یہ دوائی منظر ہو تو دی جاتی ہے۔

مرکیورس کار : مرض کے ابتدائی درجوں میں یہ بہترین ادویات میں سے ایک ہے۔ بیماری کے اوّل ہفتہ میں ایکونائٹ اور مرکیورس دوائی کی خوراکیں باری باری سے ہر چار چار گھنٹہ کے بعد دینے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ۳x ڈائی لیوشن کے ۵ قطرے ایک خوراک کی مقدار ہے۔ یہ ہر دو ادویات ایکونائٹ اور مرکیورس کا شدید علامات کو کم کرنے میں بھی ناکامیاب نہیں ہوتیں اور جب تک یہ اپنائیک اثر دکھلاتی جائیں۔ ان کو جاری رکھنا چاہیے۔

کینتھرس : مرض سوزاک کے علاج میں اس دوائی کا بھی خاصہ حصہ ہے۔ اس کا اثر تمام قوائے بول پر ہوتا ہے۔ یعنی نائیزہ کے منہ سے لے کر گردن تک پس ان تمام حالت میں جبکہ خراش نائیزہ کے منہ سے لے کر شانہ تک پھیلی ہوئی ہو۔ اور تمام نالی میں جلن ہو۔ پیشاب کی حاجت بار بار اور پُر از درد ہو تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ کینتھرس کی یہ علامت خاص ہے کہ پیشاب کی حاجت متواتر نہ رہتی ہے اور پیشاب کرتے وقت چند قطرے ہی نکلتے ہیں۔ قصب کی خیزش نہایت شدید ہوتی ہے اور درد غضب ناک ہوتا ہے۔ شہوت کی خواہش نہایت غالب ہوتی ہے۔ پیپ زرد رنگ کی یا خون آمیز آتی ہے اور جس جگہ کپڑے کو لگتی ہے داغ پیدا کر دیتی ہے۔ جب پچکاری کرنے سے پیشاب کا آنا رک جائے اور سوزش شانہ کے سرے تک پہنچ جائے تو بھی یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔

✽ خوراک : ۱۰ ڈوائی یوشن کے ۵ قطرے ایک ادس پانی میں ڈال کر ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے ۔

کینا بس سٹائو : سوزاک کے علاج میں یہ بھی ایک معتبر دوائی ہے۔ ابتداء میں جب ایکو نائٹ مرکبوس یا کینتھرل صبح، حال دی جا چکی ہو، اور ان کے دینے سے شدید علامات میں تھوڑی تخفیف واقع ہوئی ہو تو بعد میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ علامات اس کی یہ ہیں۔ جلن بوقت بول بہت ہونا نیزہ کا سرا سوجا ہوا اور سرخ ہو۔ مفید بازو پرپ مقدار میں بکثرت خارج ہوتی ہو۔ نائیزہ کو دبائے سے درد ہوتا ہے اور مریض چلتے وقت ٹانگیں جوڑ کر نہیں چل سکتا۔ کیونکہ ایسا کرنے سے پیشاب کی نالی میں اس کو درد ہوتا ہے اور بعض اوقات ایسا بھی محسوس کرتا ہے کہ پیشاب کی نالی میں گانٹھیں پڑ گئیں ہیں اگر مندرجہ بالا علامات کے ہمراہ جوش خون بجانب دماغ اور سر میں درد ہو تو یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

✽ خوراک : اس دوائی کی مدرٹنکچر کے ۵ یا ۱۱ یا ۱۵ قطرے ایک ادس پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار مرتبہ استعمال کرنے چاہئیں۔

کیوبیلا سوزاک کے مرض میں یہ بھی ایک نہایت مفید دوائی ہے۔ ایلو پتھک ڈاکٹر اس دوائی پر بڑا انحصار رکھتے ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے وہ اس دوائی کی خوراکیں اتنی بڑی مقدار میں مریض کو دیتے ہیں کہ بہت حالتوں میں مریض اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتا۔ تعجب ہے کہ ایلو پتھک ڈاکٹروں کو یہ خیال نہیں گزرتا کہ یہ دوائی زیادہ مقدار میں دی ہوئی بد اثرات پیدا کرتی ہے۔ جیسا کہ پارہ آتشک کے مرض میں زیادہ مقدار میں دیا ہوا غیر مفید ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ بہت کچھ نقصان کا موجب بنتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ہومیو پتھی سے ان امراض کا علاج کرنا سیکھیں یہ دوائی مرض کے ہر ایک درجہ میں مفید ہوتی ہے۔

تھو جیا : دوائی کینا بس سے مشابہ ہے اور بیماری کی جس حالت اور درجہ میں کینا بس دوائی کام آتی ہے اسی میں یہ دوائی مفید پڑتی ہے اس کی علامت یہ بھی ہے

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

کہ جب دورانِ پیٹ یا بعد میں ششہ کے گھونگھٹ کے اوپر سے نکل آویں تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔

ڈاکٹر لڈیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے۔ اُن کی رائے میں یہ متے اس خراش کا نتیجہ ہوتے ہیں جو کہ مواد کے گھونگھٹ کے نیچے رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اپنے اس بیان کی تائید میں وہ عجیب بات یہ بتلاتے ہیں کہ یہودیوں کو متے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ان میں گھونگھٹ کا گوشت نہیں ہوتا اور ان لوگوں میں بھی متے پیدا نہیں ہوتے جن میں گھونگھٹ کا گوشت پیچھے کی طرف بتا رہا ہے۔ اُن کی رائے میں متوں کا علاج خارجی ادویات لگانے سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ کاشک یا خاصٹک ایڈ پر لگا کر روئی کا خشک پیہ اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے وہ خشک ہو جاتے ہیں کیونکہ رطوبت جس سے نشوونما پاتے ہیں۔ ان ادویات کے لگانے سے خشک ہو جاتی ہے۔

✽ **خوراک:** ۳ ڈوائی لیوشن کے چار قطرے فی نوزاک ہر چوتھے گھنٹے۔  
مرض کی ابتدائی حالتوں میں مندرجہ بالا ادویات بالعموم بالکل کافی دوائی ثابت ہوتی ہیں اور شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرض کی سختی کے باعث یا کسی علامت مخصوصہ کے آشکارا ہونے کے سبب کوئی اور دوائی استعمال کرنی پڑتی ہے ایسے حالات میں مندرجہ ذیل ادویات کام آتی ہیں۔

**سلفر:** خنزیری مزاج والوں کے لیے یہ دوائی مفید ہے۔ یا جبکہ دیگر سبب دوائی اپنا اثر دکھانے میں قاصر رہے تو سلفر کی خوراک درمیان میں دینی مفید ہو سکتی ہے۔

✽ **خوراک:** ۱۵ ڈوائی لیوشن کے قطرہ ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے بعد۔  
نکسوامیکا: پیٹھ کرنے کے قابل آلہ تناسل کے اگلے حصہ میں سختی اور درد پھرتا اور ایسا درد مانو کہ کوئی چاقو سے کاٹ رہا ہے۔ مثلاً مقام سیون اور مقعد کا۔ خراش ہوتی ہے جس سے پاخانہ جانے کی حاجت بنی رہتی ہے اور بسا اوقات بواسیر اور ہڈی کی

✽ دوائی کی مقدار اور ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

شکایات ہی ساتھ ہوا کرتی ہیں۔

✽ خوراک: ۱۵ ڈائی یوشن کے چار قطرے دن میں تین مرتبہ۔

آر جنٹم نائٹریکیم: پیشاب جلن کے ساتھ آدے ایسا محسوس ہو کہ پیشاب کی نالی بند ہو گئی ہے۔ پیشاب کرتے وقت سارا خارج نہ ہو بلکہ خفہ قطرے باقی رہ جائیں اور نائیزہ میں درد اور سوزش ہو اور درد کی ٹیسیں مقعد تک جائیں۔ یوری مقدار نائیزہ پیشاب کی نالی سے خون اور پیپ آئے۔ قصبہ میں خیزش بہت ہو اور مجامعت کی خواہش غائب ہو ایسا محسوس ہو کہ پیشاب کی نالی میں گانتھیں پڑ گئی ہیں۔

✽ خوراک: ۳ ڈائی یوشن کے قطرے ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے۔

ایس کلی پی آس سائی ری آکا: یہ دوائی آغازِ مرض میں دی جاتی ہے۔ جبکہ خارش کی علامات آشکارا ہوں۔ خاص کر اس وقت جب کہ سرور بھی ساتھ ہو۔

✽ خوراک: ۱۵ کے تین قطرے ایک چھٹانک پانی میں ڈال کر دوسرے یا تیسرے گھنٹے۔  
چمائیلا: جب کہ پیپ بکترش آوے اور پیشاب بار بار آئے پیشاب آنے سے پہلے جلن اور درد ہو۔ پیشاب کو چکنے کے بعد سٹرن ہو جبکہ کمزوری بہت ہو فتور ہائیمہ قبض اور بواسیر ساتھ ہو۔ پیشاب تھوڑا اور بہت رنگین آئے۔

✽ خوراک: ۱۵ کے تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر ہر دو گھنٹے گھنٹے۔  
پلیسٹا: سب مرض کے دبائے جانے کے باعث فوٹے میں دم ہو جائے اور نائیزہ ریشاب کی نالی کا راستہ تنگ ہو جائے اور پیپ آنی رک جائے سیاہ رنگ کا خون پیشاب کے راستہ آوے۔ درد چنماں نہ ہو بعض اوقات آنکھیں بھی متدم ہو جاتی ہیں۔

✽ خوراک: ۱۵ ڈائی یوشن کے ۵ قطرے ایک چھٹانک پانی میں ہر تیسرے گھنٹے دیتے جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ پیپ آنی شروع ہو جائے اس وقت مناسب دوائی دینی شروع کر دینی چاہیے۔

میزیری کم: پیپ پانی کی مانند پٹی اور وزش کرنے سے زیادہ آئے بیش زنی اور تنکین کا سادہ تمام نائیزہ میں ہو بلکہ مقام سیون تک جائے اور چھونے سے تمام جگہ درد کرے۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

✽ خوراک: ڈائی یوشن کے تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر دن میں تین

یا چار مرتبہ  
ہائیڈراسٹس: جب مرض کسی دوا کو نہ مانے جلن اور درد کے ساتھ پیشاب کی  
حاجت بار بار ہو اور زرد رنگ کی پیپ بکثرت خارج ہو۔ کمزوری زیادہ اور غشی  
کی سی حاجت ہو۔

✽ خوراک: ۱۰ کے تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار مرتبہ۔  
علاوہ مندرجہ بالا ادویات کے بعض اوقات مندرجہ ذیل ادویات بھی کام آتی ہیں  
ایگنس کاسٹس۔ فرم۔ رشاکس وغیرہ۔

پچکاری: مرض سوزاک میں پچکاری کا سوال ایک ضروری سوال ہے کیونکہ جہاں  
اندرونی ادویات فائدہ کرتی ہیں۔ وہاں خارجی علاج بھی شفا بخشنے میں اکثر اوقات بڑا مفید  
اور زود اثر ہوا کرتا ہے۔ اس نکتہ پر ہومیوپیتھک ڈاکٹروں میں بہت اختلاف پایا جاتا  
ہے۔ بعض ڈاکٹر پچکاری کرنے کو ہومیوپیتھک ڈاکٹروں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے  
بعض ڈاکٹر پچکاری کرنے کو ہومیوپیتھک اصول کے برخلاف مانتے ہیں اور بعض پچکاری  
کرنے کے حق میں ہیں۔ وہ اس کو ہومیوپیتھک اصول کے مطابق مانتے ہیں اس موقع پر ہم  
ڈاکٹر یلڈم صاحب کی کتاب میں سے ترجمہ کر کے ناظرین کے پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب  
موصوفے اس بحث کو بڑی خوش اسلوبی سے درج کیا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں۔

”پچکاری کا کرنا میرے نزدیک سوزاک کے بعض کیسوں میں نہایت ضروری  
ہے۔ اگرچہ بعض ہومیوپیتھک معنفوں نے اس کی تردید کی ہے۔ دو بڑے اعتراض  
پیش کیے ہیں۔ اول یہ کہ پچکاری کرنے کے بعد سٹرکچر پیدا ہونے کا ڈر  
رہتا ہے۔ سٹرکچر کو طب میں تضیق نامیزہ کہتے ہیں یہ وہ حالت ہوتی ہے۔  
جب کہ نامیزہ میں جہاں قرص ہوتا ہے وہاں پر کچھ فاسدریشے پیدا ہو کر یا مقام  
قرص سکڑ کر پیشاب کی نالی منہ تنگ اور تقریباً بند ہو جاتا ہے۔ مؤلف دوم  
اعتراض یہ ہے کہ یہ طریقہ ہومیوپیتھک اصول کے برخلاف ہے۔ اعتراض

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

اول کے حتیٰ میں کوئی امر واقعہ کا ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا۔ سٹرکچر کا عام سبب وہ مزمن خراش یا جلن ہوا کرتی ہے۔ جو کہ سوزاک کے شدید حملہ کے بعد ظہور میں آیا کرتی ہے اور پیشاب کی تمام نالی میں سپاری کے سرے سے لے کر مثانہ تک ہوا کرتی ہے۔ اس خراش کا جلدی دور ہونا ہی سٹرکچر کا مانع ہوا کرتا ہے۔ اس میں کوئی کلام نہیں کہ با موقعہ و بر محل پچکاری کرنے سے یہ مقصد بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔

دوسرا اعتراض کہ پچکاری کرنا ہومیو پیتھک اصول کے برخلاف ہے کوئی وزن نہیں رکھتا۔ برعکس اس کے میرے نزدیک یہ پورے طور پر ہومیو پیتھک اصول کے مطابق ہے۔ سوزاک سے مراد اورم نائیزہ ہے۔ پچکاری میں ادویہ کی ڈائی یوشن بہت نرم اور ہلکے ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہی ادویات زیادہ مقدار میں نائیزہ پر لگائی جائیں تو وہاں سوزش پیدا کرتی ہیں۔ اگر یہ ہومیو پیتھک اصول کے مطابق نہیں تو اور کیا ہے۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ صرف اندرونی طور پر ادویات کے پُر دو کرنے کو ہی ہومیو پیتھی کہتے ہیں۔ اور خارجی طور پر دو کرنے کو ہومیو پیتھی نہیں کہتے۔

ضروری سوال تو مریض کو باری شفا دینے کا ہے، اصول کے بجائے اُدھیرنے کا نہیں ہے۔ معالج کے سامنے جو ضروری سوال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کن ذرائع سے وہ مریض کو بہت جلدی اور شافی شفا دے سکتا ہے اور اگر ہومیو پیتھک ڈاکٹر سوزاک کے مرض کا علاج کرتے وقت پچکاری سے مدد نہ لیں گے تو وہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔

ادویات کی مانند پچکاری کرنا بھی تب ہی مفید ہو سکتا ہے جب کہ یہ بر موقع و بر محل استعمال کی جائے اور اہم یہ کہ انتخاب بھی پسندیدہ ہو۔ اول الذکر بات کے لیے دو ہی موقع پچکاری کرنے کے موزوں ہوا کرتے ہیں۔ اول درجہ ابتدائیہ میں دوم درجہ تخفیف مرض میں۔

درجہ ابتدائیہ کا زمانہ شروع مرض سے لے کر ۲۴ یا ۴۸ گھنٹے تک ہوا کرتا ہے۔ جب کہ خفیف خراش ہوا کرتی ہے اور شاید خفیف اخراج پیپ بھی ابھی شدید سوزشی علامات ظہور پذیر نہیں ہوتے ایسے موقع پر نرم حالبس ادویہ کی پچکاری



کئی بار استعمال کرنے سے بعض اوقات مرض کی ترقی کو مسدود کرنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ ایسے موقع پر میں ان کاسٹک ٹوشنوں کو پسند نہیں کرتا ہوں جو کہ ایلوپتھک ڈاکٹر استعمال میں لاتے ہیں۔ نیز میری رائے ہے کہ اگر مرض کا حملہ شروع میں ہی شدید ہو، بعد کے حملوں سے زیادہ تیز ہو اور خواہ کتنی کوشش کی جائے مرض اپنے تمام درجوں میں سے گزر کر ہی رہے تو ایسے حالات میں پچکاری کرنی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن برعکس اس کے اگر ابتدا سے ہی علامات مرض نرم ہوں اور ان کے شدید صورت اختیار کرنے کا کوئی ڈرنہ ہو جیسا کہ بلغھی مزاج والے مریضوں میں ہوا کرتا ہے۔ جو پہلے مبتلائے مرض رہ چکے ہوں ایسے کیسوں میں ابتداءئے مرض میں ہی پچکاری کرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔

ایسے موقع پر پچکاری کرنے سے نہ صرف مرض ہی بڑھنے نہیں پاتا بلکہ شفا بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ صرف اندونی ادویات پر ہی اکتفا کی جائے۔ دوسرا موقع پچکاری کرنے کا وہ ہوا کرتا ہے جب کہ حدتِ سوزش پست پڑ چکی ہو۔ یہ موقع نہایت موزوں ہوا کرتا ہے۔ اس بات کی احتیاط از بس لازمی ہے کہ پچکاری پیش از وقت نہ کی جائے تا وقتیکہ تمام شدید علامات سوزش وغیرہ دب نہ جائیں اور شانہ میں کوئی جلن باقی نہ رہی ہو اور اخراج پیپ بہت کم ہو گیا ہو۔ یعنی اس وقت جب کہ مرض بہت تخفیف پر ہو ایسے موقع پر پچکاری کرنا لازمی اور شفا بخش ہوا کرتی ہے اور اگر اس سے پہلے پچکاری کی جائے تو موجودہ جلن کو زیادہ کرنے کا موجب ہوا کرتی ہے اور اندرونی جھل کو ایسا بے حس کر دیتی ہے کہ بعد میں پچکاری کا اثر نمایاں ظاہر نہیں ہوتا۔

## پچکاری کن ادویہ کی کرنی چاہیے

اس کا فیصلہ کرنا معالج کی ہوشیاری و تجربہ کاری پر منحصر ہے۔ اس مطلب کے لیے کئی ایک ادویہ ہیں۔ عموماً دو ادویہ کو خاص کر زیادہ استعمال میں لاتا ہوں۔ اول ہائیڈرکس کیناڈینس کا سولوشن۔ دم مکھڑھی ڈایاسی ٹالش۔ یہ دونوں ادویات بڑی اعلیٰ میں اور ان کا فعل بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا

ہے۔ میں پہلے ایک دوائی کو استعمال میں لاتا ہوں اور اگر یہ فائدہ نہ کرے تو پھر دوسری دوائی کو استعمال میں لاتا ہوں اور اگر ان کا سولیوشن مناسب طریقہ پر استعمال کیا جائے تو یہ خراش پیدا نہیں کرتیں۔ بلکہ تسکین دینے والی اور صحت بخش ہوتی ہیں۔ میں عموماً نصف ڈرام لکریلمبی کو دو اونس مقطر پانی میں ملاتا ہوں۔ ایک اونس نصف چھٹانک کے برابر ہوتا ہے۔ (مؤلف) اور ایک ہائیڈراسٹس کو ایک پائنٹ پانی میں یا تین ڈرام ہائیڈراسٹس کی تیز ٹنگچر کو تین چھٹانک پانی میں ملاتا ہوں۔ ایک پائنٹ پانی ڈیڑھ پاؤ کے برابر ہوتا ہے (مؤلف) مجھے ان ادویات کی برکت سے یا صرف ٹھنڈے پانی ہی کی پچکاری کرنے سے بہت کامیابی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہ ایلوپیتھک ڈاکٹروں کی تیز ادویات کی پچکاری کرنے پر جو اخراج پیپ بند نہیں ہوتا تھا وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔

## پچکاری کا طریقہ

یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے۔ کہ پچکاری کا سرا خاصہ لمبا ہو اور اس کے دوسرے سرے پر بلیب یعنی گانٹھ ہو۔ ایسی کے بلے سرے کو جس کو انگریزی میں نازل کہتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں بخوبی داخل کر کے پچکاری کرنی چاہیے اور اندر داخل کردہ دوائی کو دو یا تین منٹ تک روکے رکھنا چاہیے یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آلہ تناسل کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان دبائے رکھیں۔ اور پچکاری کو دائیں ہاتھ سے باہر نکال لینا چاہیے۔ ابتدا میں ہر شب کو پچکاری کرنی چاہیے اور اگر موافق پڑے تو حسب ضرورت اس کو کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر قضیب کے گرد لپیٹ دینا بھی بہت مفید پڑتا ہے اور اس طرح سے یہ کپڑا بدلتے رہنا چاہیے۔

اندرونی ادویات اور پچکاری کے علاوہ ایک اور علاج بھی ہے جس سے مجھ کو شدید درجے میں درد کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اوہیم تھینور بروما کی تین انچ لمبی تیاں استعمال کرتا ہوں۔ ہر ایک بتی میں نصف گرین کوکین ہوتی ہے۔ پیشاب کرنے کے بعد فوراً ہی نائیزہ میں یہ بتی داخل کی جاتی

ہے۔ جہاں کہ یہ گھیل جاتی ہے۔ تہی کو سوراخ میں اچھی طرح سے داخل کرنا چاہیے اور سپاری کے منہ کو انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ مضبوط پکڑے رکھنا چاہیے۔ دخول سے پہلے تہی کو تھوڑے تیل میں بھگو لینا چاہیے۔ کوکین کے دھونی سد والے سوئیوشن کی پچکاری کرنی بھی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ حمل اور درد کی زیادتی ہو۔

## غذا

جب مرض کا حملہ شدید ہو۔ تو مریض کو نرم غذا دینی چاہیے اور منشیات سے قطعی پرہیز لازم ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے جہانی محنت بھی کم کرنی چاہیے بالکل آرام سے پڑا رہنے کے برابر جلدی شفا دینے والی اور کوئی دوا نہیں ہے مریض کو آتش بخود و درد اور سوجنا وارث کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے تاکہ پیشاب کھل کر آتا رہے گرم اور خراش پیدا کرنے والی چیزیں مثلاً گرم مصالحہ سرخ مرچ اچار کھائی چٹنی گوشت انڈے چائے تھوہ قطعی پرہیز رکھنا لازم ہے۔ یہ توازن بس ضروری ہے۔ کہ مریض مجامعت سے بالکل پرہیز رکھے۔ شراب و کباب کا استعمال مطلقاً ممنوع ہے۔

مریض کو دودھ۔ چاول۔ ڈبل روٹی۔ دودھ۔ بخوکا دودھ میں پکایا ہوا دلیہ۔ کھجور کی مونگ و ماش کی دال و روٹی اور دیگر ٹھنڈی سبزی ترکاریاں استعمال کرنی چاہئیں۔

## مرزمن سوزاک قرعہ

(GLEET)

سوزش کے کم ہو جانے کے بعد، دخول تک تھوڑی بہت پیپ آتی رہتی ہے پیپ اکثر پتلی نیکیں کبھی گاڑھی ہوتی ہے اور رنگت اس کی کبھی سفید اور کبھی زردی مائل سبزی پر ہوتی ہے۔ مقدار میں کبھی زیادہ اور کبھی اس قدر کم ہوتی ہے کہ دن رات میں صرف ایک دو قطرے ہی ہوتے ہیں اور کبھی صرف سوراخ بول ہی چپکا

ہوا کرتا ہے۔ یا صبح اٹھنے پر اس کو دوبانے سے ذرا سی پیپ معلوم ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ پیشاب کرتے وقت درد ہوتا ہے اور نہ ہی جلن۔ لیکن بعض حالتوں میں درد اور جلن کی شکایات پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مرض کا علاج غلط کیا گیا ہو۔ یا مرض ہی شدید قسم کا واقع ہوا ہو تو قرحہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مرض کئی ماہ بلکہ برسوں تک بدول کسی ظاہری تکلیف کے چلا جاتا ہے البتہ مریض کی طبیعت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے لیکن بعض اوقات سٹرچر یا دیگر عوارض غده قدامیہ پراسٹیٹ گلینڈ مثانہ یا گردوں کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ خاص کیوں میں جب کہ پیپ کا آنا کئی ہفتوں تک بند رہا ہو۔ غذا کی بد پر ہیزی۔ جسمانی محنت کی زیادتی اور مجامعت کرنے سے پھر پیپ آنی شروع ہو جاتی ہے۔

## علاج

جب پیپ سوزاخ بول کے قریب سے آتی ہو تو اس کا علاج نسبتاً آسان ہوا کرتا ہے اور اگر پیپ کا منبع نائیزہ کی کوئی غدود نہ ہو یا غده قدامیہ اور یا منی کی نالی سے پیپ آتی ہو۔ تو اس صورت میں اس کو آرام دینا بہت محنت اور وقت مانگتا ہے۔ موخر الذکر حالت میں مریض کو پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ تاکہ پیشاب پتلا ہو جائے اور جلن کم ہو۔ آلہ تناسل کو پانی سے دھونا بھی مفید ہوتا ہے اور تبدیل آب و ہوا سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔

قرحہ کے مرض میں مندرجہ ذیل ادویات مفید ہوتی ہیں۔

کینتھرس۔ فرم۔ ہائیڈراسٹس۔ مرکبورس۔ نکسوامیکا۔ پٹلا۔ نائٹرک ایسڈ۔ تقوجا۔ کینالیں۔ سلفر۔ اگرچہ اور بھی کئی ادویات کام آتی ہیں لیکن مذکورہ بالا ادویات عموماً کافی ودانی لگوا کرتی ہیں۔

نکسوامیکا اور سلفر: قرحہ کے مرض میں جسمانی کمزوری اکثر بہت ہوا کرتی ہے اس لیے اچھی حالت میں نکسوامیکا اور سلفر کا استعمال بہت مفید ہوا کرتا ہے۔ اگر ان ادویات کا استعمال متواتر جاری رکھا جائے تو پیپ کا اخراج قدامی بند ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جب کہ یہ مرض شلہ و خوراک کھانے یا بیر شراب

پینے سے زیادتی پکڑ جائے تو نکس و امیکا کا استعمال از بس مفید ہوا کرتا ہے اور خنازیری مزاج والوں کو سلفر بہت مفید پڑتی ہے۔

✽ **خوراک:** سفر ۲ کے ۳ قطرے نصف چھٹانک پانی میں بوقت صبح اور

نکس و امیکا ۱۱ کے تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں بوقت شام۔

مرکیوریس کار: جبکہ آلہ تناسل کے اندر زخم کی موجودگی کاشک ہو اور مواد از

قسم پیپ ہو یا خونی ہو۔ رنگ اس کا سبز زردی مائل یا سفید ہو۔

✽ **خوراک:** ۳ ڈائی لیوشن کے تین قطرے ہر چار گھنٹے کے بعد۔

ایسڈ نائٹرک: جبکہ علامات وہی ہوں جو اوپر بیان کی گئی ہیں اور خاص

کہ جبکہ مرکیوریس کے استعمال سے فائدہ نہ ہوا ہو۔

✽ **خوراک:** ۱ ڈائی لیوشن کے تین قطرے دن میں تین مرتبہ۔ اس دوائی کی پیکاری

بھی کی جاتی ہے۔ (دس قطرے دوائی اور ایک اونس پانی)

تھو جھا: جبکہ نائیزہ سے بمقدار کثیر پانی جیسی پیپ خارج ہوتی ہو اور خاص

کہ اس وقت جب کہ مٹے بھی بہت نکل آئیں۔

✽ **خوراک:** ۳ ڈائی لیوشن کے تین قطرے دن میں دو یا تین مرتبہ

کینالیں: جب کہ نہ پیپ سے گندی بو آتی ہو اور پیپ پانی کی مانند

تیلی رنگ سبز یا زرد ہو۔

✽ **خوراک:** ۵ مدرٹنکچر کے دو قطرے نصف چھٹانک پانی میں تین مرتبہ۔

فیرم: کمزور بیماریوں کے لیے نہایت مفید ہے۔

نیتھرکس: پیشاب کی حاجت بار بار ہو اور نہایت تکلیف دہ ہو پیپ زرد

رنگ کی اور خون آمیز آئے اور جس جگہ کپڑے کو لگے داغ پیدا کر دے۔ پیشاب کی حاجت

تو متواتر بنی رہتی ہے۔ لیکن پیشاب کرتے وقت چند قطرے ہی نکلتے ہیں۔ آلہ تناسل

کی خزش ایسی شدید اور دردناک کہ خدا یا تیری پناہ۔

✽ **خوراک:** ۳ ڈائی لیوشن کے تین قطرے دن میں تین یا چار مرتبہ۔

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۷۵

پلسکلا: جب کہ مرض کے دب جانے کے باعث فوطے متورم ہو جائیں۔  
 نامیزر پیشاب کی نالی کا راستہ تنگ ہو جائے۔ نیز پیپ آنی رک جائے اور درد  
 نہ ہو۔ بعض اوقات آنکھیں بھی متورم ہو جاتی ہیں۔

✽ خوراک: ۱۵ ڈائی سیڈن کے ۵ قطرے ایک چٹاٹک پانی میں دن میں تین مرتبہ۔

## قرعہ کے مرض میں پچکاری کا سوال ایک اہم ترین ہے

پس اس موقع پر ہم ڈاکٹر یڈیم صاحب کی رائے لفظ بلفظ درج کرتے ہیں۔  
 آپ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں۔

مرض سوزاک میں پچکاری سے زیادہ مستفید ہونے کا افضل وقت قرعہ کا ہے  
 بیشک ایسے کئی کیس دیکھنے میں آتے ہیں کہ بدوں پچکاری کے دیگر ادویات ناکامیاب  
 رہی ہیں۔ اگر مہنغ مرض سوزاخ بول کے قریب ہی واقع ہے تو عام پچکاری کا کرنا  
 ناکافی ہوا کرتا ہے۔ لیکن اگر پیپ آنے کا مہنغ پیشاب کی نالی کے اندر واقع ہے  
 تو پچکاری کرنے کے لیے ایسا کبھی ٹھیک (سوا) درکار ہوتا ہے۔ جو کہ ماؤف مقام  
 تک پہنچ سکے (مریض سوئے کے ساتھ خود پچکاری نہیں کر سکتا اس کے لیے ٹاکٹر کی مدد  
 کی ضرورت ہے) جو ادویہ پچکاری میں مستعمل ہوں وہ بھی نرم ہونی چاہئیں۔

پچکاری کے علاوہ قرعہ میں بتی کے استعمال سے بھی بہت فائدہ ہوا کرتا  
 ہے۔ یہ بتی اولیم تھیورہ بروما اور دیگر ادویات کے ملائے سے بنائی جاتی ہے۔  
 ۵ گرین آیلو ڈوفارم ۵ قطرے ۱۰ کلپٹس آیل اور ۳۰ گرین اولیم تھیورہ بروما کو ملائے  
 سے ایک بہت بڑا تین انچ لمبی بتی ہے۔

دوسری ترکیب عمدہ بتی تیار کرنے کی یہ ہے کہ نصف گرین ہائیڈراسٹس یا  
 سلفیٹ آف ہائیڈراسٹس اور تیس گرین اولیم تھیورہ بروما سخت قہم کے قرعہ کے  
 مرض میں ان تیلوں کے استعمال سے مجھے بھاری کامیابی ہوئی ہے۔ بتی کے استعمال کرنے  
 کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ ادویات جائے ماؤف پر بخوبی پہنچ جاتی ہیں اور اس

لیے دیگر مقامی علاجوں سے بتی کا علاج زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔

نائیزہ کی جھلتی کی دیرینہ موٹائی بعض کیسوں میں سٹرکچر کا موجب ہوا کرتی ہے اور بعض میں پیشاب کے راستہ میں بے قاعدگی کا سبب اور اس لیے قرعہ کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اندریں حالات اگر بتی با احتیاط داخل کر کے راستہ کو کھول دیا جائے تو پیپ کا آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پس جب ادویات دینے سے مواد کا آنا بند نہ ہوتا ہو تو بتی کے نخل سے راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ ہر تیسرے روز بتی کا استعمال کافی ہوتا کرتا ہے۔ اور بعض کیسوں میں ہفتہ میں صرف ایک مرتبہ ہی ایک دفعہ کی داخل کردہ بتی دس یا پندرہ منٹ تک اندر ہی رہنی چاہیے۔ اگر بتی کا استعمال بار بار کیا جائے تو خراش پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

لیکن یہ یاد رہے کہ مذکورہ بالا ادویات اندرونی میں سے جو دوائی مناسب ہو اس کا استعمال بھی رکھنا چاہیے۔

نوٹ (۱) بعض اوقات اس بات کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ پیپ کہاں سے آتی ہے۔ اگر پیپ آلہ تناسل کے سرے کو دبائے سے نکلے تو سمجھنا چاہیے کہ پیپ کا منبع پیشاب کی نالی میں ہے۔ اگر پیپ نہ نکلے اور ایک لمبی بتی کو نالی میں داخل کرنے سے کسی سٹرکچر کی موجودگی وغیرہ کا پتہ بھی نہ چلے تو سمجھنا چاہیے کہ نقص پیشاب کی نالی سے پرے کسی جگہ پر واقع ہے۔

نوٹ (۲) اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جراثیم سوزاک نیم مردہ حالت میں چپے رہتے ہیں۔ لہذا جو شخص اس مرض میں ایک بار مبتلا ہو چکا ہو وہ بظاہر تندرست معلوم ہونے پر بھی مرض ہذا کو دوسروں میں پہنچانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ لازمی ہے کہ مریض سوزاک کی شادی نہ ہونے پائے۔ جب تک کہ صحت کلی حاصل نہ کرے اور صحت کلی حاصل کرنے کے چند ماہ بعد شادی ہونی چاہیے۔

امتحان : مرض سے شفا پانے کی علامات یہ ہیں۔

۱۔ پیپ کے اخراج کا قطعی موقوف ہو جانا۔

۲۔ سداخ بول کا چپک کر بند نہ ہونا۔

۲۔ گرم اشیا مثلاً لال مرچ گوشت مصالحہ لہسن پیاز بیکن انڈے۔ گوشت وغیرہ یا ترش اشیا کے کھانے سے پیشاب کا جل کر نہ آنا۔  
**غذا** - مریض کے لیے غذا وہی ہے جو کہ پہلے درج ہو چکی ہے۔ دیکھو صفحہ ۳۰۹۔

## دیگر عوارض و نتائج مرض

جو عوارض مرض سوزناک کا غلط علاج کرنے یا دیگر بواغث سے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے موٹے موٹے مندرجہ ذیل ہیں:-

- ۱۔ جلن و خراش مثانہ (ارٹیشن آف دی بلیڈر)
- ۲۔ حمہ قضیب یعنی قضیب کا سرخ باد (اری سپس آف دی پینس)
- ۳۔ کارڈی (نعوذ سوزاکی) رات کو سوتے ہوئے اس قدر خیزش ہوتی ہے کہ قضیب نیچے کی جانب یا ایک سمت جھک جاتا ہے اور نہایت شدید درد ہوتا ہے۔

نوٹ: (۴) سپاری کی سوجن یعنی ورم خشفہ کا مفصل حال دیکھو صفحہ نمبر ۴۱۱ پر۔

(۵) ورم خبیہ مفصل حال دیکھو صفحہ نمبر ۴۱۸

(۶) ورم خذہ قدامیہ مفصل حال دیکھو صفحہ نمبر ۴۲۱

(۷) فائی موسس (انروستق غلف) مفصل حال دیکھو صفحہ نمبر ۴۰۹ مردوں کے

خاص امراض کے باب میں۔

## جلن و خراش مثانہ

(IRRITATION of the Bladder)

یہ عارضہ سوزناک کے مرض میں عموماً پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ شاید ہی سوزناک کا کوئی شدید حملہ ہوگا۔ جس میں یہ عارضہ ساتھ شامل نہ ہو گیا ہو۔ اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور سخت درد ہوتا ہے خاص کہ پیشاب کر چکنے کے بعد مدد غضب کا ہوتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ اکثر پیپ آتی ہے اور بعض ماحول



میں خون بھی ملا ہوا آتا ہے۔ جب مرض کا حملہ خفیف ہوتا ہے تو پیشاب کی حاجت بھی خفیف سی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور خواہ پیشاب وقت مقررہ پر آئے لیکن پیشاب کرنے کی تندی ایسی غضب ناک ہوتی ہے کہ وہ ذرا فرصت لینے نہیں دیتی۔ زیادہ شدید حالتوں میں مثلاً نہ میں برابر درد ہوتا رہتا ہے اور مریض کی صحت عامہ بگڑ جاتی ہے بعض میں تیزی۔ کمی اشتہا اور کمزوری کا احساس یہ علامت ترقی پر ہو جاتی ہیں۔

## علاج

جو دوائی اصل مرض سوزاک کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ اس مرض کے لیے بھی کافی ودائی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر مریض نے کینتھرس استعمال نہ کی ہو تو یہ دوائی استعمال کرنی چاہیے یعنی کینتھرس ۵ کے ۵ قطرے اور ایکونائٹ ۵ کے ۵ قطرے ہر دو ادویات باری باری سے ہر دو گھنٹہ کے بعد استعمال کرنی چاہئیں۔ یہ ہر دو ادویات شدید علامات کو تخفیف کرنے میں شاذ و نادر ہی ناکامیاب ہوتی ہیں۔ اور اگر ان ادویات کے استعمال کے بعد بھی خفیف خارش باقی رہ جائے تو ایسی حالت میں بیلادونا دوائی مفید پڑتی ہے ۱ یا ۲ ڈائی میوشن کے چار قطرے ہر دوسرے گھنٹے استعمال کرنے چاہئیں۔ مرکبوریس کارا اور نکس و امیکا۔ پٹلا و سلفر بھی مفید ادویات ہیں۔

جب پیشاب کرتے وقت نہایت تندہی اور تہنجی حالت ظاہر ہوتی ہو تو کیفیر سپرٹ کے پانچ قطرے پانی میں ہر دوسرے یا تیسرے گھنٹے دینے سے بعض اوقات بہت جلد آرام آجایا کرتا ہے۔

گرم پانی میں کوٹھے تک بیٹھا یا ایسی کی گرم پٹس مقام سیون پر باندھنا۔ بھی بعض اوقات بہت جلد آرام دیتا ہے۔ بیمار کو فیثات سے پرہیز لازم ہے اور آتش جو بکثرت پینا چاہیے۔ مثلاً نہ کو بذریعہ سوا گرم بورک لوشن یا گرم کاندی لوشن سے من میں دو دفعہ دھونا مفید ہے۔

# حمرہ قضیب

(ERYSIPELAS of the Penis)

سوزاک کے ابتدائی اور شدید کیوں میں قضیب کے اوپر کے چمڑے اور گھونگھٹ پر سُرخ باد کے دانے نکل آیا کرتے ہیں۔ تمام قضیب سُرخ اور متورم ہو جاتا ہے بیمار اس حالت میں گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اس مرض میں سوائے اس کے قضیب وزنی ہو جاتا ہے اور کسی قسم کی تکلیف یا درد نہیں ہوتا اس کے لیے بہترین ادویات ہیلڈونا اور ایس ہیں۔ ان ادویات کے ۲۵ ڈائی لیٹن کے ۵ قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد دینے چاہئیں اور ان کے ساتھ اصل مزمن کی جو دوا مریض استعمال کر رہا ہو وہ بھی باری باری سے استعمال کر سکتا ہے۔ قضیب کے اوپر گیلا کپڑا باندھنا مفید ہوا کرتا ہے۔ ٹینکچر سٹیل کا خارجی استعمال مفید ہوتا ہے۔

# نعوذ سوزاکی (کارڈی)

(CHORDEE)

سوزاک کی شدید حالت میں آلہ تناسل کی خیرش نہایت تکلیف دہ عارضہ ہے اور بوقتِ شب سخت تکلیف ہوتی ہے۔ نیند میں خصل واقع ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں غذا مریض کو بہت سادہ اور تھوڑی کھانی چاہیے اور بوقتِ شب اوپر کپڑا ہلکا لینا چاہیے۔ سرد پانی میں چند قطرے اکیونائیٹ مدر ٹینکچر کے ڈال کر اور اس میں کپڑا بھگو کر آلہ تناسل کے اوپر لپیٹنا چاہیے اور اکیونائیٹ ۳x کا ایک قطرہ پانی میں ڈال کر رات کو دو تین مرتبہ استعمال کرنا چاہیے۔

کیمفر مدر ٹینکچر کے ۵ قطرے نیم چھانک پانی میں ہر ۱۵ منٹ کے بعد پینے چاہئیں اور ایسی چار خوراکیں ایک گھنٹہ میں پینی چاہئیں۔ اسی طرح سے دن میں دو یا تین مرتبہ فی مرتبہ چار خوراکیں پینی چاہئیں۔

جلسی میم: دن کے وقت آلہ تناسل ڈھیلا اور پیپلا ہو اور بوقتِ شب جلن

جماعت کی خواہش اور آلہ تناسل میں اجتماع خون ہو۔  
 ✽ خورال ۱: ۱۵ ڈائی لیوشن کے دو قطرے سوتے وقت اور اگر ضرورت ہو تو  
 پھر بھی رات کو لے سکتے ہیں۔  
 کیفیتہرس: پیپ برنگ زرد۔ شدید۔ درد مبعہ جلن پیشاب کرتے وقت  
 بڑی درد اور تکلیف بعض اوقات پیشاب کے بعد خون آئے۔  
 ✽ خورال ۲: ۳۰ کے دو قطرے ہر دوسرے یا تیسرے گھنٹے۔  
 پلسٹا: جب کہ کارڈی (نعوذ سوزا کی) کا مرض سوزاک کے دب جانے کے  
 باعث پیدا ہو۔ یا خون دریدی کا اجتماع قصب میں ہو۔  
 ✽ خورال ۳: ۳۰ ڈائی لیوشن کے ۵ قطرے ہر چوتھے گھنٹے۔

## سٹرکچر (STRUCTURE)

اسٹرکچر سے وہ حالت مراد ہے کہ جب پیشاب کی نالی کا کوئی مقام سکڑ کر تنگ  
 ہو جاتا ہے اور شانہ سے پیشاب آتے وقت رُک جاتا ہے۔ سٹرکچر کا عام باعث تو  
 درم ہے جو کہ سوزاک کی شدید حالت میں ہوا کرتی ہے جبکہ پیشاب کی تمام نالی متورم  
 ہو جاتی ہے اور اگر مریض کی صحت عامہ خراب ہو اور مرض لمبا ہوتا جائے تو مزمن  
 درم پیدا ہو کر نائیزہ کی جھلی کو مستقل طور پر موٹا کر دیتی ہے۔ سٹرکچر ایک مقام پر  
 یا زیادہ جگہوں پر واقع ہو سکتی ہے۔ اگر مرض شدید ہو تو علامات شدید ہوا کرتی  
 ہیں اور اگر مرض خفیف ہو تو علامات خفیف ہوا کرتی ہیں۔ عموماً ابتدا میں علامات  
 یہ ہوا کرتی ہیں کہ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے یا پیشاب جب تھوڑی دیر  
 ٹھہرا رہے تو اس پر سفید بادل سے معلوم ہوتے ہیں۔ جوں جوں سٹرکچر بڑھتی  
 جاتی ہے۔ توں توں پیشاب کی دھار باریک ہوتی جاتی ہے اور پیشاب رُک رُک

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

کے آتا ہے اور ابتدائی حالت میں قرحہ کی پیپ بھی نکلتی ہے اگر یہ سب بند ہونے میں نہ آئے تو سمجھنا چاہیے کہ سٹرکچر موجود ہے۔ اگر سٹرکچر کے عارضہ کا علاج کرنے میں کوتاہی کی جائے یا یہ مرض شدید صورت اختیار کر لے تو مریض کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ خدایا تیری پناہ خواش دیگر آلات بول تک پھیل جاتی ہے اور سمیت خون کے باعث مثانہ کے فعل میں نقص واقع ہوتا ہے۔ بھوک ماری جاتی ہے۔ صحت عامہ بگڑ جاتی ہے اور اگر جلدی مرض کا افاقہ نہ ہو تو مریض لقمہ اجل ہو جاتا ہے۔

۲۔ جب مرض سوزاک کا درست علاج نہ کیا جائے اور شدید علامات کے تخفیف ہونے پر صبح کے وقت قصب کا منہ پیپ سے بند پایا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ سٹرکچر کا ناز ہے۔ پیشاب کو بہت زور لگا کر خارج کرنے کی کوشش میں امراض ہرنیا یا کالج کے نکلنے کا قہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت زور نہیں لگانا چاہیے۔ بعض مریض بدیں خیال کہ نہ بانی ہیں گے اور نہ پیشاب کی حاجت بار بار ہوگی وہ پانی سے اجتناب کرتے ہیں یا بہت کم پیتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی ہے کیونکہ اس سے پیشاب گاڑھا ہو جاتا ہے اور زیادہ تکلیف کا موجب بنتا ہے۔

۳۔ تشنہ سٹرکچر سے یہ مراد ہوتی ہے کہ موجودہ سٹرکچر کی علامات سردی لگنے نشیات کا زیادہ استعمال کرنے اور اسی طرح کے دیگر سبب سے زیادتی پکڑ لیتی ہیں۔

## علاج

چونکہ موجودہ درم کو کم کر کے پیشاب کی نالی کا راستہ کھول دینا ہی سٹرکچر کا علاج ہے اس لیے اس مرض کی ابتدا میں اکیونائٹ اور کینتھرل بہت مفید ادویات ہیں۔ جب کہ تمام نالی میں درد ہو پیشاب کرنے کی خواہش بکثرت ہو اور عموماً پیپ آئے اور ایسے حالات میں اکیونائٹ ۱x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے بوقت خفتن بیمار کو دینے چاہئیں اور کینتھرل ۱x کے پانچ قطرے دو مرتبہ دن میں اندریں حالات بیمار کو ہر قسم کی نشیات سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ مقام سیون پر ٹنڈے پانی کی پٹی بھی مفید ہوتی ہے جب اکیونائٹ اور کینتھرل اپنا کام کر چکیں تو اس کے بعد مرکب ۳x ڈائی لیوشن کے

پانچ قطرے دو مرتبہ یومیہ ایک ہفتہ تک استعمال کرنے چاہئیں اور بعد ازاں سلفرے  
مدرٹنکچر کے پانچ قطرے دو مرتبہ روزانہ ایک ہفتہ تک استعمال کرنے چاہئیں۔  
جب سٹرکچر کا مرض زیادہ بگڑ جائے اور مستقل صورت اختیار کرے۔ تو  
مندرجہ بالا ادویات کے ساتھ مکنیکل ڈرائیج کے اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی  
ہے۔ مثلاً کیتھیٹر یا بتی کے دخول سے رات کو کھول دیا جاتا ہے۔

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے مندرجہ ذیل ادویات بھی کام دیتی ہیں۔ بیلادونا  
ڈیجیٹلس۔ کالی آیوڈائیڈ۔ نکس وامیکا۔ اوپیم۔ جلسی میم۔ کلکیریا۔ وراٹرم  
ورائیڈ سٹرامونیم وغیرہ۔

## سوزاکی گنٹھیا۔ وجع المفاصل سوزاکی

(GONORRHOEAL Rheumatism)

سمیت سوزاک کے جوڑوں اور خاص کر گھٹنوں میں موثر ہوتے کے باعث  
اس قسم کا گنٹھیا ہو جاتا ہے کہ جلدی آرام ہونے میں نہیں آتا۔ اس سے مادن جھلی  
ہمیشہ کے لیے موٹی ہو جاتی ہے۔ بدیں وجہ جوڑ اچھی طرح سے حرکت بھی نہیں کر سکتا  
اور جب جوڑوں کے ہمراہ کمری بھی اس زہر سے متاثر ہو جائے تو جوڑ مادن  
بالکل سخت ہو جاتا ہے اور یہ مرض رات کو زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتا ہے

### علاج

مریض کو چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے۔ اور اس کو پورا پورا آرام حاصل ہونا  
چاہیے۔ جگہ مادن پر بجاپ دینا یا مالش کرنا مفید ہوتا ہے۔  
ایکونائٹ : مرض سوزاک کے معدان میں جوں ہی کہ کسی جوڑ میں درد  
معلوم ہو دینی چاہیے۔

✽ خوراک : مڈا ڈائی سیوشن کے ۵ قطرے پانی میں ہر تیسرے گھنٹے دینے چاہئیں

✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

دراٹرم ورائیڈ : جب مرض سوزاک میں تے یا ابکائیاں آنی شروع ہو جائیں اور مریض ذکی اچس ہو اور کسی عضو کو حرکت نہ دے سکے۔ یا حرکت دینے کے وقت سخت جانکشی کا درد ہو۔ رات کے وقت تکلیف کی زیادتی ہو۔

✽ خورال : ۲x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر تیسرے گھنٹے۔  
ایس پی ایس سائی ری آکا۔ جوڑکے گرد ریزش جمع ہو۔ گھٹنے کی ٹوپی ڈھیلی ہو اور دبانے سے رگڑ کھائے۔

✽ خورال : ۱x ڈائی یوشن کے ۶ قطرے دن میں تین مرتبہ۔  
مرکیورس دو مرکیورس آئیوڈائیڈ۔ یہ ادویات ریزش کے جذب کرنے کے لیے دی جاسکتی ہیں۔

✽ خورال : ۵x ڈائی یوشن کے ۳ قطرے ہر ۶ گھنٹے کے بعد اور ماؤن مقام پر صبح و شام مالش بھی کرنی چاہیے۔

کالی ہائیڈراڈیکم : نہایت شدید دردیں۔ چپ چاپ پڑا رہنے میں زیادہ ہوں اور حرکت کرنے سے دردیں کا فور ہو جائیں۔

✽ خورال : ۲x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر چوتھے گھنٹے۔

ناٹسٹک ایسڈ : ٹانگیں وزنی معلوم ہوں اور دکھتی ہوں۔ چلنے پھرنے کے وقت جوڑا دھرا دھرا جائیں اور اپنی جگہ پر ٹھیک قائم نہ رہیں۔ شام کے وقت دردیوں میں بہت زیادتی ہو۔

✽ خورال : ۳x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر چوتھے گھنٹے۔

میزیریم : جبکہ دردیں نہایت شدید ہوں اور برچی لگنے کی سی ہوں ہڈیوں میں گرمی اور جلن ہو۔ خاص کر ٹانگوں کے سامنے ہڈیوں میں زیادہ دردیں ہوں اور بوقت شب دردیوں میں زیادتی ہو جاتی ہو۔

✽ خورال : ۳x ڈائی یوشن کے تین قطرے دن میں تین مرتبہ۔



✽ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵

# عورتوں میں سوزاک

(GONORRHOEA in Women)

مردوں کی مانند مستورات بھی اس مرض میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ بازاری عورتوں یعنی رنڈیوں میں یہ مرض کثرت پایا جاتا ہے۔ شاید ہی کوئی رنڈی ہوگی جس کو یہ مرض نہ ہوا ہو۔ لیکن خاوندوں کے ذریعہ بیویوں کو بھی یہ مرض گاہے بگاہے ہو جاتا ہے اور وہ شرم کی ماری اس کا علاج نہیں کر دیتیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رحم اور پیڑ کی کئی ایک مہلک اور پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔

مستورات میں یہ مرض اتنا شدید نہیں ہوتا۔ جتنا کہ مردوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی اتنی پیچیدگیاں پڑتی ہیں جتنی کہ مردوں میں بعض حالات میں اس مرض کا حملہ اتنا نرم ہوتا ہے کہ مستورات کو اس کا پتہ بھی نہیں لگتا اور بعض اوقات پیشاب کی نالی اور اندام نہانی کے سوراخ میں سوزش ظاہر ہوتی ہے اور بیرونی حصوں میں سرخی درم اور گرمی ہوتی ہے اور بعد میں سفید یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہونے لگتی ہے۔ جب سوزش شدید ہو تو جھلی چھڑ جاتی ہے اور پیشاب کرتے وقت پیشاب لگتا ہے اور بہت سخت درد ہوتا ہے۔ اکثر حالات میں تو پیشاب کی نالی مبتلائے مرض ہو جاتی ہے اور پیشاب کرتے وقت سخت جلن ہوتی ہے اور اگر مثانہ مبتلائے مرض ہو چکا ہو تو پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے اور نہایت شدید حالتوں میں خون بھی ساتھ آتا ہے۔

## علاج

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ مستورات میں مرض کا حملہ اتنا شدید نہیں ہوا کرتا۔ جتنا کہ مردوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے بہ نسبت مردوں کے علاج بھی آسان ہوتا ہے۔ جب سوزش بزور ہو تو ایکونائٹ اور مرکبوس یا ایکونائٹ اور سینتھرس باری باری سے دینے چاہئیں اور ساتھ ہی سرد یا شیر گرم پانی سے بار بار دھونا چاہیے اور جب شدید علامات ذرا کمی پر ہوں تو کینالس یا کوپیا دینے چاہئیں اور

اور ہائیڈراسٹس یا ایڈمینا کے لوشن کی پچکاری کوئی چاہیے اور یہ پچکاری دن میں کئی مرتبہ کوئی چاہیے۔

ادویات دینے کی وہی ہدایات ہیں جو کہ سوزاک کے بیان میں مذکور ہو چکی ہیں۔  
 \* ایکونائٹ  $x$  یا  $2x$  ڈائی یوشن جب اعضاء بیرونی ہیں سوجن اور گرمی ہو۔  
 شانہ میں خراش ہو اور پیشاب کرنے کی حاجت بار بار ہو۔  
 \* کنیتھرسل  $x$  یا  $2x$  ڈائی یوشن جب کہ بار بار پیشاب کرنے کے لیے دباؤ پڑے اور گرمی ہو۔ پیپ خواہ آئے خواہ نہ آئے شدید حالتوں میں ایکونائٹ اور یہ دوائی باری باری سے دی جاتی ہے۔

مرکبوس : جب نہایت شدید علامات میں مذکورہ بالا ادویات کے دینے سے کمی واقع ہو جائے۔ لیکن سفید یا زردی مائل رطوبت خارج ہوتی رہے اور مریض کو گرمی محسوس ہو تو اس دوائی کے دینے سے اور خارجی علاج کرنے سے اس مرض کو چند روز میں آرام آجاتا ہے۔

# آتشک یا بادفرنگ نجابی گرمی

(Syphilis Chancre)

یہ ایک متعدی بیماری ہے جو کہ :

- ۱۔ چھوت لگنے یعنی مادہ مرض کے جسم میں سرایت کرنے سے یا
  - ۲۔ موردی طود پر والدین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس مرض کا باعث بھی ایک باریک خوردبینی لہر دار کیرا مانا گیا ہے جس کو سپائی اور چٹیا پلیٹہ کہتے ہیں۔
- مرض کی چھوت : یعنی مرض کے زہر کا جسم میں سرایت کرنے کا طریقہ۔  
 اکثر تو اس مرض کا چھوت بیمار مرد یا عورت کے ساتھ مجامعت کرنے سے لگا کرتا ہے یعنی زنا کاری سے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتشک کے مریض کا بوسہ لینے یا اس

\* دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵



کا جوٹھا حقہ یا پانی پینے یا اس کے ساتھ مل کر کھانا کھانے یا اس کا جوٹھا کھانا کھانے، یا اس کے ساتھ سونے یا اس کا لباس پہننے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ مودوثی آتشک کے مریض بچہ کو دودھ پلانے سے دایہ کو یہ مرض ہو جاتا ہے یا مریض دایہ سے تندرست بچے کو یہ مرض ہو جاتا ہے۔ مودوثی آتشک کے مریض بچہ کا موادلے کو دوسرے تندرست بچوں کو چھیک ٹیکا لگانے سے انہیں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

سہولت بیان کے لیے آتشک کے مرض کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

آتشک کے درجہ اول کو پرائمری سفلس یا آتشک اولیٰ یا آتشک کا درجہ ابتدائی کہتے ہیں۔

درجہ دوم۔ آتشک کے درجہ دوم کو سیکنڈری سٹیج (درجہ ثانوی یا سیکنڈری سفلس کہتے ہیں)۔

درجہ سوم۔ آتشک کے درجہ سوم کو انگریزی میں ٹرٹھری سٹیج (درجہ ثالث) یا ٹرٹھری سفلس آتشک ثلاثی کہتے ہیں۔

نوٹ: ڈاکٹری اصطلاح میں آتشک کے زخم کو شکر کہتے ہیں۔ جب زخم کڑی کی مانند سخت ہوتا ہے تو اس کو ہارڈ شکر یا سخت آتشک کہتے ہیں۔ اگر زخم نرم ہو تو اس کو سافٹ شکر کو مادہ آتشک یا آتشک یا آتشک مجازی کہتے ہیں۔ عام طور پر ہندوستان میں ہارڈ شکر کو مادہ آتشک یا آتشک حقیقی کہتے ہیں اور سافٹ شکر کو نرم آتشک یا آتشک مجازی کہتے ہیں۔

## پرائمری سفلس

(آتشک اولیٰ) شکر (آتشکی زخم) آتشکی مواد کے جسم میں داخل ہونے کے بعد ایک زخم پیدا ہو جاتا ہے۔ مردوں میں عموماً قصب کے اوپر یعنی علفہ سپاری نائیزہ اور عورتوں میں بہائے اندام نہانی کے اندر کی طرف پانچم رحم یا پیشاب کی نالی میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ کہ زخم صرف انہی جگہوں میں ہو۔ بلکہ بعض اوقات بول پستان کے منہ۔ انگلی یا کسی اور حصہ جسم پر جہاں کہ آتشکی مواد یا مرض کا زہر سرایت کر جائے۔ ایسا زخم ہو جاتا کہتا ہے۔

آتشک کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ بالمش بالمش کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی زخم زخم کو پیدا کرتا ہے۔ یا بالفاظ دیگر کہ وقت جماعت ایک شخص دوسرے بیمار شخص سے اس قسم کی بیماری حاصل کر لیتا ہے۔ ایک شخص کسی ایسی عورت سے یہ مرض حاصل کر سکتا ہے کہ جس کی اندام نہانی میں آتشکی مادہ موجود ہو۔ اگرچہ اس وقت تک اس میں مرض چھوٹ نہ نکلا ہو جو اشخاص بازاری عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں وہ اکثر اسی نامراد مرض میں مبتلا ہوا کرتے ہیں کیونکہ یہ رنڈیاں بیماری پھیلانے کا موجب ہوا کرتی ہیں۔ فرض کرو کہ ایک رنڈی کے ساتھ ایسا آدمی مباشرت کرتا ہے جو کہ آتشک کے مرض میں مبتلا ہے اور وہ زہریلا مادہ اس رنڈی کی اندام نہانی میں چھوڑ جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص مباشرت کرتا ہے اور اس میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ جس سے اس کی اور اس کے گھرانے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو لازم ہے کہ وہ بھول کر بھی کسی غیر عورت کے پاس ہرگز نہ ہرگز نہ جائیں۔ خواہ ان کو کتنا ہی یقین کیوں نہ ہو کہ یہ عورت اس مرض سے متبرک ہے اور یہی حال سوزاک کے زہر کا ہے۔

چھوٹ لگنے سے تین دن سے لے کر چودہ دن تک اور بعض اوقات اس سے بھی دیر میں مرض کا اظہار ہوتا ہے۔ بعض ڈاکٹروں کا قول ہے کہ یہ مرض چھ ہفتوں کے بعد بھی ظہور پذیر ہو سکتا ہے۔

آتشکی زخموں کی مختلف اشکال ہوتی ہیں۔

۱۔ نرم زخم جس کو سافٹ السر کہتے ہیں۔

۲۔ سخت زخم جس کو ہارڈ شنکر یا ہسٹیرین عسکر کہتے ہیں۔

۳۔ پھلنے والا زخم یعنی آتشک کے زخم میں خراش ہو کر اس میں سے پیپ نکلتی ہے تو

جہاں پر یہ پیپ لگتی ہے وہاں زخم کو دیتی ہے۔ اس طرح یہ زخم بہت پھیل جاتا ہے۔

۴۔ زخم نائیزہ بعض اوقات آتشک کا زخم پیشاب کی نالی میں ہو جاتا ہے اس لیے

اس کو یودی قنرل السر کہتے ہیں۔

## سافٹ شنکر۔ نرم آتشک۔ نرم آتشک مجازی

آتشک کی قسم بالعموم زیادہ پائی جاتی ہے۔ ابتدا میں ایک چھوٹی سی خراش دار

پھنسی ہوتی ہے جو کہ پھٹ کر زخم بن جاتا ہے۔ یہ زخم دم ہوتا ہے اور مادہ آتشک کے زخم کی مانند کڑی کی طرح سخت معلوم نہیں ہوتا اور یہ زخم شروع سے اخیر تک نرم ہی رہتا ہے۔

**تشخیص :** ہارڈ تشکر یعنی مادہ آتشک کا زخم شروع میں تو نرم ہوتا ہے۔ لیکن بعد میں چوبیس سے اڑتالیس گھنٹہ کے بعد سخت ہو جاتا ہے لیکن نرم آتشک کا زخم شروع سے اخیر تک نرم ہی رہتا ہے۔ اس زخم کو اگر دو انگلیوں کے درمیان میں لے کر دبایا جائے تو دوسرے چڑے کی طرح ہی مادہ جگہ بھی معلوم پڑتی ہے اور کوئی سختی وغیرہ نہیں ہوتی۔ نرم آتشک کے زخم کا زہر بہت گہرا نہیں جاتا۔ اس لیے یہ زہر خون میں سرایت نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آتشک مجازی کے شفا پا جانے کے بعد فساداتِ خون مثلاً جسم پر داغ یا آبے وغیرہ ظاہر نہیں ہوتے نہ دیگر امراضِ دماغ یا اعصاب ہڈیوں وغیرہ کے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس زخم کے کنارے دیگر ارد گرد کے گوشت سے کسی قدر ابھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں یہ سفید اور تیز ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ گول اور سرخ ہو جاتے ہیں ان زخموں کی سطح پر ایک ایسا مادہ لگا رہتا ہے جو کہ چربی کی مانند چمکتا ہوتا ہے۔ ان زخموں میں سے سفید یا زرد مادہ نکلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات زخم کے ارد گرد کے چھتے متورم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا زہر تمام جسم میں سرایت نہیں کر جاتا۔

## ہارڈ تشکر۔ آتشک سوداوی یا سخت آتشک۔ مادہ آتشک

زخم کے پیدا ہونے میں چوبیس یا اڑتالیس گھنٹہ کے اندر اندر مادہ آتشک یا ہارڈ تشکر کا امتیاز کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ لیکن تیسرے یا چوتھے روز مادہ آتشک کے زخم میں سختائی ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس سے بھی دیر میں سختائی کا ظہور ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نرم آتشک کا زخم بھی تھوڑا سخت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی سختی اور ہارڈ تشکر کی سختی میں نمایاں فرق ہوتا ہے ہارڈ تشکر کو جب انگلیوں کے درمیان دبایا جائے تو وہ ایسا سخت معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ کڑی کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ ہارڈ تشکر اور سافٹ تشکر کی شکل

میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ ہارڈ شنکر کے کنارے ارد گرد کی سطح سے ابھرے ہوئے نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ اس کا زہر نیچے کی ساخت میں سرایت کرتا جاتا ہے اس لیے اس کی شکل ایک پیالے کی شکل بن جاتی ہے اور زخم کی سطح بڑھنے سے اس کے کہ دو تہرے اور اس میں سے مواد بکثرت مانند سافٹ شنکر کے خارج ہو۔ یہ عموماً خشک ہوتی ہے یا اس کے اوپر ایک قسم کا کھرند آیا ہوتا ہے۔

ہارڈ شنکر کے پیدا ہوتے ہی نیچے ران کے غدود بھی سخت ہو جاتے ہیں اور ان کو چھونے سے ایسا پتہ لگتا ہے۔ گویا کہ چمڑے کے نیچے چھپے مڑوں کے دانے ایک قطار میں پڑے ہیں۔ لیکن ان غدودوں میں شافو تار ہی پیپ پڑتی ہے۔ مادہ آتشک کا زہر چونکہ خون میں سرایت کرتا ہے اس لیے یہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور آتشک کے دوسرے درجہ کے خوفناک علامات پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔

مادہ آتشک کے بہت ہی کم کیس ہوں گے کہ جن میں ان خوفناک بیماریوں کا مابعد میں ظہور نہ ہوتا ہوگا۔ ایک اور قسم کا زخم ہوتا ہے۔ جو کہ نہ سافٹ شنکر ہوتا ہے اور نہ ہی حقیقی ہارڈ شنکر۔ بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اس کو ابھرا ہوا زخم کہنا بجا ہے۔ بعض اوقات یہ ارد گرد کی سطح سے بہت اونچا ہے۔ جیسا کہ ایک بڑا مسہ یعنی موہکا ہوتا ہے اور یہ ایک موٹے اور سخت مادے کا بنا ہوا ہوتا ہے ساتھ کے مقام ہی متورم ہوتے ہیں۔ ایسے زخم کو آرام بہت دیر میں آیا کرتا ہے اگرچہ یہ شکل اور بناوٹ میں حقیقی ہارڈ شنکر سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ لیکن یہ اس کی قسم سے ہی شمار ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں بھی درجہ دوم کی علامات ظہور پذیر ہوا کرتی ہیں۔

## پھیلنے والا زخم

یہ کوئی الگ قسم نہیں ہے۔ بلکہ ان ہی زخموں سے یہ زخم پیدا ہو جاتا ہے سافٹ شنکر بہ نسبت ہارڈ شنکر کے اکثر اوقات پھیل جاتا ہے اور یہ حالت اکثر اس وقت ہوتی ہے۔ جب کہ مرض آتشک کی چھوت لگنے کے وقت مریض کی سمجھت عامہ خراب ہو اس قسم کے زخم اکثر کثیف اور شہابی آدمیوں میں بہت پھیل

جایا کرتے ہیں۔ اس لیے بازاری عورتیں اور گندے عیاش آدمی اس تباہ کن مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں

ڈاکٹر سٹیفن یلڈھم صاحب جنہوں نے بے شمار کیسوں کا پیلے ایلیو پیٹھک طریقہ پر علاج کیا اور بعد میں بے شمار کیسوں کا ہومیو پیٹھک طریقہ پر علاج کرتے رہے اپنے تجربہ کی بنا پر رقم طراز ہیں۔

”میں تجربہ کی بنا پر کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہومیو پیٹھک طریقہ پر علاج کرنے سے زخم نہیں پھیلتا۔ لیکن اگر پارے کی مقدار زیادہ دی جائے و (جیسا کہ ایلیو پیٹھک ڈاکٹر دیا کرتے ہیں)۔ تو اس تباہ کن زخم کے پھیلنے کا موجب ہوا کرتا ہے۔ خنازیری مزاج والوں میں بھی ایسے زخم زیادہ پھیلا کرتے ہیں۔

اس تباہ کن پھیلنے والے زخم کی مختلف حالتوں میں کئی ایک مختلف علامات ہوتی ہیں۔ لیکن عام علامات مندرجہ ذیل ہوا کرتی ہیں۔ زخم کی بے قاعدہ شکل ناہموار کنارے اس کی بڑی صورت اس میں درد اور تپلی سفید رطوبت اس سے نکلا کرتی ہے اور اس کا جلدی پھیلاؤ اور کسی دعائی کو نہ ماننا باوجود علاج معالجہ کرنے کے پھر بھی یہ زخم پھیلتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ تناسل کا بہت سا حصہ ماؤف ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر یلڈھم صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بیمار کو دیکھا کہ جس کے آلہ تناسل کا تمام چمڑا اور بہت سا سپاری کا حصہ گل سڑ چکا تھا اور پھر بھی بالکل ننگا ہو گیا تھا اور نوٹے کا چمڑا بالکل گل سڑ چکا تھا۔

## زخم نائیزہ رپوری تھل شکر

یہ ایک زخم ہوتا ہے۔ جو کہ پیشاب کی نالی کے سرے پر یا میانہ میں واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات سوزاکی زخم اور اس زخم کے درمیان امتیاز کرنے کی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تاکہ مرض کا علاج خاطر خواہ ہو سکے۔ ایسے حالات میں پیشاب کی نالی کا امتحان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ زندگی کی گارڈھی خفیف پیپ نائیزہ

میں سے نکلے کیونکہ سوزاک میں پیپ پتلی رُودھ کی مانند سفید اور مقدار میں کثیر ہوتی ہے۔ اور یوری تھلر شنکر کی پیپ اتنی کثیر مقدار میں نہیں ہوتی۔

یوری تھلر شنکر نائیزہ کے سرے کے نزدیک ہی پیشاب کی نالی میں واقع ہوتا ہو عموماً یہ چپٹا ہوتا ہے اور رنگت اس کی وہی ہوتی ہے جو کہ نالی کی بھٹی کی اگرچہ اس کے پھیلنے اور سخت ہونے کا تو بہت کم احتمال ہوتا ہے۔ لیکن درست ہونے میں بہت وقت لیتا ہے ایک تو شاید اس لیے کہ پیشاب اس پر سے ہر وقت گزرتا رہتا ہے اور دوسرے اس لیے کہ بالمقابل کے چمڑے کے ساتھ یہ چھوتا رہتا ہے۔ اس کے چھونے کا انتظام تو اس طرح سے کیا جاسکتا ہے۔ کہ تھوڑی سی روئی کو کیلنڈر لہ لوشن میں بھگو کر نائیزہ کے اندر داخل کیا جائے اور اس طرح سے یہ بالمقابل کی سطح کے ساتھ چھونے سے بچ سکتا ہے۔

## آتشک کے درجہ ابتدائیہ کا علاج

درجہ ابتدائیہ کا علاج کرتے وقت اس امر کو مد نظر رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے زخم کو سب سے پہلے درست کیا جائے تاکہ سمیت زخم باقی میں سرایت نہ کر جائے اس مطلب کو حاصل کرنے کے لیے خارجی ادویات کے استعمال کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ایسے موقع پر ہومیو پیتھک ڈاکٹروں کی آراء میں بہت اختلاف ہے۔ بعض خارجی علاج مثلاً کاشک یا نائٹرک ایسڈ سے جلا دینا مفید بتلاتے ہیں ان کا قول ہے کہ ابتداء میں زخم کو جلا دینے سے آتشک زہر دیگر حصہ جسم میں سرایت نہیں کر سکتا اور اس طرح ایک دشمن کی رفتار کو ابتداء ہی میں روک دینا زیادہ مفید ہوا کرتا ہے اور باقی بیماری کو جسم سے خارج کرنے کے لیے اندرونی ادویات دی جاسکتی ہیں۔ لیکن بعض ڈاکٹر زخم کے جلانے کے خلاف ہیں۔ ان کا اعتراض کہ جب زخم کی قدرتی شکل بدل دی گئی اور زخم کو جلا دیا گیا تو پھر ہمارے پاس کیا علامت باقی رہ گئی جس سے ہم معلوم کر سکیں کہ اندرونی ادویات نے مرض کو درست کر دیا ہے یا کہ نہیں۔

بعض ڈاکٹروں کا یہ بھی اعتراض ہے کہ کاشک یا نائٹرک ایسڈ سے جلانا ہومیو پیتھک

۱۔ اصول کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایسے فرائع عمل میں لانے کے برخلاف ہیں۔  
 اعتراض اول درست ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب زخم کو جلا دیا گیا تو  
 پھر معالج کے لیے یہ معلوم کرنا کہ اندرونی دوائی فائدہ کب رہی ہے یا کہ نہیں۔ بڑا مشکل امر  
 ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ملک کی حالت کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ اعتراض نظر انداز کرنا پڑتا  
 ہے۔ ہمارے ملک میں چونکہ ادویات (جہالت) بہت ہے اس لیے مریض کا باقاعدہ علاج  
 کرنا بہت کم جانتے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہی خواہش کرتے ہیں کہ معالج ایک یا دو روز میں  
 آتشک کے مرض کا قلع قمع کر دے اور اگر کوئی معالج یہ کہہ دے کہ چونکہ یہ مرض  
 بہت خبیث ہے۔ اس لیے اس کا علاج شافی کرنے میں کچھ عرصہ دوائی کرنے  
 کی ضرورت ہے تو وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بلکہ وہ کسی اور  
 کی تلاش میں ہو جاتے ہیں کہ جو ان کی مرضی کے مطابق دو تین روز کے اندر اندر  
 مرض کا ظاہری نشان یعنی آتشک کا زخم دودھ کر دیوے۔  
 ہمارے ملک میں اس قسم کے معالج بہت ہیں جو کہ اس قسم کی ادویات استعمال  
 کراتے ہیں۔ جو تین روز میں ہی مرض کے ظاہری نشان کاٹا دیتی ہیں۔ لیکن مریض  
 اور امراض کا شکار بن جاتا ہے۔ کون ذی شعور ہوگا جو اس امر کی درستی سے انکار  
 کر سکتا ہے۔

ہمارے لیے یہ امر تو موجب مسرت ہے کہ ہومیو پیتھک ادویات میں مذکورہ بالا  
 نقص نہیں ہے۔ یہ مرض کو دبا کر اس کا رُخ دوسری طرف نہیں بدل دیتیں بلکہ مرض  
 کو جڑ سے اکھیر دیتی ہیں۔ اس لیے اگر مریض کی تسلی کے لیے زخم کو جلا کر آئینہ  
 زہر پھیلانے سے روک دیا جائے اور ساتھ ہی ہومیو پیتھک ادویات دے کر مرض کا  
 جرم سے قلع قمع کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہم کو ادویات  
 پر پورا یقین ہے کہ مرض کا علاج شافی طبع پر کرنے کے لیے بالکل کافی ہیں۔ خواہ  
 نشان ہماری راہنمائی کے لیے ہوا اور خواہ نہ ہو، شاید زیادہ تعلیم یافتہ ملکوں میں زخم  
 کو جلا کر درست کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ لیکن ہمارے ملک میں تو مریض کی  
 تسلی کے لیے یہ ایک ضروری بات ہے جب قسمتی سے اس مرض میں اکثر کم تعلیم یافتہ  
 لوگ ہی زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

دوسرا اعتراض اصول کے متعلق ہے۔ میری رائے میں یہ اعتراض کوئی زیادہ وزن دار معلوم نہیں ہوتا۔ جس طرح ہو میو میچیک ڈاکٹر کو ایک زہر کو بذریعہ قے خارج کرنے کی ضرورت بعض اوقات پڑتی ہے۔ جس طرح ادویات کے اکیشن میں مدد دینے کے لیے اینما کر کے مریض کا پاخانہ خارج کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آتشک زہر کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی کنٹیکل ذریعہ اختیار کر لیا جائے جس سے اس زہر کی آئندہ ترقی مسدود ہو جائے تو یہ سب کچھ جائز ہے۔ جب کسی مریض کو سپا کاسٹ کھاتا ہے تو اس امر کی احتیاط کے لیے کہ سانپ کا زہر تمام جسم میں سرایت نہ کر جائے کئی قسم کے کنٹیکل ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی تو زخم کے اوپر کی جابا مضبوط بند باندھنے پڑتے ہیں۔ تاکہ خون کا دورہ رک جائے اور کہیں پر چیرا دے کر زہر آلود خون باہر نکالنا پڑتا ہے اور کہیں آگ کے کوئلے سے اس کو جلانا پڑتا ہے۔ یہ سب اس لیے کرنا پڑتا ہے تاکہ سانپ کا زہر باقی حصہ جسم میں سرایت نہ کر سکے پس اگر آتشک کے زہر کو باقی جسم میں سرایت کرنے سے روکنے کے لیے کسی کنٹیکل ذریعہ سے جلادیا جائے تو اس طرح کرے سے میری رائے میں کوئی بالی نہیں ہوتی کیونکہ کنٹیکل ذرائع کسی بھی اصول کے برخلاف نہیں ہیں اور وقت ضرورت ان کو کام میں لا کر کوئی نیک کام انجام دے دینا کسی طرح سے بھی ہو میو میچیک ڈاکٹر کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔

کاشک سے جلانا صرف اول اول ہی مفید ہو سکتا ہے جب تک کہ زخم کے زہر نے زیادہ گہرا اثر نہ کیا ہو۔ لیکن جب زخم کو پیدا ہوئے چوبیس یا اڑتالیس گھنٹے گزر جائیں تو پھر کاشک زیادہ مفید نہیں پڑتا ہے کیونکہ کاشک تو صرف اوپر کی سطح کو جلا سکتا ہے۔ لیکن زہر نے جو گہرا اثر پیدا کیا ہے۔ اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب ایک ایسے ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ زیادہ گہرا اثر پیدا کر سکے۔ ایسی صورت میں تیز نائٹرک ایسڈ سے جلانا مفید ہوا کرتا ہے مگر اس میں ایک زخم پر تھوڑا سا لکڑی کا کوئلہ پس کراد اس میں سلفیورک ایسڈ ڈال کر اور ایک لٹی سی بنا کر زخم پر لگانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بلڈ صم صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ وہ نائٹرک ایسڈ کا ایک قطرہ زخم کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو کہ چند



سیکنڈ زخم کے اوپر لگا رہتا ہے۔ پھر بلاٹنگ پیپر کے ٹکڑے کے ساتھ اس کو خشک کر لیتے ہیں اور اس طرح سے مطلب بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب زخم سخت ہو چکا ہو تو پھر یہ سب خارجی ترکیبیں بے سود ہوتا کرتی ہیں۔ ایسی عورت میں کاشک اور نائٹرک ایسڈ وغیرہ نہ لگانے چاہئیں۔ کیونکہ اب بیماری صرف اسی مقام تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ سارے جسم میں سرایت کر چکی ہے۔ ایسے حالات میں صرف اندرونی ادویات ہی مفید ہو سکتی ہے

## اندرونی علاج

سفلس کے مرض میں مرکبوس دوائی نہایت مفید اور ضروری دوائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مرکبوس (پارہ) ہر ایک طریقہ طب میں اس مرض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ علاج کے شروع میں ہی دوائی دی جاتی ہے اور اگر کسی کس میں کامیاب نہ ہو تو پھر کوئی اور دوائی تجویز کرنی پڑتی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مرکبوس کو تمام طریقہ ہائے طب اس مرض میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن فرق اس کی خوراک کی مقدار میں ہے اور یہ ایک نہایت ضروری فرق ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

بعض طریقہ ہائے طب تو پارہ اتنی مقدار میں دیتے ہیں کہ پارہ منہ کو آ جاتا ہے۔ ایلوپتھی کا مقولہ ہے۔ مرکری ٹوسلی ویشن پارہ دینے کے متعلق ایلوپتھک مصنفوں کی آراء میں بڑا بھاری فرق ہے۔ مسٹر ڈروڈ اپنی کتاب ”ویڈی سکیم“ میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ پارے کا استعمال اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ زخم بالکل خشک نہ ہو جائے اور پھر طے کی سختی معدوم نہ ہو جائے اور بعض ایلوپتھک مصنف پارے کے استعمال کو جاری رکھنا اس وقت تک ضروری سمجھتے ہیں جس وقت تک کہ پارہ منہ کو نہ آجائے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اب پارے کا اثر تمام جسم میں ہو گیا ہے۔ لیکن یہ سب غلط ہے۔ پارے کے زیادہ استعمال سے وہ ہوناک اور تباہ کن مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کو پھیلنے والا زخم کہتے ہیں۔ جس کا بیان اوپر آچکا ہے۔ پارے کے زیادہ استعمال سے بخار پیدا ہو جاتا ہے۔ بخار ماری

جاتی ہے۔ اسہال اور پھیش شروع ہو جاتے ہیں اور منہ اور گلے میں زخم ہو جاتے ہیں۔

ہو میو پیٹیک طریقہ میں تیار کی ہوئی مرکبوس سالواس مرض میں نہایت ہی مفید ہے۔ خاص کر ہارڈ شکر مادہ آتشک (پیش تو اس کے بغیر گزارہ مشکل ہے۔

بذ خوراک: ۱۰ اٹری ٹورشن کے ایک سے دو گرین تین مرتبہ دن میں بعض ڈاکٹر صاحبان اس کو ۳x یا ۴x یا ۵x میں استعمال کرتے ہیں یہ سب کچھ معالج کے تجربے بیماری کی سختی یا نرمی اور بیمار کی طبیعت پر منحصر ہوتا ہے اور اسی پر دوائی کی خوراک کی کمی بیشی منحصر ہے۔

مرکبوس و: مرکبوس کار اور مرکبوس بن آیوڈائڈ بھی مرکبوس سالو کی بجائے استعمال میں لائے جاسکتے ہیں اور خاص کر خازیری مزاج والوں کے لیے تو مرکبوس بن آیوڈائڈ مفید ہوتی ہے۔

ایسی ڈم نائٹریکیم (نائٹریک ایسڈ) مرکبوس کے دوسرے درجہ پر سلفس کے زہر کو ہلاک کر دینے والی یہ دوائی ہر قسم کے زخم کے لیے اور خاص کر نرم آتشک کے لیے کمزور اور ناتواں مریضوں کے لیے نہایت موزوں ہے۔ جن مریضوں ہجیروں کا مرض ہو اور ان کے باعث وہ بہت کمزور ہو چکے ہوں یا ان مریضوں کے لیے جو پہلے پارہ زیادہ مقدار میں استعمال کر چکے ہوں اور پارے نے کوئی فائدہ نہ کیا ہو بلکہ طبیعت کو بگاڑ دیا ہو تو یہ دوائی نہایت ہی موزوں ہے۔ چونکہ یہ مرض عام طور پر ان ہی لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ جوان مضبوط طبیعت ہوتے ہیں۔ اس لیے مرکبوس زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ لیکن کمزور طبیعت والے بھی کئی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خاص کر جبکہ پارے کے استعمال اور سلفس کے باعث مریض کی طبیعت بہت کمزور ہو چکی ہو تو ایسے حالات میں نائٹریک ایسڈ ایک مفید دوائی ہے۔

بذ دوائی کی مقدار و ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲

✽ خوراک : ۱x یا ۲x ڈائی لیوشن کے ۵ سے ۱۰ قطرے دن میں تین مرتبہ۔  
نوٹ : بہت سے مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی طبیعت نہ بہت مضبوط ہوتی  
ہے اور نہ ہی بہت کمزور بلکہ درمیانہ قسم کے ہوتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے۔  
یا ان حالتوں میں جب کہ معالج یہ فیصلہ نہ کر سکے۔ کہ مریضوں زیادہ مفید ہوگا  
کہ نائٹرک ایسڈ تو ان دونوں ادویات کو باری باری سے دیتے ہیں اور زیادہ  
مفید اور موزوں رہتا ہے۔

چونکہ ہومیوپیتھی میں سفلس کے علاج میں ان دونوں ادویات کا درجہ بہت اعلیٰ  
ہے اس لیے ان دونوں کے ہی استعمال سے بہت سی تعداد مریضوں کی شفا یاب  
ہو جاتی ہے۔

علاوہ ان کے اور بھی ادویات ہیں جو کہ آتشک کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں  
لیکن ان کا درجہ ان دونوں سے بہت نیچا ہے۔

ایکونائٹ : جب پارے کے استعمال کے بعد آلہ تناسل میں شدید سوزش  
واقع ہو جائے تو ایک مفید دوائی ہے۔

✽ خوراک : ۱x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے ہر تیسرے گھنٹے۔

احتیاط : جب زخم کے ہمراہ سوزش سپاری پر ہو تو گھونگھٹ کے گوشت  
کو بہت زور لگا کر پیچھے نہیں ہٹانا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ اُسی حالت میں  
ہی شفا ہو جائے۔

آر سینکم : جب پارے کے استعمال سے زخم کے اوپر سرخ الجھرے ہوئے  
وانے نکل آویں اور زخم کے کنارے سخت ہوں اور ذرا سا چھونے سے بھی اُن سے خواب نکل  
آوے اور جو مواد زخم میں سے نکلے وہ بہت پتلا اور بدبو دار ہو تو یہ دوائی بہت مفید  
پڑتی ہے۔ جب زخم گل مٹ گیا ہو اور پھیل رہا ہو۔ بد شکل ہو چکا ہو اور اس میں ایسی  
جلن ہو جیسا کہ آگ کا کوندہ اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں اس دوائی کے  
بغیر گزارہ چلنا مشکل ہے۔

✽ دوائی کی مقدار ترکیب استعمال کے لیے دیکھو صفحہ نمبر ۲۵



یادہ سخت رہتی ہیں۔ یہ بدیں دوران سوزاک میں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ مگر شاذ و نادر مگر مرض آتشک میں تو عام طوعہ پر بڑھ جاتی ہیں۔

سوزاک کی بدیں۔ اگرچہ سوزاک میں بدیں کم جھولتی ہیں۔ لیکن زیادہ جسمانی محنت کرنے سے پھول آتی ہیں اس لیے جب مرض سوزاک کا زور ہو تو مریض کو بالکل چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے۔

سوزاک کی بدوں میں شاذ و نادر ہی پیپ پڑتی ہے اور آرام سے پڑا رہنے یا ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے سے یا ٹھنڈے تیلے باندھنے سے آرام آجایا کرتا ہے۔ ایکونائٹ اور مرکبوس اس مرض میں نہایت مفید ادویات ہیں۔

آتشکی بدیں خاص توجہ کے قابل ہیں۔ یہ آتشکی زخم کے زہر کو جذب کر کے پھول آتی ہیں اور ان کی حالت اور درد بہت کچھ اس آتشکی زخم کی حالت پر منحصر ہوا کرتا ہے پس اگر زخم نرم اور اس میں سے پیپ آتی ہو۔ تو یہ بھی پیپ والی ہوتی ہے۔

سخت شکر کی بد بھی سخت ہوتی ہے اور اس میں شاذ و نادر ہی پیپ پڑتی ہے۔ اور مزید بات یہ ہے کہ پیپ والی بدوں کے بعد مرض کا دوسرا درجہ شاید ہی ظہور میں آتا ہو لیکن سخت بدیں جو کہ ہارڈ شکر کے ساتھ پیدا ہو جایا کرتی ہیں وہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہیں کہ آتشک کا مرض جسم میں سرایت کر چکا ہے اور مرض کا دوسرا درجہ ضرور شروع ہوگا۔ نرم آتشک کی بدوں میں پھوت کا مادہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان میں زیادہ درد ہوتا ہے مریض اپنا کاروبار کرتا رہتا ہے۔ لیکن زیادہ حرکت کرنے سے سوزش بڑھ جاتی ہے اور مادہ پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ مگر تین یا چار روز آرام کرنے اور ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنے اور مناسب ادویات کے استعمال سے پیپ کا بنتا بند ہو جاتا ہے اور اگر پیپ بن بھی جائے تو بھی اکثر حالتوں میں غدود بیٹھ جاتے ہیں اور پھٹتے نہیں ہیں۔

ایسے خوش قسمت کیسوں میں چمڑے کی سرنخی کم ہو جاتی ہے اور جگہ ماؤف درد نہیں کرتی۔ چند روز ایسی ہی حالت بنی رہتی ہے اور پیپ آہستہ آہستہ جذب ہوتی شروع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ بدیں اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہیں اس لیے بد کو چیرا دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ بلکہ اس امر کا انتظار کرنا چاہیے کہ بدیں بلا چیرا دینے کے ہی نمیک ہو جائیں اگر خود بخود بد ٹھیک نہ ہو اور اس کا کھولنے کے بغیر اور کوئی علاج نہ ہو تو نشتر سے کھول

دینا چاہیے۔

جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ جونہی بدیں درد ہوا وہ بڑھتی شروع ہو جائے۔ تو جہاں تک ممکن ہو مریض کو چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے اور بد کے اوپر ٹھنڈے پانی کی پٹی لگانی چاہیے۔ اگر ایسے موقع پر مریض مرکبوس سالو کو استعمال کر رہا ہے تو اس کے ہمراہ اکیونائٹ کا استعمال بھی باری باری سے یکے بعد دیگرے شروع کر دینا چاہیے اور پھر مرکبوس کے ساتھ بیلادونا باری باری سے دینا چاہیے اس عمل سے سوزش کم ہو جائے گی۔ تب ہیمپرسلف ۳x ٹری ٹیورلین دینے سے مادہ تحلیل ہو جائے گا حسب ضرورت بد کے اوپر ایسی کی گرم پلٹس باندھنا اس مطلب کو حل کرنے کیلئے مددگار و معاون ہونا کرتا ہے۔

### ناسور غدد

بعض اوقات بد کو چیرا دینے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ خراب صورت اختیار کر لیتی ہے اور ارد گرد دھتے خراشدار اور متورم ہو جاتے ہیں اور کئی ایک نئے منہ بن آتے ہیں اور آخر کار تمام جگہاں میں سوراخ ہی بن جاتے ہیں۔ خنازیری مزاج والے مریض اکثر اس ناسور میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ پس ایسے ناسور کے علاج میں بہت احتیاط اور توجہ کی ضرورت ہوا کرتی ہو۔ ایک تو ایسی کی گرم پلٹس باندھنا اور دوسرا ایک حصّہ کیلنڈر لالوشن اور آٹھ حصّے پانی ملا کر اس میں ردی بھگو بھگو کر زخم کے اندر اور باہر کھنی چاہیے اور مرکبوس سالو یا مرکبوس بن آیوڈائیڈ ۳x ٹری ٹیورلین کے پانچ سے دس گرین تک فی خوراک کے حساب سے دن میں تین یا چار مرتبہ استعمال کرنے چاہئیں اور اگر مرکبوس مریض کو پہلے دیا جا چکا ہے تو پھر اب مرکبوس دینے کی ضرورت نہیں بلکہ ایڈیم نائٹریکیم x یا ۲x ڈائی بوشن کے دس قطر فی خوراک کے حساب سے دن میں تین مرتبہ دینے چاہئیں اور ساتھ ہی مریض کی طاقت کو بحال رکھنے کے لیے اس کو مرغی غذا دینی چاہیے اور نیزات ایک چمچ کاڈلورائل کا پلانا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے مریض کو چپ چاپ اور با من پڑا رہنا چاہیے حرکت کرنے سے صحت کی رفتار میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔

آتشک کا درجہ دوم یا درجہ ثانوی

جب آتشکی زہر جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو کئی ایک عوارض جسم کی چلد ہڈیوں

اور دیگر ساخت میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات زہر کا اثر منہ، حلق، ناک اور کان کی رطوبتی جھلیوں میں بھی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ اکثر تو یہ عوارض آتشکی زخم کی موجودگی میں ہی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات زخم ٹھیک ہونے کے چند روز یا چند ہفتے بعد۔

یہ امراض خاوند سے عورت کو اور ماں سے بچے کو ہو جایا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر یلڈہم صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان میں آتشک کی علاماتِ ثانوی ظہور پذیر ہوئیں اس کا علاج کیا گیا اور وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس کے تین ماہ بعد اس کی شادی ہوئی۔ اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ جس کے منہ، ناک اور مقعد میں آتشکی علامات موجود تھیں۔ افسوس کہ وہ اس زہر سے جانبر نہ ہو سکا۔

ایک اور کہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کو اس کے خاوند سے آتشک کا اثر ہو گیا۔ اگرچہ شادی سے پہلے مرو کا زخم بالکل درست ہو چکا تھا۔ بعد میں علاماتِ ثانوی مرو میں ظہور پذیر ہوئیں۔ اس لیے اس آدمی کو جس میں مادہ آتشک ہو ہرگز شادی نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک کہ علاماتِ ثانوی کے ظہور پذیر ہونے کا ممکن سے ممکن عرصہ ہو سکتا ہے گزر نہ چکا ہو۔

ڈاکٹر صاحب موصوف ایک اور مزید اہم بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ لنڈن ہومیو پیتھک ہسپتال میں ایک عورت لائی گئی جس میں آتشک کی ثانوی علامات ظاہر ہو چکی تھیں اور اس زہر کا سبب یہ تھا کہ اس نے اپنی بھانجی کے لڑکے کو اپنے پستان سے دودھ پلایا تھا اور اس کی بھانجی یہ لڑکا چھوڑ مری تھی۔ اور مرتے وقت آتشکِ ثانوی کی علامات اس کی جلد پر ظہور پذیر تھیں۔ اب اس امر میں تو کوئی کلام نہیں رہا کہ چھپک کا ٹیکہ لگواتے وقت ایک لڑکے کا آتشکی زہر دوسرے لڑکے میں اثر کر جاتا ہے۔

اسبابِ مرض : علاماتِ ثانوی پیدا کرنے میں کئی اسباب مددگار ہوا کرتے ہیں اور خاص کر جب کہ مریض کو ہارڈ شنگر ہو چکا ہو اور مرض کو دیر میں آرام آیا ہو۔ خاص کر جبکہ جنگا سہ کے غدود ساتھ ہی سخت ہو چکے ہوں تو ثانوی علامات کا ظاہر ہونا یقینی ہوا کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مریض نے ہومیو پیتھک

علاج نہیں کرایا ہے۔ بلکہ اس نے ایلوپتھک یا دیگر طریقہ طب کا علاج کرایا ہے۔ تو علامات کے شدید صورت اختیار کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا اور اگر مریض کا علاج ہومیو پتھک طریقہ پر کیا گیا ہے۔ تو اگر علامات ثانوی پھوٹ بھی نکلیں گی تو نہایت ہلکی ہوں گی اور مریض جلد ہی شفا یاب ہو جائے گا۔

غذا میں بد پرہیزی (خاص کر دوران علاج شراب کا استعمال) ان علامات کے پھوٹ نکلنے میں زیادہ معاون اور مددگار ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے ناکافی علاج اور زخم کا مکمل شفا نہ پانا ان عوارض کا موجب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب تک زخم میں سختی کے نشانات قطعی طور پر گم نہ ہو جاویں۔ تب تک علاج کرتے رہنا چاہیے اور چھوڑ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ آتشک کی علامات ثانوی کی تشخیص کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ علامات ایسی واضح ہوتی ہیں۔ کہ ان کی پہچان میں کوئی غلطی واقع نہیں ہو سکتی اور اگر یہ بھی ساتھ ہی پتہ مل جائے کہ مریض کو آتشک ہو چکا ہے تو پھر تو کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ البتہ مزمن علامات کی تشخیص مشکل ہوا کرتی ہے لیکن ہومیو پتھک علاج میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ یہاں تو مرض کی علامات کا علاج ہوتا ہے۔ نہ کہ مرض کے نام کا۔ اس لیے جس دوائی کی علامات ٹکڑا کھا جاویں۔ وہی شفا بخش ہوتی ہے۔

جب مریض کے جسم کا رنگ سیاہ تانبے کے رنگ جیسا ہو یا پیشتر ازیں مرض کے حملہ آور ہونے کا کوئی نشان موجود ہو یا اگر وقت شب ہڈیوں میں دردوں کی زیادتی ہوتی ہو تو یہ سب آتشکی زہر کی خاص علامات ہیں۔

ڈاکٹر رکھو صاحب علامات ثانوی کا بیان اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ آتشک کی علامات ثانوی کا اظہار چھوٹ لگنے کے دوسرے یا تیسرے ہفتہ کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن عام قاعدہ چھٹے ہفتہ کے قریب ہے اور اکثر اوقات علامات ثانوی تیسرے مہینے بھی ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ رنگت جسم تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ چمڑے کی قدرتی خوشنمائی زائل ہو کر اس کا خاکتری رنگ ہو جاتا ہے۔ بینائی مدھم پڑ جاتی ہے تمام جسمانی اور دماغی طاقتیں مریض کھو بیٹھتا ہے اور سست اور اداس پڑا رہتا ہے۔ بال خشک ہو جاتے ہیں اور جھک گم ہو جاتی ہے۔ سرورزی ہو جاتا ہے اور درد



کرتا ہے۔ گردن کے قریب بہت بے چینی معلوم ہوتی ہے اور ایک خاص قسم کا درد کینٹھیوں میں ہوا کرتا ہے۔ سر کی تکالیف بوقتِ شام شروع ہوتی ہیں اور صبح کے قریب دور ہو جاتی ہیں۔ بستر کی گرمی سے ان میں تکلیف ہوا کرتی ہے۔ کینٹھیوں کے پاس اکثر یہ در دیں زیادہ ہوا کرتی ہیں اور جب ان دردوں میں زیادتی ہوا کرتی ہے تو مریض کو ایسا معلوم پڑتا ہے گویا کہ آنکھوں کے ڈھیلے اپنی جگہ سے باہر نکل رہے ہیں۔

”ماؤف جگہیں نہ تو سُرخ ہوتی ہیں اور نہ متورم اور نہ چھونے سے درد کرتی ہیں۔ سرور و ایک جگہ مقامی ہو جاتا ہے اور دردِ شقیقہ یا چہرہ میں ریشے کا درد ہو جاتا ہے لیکن ظاہر کوئی علامات نظر نہیں آتیں مگر مرض کا تدارک جلدی نہ کیا جاوے تو چہرہ کا فالج ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں پچھلے حالات کی خبر نہ ہو تو وجع المفاصل کی شکایات کے ساتھ اس کو ہم منسوب کرتے ہیں۔ اس قسم کے کئی ایک کیس بھی میرے پاس آئے جن کو میں نے مرکوریس آیوڈائیڈ دے کر شفا دی۔ کئی ایک کیس ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ بدوں دردِ عصبی پیدا ہوئے اعصابِ چہرہ پر مرض نے جاملہ کیا اور لقوہ کا مرض پیدا ہو گیا۔“

جلدِ جسم۔ گلو اور منہ کی جھلی پر آتشکی زہر کا اثر بالعموم زیادہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی پہلے جلدِ جسم ماؤف ہو جاتی ہے اور کبھی اول گلے پر مرض کا حملہ ہو جاتا ہے۔

جلد کے کئی ایک امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً

۱۔ اگنر تھم (XANTHOMA) یہ چھانٹ سب سے پہلے جسم پر ظاہر ہوتی ہے

ابتداء میں اس کا رنگ گلابی اور بعد میں تانبے کا رنگ ہو جاتا ہے۔ یہ چھانٹ جسم کے مختلف حصوں میں تدریج ظاہر ہوتی ہے یا ایک ہی مرتبہ تمام جسم پر نمودار ہوتی ہے۔ چہرہ پیشانی۔ بازو۔ چھاتی اور پیٹ پر یہ بالعموم ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اس کے دانے خسرہ کی مانند ہوتے ہیں اور ابتداء میں ان دونوں میں امتیاز کرنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے۔

۲۔ پاپولی یا پنپلز۔ یہ پھنسیاں بھی علاماتِ ثانوی کے ابتداء میں پیدا ہوتی ہیں۔

رنگ ان کا زرد، سُرخ یا سیاہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ان کا علاج مناسب طریقہ پر نہ کیا جائے تو ان کا رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے اور نوک تیز ہو جاتی ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم بھر پور ہو جاتا ہے۔ اگر سر سری نظر سے دیکھا جاوے تو یہ داغ ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے چمچک کے مر جھلے ہوئے دانے۔

۴۔ لسیچولرا ایریپشنز (PUSTULER ERUPTIONS) (چھلے) یہ مرض اس وقت ظہور پذیر ہوتا ہے جبکہ آتشکی زہر جسم میں بہت سرایت کر چکا ہو۔ اکثر کمزور اور بیماری سے نیاؤں بے ہوئے مریضوں میں یہ چھلے ظاہر ہوتے ہیں۔

۴۔ جلد کا چھل جانا۔ بعض اوقات مریضوں کی جلد پر سر سے پاؤں تک سینکڑوں ہی زخم پیدا ہو جاتے ہیں جن کا باعث آتشکی زہر ہوا کرتا ہے۔

۵۔ ٹیوبرکلز (گانٹھیں) مریض کی جلد کے اوپر بے قاعدہ شکل کی گانٹھیں نکل آتیاں کہتی ہیں۔ ان کو ٹیوبرکلز کہتے ہیں۔

۶۔ امراض جلدی کھوٹھی۔ مثلاً پھوٹے پھنیاں اور بالوں کا گر جانا وغیرہ۔

۷۔ گلہ اور منہ کی رطوبتی تھیلیوں کا ورم اور زخم۔ آتشکی زہر کی ابتدائی علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہے۔ بعض اوقات ٹھنڈے لگنے سے یہ مرض جاگ اٹھتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر احتیاط کی جاوے تو مریض اس مرض سے بچے رہتے ہیں۔

۸۔ آتشکی زہر کا اثر عام طور پر حلق اور اس کے غدودوں پر ہوتا ہے۔ مریض اکثر اوقات گلے سے اس کو معمولی گلے کا دھنا سمجھ لیتا ہے۔ رنگ اس کا سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے۔ اندر زخم ہوتے ہیں۔ پیپ بکڑت خارج ہوتی ہے۔ مرض درست ہونے میں نہیں آتا۔ علامات نزلہ کی غیر موجودگی اور سب سے بڑھ کر اگر آتشک اس وقت یا اس سے پہلے ہو چکا ہو تو یہ ایسی علامات ہیں کہ جن سے کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا کبھی تو یہ مرض نہایت نرم ہوتا ہے اور کبھی ایسا شدید کہ غدود گواور کوا وغیرہ سب تباہ ہو جاتے ہیں۔

## علامات ثانوی کا علاج

ایسے حالات میں علاج اکثر مشکل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے معالج کی خصوصی توجہ درکار ہو سکتی ہے اور جب ہم اس امر پر غور کرتے ہیں کہ زہر صرف مریض تک ہی نہ رہے گا۔ بلکہ اس کی اولاد بھی مبتلائے مرض ہوگی۔ تو اس مرض کی یخ کنی کے لیے جس قدر محنت اور کوشش کی جائے تھوڑی ہے۔

بعض معالجوں کے نزدیک یہ مرض لا علاج ہے اور بعض معالج اپنے مریضوں

سے جھٹ وعدہ کر لیتے ہیں کہ دائمی شفا بہت جلد ہو جائے گی۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اگر مریض ابتدائی حالت میں ہو۔ مریض کی صحت بھی اچھی ہو اور مریض پارے کا زیادہ استعمال نہ کر چکا ہو تو مرض کی بیخ کنی اور مریض کی بالکل شفا یابی کی بابت بڑی آسانی سے وعدہ کیا جاسکتا ہے اور برعکس اس کے اگر مرض جسم میں گھر کر چلا ہے اور صحت بہت بگڑ چکی ہے۔ مزید برآں اگر مریض خنازیری جثہ کا ہے تو اگر علامات ثانوی کو تھوڑے عرصہ کے لیے آرام بھی معلوم ہو تو مرض کا پھر عود کر آنا بالکل معمولی بات ہوا کرتی ہے۔

پہلے وقتوں میں مریض کو پارے کی بڑی بڑی مقدار دی جاتی تھی جس سے مریض کا جسم زہر آلود ہو کر علامات ثانوی کے نشوونما پانے کا موجب ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب سائنس نے ترقی کی ہے اور معالج زیادہ محتاط ہو گئے ہیں اور تعلیم یافتہ معالج تو اور بھی زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں۔ اگرچہ بد قسمتی سے ہمارے ملک میں امراض خبیثہ کے معالج عموماً وہ لوگ ہیں جو کہ علم سے نا آشنا اور طریقہ طب سے بالکل ناواقف ہیں۔

اکثر دیکھا گیا ہے کہ مریض پڑھے لکھے معالجوں کے پاس جانے سے شرماتا ہے اور وہ اکثر ایسے لوگوں سے علاج کرواتا ہے کہ جو اس کی باقی ماندہ زندگی کو تباہ کر کے اس کے خاندانی کی بربادی کا موجب ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں یہ خیال گھڑکے ہوئے ہے کہ امراض خبیثہ کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان تباہ کن امراض کا شکار مریض ان کا علاج بازاری رٹدیوں۔ جولاہوں اور ملاؤں یا اشتہاری حکیموں سے کرواتے پھرتے ہیں ان کے خیال میں بقولیکہ ”مریض بھی نصف حکیم بن جاتا ہے“۔ بازاری رٹدیاں چونکہ خود ان امراض میں مبتلا رہا کرتی ہیں۔ اس لیے ان کے پاس بڑے مجرب نسخے ہوا کرتے ہیں۔ بدیں وجہ وہ ان لوگوں کو ان امراض کا ماہر جان کر ان سے علاج کرواتے ہیں اور نتیجہ وہی ہوتا ہے۔ جس کی ایک ذی عقل توقع کر سکتا ہے

مکن ہے کہ پڑھے لکھے ویدوں اور یونانی طبیبوں کے پاس ان امراض کا علاج اچھا موجود ہو۔ لیکن یہ بات بغیر تردید کے کہی جاسکتی ہے کہ ان امراض کے علاج

میں ہو جیو پتیجی سے بہت کچھ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ معالج کا اعلیٰ منصب یہ ہے کہ صحت جلد از جلد مستقل طور پر اور بغیر کسی زیادہ درد یا تکلیف کے بحال ہو جائے اور تھوڑے سے تھوڑے عرصہ میں مرض کا قطعاً اور یقینی طور پر قلع قمع کر دیا جائے۔

آتشک کے درجہ دوم میں چونکہ خون زہر آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس زہر کی بیخ کنی کرنا ہی شفا کہلاتا ہے۔ یہ بیخ کنی تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ احتیاط اور قاعدہ سے مناسب ادویات منتخب کر دہ کا استعمال عرصہ تک کیا جائے اور ساتھ ہی حفظانِ صحت اور خوراک وغیرہ کے متعلق ایسی ضروری احتیاط کی جائے کہ جس سے مریض کی صحت قائم رہ سکے۔

مرکیورس : یہ دوائی جیسے ابتدائی حالات میں مفید ہے ویسے ہی درجہ دوم میں بھی کئی حالتوں میں مفید پڑتی ہے۔ اکثر ایسے کیس بہت دیکھنے میں آتے ہیں۔ کہ جن میں ابتدائی دثانوی علامات دونوں ہی ایک وقت میں موجود ہوتی ہیں۔ پس مرکیورس جب ایک حالت کے لیے دیا جائے تو دوسری حالت کے لیے بھی مفید پڑتا ہے اور اکثر جلدی امراض میں یہ دوائی بڑی مفید پڑتی ہے۔ اگر مریض پارے کا استعمال پہلے کر چکا ہو۔ تو پھر مرکیورس کا استعمال مفید نہیں ہوا کرتا۔ اگر پہلے استعمال نہ کیا گیا ہو اور علامات بھی مرکیورس کے موجود ہوں تو پھر یہ دوائی ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ عام طور پر مرکیورس سالو۔ مرکیورس کار۔ مرکیورس آمبو ڈائیڈ یا مرکیورس بن آیوڈائیڈ ۲x یا ۳x ٹی ٹیوریشن کے پانچ گزین دلی میں تین مرتبہ دیتے ہیں۔

کالی ہائیڈراڈیکم۔ جب مرکیورس کے استعمال سے پورا فائدہ نہ ہو۔ تو دوسرے درجہ پر جس دوائی کا معالج کو خیال ہونا چاہیے۔ وہ کالی ہائیڈراڈیکم ہے بہت سے جلدی امراض میں اس کا شفا بخش اثر قابل تعریف ہے۔ وہ کیس جو کہ کسی دوائی کے اثر کو نہ مانے۔ یا مریض خازیری جھٹے کا ہو۔ تو یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے۔

ایسے کیسوں میں اگر مرکیورس اور کالی ہائیڈراڈیکم کا استعمال باری باری سے

کرایا جائے تو نتائج نہایت تسلی بخش ہوا کرتے ہیں۔ باری باری سے استعمال کرانے سے یہ مراد ہے کہ مرکبوں میں ایک ہفتہ استعمال کرائی جائے اور دوسرے ہفتہ کالی ہائیڈرائیم اسی طرح ہفتہ بہ ہفتہ باری سے استعمال کرنا نہایت تسلی بخش نتائج پیدا کرتا ہے۔ علامات مخصوصہ اس کی یہ ہیں۔ خنازیری مزاج اور کمزور طبیعت۔ جنگاں۔ گلے یا گردن کے غدود بڑھے ہوئے۔ گلے میں ایسا درد گویا کہ کوئی برچھی چھبورا رہے۔

جب پارہ زیادہ مقدار میں دیا جا چکا ہو۔ تو اس کے بُرے نتائج کو روکنے کے لیے یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ جب پارے کے زیادہ استعمال سے مریض کے سرخ سرخ اور متورم ہو گئے ہوں۔ گلا درد کرے۔ سانس متعفن ہو اور رات کے وقت ہڈیوں میں سخت درد ہو تو یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے۔

خوراک: درنیکچر یا ۵ کے ۵ سے ۸ گزین پانی میں گھول کر دن میں تین مرتبہ۔

ایسڈم نائٹریکیم۔ یہ دوائی بھی درجہ دوم میں خاص فوٹیت رکھتی ہے۔ کالی ہائیڈرائیم کی طرح یہ دوائی بھی ان مریضوں کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے۔ جنہوں نے پارے کا استعمال بہت زیادہ کیا ہو۔ اس کی علامات مخصوصہ چھوٹے چھوٹے گول گول زخم جن میں خون آسانی بہ نکلے اور ان میں ایسا درد ہو جیسا کہ کوئی برچھی چھبورا رہے۔ جب گلے، منہ اور ناک کی رطوبتی جھلی میں زخم ہو تو یہ دوائی زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔ خوراک: ۱x یا ۲x ڈائی لیوشن کے ۵ سے ۷ کے ۱۰ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

## رطوبتی جھلی کے عوارض کا علاج

جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے یہ عوارض ٹھنڈے لگنے سے جاگ اٹھتے ہیں۔ ان میں

ایکونائٹ۔ بیلادونا۔ ایپس اور مرکبوں کا مفید پڑتی ہیں۔

جب ایکونائٹ کے دینے سے بخار اور شدید علامات میں تخفیف ہو جائے۔

تو ایپس ۱x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے فی خوراک کے حساب سے دینے سے باقی مرض کو آرام ہو جاتا ہے۔

علاوہ ازیں بیلادونا۔ لاکس اور مرکبوں کا راہی اپنی علامات کے ساتھ

استعمال میں لائی جاسکتی ہیں۔ اگر ان امراض میں مرکبوں کا کار کے دینے سے تھوڑا افادہ

ہوا ہو۔ لیکن مرض رفع نہ ہوا ہو۔ تو ایسے موقعہ پر ایسڈیم ٹائٹرکیم ایک مفید دوائی ہوتی ہے یعنی ۱x یا ۲x ڈائی لیوشن کے دس قطرے دن میں تین مرتبہ پلانے چاہئیں اور نصف ڈرام خالص نائٹرک ایسڈ ایک پاؤ پانی میں ہلا کر اس کے غرارے کو انے چاہئیں یہ دوائی بعض حالتوں میں نہایت مفید پڑتی ہے گلے کے آتشکی امراض میں آر جینٹم نائٹرکیم بھی بڑی مفید دوائی ہے۔

مریض کو ہر قسم کے نشہ اور حقہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ جسمانی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے کاڈیور آیل کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے یعنی سوتے وقت رات کو ایک چمچ کاڈیور آیل کا پی لینا بہت مفید اثر رکھتا ہے۔ اگر کاڈیور آیل زیادہ پیاجائے تو غیر مفید اثرات پیدا کرتا ہے۔ مریض کا جی ملتا ہے۔ اور اس کی اشتہاماری جاتی ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے مناسب پارچات پہننے کی مریض کو ضرورت ہوا کرتی ہے۔

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے اور بھی کئی ادویات مثلاً ایسڈیم ہسلفیوریکم۔ فاسفورس۔ ہیرسلف۔ کالی بائی کرومیکم اور سلفراپنے اپنے موقعوں پر مفید ہوتی ہیں۔

## گلیٹیاں کنڈری لیو مائیا میو کس ٹیو برکلز

یہ گلیٹیاں رطوبتی جھٹی کے اوپر نکل آیا کرتی ہیں اور خاص گھونگھٹ کے نیچے بیماری کے دونوں پہلوؤں پر۔

جو گلیٹیاں آتشک کے مرض سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ قد۔ رنگ اور شکل میں آپس میں نہیں ملتیں اور ایک دوسری سے مختلف ہوا کرتی ہیں۔ وہ اسلی سطح سے کم و بیش ابھری ہوئی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات چپٹی اور بعض اوقات گول اور جس سطح پر واقع ہوتی ہیں۔ تقریباً اسی رنگت کی گلیٹیاں بھی ہوا کرتی ہیں اور اکثر وہ ایسی جگہ پر پیدا ہوتی ہیں کہ جو جگہ آپس میں رگڑ سکھاتی ہو۔ مثلاً مقعد۔ حشفہ کی بالائی جلد کے نیچے۔ ہونٹوں کے کناروں پر۔ زبان کے زیریں اور مستورات کی اندام نہانی و شرمگاہ پر۔

ان گلیٹیوں میں سے خراشدار مادہ خارج ہوتا رہتا ہے اور وہ بہت بدبودار ہوتا ہے۔ جب یہ گلیٹیاں مقعد یا اندام نہانی پر ہوں تو پاخانہ اور پیشاب کے گزرے

کے باعث سخت درد ہوتا ہے۔

## علاج

مرکیورس سالو: ایک مفید دوائی ہے۔ ابتداء میں اسی کو استعمال کرنا چاہیے۔  
 بہت سے کیسوں میں یہ دوائی اکیلی ہی شافی ہوا کرتی ہے۔  
 خوراک: ۲x ٹری ٹیوریشن کے ۵ گریں دن میں تین مرتبہ۔  
 ایسڈم نائٹرکیم: اگر کسی کیس میں مرکیورس سالو مفید ثابت نہ ہو تو یہ دوائی  
 مفید پڑتی ہے۔  
 خوراک: ۱x ڈائی یوشن کے ۵ سے ۱۰ قطرے ایک چھٹانک پانی میں دن  
 میں تین مرتبہ۔

## خارجی علاج

کیلنڈر ولاوشن یا تھو جیا: مدرشکچر سے روئی جگہ کو اُد پر رکھنا۔ یا اسی کی  
 پلٹس باندھنا۔ شدید مرض کی حالت میں جب کہ بدبو زیادہ ہو تو اسی کی پلٹس کا چند بار باندھنا  
 نہایت ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ مقامِ ماؤف صاف ہو جائے۔ اس کے بعد کیلنڈر ولاوشن  
 لگانا چاہیے۔

## آتشکیا مرض چشم

(SYPHILITIC DISEASES OF THE EYE)

سوزش آئرس و سوزش انگوری پردہ چشم۔ اس مرض کا اگر جلدی اندازہ نہ کیا جائے  
 تو آنکھ کی پتلی کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوا کرتا ہے۔  
 اس میں آئرس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی سطح پر چھوٹے چھوٹے  
 سرخ یا براؤن نشان پیدا ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کا رنگ گلابی ہو جاتا ہے۔ رات کے  
 وقت سر میں سخت درد ہوتا ہے اور روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ آنکھ میں بھی درد  
 ہوتا ہے۔ آنسو چھا چھم نکلتے ہیں اور بینائی میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔

## علاج

اس مرض کا علاج کرنے سے قبل اس امر کا جان لینا ضروری ہوا کرتا ہے کہ آیا مریض پہلے پارہ تو زیادہ استعمال نہیں کر چکا ہے۔ کیونکہ پارہ کا زیادہ استعمال اس مرض کے بڑھانے میں مددگار ہوا کرتا ہے۔ اگر پارہ پہلے استعمال کیا جا چکا ہے تو پارہ کے بد اثر کو دور کرنے والی ادویات کا استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مریض کو اندھیرے کمرے میں پڑا رہنا چاہیے اور ہر قسم کے کام سے پرہیز کرنا چاہیے۔

مرکیورس کارہ اور مرکیورس آیوڈائیڈ: یہ ہر دو ادویات اس مرض میں نہایت ضروری ہیں۔ موخر الذکر دوائی خاص کر خنازیری مزاج والے مریضوں کے لیے۔  
آنکھ گلابی رنگ کی اور اس میں جلن اور درد۔ پانی بکثرت۔ آنسو بد شکل اور سکڑا ہوا۔

ان شدید حالتوں میں بھی یہ ادویات مفید ہوتی ہیں جب کہ آنکھ میں پیپ پڑ جانے کا خطرہ لاحق ہو۔

خوراک: ۲x ڈائی یوشن کے تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے بعد۔

نوٹ: ان ادویات کے اثر کو بڑے غور سے خیال میں رکھنا چاہیے اور اگر ان کا استعمال مرض میں زیادتی پیدا کرنے کا موجب ہو۔ تو فوراً ان کو موقوف کر دینا چاہیے اور کوئی دیگر مناسب دوائی شروع کر دینی چاہیے۔

ایسیدم نائٹریکیم: اگر مرکیورس فائدہ نہ کرے یا علامات میں زیادتی پیدا کرنے کا موجب ہو تو اس دوائی کا استعمال نہایت مفید ہوا کرتا ہے۔ یوں بھی جب مریض کی صحت بہت خراب ہو چکی ہو وہ کمزور اور نحیف ہو تو اس دوائی کا استعمال نہایت مفید ہوا کرتا ہے۔

خوراک: ۲x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر تیسرے یا چوتھے گھنٹے بعد۔  
بیلڈ ڈونا: یہ دوائی مفید پڑتی ہے جب کہ باوجود دیگر ادویات کے استعمال کے آنکھ کی نپتلی سکڑی رہے یا جب مرض زیادہ ترقی کر کے پتلی کو بالکل بند کر دے۔



خوراک : ۱x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر تیسرے گھنٹے بعد۔

تھوہا : جب گلیاں یا چھوٹے چھوٹے مسے آئرس پر نمودار ہوں تو یہ دوائی اکیلے ہی یا نائٹرک ایسڈ اور یہ دوائی باری باری سے دینی چاہیے۔

خوراک : ۲x ڈائی یوشن کے تین قطرے دن میں تین مرتبہ۔

آرم : جب پارہ کے زیادہ استعمال کے باعث اس مرض میں زیادتی پیدا ہوگئی ہو اور دل کی حالت یہ ہو کہ مریض مایوس ہو کر خودکشی کا خیال دل میں لاتا ہو تو یہ دوائی بمقابلہ نائٹرک ایسڈ کے زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۱۲x کے ۵ قطرے صبح و شام دو مرتبہ۔

ہیپر سلف : جب آنکھ میں پیپ پیدا ہو چکی ہو تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ خاص کر پارے کے زیادہ استعمال سے جو نتائج بدظہور پذیر ہو چکے ہوں ان کے درست کرنے کے لیے مفید ہے۔

خوراک : ۳x ٹری ٹیوشن کے پانچ گوبی برتین گھنٹے کے بعد۔

## بچوں میں آتشک

### (HEREDITARY SYPHILIS)

پیدائش سے لے کر چند ماہ تک بچوں میں سفلس کی علامات پھوٹ نکلتی ہیں اور یہ علامات جسم کی جلد، ناک، گلے اور منہ کے اندر آشکارا ہوتی ہیں۔ ڈاکٹروں کی رائے میں اس بارے میں اختلاف ہے بعضوں کا خیال ہے کہ باپ کے نطفے سے یہ زہر بچہ حاصل کرتا ہے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ زہر صرف ماں سے بچہ حاصل کرتا ہے لیکن اس امر میں تو کوئی کلام نہیں کہ ماں کا زہر بچہ یقینی طور پر حاصل کر لیتا ہے۔ ایسے کئی کیس دیکھنے میں آئے ہیں کہ باپ سفلس کے مرض میں مبتلا ہوا لیکن وہ شفا یاب ہو گیا۔ بچہ کی ماں تک زہر نہیں پہنچا۔ پس ایسے حالات میں جو بچے پیدا ہوئے وہ بالکل تندرست و توانا تھے اور انہوں نے آتشک کا زہر حاصل نہ کیا۔ لیکن جب حاملہ ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک عورت مرض آتشک میں مبتلا ہوگئی اور حاملہ ہونے کے وقت آتشکی علامات اس میں موجود تھے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو اس میں آتشکی آثار نمایاں تھے اور وہ بچہ زکا

لیکن دو سال کے بعد جب کہ اس عورت کو پھر حمل قرار پایا تو اس وقت کوئی علامات نمایاں نہ تھے۔ پس جب بچہ پیدا ہوا تو وہ توانا اور تندرست تھا اور اس میں آتشکی علامات اثر نہ کیے ہوئے تھے۔ اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ بچہ بالکل زہریلے اثر سے بچ گیا۔ حالانکہ ماں آتشکی زہر سے متاثر تھی۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے جو کہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا۔

**علامات مرض:** بچہ میں سفلس کی علامات صاف عیاں ہوا کرتی ہیں اور کسی قسم کی غلطی کا احتمال نہیں ہوا کرتا۔ آتشکی پھنسیاں دیگر اقسام کی پھنسیوں سے بخوبی امتیاز کی جاسکتی ہے۔ بعض اوقات مرض بوقت پیدائش ساتھ ہی پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات پیدائش سے چند یوم چند ہفتے یا چند ماہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اول الذکر صورت میں بچہ پست قد اور کمزور پیدا ہوتا ہے اور بخوبی نشوونما نہیں پاتا بلکہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے اور مرجھاتا ہے۔ موخر الذکر صورت میں بچہ کے شفا پا جانے اور بچ جانے کا بہت موقع ہوتا ہے۔ آتشکی چھانٹ نکلنے کے قبل بچہ کی حالت بہت بے چین ہوتی ہے۔ یہ چیختا چلاتا اور روتا ہے اور مرجھایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ چند یوم کے بعد تانبہ کے رنگ کے دھبے جسم کے مختلف حصوں پر نکل آتے ہیں۔ مثلاً ران۔ ہاتھ پاؤں۔ منہ اور مقعد اور بعض اوقات سر اور دھڑکے اوپر منہ۔ گلا اور نتھنوں کا اندرونی حصہ متورم اور زخمی ہو جاتا ہے اور مواد بکثرت خارج ہوتا ہے جس سے کسی چیز کے نکلنے اور سانس لینے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نشان باقی حصہ جسم سے تھوڑے اکھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ شکل میں چپٹی گلیٹوں کی مانند کسی جگہ ای سے مواد خارج ہوتا ہے اور کسی جگہ خشک ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ علامات بہت معمولی اور سادہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات اتنے سخت کہ مرض پورے طور پر ترقی یافتہ معلوم ہوتا ہے۔

## علاج

مرکیورس سالو اور مرکیورس بن آیوڈائیڈ: جیسا کہ اوپر کئی بار ذکر آچکا ہے کہ آتشکی امراض میں ان ادویات کا درجہ بہت افضل ہے۔ جب بچوں میں آتشکی امراض آشکار ہوں تو ان ادویات کا استعمال نہایت مفید ہوا کرتا ہے۔

خوراک: ۲x ٹری ٹیورین کا  $\frac{1}{4}$  یا  $\frac{1}{8}$  گرین دین میں تین یا چار مرتبہ۔

اکثر اوقات تو مندرجہ بالا ادویات میں سے کوئی ایک دوا کافی ثابت ہوتی ہے۔  
لیکن اگر کسی کیس میں ایسا نہ ہو تو کالی بائیڈراڈیکم دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ اس  
دوائی کے ایک یا دو قطرے بموجب عمر بچہ کو دن میں تین مرتبہ دینے چاہئیں۔ لیکن  
ہوا گھٹنوں اور گلے میں گھاؤ زیادہ تکلیف دہ ہوں تو ناسٹرک ایسڈ مفید دوائی ہے۔  
۳x ڈائی لیوشن کے ایک یا دو قطرے دن میں تین مرتبہ دینے کافی ہیں اور اس دوائی  
کا ایک نرم سو لیوشن بنا کر اس سے گلے کو صاف کر دینا چاہئے اور بچے کو کاڈیور  
آئیل چٹانا چاہئے تاکہ اس کی طاقت بحال رہے۔

## آتشک شلاشوی

جب مرض اس درجہ میں پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں پھوٹ کا مادہ  
نہیں رہتا۔ عام امراض جو اس درجہ میں نمودار ہوا کرتے ہیں وہ یہ ہیں :-

- ۱۔ امراض استخوان
- ۲۔ امراض جلد
- ۳۔ امراض خصیہ
- ۴۔ امراض دماغ و حرام مغز
- ۵۔ امراض چشم
- ۶۔ آتشکی نقابت

## استخوان کی آتشکی بیماریاں

جب آتشکی زہر استخوان میں سرایت کر جاتا ہے تو کئی قسم کی تکالیف آ نمودار  
ہوتی ہیں۔ بالعموم جو ہڈیاں زیادہ مبتلائے مرض ہوا کرتی ہیں وہ ٹانگوں۔ بازوؤں اور  
کھوپڑی کی چپٹی ہڈیاں ہیں۔

علامات : تکلیف دہ دریں بالعموم رات کو زیادہ۔ جبکہ ماؤف کو دبائے  
سے بہت درد محسوس ہو۔ حرکت کرنے میں تکلیف۔ جبکہ ماؤف میں تھوڑی سوزش  
ہوا کرتی ہے اور یہ سوزشی حصہ آہستہ آہستہ بڑھ کر سخت ہو جاتا ہے۔ اور ہڈی

کی مانند سخت معلوم ہوتا ہے۔ جب ناک کی بڑی پر اس کا اثر ہو تو بعض اوقات یہ ہڈی بالکل باقی حصہ جہم سے الگ ہو جاتی ہے۔ استخوان کے امراض کی چار قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ پیری اوس ٹمائیٹس (PERIOSTITIS) سوزش پردہ استخوان

۲۔ اوس ٹمائیٹس (OSTETIS) سوزش استخوان

۳۔ ایکس اوس ٹمائیٹس (EXOSTOSIS) استخوانی گلتی کا ہڈی پر نکل آنا۔

۴۔ کیریس (CARIES) ماؤف ہڈی کا گل سڑک بالکل ضائع ہو جانا۔

## علاج

مرکیورس سالو: اگر پارے کا استعمال پہلے مریض نہ کہ چکا ہو تو اس دوائی کو استعمال کرنا چاہیے۔ خنازیری مزاج والوں کے لیے مرکیورس بن آیوڈائیڈ زیادہ مفید ہے۔ اکثر حالات میں یہ دوائی اکیلی ہی کافی ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۳x ٹری ٹیوریشن کے ۵ سے ۱۰ گریں دن میں تین مرتبہ۔

کالی ہائیڈرائڈیکم: اگر مرکیورس سے آرام نہ ہو تو یہ دوائی آرام دینے میں مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

خوراک: مدرٹنکچر یا ۱x ٹری ٹیوریشن کے دس گریں دن میں دو یا تین مرتبہ یا ۱x ڈائی یوشن کے ۵ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

یہ دوائی سوزش پردہ استخوان اور سوزش استخوان خاص کہ کھوپڑی کی چھٹی ہڈی اور ٹانگوں اور بازوؤں کی لمبی ہڈیوں پر زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے۔

ایسڈم نائٹریکم: جب مرکیورس اور کالی ہائیڈرائڈیکم سے تھوڑا فائدہ ہو اور پھر مرض گھٹنے میں نہ آوے ویسے کا ویسا ہی قائم رہے تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔

خوراک: ۵ مدرٹنکچر کے ایک یا دو قطرے بہت سے پانی میں ملا کر دن میں تین یا چار مرتبہ دینے چاہئیں۔

جگہ ماؤف پر اس دوائی کا ایک نرم سویلوشن بنا کر لگانا بھی مفید ہوا کرتا ہے۔  
روٹی یا لٹ اس پر جگہ کو باندھ دینی چاہیے۔

علاوہ ازیں میزیریم - وراٹرم ورائیڈ - آرسینکم - کلکیریا کارب - فاسفورس - سلفر - رے ن کبوس - فائو لیکا اور ایس کلیاس ادویات گاہے بگاہے استعمال ہوتی ہیں

## گماتا (GUMATA)

بسیب آتشکی زہر - چھوٹی - سخت اور درد نہ کرنے والی گلیٹیاں (راجار) کھوپڑی گردن - ہاتھ اور پاؤں - فوطہ اور تفسیب کی جلد کے نیچے اور بعض اوقات زبان کے زیریں نکل آتی ہیں - یا تو یہ گلیٹیاں علاج کرنے سے گم ہو جاتی ہیں اور یا کچھ عرصہ سخت رہ کر ان میں مواد بھر جاتا ہے اور بالآخر پھٹ کر مواد خارج ہو جاتا ہے جس سے گہرے اور تکلیف دہ زخم بن جاتے ہیں - جب یہ گلیٹیاں زبان کے نیچے ہوں تو نہایت تکلیف دہ ہوا کرتی ہیں - زبان سخت اور کانٹھیں کانٹھیں ہو جاتی ہیں - کسی چیز کے چپانے اور بولنے کے وقت سخت تکلیف ہوتی ہے - ان گلیٹیوں اور سرطان زبان میں یہ فرق ہے کہ سرطان میں ایسی دروئی ہوتی ہیں - جیسے کہ برچھی چھونے سے ہوتی ہیں اور علاوہ بریں سرطان کی ایک ہی سخت گانٹھ ہوتی ہے جو کہ زبان کی تمام موٹائی کو مبتلا کیے رہتی ہے -

### علاج

مرکیورس سالو: ایسڈیم نائٹریٹیم - کالی ہائیڈرائڈیم - سلیشیا اور سلفراس مرض میں خاص ادویات ہیں -

## نخسہ کی آتشکی سوچن (SYPHILITIC SARCOCELE)

اس مرض میں ایک یا دونوں حصے آہستہ آہستہ بڑھ جاتے ہیں - ان کا فعل معطل

۱۔ مرد کا انڈا - فوطہ - یہ دو چھوٹے چھوٹے بیضوی شکل کے غدود ہیں جو کہ مرد میں منی پیدا کرتے ہیں - یہ نخسے ایک قسم کی دوری کے ذریعہ فوطہ کی تھیلی میں آویزاں ہوتے ہیں -

ہوجاتا ہے اور جماع کی خواہش کم ہوجاتی ہے اور بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ دونوں خجیے بالکل ضائع ہوجاتے ہیں۔

جب یہ مرض ترقی پر ہو۔ تو اکثر اس کے ہمراہ سوزشِ فوطہ شامل ہوجاتی ہے۔

## علاج

مرکیورس بن آئیوڈائیڈ اس مرض کے لیے خاص دوائی ہے۔ اس کے استعمال سے سوزش بہت کم ہوجاتی ہے۔

علاوہ ازیں آرم۔ کونیم۔ کلیٹس۔ فاسفورس۔ پشلا۔ لائیکوپوڈیم۔ بیلا ڈونا۔ مزیریم۔ کالی ہائیڈرائڈ یکم بھی مفید ادویات ہیں۔

## دماغ اور حرام مغز کے تشکیلی امراض

(SYPHILITIC DISEASES OF THE BRAIN)

نظامِ عصبی پر جو اثر تشکی زہر کا ہوتا ہے۔ اس کا بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ پرے لے سس (فالچ رشل ہوجانا) اس کا عام نتیجہ ہے۔ دماغ اور حرام مغز میں سوزش پیدا ہونے کے باعث یہ عارضہ وقوع میں آتا ہے۔ یہ فالچ مختلف درجوں کا ہوا کرتا ہے۔ کبھی تو جسم کا نصف حصہ جس کو انگریزی میں ہیپے پلیجیا (ادھرنگ) کہتے ہیں اور کبھی نیچے کا دھڑ جسکو انگریزی میں پیرا پلیجیا کہتے ہیں شامل ہوجاتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ یہ عارضہ تندرست ترقی کرتا ہے۔

## علاج

اس عارضہ میں صحت آہستہ آہستہ ہوتی ہے! اس لیے علاج دیر تک کرنا پڑتا ہے۔

۱۔ حرام مغز یہ دماغ یعنی بھیجے کی مانند ایک نرم اور سفید جسم ہے جو کہ ریڑھ کے ستون کی نالی میں رہتا ہے۔ حرام مغز درحقیقت دماغ ہی کا بڑھاؤ یا ایک حصہ ہے اس کے دونوں جانب سے اعصاب نکلتے ہیں۔

مرکیورس آیوڈائیڈ اور کالی ہائیڈرائڈ کم ان عوارضات میں نہایت مفید ادویات ہیں  
موجرا الذکر دوائی بہت عرصہ تک استعمال کرنی چاہیے اس دوائی کے دیتے ہی فائدہ ہونا  
شروع ہو جاتا ہے۔

سٹرکٹاٹینم نائٹریٹ بھی مفید دوائی ہے۔ اس کے ۲ ڈوائی لیوشن کے پانچ قطرے  
ہر بار دن میں تین مرتبہ دینے چاہئیں۔

بیلادونا: جب اس مرض کے ہمراہ سر درد بہت ہو تو یہ دوائی بھی مفید ہوا  
کرتی ہے۔

ایسکریٹسٹی (ریگل) بھی فالجی امراض میں بہت مفید چیز ہے۔ خواہ یہ ماؤف  
مقام پر لگائی جائے اور خواہ گرم پانی میں سے گزار کر اس میں مریض کو غسل کرایا جائے یا حاصل  
سمندر کی آب و ہوا بھی مفید ہوا کرتی ہے۔

## آتشی نقابت

(SYPHILITIC EACHEXIA)

سب امراض میں سے جو کہ آتشک کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عارضہ سب سے  
زیادہ ہولناک ہے۔ اس عارضہ میں ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ زندگی کا حوض  
ہی زیر آلودہ ہو چکا ہے۔ جسمانی اور اعصابی طاقتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ جسم کا ہر ایک  
فعل بگڑ جاتا ہے۔ چہرہ زرد اور بھسا ہو جاتا ہے۔ جسم کا گوشت ڈھیل پڑ جاتا  
ہے۔ اور جسم ناتواں ہو جاتا ہے۔ اعضاء کمزور ہو کر کانپنے لگتے ہیں۔ بھوک  
ماری جاتی ہے۔ اعصابی بخار ہر وقت دامن گیر رہتا ہے۔ شب کو پسینے اپناؤ  
آ جاتے ہیں۔

مذکورہ بالا علامات کے ہمراہ استخوان۔ گلیٹوں اور زخموں کے عوارضات اور  
دیگر نامراد امراض جلد آہم رکاب ہوتے ہیں اور آخر میں یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بسبب کمی  
نور ضعف و نقابت سے مریض راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

اس حالت کے پیدا کرنے میں جو امور مددگار و معاون ہوا کرتے ہیں وہ یہ ہیں:-  
خنازیری مزاج۔ آتشک ادلے و ثنائی کا بے قاعدہ علاج۔ پاؤں کا بکثرت دنا جانا۔

استعمال - سردی اور رطوبت کا اثر - نشیات کا استعمال - بُری غذا - گندی رہائش اور دیگر کئی ایک اسباب جو کہ حیون شکستی (قوت زیت) کے کمزور کرنے والے ہوتے ہیں -

## علاج

جیسا مرض کا حال ویسا علاج کا حال - کوئی علاج یقینی نہیں کہا جاسکتا اور اگر کوئی دوائی مفید بھی ہو تو عرصہ تک استعمال کرنی پڑتی ہے - ایسے کیسوں میں شفا کی اوسط بہت کم ہوتی ہے - پھر بھی یہ کہنے سے میں باز نہیں رہ سکتا کہ دیگر طریقہ بہتر طب کی نسبت ہومیو پیتھک ادویات امید کی زیادہ جھلک دکھا سکتی ہیں - چونکہ یہ علاج اصول پائش پر مبنی ہے اور ادویات کا کثیر ذخیرہ اس میں موجود ہے اس لیے مریض کو بہت سا فائدہ اور شفا کا وعدہ بمقابلہ دیگر طریقہ ہائے علاج کے ہم دے سکتے ہیں -

زیادہ کا سا دوا دیات - آرسینکیم - فاسفورک ایسڈ - نائٹریک ایسڈ - کاربووہی - چائنا - فیرم - کالی ہائیڈراڈیم - مرکوریس اور سلفر ہیں -

کالی ہائیڈراڈیم اور ایسڈم نائٹریکم کا درجہ سب سے افضل ہے - جب مریض بہت نحیف ہو چکا ہو اور اعصابی کمزوری بھی بہت ہو تو آرسینکیم - فیرم اور فاسفورس کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے -

## ضروری ہدایات

نشیات سے پرہیز - طاقت بخش غذا کا کھانا - کاڈیور ائل کا استعمال - جسم کی نائش اور غسل کرنا - کھلی ہوا میں ورزش - مفصلات اور ساحل سمندر پر رہنا - یہ سب مفید ہیں - آتشک کے مریض کو لازم ہے کہ وہ بے ضرر اور فائدہ بخش ادویات کا استعمال عرصہ تک جاری رکھے تاکہ یہ نامر او زہر زائل ہو جائے -





# شدید وجع المفاصل - گنٹھے کا بخار

(RHEUMATIC FEVER ACUTE RHEUMATISM)

یہ ایک شدید مرض ہے جس میں تیز بخار ہوتا ہے اور جوڑے متورم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قسم کے خوردبینی کپڑے سے پیدا ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں ڈپلو کوکس روئے ٹیکس یعنی گنٹھے کا کیرا کہتے ہیں۔

اسباب مرض: اگرچہ اس کا باعث ایک خاص قسم کا کیرا ہے جو کہ مریض کے خون میں پایا جاتا ہے۔ لیکن دیگر اسباب مثلاً مندرجہ پر سونا، بھگے کپڑے دیر تک پہنے رہنا، یا سردی لگنا یا بارش میں بھیگنا، تغیرات موسم، متور ہاضمہ اور سخت محنت جسمانی کرنا بھی اس کے اسباب ہیں۔

مستورات میں حیض کا بند ہو جانا، یا عرصہ تک دودھ پلانا، یا وضع حمل وغیرہ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ سفلس اور سوزاک بھی اس کے باعث ہوتے ہیں۔

علامات مرض: ابتدا میں یکایک لرزہ لگ کر تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ حرارت جسم بہت تیز ہوتی ہے۔ ۱۰۲ سے ۱۰۴ بلکہ ۱۰۸ درجہ تک ہو جاتی ہے۔ ماؤں جوڑوں پر ورم ہوتا ہے اور سرخی ہوتی ہے اور سخت درد ہوتا ہے۔ مریض چھوٹا تک برداشت نہیں کر سکتا اور نہ اعتدال کو برداشت کر سکتا ہے۔ درد کی شدت اور بخار کی تیزی یہ خند و نول تک رہتی ہے۔ اس کے بعد ٹھنسی شروع ہو جاتی ہے۔ گنٹھے کے بخار کی دوسری خاص علامت یہ ہے کہ کڑھا۔ بدبودار پسینہ بکثرت آتا ہے اور پیشاب بھی سُرخ رنگ کا کم مقدار میں خارج ہوتا ہے اور نہایت رنگین ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ جھوک ماری جاتی ہے۔ لیکن پیاس بہت لگتی ہے۔ اس مرض میں جوڑوں کی دم ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں اور دوسرے سے تیسرے جوڑے میں منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح بڑے بڑے جوڑوں میں درد کا دورہ ہوتا رہتا ہے۔ مارے درد کے مریض بے چل نہیں سکتا اور رات کو نیند نہیں آتی اور جس طرف مریض پڑا رہتا ہے۔ اُسی طرف پڑا رہنا چاہتا ہے کیونکہ ہلنے چلنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے نبض گول اور بھرپور چلتی ہے اور ۹۰ سے ۱۲۰ مرتبہ چلتی ہے زبان پر سردی مائل سفید فرجی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن سر میں کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی۔

گنٹھے کے شدید بخار میں سر درد یا بذیان نہیں ہوا کرتا اور یہی اس کی تمیزی علامت ہے۔

عموماً دس بارہ روز کے بعد بخار اتر جاتا ہے اور پھر شکایات بھی کم ہو جاتی ہیں اور صرف کمزوری باقی رہ جاتی ہے۔ مرض اکثر عود کرتا ہے۔

نوٹ: جب بخار بھی شدید نہ ہو اور جوڑوں کا درم اور درد بھی زیادہ نہ ہو تو اس قسم کے مرض کو سب اکیوٹ روماتیزم یا کم شدید گنٹھیا کہتے ہیں۔

اس میں ماؤف جوڑوں کی ساخت میں خنداں فرق نہیں آتا۔

نقل مکانی: وجہ مناسل کی دروین نقل مکانی کرتی رہتی ہیں۔ یکایک ایک جوڑ

کو چھوڑ کر دوسرے جوڑے میں چلی جاتی ہیں۔ پھر دوسرے سے تیسرے میں اور اسی طرح سے

واپس ہوتی ہوئی اپنے پہلے مقام میں چلی آتی ہیں اور یہی حال درم کا ہے۔ جب ایک

جگہ درم زیادہ ہوتا ہے۔ تو دوسری جگہ کم ہو جاتی ہے۔ مرض کے حملہ کے دوران اسی طرح

سے کئی بار ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب کہ مرض جوڑوں

سے پردہ دل یا بطون قلب میں چلا جاتا ہے۔ جب مرض کا حملہ نہایت شدید ہوتا ہے۔

تب مذکورہ بالا پھیپگی پیدا ہوتی ہے۔ نوجوان اشخاص میں زیادہ اور مردوں کی نسبت

عورتوں میں زیادہ اور خاص کر ایسے مریضوں کو جو کہ پہلے ہی سے کمزور ہوں یا جن کو دل کی

دھڑکن کا عارضہ ہو۔

وجع القلب (درد دل) جب درم حجاب القلب ہو تو مریض کا چہرہ نہایت

دراؤنا و متفکر ہو جاتا ہے۔ سانس تکلیف سے آتا ہے اور دل کے مقام پر درد ہوتا ہے

نیز پسلیوں کے زیریں اور درمیانی مقام پر دھکن ہوتی ہے۔ دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ یا

دل کے فعل میں فوری واقع ہوتا ہے۔

## علاج

ایکونائیٹ۔ برائی ادینا۔ مریکوریس۔ رشاکس۔ پیٹلا۔ سلی سالک ایٹڈ۔ یڈم

اور ورائٹم درائیڈ بہت مفید ادویات ہیں۔ نیز کالچی کم۔ ڈیجی ٹیس اور سلفر بھی اکثر

مستعمل ہیں۔

ایکونائیٹ: نبض بھرپور اور سخت ہو۔ بخار تیز ہو۔ جوڑے سرخ اور بہت درد

کہتے ہوں۔ بے چینی اور موت کا ڈر ہو۔ پسینہ نڈارو۔ جب کہ مرض کا باعث خشک ٹھنڈکا  
ہوا کا لگنا ہو۔ بے چینی ہو۔

خوراک:  $2x$  یا  $3x$  ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

برائی ادویا: شدید اور حرم دونوں قسم کے وجع المفاصل میں یہ ایک نہایت  
مؤثر دوائی ہے۔ جوڑوں میں سخت دم اور درد۔ چھوٹا تک برداشت نہ ہو سکتا ہو۔ اگر  
مرض نے پھیپھڑوں یا پلوار (پھیپھڑوں کے پردہ) کی طرف رجوع کیا ہو تو یہ دوائی اور  
بھی زیادہ منظر ہوا کرتی ہے۔

خوراک:  $3x$  یا  $30$  ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس: یہ دوائی شدید اور حرم دونوں حالتوں میں کام آتی ہے۔ تیز بخار  
نبض بھرپور اور تیز۔ پسینہ بکثرت اور بدبودار لیکن پسینہ آنے سے نہ تو درو میں افاقہ ہوا  
نہ ہی سوزش میں کمی۔ درد بوقت شب اور بترکی گرمی سے زیادتی اختیار کرتے ہوں۔ مادیات  
مقامات میں سوزش اور مسخی بہت ہو۔ رات کو تمام شکایات ترقی پذیر ہوتی ہوں۔

خوراک:  $3x$  یا  $30x$  ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس: تمام اقسام کے وجع المفاصل میں رٹاکس ایک عظیم الشان دوائی  
ہے۔ تیز بخار۔ تپ محرقہ کی طرف رجحان۔ بے چینی اور ادھر ادھر کر و میں بدنا۔ جس سے  
مریض کو آرام ہوتا ہے۔ سوزش زیادہ اور مخرج۔ گرمی پہنچانے سے مریض کو آرام معلوم  
ہوتا ہو۔

خوراک:  $3x$  یا  $30$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹلا: جب جوڑ اور عضلات دونوں ہی قبلائے مرض ہوں۔ درد نقل مکانی  
کہتے ہوں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانہ دار ہوتے ہوں۔ بعد اوپر بخار اور  
دیگر تکالیف ترقی پذیر ہوتی ہوں۔ گرمائش سے تکلیف اور ٹھنڈی ٹکوری سے آرام ہو  
عورتوں کے وجع المفاصل کی یہ ایک خاص دعائی ہے۔

خوراک:  $3x$  یا  $30x$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ویبکی ٹیلس: وجع القلب میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ نبض چھوٹی اور تیز۔  
پیشاب مقدار میں کم آتا ہو۔ جوڑ سوجے ہوئے اور زیادہ درد نہ کہتے ہوں۔

خوراک: ۱ یا ۲ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

سلفر: بہ دوائی وجہ المفاصل میں ویسی ہی مفید ہے جیسی کہ آتشک کے مرض

میں۔

مرکیورس: دردیں ٹھنڈ لگنے سے یا پانی میں کام کرنے سے زیادہ ہوتی ہوں۔ رات کو زیادتی ہو اور جلدی بیماری کے دب جانے سے بیماری کا حملہ ہوا ہو۔

خوراک: ۲ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

غذا: بخار کے دوران میں اور کم از کم ابتدائے مرض میں غذا کا مزد خیال رکھنا چاہیے اور سوائے پانی۔ دودھ۔ آتش بخور اور اڑ روٹ کے اور کچھ نہیں دینا چاہیے۔ ضروری ہدایات: مرض کے ابتدا میں گرم گرم ٹکڑیاں یا ستیم باقیہ مفید ہے۔ مریض کو بالکل آرام سے لیٹا رہنا چاہیے اور اگر قلب بتلائے مرض ہو جائے تو پھر زیادہ اٹھنا۔ بیٹھنا یا چلنا پھرنا خطرناک ہوتا ہے۔

بخار اتر جانے کے بعد بھی ہفتہ عشرہ تک مریض کو آرام سے لیٹے رہنا چاہیے۔ بعدہ رفتہ رفتہ اٹھ کر بیٹھنا۔ کھڑے ہونا اور چلنا پھرنا چاہیے۔ اگر چلنے پھرنے سے دل کی دھڑکن بڑھ جاوے یا نبض تیز ہو جائے تو ایسی صورت میں اور چند روز آرام کرنا چاہیے۔

متورم مقامات پر جو شانہ پوست کی دن میں دو مرتبہ نصف نصف گھنٹہ تک ٹکڑ کرنا چاہیے۔

## مزمن وجع المفاصل۔ پُرانا کنجیہ

(CHRONIC RHEUMATISM)

یہ ایک جسمانی ساخت کی بیماری ہے جس میں جوڑوں کے اندر اور اطراف کی ریشہ دار ساخت سخت ہو کر حرکت کو کم کر دیتی ہے۔

اسباب مرض: کبھی کبھی شدید کنجیہ مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن بعض مریضوں میں یہ مرض ابتداء ہی مزمن قسم کا ہوتا ہے۔ یہ حالت سوزاک اور آتشکی مریضوں میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔

سردی کا لگنا یا بھگنا۔ بعض اوقات کھیتے کے وقت جب کسی خاص جوڑ پر زیادہ زور پڑے تو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ سمیت یا زہر کا خون میں سرایت کر جانا۔ ہاضمہ میں بگاڑ کرنے والی غذائیں کھانا اور شراب وغیرہ پینا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ کبھی یہ مرض محرومی بھی ہوتا ہے۔

علاماتِ مرض: جوڑ سخت ہو جاتے ہیں اور ان میں درد ہوتا ہے۔ رات کو درد کی زیادتی ہوا کرتی ہے۔ سرد اور مرطوب موسم میں مرض کا زیادہ زور ہوا کرتا ہے۔ ماؤف جوڑ میں خفیف درم ہوتی ہے۔

”بعض اوقات یہ درم شدید صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ماؤف جوڑوں کے ارد گرد کے عضلات کمزور ہو جاتے ہیں اور گاہے ماؤف جوڑوں کے اندر رطوبت جمع ہو جاتی ہے یا ان کی ساخت موٹی ہو جاتی ہے۔ جس کے باعث جوڑ موج کر بدفع ہو جاتے ہیں۔ یا آپس میں باہم جڑ کو ناکارہ ہو جاتے ہیں۔

باوجود ان تمام تکالیف کے مریض بخار سے بچا رہتا ہے اور اگر وہ بھی جاوے تو بہت خفیف ہوتا ہے۔ اس مرض کے مریض کو فتور ہاضمہ کی شکایت اکثر رہتی ہے۔ بدیں وجہ کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔

## علاج

رٹاکس: ابتداء ہومیو پتھی سے رٹاکس برائی دردوں و وجع المفاصل کی عظیم دوا شمار کی جاتی ہے۔ اور اس کی مد مقابل دوا صرف برائی اونیہ ہے۔ ذیل میں دونوں کے امتیازی فرق کو واضح کیا گیا ہے۔

### برائی اونیہ اور رٹاکس میں امتیازی فرق

| برائی اونیہ                                                                          | رٹاکس                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۔ چپ چاپ پڑا رہنے کی زبردست خواہش۔ کیونکہ ایسا کرنے سے دردوں کو آرام ہوتا ہے۔ اگرچہ | ۱۔ بے چینی اور لگاتار حرکت کرنے کی خواہش کیونکہ حرکت کرنے سے دردوں کو آرام رہتا ہے۔ |

## رشتہ کس

## برائی ادو نیا

بعض کیسوں میں مریض حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے لیکن حرکت کرنے سے اس کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔

۲۔ برائی ادو نیا میں مخصوص طور پر یہ وجہ نہیں ہوتی۔ اگرچہ برائی ادو نیا کا وجع المفاصل ان وجوہات کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے۔

۳۔ ایسے وجع المفاصل کے لیے مفید ہے جو جوڑوں اور خود عضلاتی بافتوں پر اثر انداز ہو۔

۲۔ جب گرمی آتی ہو، یا پسینہ آیا ہو، اس وقت نہانے یا سرد گرم ہو جانے کے باعث دردوں کا پیدا ہونا۔

۳۔ ایسے وجع المفاصل کے لیے مفید ہے جو ریشہ دار بافتوں اور عضلات کے غلافوں پر اثر انداز ہو۔

حالت کرتے رہنے سے رشتا کس کی دردوں کو آرام رہتا ہے۔ بیٹھنے یا بیٹھ کر اٹھتے وقت یا آغاز حرکت میں دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لگاتار حرکت کرنے سے بہر حال آرام معلوم ہوتا ہے۔ رشتا کس کی یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ گرمی سے آرام ہوتا ہے۔ سرخوب موسم یا طوفان کی آمد سے درویں بڑھتی ہیں۔ سردی سے بھی درویں زیادہ ہوتی ہیں۔ کمر میں جب یکایک کوٹک پڑتی ہو۔ اس کے لیے رشتا کس ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ کمر کے درد عضلات کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ کمر درد کی رشتا کس ایک خاص دوائی ہے۔ جب زیادہ ورزش کرنے یا وزنی چیز کو اوپر اٹھانے سے عضلات کو کھچاؤٹ پہنچ جاوے اور عضلات تن کو دیکھنے لگیں تو ایسی حالتوں میں رشتا کس ایک عمدہ دوائی ہے۔

رشتا کس کے علاماتِ مخصوصہ حسبِ ذیل ہیں :-

- ۱۔ لگاتار حرکت کرنے سے آرام ماسوائے کمر درد کے۔ جس کو بعض اوقات لگاتار حرکت کرنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔
- ۲۔ اکڑاؤ اور دھکن۔

۳۔ حرکت کی ابتداء میں دردوں میں اضافہ۔

۴۔ مرطوب موسم یا ٹھنڈے سے تکلیف کا زیادہ ہونا۔ ٹھنڈی ہوا برداشت

نہیں ہوتی۔ یہ جلد میں درد پیدا کرتی ہے۔

۵۔ گرمی سے ہر قسم کی علامات کا آرام۔

رٹاکس دوائی دوج المفاصل کے ہر ایک کیس میں شافی نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اس

میں کلام نہیں کہ بہت تعداد میں شافی ہوا کرتی ہے۔

خودراک: ۳x یا ۳۰ چار گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا: جب درد جوڑوں میں ہو۔ یعنی دوج المفاصل کی یہ

ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ اگرچہ عضلاتی دوج المفاصل میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ عضلات

دکھتے ہوں اور سوجے ہوئے ہوں اور جوڑ غضب کے سوج گئے ہوں۔ سُرخ۔ چمکیے اور

بہت گرم ہوں۔ درد کی ٹیمیں پڑتی ہوں۔ یا کاٹنے کی مانند درد ہو۔ حرکت کرنے سے

تکلیف بڑھتی ہوں۔ چھونے سے یا دباؤ سے بھی دردوں میں بھی اضافہ ہوتا ہو۔

برائی اونیا کے درد نقل مکانی شاذ و نادر ہی کیا کرتے ہیں۔ اس کے برعکس

پلسٹا اور کلیا کے درد نقل مکانی بہت کیا کرتے ہیں۔

برائی اونیا ہڈیم۔ نکس و امیکا اور کالجیکم چار ادویات موٹی موٹی ہیں۔ جن میں

حکمت کرنے سے دردیں بڑھتی ہیں

خودراک: ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

جب دوج مفاصل میں پاؤں کے تلوے بہت درد کرتے ہوں تو اینٹیم کوڈم

بہت نافع ہوتی ہے۔

کاسٹیکم اور رٹاکس کئی ایک علامات میں مشابہ ہیں لیکن امتیازی فرق یہ ہے۔

رٹاکس

کاسٹیکم

بے چینی ہر وقت موجود رہتی ہے۔ دوج

المفاصل کا باعث مرطوب و تر آب و ہوا

ہو۔ حرکت کرنے سے عارضی طور پر آرام

ہو۔

بے چینی صرف رات کو ہوتی ہے۔ دوج المفاصل

کا باعث خشک سرد کھروالی ہوا ہو۔ رویں

متواتر حرکت کرنے کے لیے مجبور کریں۔

لیکن بے چینی سے افاقہ نہ ہو۔

کاسٹیکم: جوڑوں کا اکڑ جانا۔ عضلات کے بند چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اعضا بد شکل ہو جاتے ہیں۔ گرمی سے آرام ہوتا ہے۔ جس طرف مریض لیٹتا ہے۔ اس طرف کے عضلات دکھتے درد کرتے ہیں۔ جوڑوں کی وجہ المفاصل کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ اگر وجع المفاصل کے ہمراہ بخار بھی ہو۔ تو پھر کاسٹیکم دوائی مفید نہیں ہوا کرتی۔ خوراک: ۶x یا ۳۰x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

لیڈم: وجع المفاصل اور فقرس کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ خاص کر موخر الذکر کی لیڈم کے دردوں کی خاص علامت یہ ہے کہ درونچے سے اوپر کو چڑھتے ہیں۔ بستر کی گرمی سے دردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ جوڑوں میں روغن کم ہوتا ہے۔ اس لیے وہ سخت ہو کر گلیٹیاں بن جاتی ہیں۔ لیڈم کی درویں دماند کا پلچیکم کے جوڑوں میں کاٹنے والی ہوا کرتی ہیں۔ اعضاء کمزور اور سطح ٹھنڈی اور سن ہوتی ہے۔

لیڈم کی موثر علامات یہ ہیں:

- ۱۔ دردوں کا اوپر کی جانب پڑھنا۔
- ۲۔ چھوٹے جوڑوں میں گلیٹیوں کا بن جانا۔
- ۳۔ بستر کی گرمی سے تکلیف کا بڑھ جانا۔
- ۴۔ حرکت سے دردوں کا زیادہ ہونا۔

جب کالچیکم دوائی کی بہت خوراکیں دی گئی ہوں اور وہ نقصان رساں ہوئی ہوں تو لیڈم دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ کے قطرے نصف چٹانک پانی میں چار مرتبہ یا ۳۔ پلسٹلا: جب درد نقل مکانی کرتے ہوں تو پلسٹلا دوائی یا داتی ہے لیکن دیگر ادویات جن میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ کلیا۔ بڑائی ادویا۔ کالچیکم۔ سلفر۔ کالی بائی کریمیکم اور کالی سلفیوریکم بھی ہیں۔

گرمی سے درویں بڑھتی ہوں اور شام کو زیادہ ہوتی ہوں اور ٹھنڈے آرام ہوتا ہو۔ گھٹنے۔ ٹخنے اور پاؤں کے جوڑوں میں جب درویں ہوں تو پلسٹلا دوائی کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ مارے دردوں کے مریض حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہو اور آہستہ آہستہ و خراں چلنے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ سوزا کی وجہ المفاصل کی خاص دوائی یہ ہے۔



کالی بانی کرو میکم بھی سوزا کی وجہ المفاصل کی دوائی ہے اور نیز ایسے دردوں کی جو ایک مقام سے دوسرے مقام میں نقل مکانی کرتے رہتے ہوں اور گرم کمرے میں آرام ہو۔ سوزا کی وجہ المفاصل کی تھو جا بھی دوائی ہے۔ جب جگر یا معدہ میں نقص واقع ہونے کے باعث بانی کی در دیں شروع ہو جائیں تو پستلا دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

کلمیا: نقل مکانی کرنے والے وجہ المفاصل کے دردوں کی یہ بھی ایک دوائی ہے۔ اور خاص کر جبکہ چھاتی میں در دیں ہوتی ہوں یا جبکہ بوڑوں سے دل میں وجہ المفاصل یا نقرس کی در دیں چلی گئی ہوں جس کی وجہ اوپر لیب لگانا ہو۔ ٹانگوں میں کٹھننے والی در دیں ہوتی ہوں بدوں سوج اور بدوں بخار کے۔ لیکن کمزوری بہت ہو۔ جب در دیں سینے سے معدہ اور شکم میں جاتی ہوں۔ کلمیا دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

گردن کے عضلات دکھتے ہوں اور کمر ٹوٹی محسوس ہو۔ در دیں سرتے وقت زیادہ ہوتی ہوں۔

خوراک: ۳۰ یا ۳۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سچی سی فیوگا۔ یہ بھی وجہ المفاصل کی ایک کارآمد دوائی ہے۔ جب کہ دردوں کا حملہ یکا یک اور شدید ہوتا ہو۔ رات کو در دیں زیادہ ہوتی ہوں اور مرطوب اور طوفانی موسم میں زیادتی اختیار کرتی ہوں۔ شدید بے چینی مگر حرکت سے تکلیف میں زیادتی۔

خوراک: ۵ کے قطرے دن میں پانچ مرتبہ۔

کالچیکیم: اگرچہ نقرس کی یہ خاص دوائی ہے۔ لیکن وجہ المفاصل میں بھی اس کا اثر قابلِ تعریف ہے۔ اس کی در دیں بھی مانند کلمیا اور پستلا کے نقل مکانی کرتی رہتی ہیں۔ در دیں شام کو زیادہ ہوتی ہیں۔ زیادتی حرکت سے بھی در دیں بڑھ جاتی ہیں۔ مریض بے قرار ہوتا ہے اور در دیں ناقابلِ برداشت ہوا کرتی ہیں۔ سینہ کی وجہ المفاصل میں بھی یہ دوائی بعض اوقات مفید ہوتی ہے۔ جب کہ دل کے پاس درد ہوتا ہوا دایا محسوس ہو کہ کسی نے دل کو سخت بند سے کس دیا ہے۔ شام کو در دیں زیادہ ہوتی ہوں۔ اور جوڑ سوچے ہوئے اور سیاہی مائل سرخ ہوں۔

کالچیکیم کمزور آدمیوں کے وجہ المفاصل کی دوائی ہے۔ کمزوری اس کی علامت

مخصوصہ ہے۔ چھوٹے جوڑوں کے دردوں کی بھی یہ دوا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کے چھوٹے جوڑوں کی اور بھی ادویات ہیں مثلاً ایکٹیا سپیکاٹا۔ کالوفالٹم۔ لیڈم اور روڈوڈنڈین ابتدائے مرض میں کالجیکم دوائی شاذ و نادر ہی منظر ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب مریض کمزور ہو چکا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

فائیلٹولیکا: وجع المفاصل کی یہ بھی دوائی ہے۔ جب کہ آتشکی زہر جسم میں موجود ہو۔ جب کہنی اور گھٹنے کے نیچے درد ہوتے ہوں تو یہ دوائی خصوصاً مفید ہوتی ہے۔

عضلات اکڑ گئے ہوں۔ درمیں ادھر ادھر دوڑتی ہوں۔ رات کو زیادہ ہوتی ہوں۔ اور مرطوب موسم میں خاص کر زیادتی اختیار کرتی ہوں۔ آتشکی مریضوں کو جب کندھوں اور بازوؤں میں درد ہوتا ہے تو فائیلٹولیکا دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۵ یا ۱x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کالی ہائیڈرائڈ ٹیکم: جوڑوں کے اور خاص کر گھٹنوں کے وجع المفاصل کی یہ خاص دوائی ہے۔ گھٹنا سوجا ہوا اور خمیرا ٹھننے کی مانند ہو۔ درمیں رات کو زیادہ ہوتی ہوں اور دردوں کا باعث آتشکی زہر ہو۔ یا پارہ کا ناجائز استعمال ہو۔

خوراک: ۵ کے ۵ سے ۱۰ قطرے نصف چھٹانک پانی میں دن میں چار مرتبہ۔  
مرکیورل: جوڑوں میں درد اور سوجن۔ زیادتی رات کے وقت۔ پسینہ بہت آئے۔ لیکن تکالیف میں ذرا بھی تخفیف واقع نہ ہو۔ پسینہ سے بعض اوقات بدبو آتی ہے اور پسینہ تل کی مانند ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلیشیا: موروٹی وجع المفاصل کی یہ ایک دوائی ہے۔ درمیں رات کو زیادہ ہوتی ہوں۔ کپڑے اتارنے سے دھبوں میں زیادتی ہو اور گرمی سے افاقہ ہو۔  
خوراک: ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

گوائیکم: مزمن مرض میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ آتشکی یا سیماپی وجع المفاصل میں یہ دوائی دی جاتی ہے۔ سوزا کی وجع المفاصل میں جب کہ بہت سے جوڑاؤں

ادردہ سخت - گرم - سوجھے ہوئے ۱۔ درد کھڑے ہوں - کھچاؤٹ ہو اور عضلات بہت چھوٹے معلوم ہوتے ہوں -

خوراک: ۵۰ یا ۲۰ ہر ڈگھنٹہ کے بعد -

کلکیریا کارب: سر اور ماتھے پر پسینہ زیادہ آئے - ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے اور ان میں پسینہ زیادتی کے ساتھ آئے - ہر بار حرکت کرتے سے درودوں میں زیادتی واقع ہو - نہانے کے بعد یا پانی میں کام کرنے کے بعد بھی درد زیادہ ہوں -

خوراک: ۳۰ یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد -

اس کے علاوہ کالوسنتھ - روڈو ڈنڈران - ڈولکامارہ - سنگوئیریا - لتیم کارب

گنیشیا کارب - فیرم - آرٹیکا یورنز - آرنیکا - وائی ادلا اوڈ پر بھی غور کریں -

ضروری ہدایات: مریض کو گرم اور خشک آب و ہوا میں رہنا چاہیے - فلائین

یا دیگر گرم کپڑے پہننے چاہئیں اور موسم کی تبدیلی پر باخبر رہنا چاہیے - پاؤں کو ٹھنڈا اور نمی

سے بچانا چاہیے - بعض اوقات گرم پانی میں اور خاص کر نمکیں پانی میں غسل کرنا مفید ہوا

کرتا ہے - ماؤن جوڑوں پر آرنیکا یا رساکس کی مرہم ملنی چاہیے - اس مرض میں چونکہ ہاضمہ

میں فتور ہوتا کرتا ہے - اس لیے زود ہضم غذا استعمال کرنی چاہیے - شراب وغیرہ سے پرہیز

کرنا لازم ہے -

## شدید نقرس

(ACUTE GOUT)

یہ مرض ایک خاص قسم کے بخار سے وابستہ ہے اور اس کا دورہ بار بار ہوتا رہتا

ہے - اس میں ہاتھوں اور پاؤں کے جوڑوں میں درم اور سرخی ہو جاتی ہے - لیکن

پیپ نہیں پڑتی - اس مرض کی ابتداء پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے یہ مرض اکثر

موروثی ہوتا ہے - اکثر اس کے ساتھ ہاضمہ میں فتور ہو جاتا ہے اور دیگر اعضاء کے

افعال میں بھی نقص واقع ہوتا ہے -

علامات مرض: اس مرض کا حملہ یا دورہ بالعموم آدھی رات کے بعد ہوتا ہے

اور عموماً زیادہ عیاشی کی وجہ سے یا زیادہ تھکاوٹ سے شدید حملہ شروع ہو جاتا ہے -

رات کو مریض آرام سے سوتا ہے۔ لیکن صبح اٹھنے پر وہ سخت درد میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ درد انگوٹھے میں زیادہ تر ہوا کرتا ہے۔ انگوٹھا سرخ۔ گرم اور متورم ہو جاتا ہے اور اتنا ذکی الحس ہو جاتا ہے کہ کپڑے کا وزن بھی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ خفیف لوزہ لگ کر بخار پڑھتا ہے۔ جس کی حرارت ۱۰۲ یا اس سے تھوڑی کم و بیش ہوتی ہے۔ مریض بے چین ہوتا ہے اور کبھی اپنا پاؤں ادھر بدلتا ہے اور کبھی ادھر لیکن افسوس چین نہیں آتا۔ دن کے وقت تو کسی قدر آفاقہ رہتا ہے لیکن رات کو درد شدید ہو جاتا ہے اور پھر صبح خفیف پسینہ آکر قدرے آرام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پانچ سات یوم گزر جانے پر علامات مرض میں آہستہ آہستہ تخفیف ہوتی جاتی ہے۔ یعنی بخار جانا رہتا ہے اور درد موقوف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مقام ماؤٹ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے یا اس میں مزمن سوزش باقی رہ جاتی ہے۔ مرض کا دورہ بعض اوقات ایک دو ہفتے تک بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پاؤں کے انگوٹھے مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک جوڑے میں درد کم ہوتا ہے تو دوسرے میں زیادہ۔

بہت سے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرض کے ابتدائی درودوں کے بعد دیگر جوڑوں مثلاً ٹخنے۔ ایڑی۔ پاؤں کے تلوے یا گھٹنے میں مرض چلا جاتا ہے لیکن ہاتھوں کے جوڑے بہت کم مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

## نقرس اور وجع المفاصل میں امتیازی فرق

### وجع المفاصل

- ۱۔ خصوصاً بڑے جوڑے مبتلائے مرض ہوتے ہیں اور ایک ہی وقت میں بہت سے جوڑے مبتلا ہو جاتے ہیں۔
- ۲۔ یہ مرض عموماً نوجوانوں میں زیادہ ہوتا ہے بیس سال سے تیس سال کے اندر اور اکثر اس سے بھی پہلے۔

### نقرس

- ۱۔ حملہ کی ابتداء میں چھوٹے جوڑے اور خاص کر پاؤں کے انگوٹھے کے جوڑے مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔
- ۲۔ سن بلوغت سے پہلے شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ۲۵ یا ۵۰ سال کے درمیان اشخاص عموماً مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔

| نقرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وجع المفاصل                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۳۔ مستورات کی نسبت مردوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے اور اقل الذکر میں حیض کے بند ہونے کے قبل شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔</p> <p>۴۔ یہ مرض اکثر کاہلی - عیاشی اور شراب خوری کی سزا ہے۔</p> <p>۵۔ یہ ایک زبردست موردی مرض ہے۔</p> <p>۶۔ بیرونی کان کے ارد گرد اور انگلیوں کے سروں پر کھڑیا مٹی کی طرح سے یوریٹ آف سوڈا نمایا ہوتا ہے۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>۳۔ اس مرض کا حملہ مردوں اور مستورات میں یکساں ہوتا ہے۔</p> <p>۴۔ غریب محنت کش اور ننگے دھڑنگے اشخاص کو یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔</p> <p>۵۔ یہ مرض بہت کم درجہ کا موردی ہے۔</p> <p>۶۔ اس مرض میں کھڑیا مٹی کی طرح یوریٹ آف سوڈا نہیں ہوا کرتا۔</p> |
| <p><b>علامات قبل از دورہ مرض : نفخ - جلن معدہ - ترشی - اسہال یا قبض،</b><br/> <b>اور دیگر علامات فتور ہاضمہ اور بعض مریضوں کو تنفس کی شکایت ہو جاتی ہے یا جگر کا نفل</b><br/> <b>غراب ہو جاتا ہے۔ بعض مریضوں میں نظام عصبی مبتلائے مرض ہو کر دل کی دھڑکن بڑھ</b><br/> <b>جاتی ہے یا پیشاب میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یا عضلات میں کوئل پڑتے ہیں</b><br/> <b>اسباب مرض : یہ مرض بڑا زبردست موردی ہوتا ہے۔ یعنی نصف سے</b><br/> <b>زیادہ مریضوں کو دراشت میں بلا ہوتا ہے۔ اور بڑے تھوڑے ہیں جو کہ خود اس مرض کو</b><br/> <b>حاصل کرتے ہیں۔ موٹے آدمی جو کہ عیاشانہ زندگی بسر کرتے ہیں لیکن ورزش بہت</b><br/> <b>کم کرتے ہیں۔ اس مرض کے اکثر شکار ہوتے ہیں۔ پورٹ داین شراب پینے والے</b><br/> <b>بالعموم زیادہ مبتلائے مرض ہوتے ہیں۔ یہ مرض مردوں کا ہے۔ اگرچہ موٹے جسم کی مستورات</b><br/> <b>بھی جبکہ ان کو حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ گاہے بگاہے اعلیٰ مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔</b><br/> <b>یہ امر کہ عیاشانہ زندگی بسر کرنا اور ورزش نہ کرنا نقرس کے اسباب ہیں۔ پورے</b><br/> <b>طور پر واضح ہو جاتا ہے۔ جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محنت کش کسان اس مرض سے متبرا</b><br/> <b>رہتے ہیں۔ سبب بھی نقرس پیدا کرنے میں بہت معاون ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ سبے</b><br/> <b>کا کام کرتے ہیں وہ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ موسم اور آب و ہوا بھی نقرس</b> </p> |                                                                                                                                                                                                                                                  |

کے دورے کے بہت حد تک ذمے دار ہیں۔ مرض کے ابتدائی حملے موسم بہار میں زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جب مرض زیادہ بڑھ چکا ہو تو ہر ایک موسم میں نقرس کا حملہ ہو جایا کرتا ہے۔

## علاج

دورانِ حملہ میں: کالجیکم۔ ایکونائٹ۔ برائی ادنیا۔ کالی ہائیڈراڈکیم۔ ایپوسائٹیم۔ ارمیکا پورنز۔

وقفہ میں: پستلا۔ نکسوامیکا۔ مرکپورس۔ آئیوڈائیڈ۔ برائی ادنیا۔ روڈوڈنڈین۔ رشاکس۔ آرنیکا۔ سلفر۔ لمبیم وغیرہ۔

نوٹ: تشریح علامات کے نیچے دیکھو بیان پرانا نقرس

## پُرانا نقرس

(CHRONIC GOUT)

علاماتِ مرض: مزمن نقرس میں مرض کے دورے دیر وید بعد ہوتے ہیں۔ اور زیادہ جوڑے قبائے مرض ہوا کرتے ہیں۔ جب مرض کے حملے بار بار ہوتے ہیں تو ماؤں جوڑے متورم اور بے ڈول ہو جاتے ہیں۔ یوریت آف سوڈا کے جمع ہو جانے سے انگلیوں کے جوڑوں میں بڑی بڑی گلیٹیاں یا آبجاء بن جاتے ہیں۔ ایسے مریضوں کے ہاتھ میں اکثر فتور ہوا کرتا ہے اور دل کے فعل میں بھی نقص واقع ہوتا ہے۔ مریض پست ہمت اور دل کے فعل میں بھی نقص واقع ہوتا ہے۔ مریض پست ہمت اور بد مزاج ہوا کرتا ہے وقتاً فوقتاً جوڑوں میں درد ہوتا رہتا ہے۔ پیشاب پھیکے رنگ کا آتا ہے اور اس میں البیومن خارج ہوتی ہے۔

نوٹ: نقرسی مریضوں میں اکثر مندرجہ ذیل امراض دیکھنے میں آتے ہیں۔ جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان امراض کا تعلق ضرور اس مرض کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور بالخصوص مدد ملی نقرسی مریضوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں۔

تفصیل امراض: آنکھوں کا جلنا۔ سوزش پردہ۔ صلبیہ۔ درد معدہ۔ قولنج

درد اسہال۔ دم جگر۔ قبض یا اسہال۔ بد ہضمی وغیرہ۔ درد دل۔ دل کا بڑھ جانا۔ ٹرائین

کی دیواروں کا سخت اور موٹا ہونا۔ غشی۔ شفقان وغیرہ۔ امراض بول اور امراض تنفس اور بعض امراض جلدی اور بعض امراض عصبی مثلاً سر درد۔ سرچکڑ۔ دیوانگی۔ مرگی۔ فالج وغیرہ۔

## علاج

ایکونائٹ : جب خشک سرد ہوا لگنے سے جوڑوں میں درد ظاہر ہو۔ بخار پامس اور بے چینی زیادہ۔ درد کی زیادتی رات کو ہو۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

آرنیکا : درد والے مقامات کو چھونا از حد ناگوار معلوم ہوتا ہے۔ جوڑوں میں سوجن اور سُرخی۔ بستر سخت معلوم ہو اور مریض اس سختی کے دور کرنے کے لیے ادھر ادھر کو وٹیں بدلتا رہتا ہو۔ حرکت کرنے سے درد زیادہ ہو۔ ابتداء مرض چوٹ لگنے سے ہو۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : سرد موسم۔ دن کے وقت گرمی۔ رات کو سردی۔ حرکت سے نمایاں زیادتی معلوم ہو۔ متہ خشک۔ پیاس زیادہ۔ مریض آرام کے ساتھ چپ چاپ پڑنا پسند کرتا ہو۔ طبیعت چرچوری۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : ابتداء مرض میں جب کہ مقامات سُرخ ہوں اور سوجن جی بہت زیادہ ہو۔ درد جھٹکوں میں یکایک ظاہر ہو اور جلد ہی گم ہو جائے۔

خوراک : ۱x یا ۲x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

پلسٹا : جب گنٹھیا کا درد ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے میں چلا جائے اور نقل

مکانی کرتا رہے۔

سُرخ اور گرم سوجن خاص کر گھٹنے کے جوڑوں کی۔ گرمی پہنچنے سے زیادتی ہو اور ٹھنڈک پہنچانے سے تخفیف معلوم ہو۔ زیادتی شام کو یا رات کے وقت۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس : بائی کے دردوں کے ساتھ ہی نقرس کی دریں ہوں۔ جوڑوں میں

سوجن اور سُرخ زیادہ ہو۔ آرام دینے سے جوڑوں کے درد زیادتی اختیار کریں۔ لیکن

حرکت سے درد کا آرام ہو جائے۔ جوڑ جکڑی ہوئی حالت میں ہوں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹے کے بعد یا ۳۰x ہر چار گھنٹے کے بعد۔

کالچیکم : طبیعت سخت بے چین۔ کمزوری زیادہ۔ متلی۔ جوڑوں اور عضلات میں سخت چیرنے والے درد۔ جن میں حرکت سے زیادتی پیدا ہو اور رات کو تکلیف بڑھ جائے۔ ٹانگوں، پاؤں اور انگلیوں میں چیرنے والے درد جن میں سوجن بھی ہو۔ درد ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں نقل مکانی کرتے ہوں۔ نقرس کی یہ ایک مشہور دوائی ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو یا تین گھنٹے کے بعد یا ۳۰x ہر چار گھنٹے کے بعد۔

علاج خارجی : ہر گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اور اس کو نچوڑ کر اس میں کالچیکم درہ تنچر کے بہت سارے قطرے ڈال کر مقام ماؤف پر ٹکور کرنی چاہیے۔

سلفر : جب مرض پُرانا ہو گیا ہو۔ خصوصاً اُن مریضوں کے لیے جو شراب اور گوشت زیادہ استعمال کرتے ہوں۔ آرام طلب اشخاص جو زیادہ طاقتور غذائیں کھائیں۔ لیکن ورزش کے علوی نہ ہوں۔ جوڑوں میں ہلکا ہلکا درد ہمیشہ رہے۔ کبھی قبض کی شکایت ہو کبھی دست لگ جائیں۔

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹے کے بعد یا ۳۰ روزانہ صبح۔

نکس و امیکا : درد کی تکلیف صبح کے وقت زیادہ ہو۔ جوڑوں میں کھچاؤ معلوم ہو اور درد جھٹکوں میں ہوتا ہو۔ ایسے مریض عموماً گھر کی چار دیواری میں ہی رہا کرتے ہیں اور ثقیل غذا کو استعمال میں لاتے ہیں۔ قبض ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹے کے بعد یا ۳۰x ہر چار گھنٹے کے بعد۔

لیڈم : نقرس کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے کا جوڑ بہت سوجا ہوا ہو۔ قدم اٹھانے سے درد ہوتا ہو۔ گرمی سے۔ دبانے سے اور حرکت کرنے سے درد زیادہ ہوتا ہو۔ جب کالچیکم دوائی کا ناجائز استعمال کیا جا چکا ہو تو بھی لیڈم دوائی نفع ہوتا ہے۔

خوراک : ۵ کے قطرے نصف چٹانک پانی میں ڈال کر دن میں چار مرتبہ۔ یا

۳۰ دن میں دو مرتبہ۔

ارٹیکا یورنز : اس دوائی کا نمبر بھی نقرس کے علاج میں صفاً اول میں ہے جب



چھپا کی اور نقرس کے عارضے باری باری سے ہوتے ہوں تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے گرم پانی میں ڈال کر دن میں چار مرتبہ۔

ضروری ہدایات : دودھ مرض میں مائوف عضو کو اونچا کر کے رکھیں تاکہ

دل کی جانب دودھ خون میں آسانی ہو اور مائوف جوڑے اوپر فلائین کا ٹکڑا یا گرم روئی

رکھ کر ڈھانپ دیں اور اگر گرم اور درد شدید ہوں تو

۱۔ گرم گرم پلٹس باندھیں یا

۲۔ جو شانڈے پوست کی بھاپ یا سینک دیں یا

۳۔ پیسے ہوئے نمک کی پوٹلی باندھ کر اور گرم گرم گھی میں بھگو کر مائوف مقام پر ٹکود

کرتے جائیں۔

۴۔ اینٹی فلو جبین کالیپ کریں۔

۵۔ گن آئل کی مالش کریں۔

۶۔ تارپین کا تیل اور میٹھاتیل مساوی ملا کر مالش کریں۔

۷۔ ایکو نائیٹ مدرٹکچر کے چند قطرے ایک اونس زیتون کے تیل میں ملا کر مالش کریں یا

۸۔ جو دوائی اندردی جارہی ہو اسی دوائی کے مدٹکچر کے چند قطرے زیتون کے

تیل میں ملا کر اوپر مالش کریں یا

۹۔ بقول ڈاکٹر رڈک، ایسڈ ایسی نمک ایک ڈرام۔ سپرٹ۔ شراب ۶ ڈرام۔ سپانی

چھ اونس ملا کر ایک لوشن تیار کریں اور مائوف مقام کو اس میں بھگو دیں۔ یا

۱۰۔ ایک تولہ پوست (دودھ پوست) لے کر اور اس کو کوٹ کر دو میر پانی میں جوش دے

کر مائوف جوڑوں کے نیچے پانی کو اس ترکیب سے رکھیں کہ اس کی بھاپ مائوف مقامات

پر بخوبی پہنچ سکے۔ برتن کے ڈھکنے کو آہستہ آہستہ ہٹا دیں اور مائوف مقامات کو اوپر سے اچھی

طرح سے چادر سے ڈھانپ رکھیں اور وہی حصہ ننگا ہو جو کہ پانی کے اوپر ہو۔ اس

ترکیب سے بھاپ دیں۔ یا اگر ٹکود کرنا منظور ہو تو پوست والے پانی میں کھدر کے

ٹکڑے ڈال دیں اور پچوڑ پچوڑ کر مائوف مقام پر رکھتے جائیں اور اس طرح سے ٹکود

کرتے جائیں۔ رات دن میں دو مرتبہ ایسی ٹکود کریں۔

کپڑے کے ٹکڑے کو اس میں تھکڑے کر کے ماؤف بوڑوں پر رکھتے جائیں اور اوپر سے خشک فلائین کے ٹکڑے سے ڈھانپ دیں۔  
 غذائے مریض: جب مرض کا حملہ بہت شدید ہو تو مریض کو چوبیس گھنٹوں تک کھانے کو کچھ نہ دیں۔ پینے کے لیے صرف پانی دیں۔ بعد اگائے کا دودھ جوش دے کر نیم گرم اس کو پلا دیں اور پھر ساگو دانہ اراروٹ۔ ڈبل روٹی۔ دودھ دیں۔ جب علامات میں تخفیف ہو جائے تو مونگ کی دال۔ پالک کاساگ اور روٹی دیں۔  
 نوٹ: نمک۔ شکر۔ نشاستہ اور گوشت بہت کم استعمال کرنے چاہئیں اور شراب سے قطعی پرہیز کرنا چاہیے۔

حالت وقفہ میں مریض ان نقرس کو مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے:-

- ۱۔ کھلی اور صاف ہوا میں رہنا اور روزانہ وقت مقررہ پر ورزش کرنا۔ پیدل سیر کرنا لیکن زیادہ ورزش نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی لمبا فاصلہ پیدل چلنا چاہیے جس سے تھکان پیدا ہو۔ کیونکہ اس سے مرض کے حملہ کا ڈر ہوتا ہے۔
- ۲۔ سردی اور بھینکے سے محفوظ رہنا چاہیے۔
- ۳۔ گرم پانی سے نہانا اور جلد جسم کو خوب تولیہ سے ملنا چاہیے۔
- ۴۔ مریض نقرس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو قبض نہ ہو اور نہ ہی ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہئیں جو بد ہضمی کا موجب ہوں۔ یا جن کے کھانے سے ان کے مضر پڑنے کا ڈر ہو۔

کھانے پینے میں اعتدال کو مدنظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ مریض ان نقرس اور ایسے اشخاص کہ جن کے خاندان میں یہ مرض موروٹی ہو۔ مندرجہ ذیل اشیاء کھاپی سکتے ہیں۔  
 دودھ۔ دہی۔ چھچھ۔ کھن۔ پنیر۔ تازہ میوہ جات مثلاً سنگتہ۔ انار۔ انجیر۔ فالسہ۔ خوبانی۔ جامن۔ نازنگی وغیرہ۔ پالک کاساگ اور سبز ترکاریاں۔ ہر قسم کے اناج۔  
 فلتے۔ روٹی۔ بادام۔ پتہ۔ اخروٹ۔ چلغوزہ وغیرہ۔

مندرجہ ذیل اغذیہ و اشربہ سے پرہیز لازم ہے:-

زیادہ مٹھا۔ گرم مصالحہ یا زیادہ مصالحہ دار غذا۔ شراب ہر قسم۔ زیادہ نمک۔ چائے

قہوہ - گوشت - آلو - سرکہ - اچار چٹنی نیز بہت میٹھے میوے مثلاً انگور - آم - کھجور - ناشپاتی وغیرہ -

## ذیابیطس (DIABETES)

اس کی دو قسمیں ہیں :-

- ۱- ڈایابیطس میڈیٹس یعنی ذیابیطس شکاری یا ذیابیطس حاد -
  - ۲- ڈایابیطس انسڈس یعنی ذیابیطس سادہ یا کثرت البول -
- چنانچہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ بیان دیا جاتا ہے -

### ذیابیطس شکاری - بول شکاری

(DIABETES MELITUS) (GLYCOSURIA)

اس مرض میں پیشاب میں شکر خارج ہوتی ہے اور پیشاب بھی بکثرت آتا ہے۔ مریض کی صحت عامہ خراب ہوتی جاتی ہے -

اسباب مرض : یہ مرض بچپن میں نہیں ہوتا۔ عموماً ۲۵ یا ۳۰ برس کی عمر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ مردوں کو بمقابلہ عورتوں کے یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔ خیریں اشیا اور نشاستہ دار غذا یہ بکثرت کھانا پینا اور ورزش نہ کرنا یا ورزش کرنے کے بعد جب کہ جسم ابھی گرم ہی ہو یکایک ٹھنڈا پانی پی لینا۔ زیادہ شراب پینا۔ یا بہت دماغی محنت کرنا۔ کثرت مجامعت۔ فکر و غم یا دیگر امراض کا ہونا۔ مثلاً سر یا ریڑھ کے ستون یا شکم پر چوٹ لگنا۔ بلبہ یعنی پنکریاز کا پھوٹا ہو جانا یا اس میں ناقص رطوبت کا پیدا ہونا۔ کبھی آتشک یا نقرس کے بعد یہ مرض ہو جاتا ہے اور گاہے گاہے میعاد دی بخار یا طیر یا بخار یا شدید نمونیا کے بعد بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

الغرض : ۱- جب یہ مرض زیادہ میٹھا وغیرہ کھانے اور انٹریوں میں فتور کی وجہ سے واقع ہو تو اس کو ذیابیطس معدی کہتے ہیں -

۱۔ جب جگر کی خرابی یعنی کھانے پینے میں بد پرہیزی یا خراب خوری کی وجہ سے ہو تو اس کو ذیابیطس جگری کہتے ہیں۔

۲۔ جب کثرت محنت و ماعنی یا کثرت مجامعت یا سر یا ریڑھ وغیرہ پر صدمہ پہنچنے کی وجہ سے یہ مرض ہو تو اس کو ذیابیطس عصبی کہتے ہیں۔

علاماتِ مرض : شروع مرض میں صرف اس قدر ہوتا ہے کہ بیمار کو پیاس بہت لگتی ہے۔ پیشاب زیادہ آتا ہے اور وہ اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ لیکن جوں جوں بیماری بڑھتی جاتی ہے تو توں مذکورہ بالا علامات بھی شدت اختیار کرتی جاتی ہیں۔ چنانچہ جب یہ مرض ترقی پذیر ہوتا جاتا ہے تو مریض کو پیاس بہت شدت کی لگتی ہے اور اس کا منہ خشک رہتا ہے۔ منہ میں مٹھاس کا ذائقہ رہتا ہے اور تنفس سے ایک خاص قسم کی بو آتی ہے۔ سوڑھے پھول جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ دانت ڈھیلے ہو کر نکل جاتے ہیں۔ اس مرض کے مریض کو بھوک عموماً زیادہ لگا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ادھر پیٹ بھر کر کھایا اور ادھر پھر بھوک لگ گئی۔ لیکن بائیں ہمد مریض دن بدن لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مریض کا اضمہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں۔ مریض سست اور پست ہمت ہوا کرتا ہے۔ اور اس کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ معمولی سی بات پر محبت لڑنے لگ جاتا ہے۔ سر میں چکر آتے ہیں۔ یا درد رہتا ہے۔ جلد جسم خشک ہو جاتی ہے اور اس پر بھوسا اُترتی ہے اور جلد پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ چوڑے پھنسیاں یا کارنیکل (کدو دھانہ شب چراغ) کبھی کبھی نکل آتے ہیں اور کبھی جلی دار پھنسیاں (ایگزیریا) نکل آتی ہیں۔ پیشاب بار بار اور بکثرت آتا ہے۔ دن رات میں چھ سات سیر بلکہ اس سے بھی زیادہ آتا ہے۔ پیشاب کی رنگت پھیکی ہوتی ہے اور اس میں پانچ چھٹانک سے بارہ چھٹانک تک شبانہ روز میں شکر خارج ہوتی ہے۔ شکر کی زیادتی کی وجہ سے اس کا وزن مخصوص (سپیسفک گریوٹی) ۱۰۳۰ سے ۱۰۶۰ درجہ تک اور کبھی اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ دن کے پیشاب میں شکر زیادہ آیا کرتی ہے۔ بہ نسبت رات کے پیشاب کے مردوں میں قوت باہ کمزور ہو جاتی ہے اور عورتوں میں حیض آنا بند ہو جاتا ہے۔ موتیابند کا عارضہ ہو کر

بصارت میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور آخر کار مریض شدتِ ضعف یا اسہال یا کارنگل یا مرضِ سل یا نمونیا میں مبتلا ہو کر اس جہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔

مرضِ ذیابیطس کی مندرجہ ذیل پانچ علامات خاص ہیں :-

۱۔ پیشاب کا بار بار آنا اور مقدار میں زیادہ آنا۔

۲۔ پیشاب میں شکر آنا۔

۳۔ شدت کی پیاس لگنا۔

۴۔ بھوک بہت لگنا۔

۵۔ لاغر و کمزور ہوتے جانا۔

انجامِ مرض : جب یہ مرض نوجوانوں کو ہو جن کی عمر چالیس سال سے کم ہو تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ البتہ جب یہ مرض بوڑھوں کو ہو جاوے تو انجامِ آنا خراب نہیں ہوتا۔ جتنا کہ جوان آدمیوں میں۔

## علاج

یورنیم نائٹریکم (یورنیم نائٹریٹ) اس مرض کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ ڈاکٹر میوز اور ڈاکٹر ہل وغیرہ بے شمار ڈاکٹر اس کے بڑے بھاری مداح ہیں۔ خاص کر جب کہ نقصِ ہاضمہ کی وجہ سے یہ مرض ہو۔ تو یہ دوائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہیک کا قول ہے کہ ذیابیطس شکاری میں جو اعلیٰ نتائج اس دوائی کے استعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کسی دوسری دوائی سے نہیں ہوتے اس کے دینے سے پیشاب بھی کم آتا ہے اور شکر بھی گھٹ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اس کو x ۳ ٹری ٹیوریشن دینے کی سفارش کی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں :

فقرِ ہاضمہ۔ کاپلی۔ کمزوری۔ پیشاب میں زیادہ شکر آنا۔ بھوک اور پیاس کا بہت لگنا اور مریض کا لاغر و کمزور ہوتے جانا۔ اگر کھانسی اور پھیپھڑوں میں مادہ سل بھی موجود ہو تو بھی یہ دوائی منظر ہوتی ہے۔

خوراک : x ۳ یا ۳۰ وی میں دو یا تین مرتبہ۔

سالی زی جلیئم : اس دوائی کے دینے سے پیشاب میں شکر کا آنا بند ہو جاتا

ہے۔ اس دوائی کو مدرٹنگچر یا  $1x$  میں دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دوائی جامن سے تیار کی جاتی ہے۔ اکثر تجربہ میں آیا ہے کہ جامن کھانے سے شکر کا آنا بند ہو جاتا ہے۔

خوراک :  $1x$  یا  $5$  کے ۵ سے دس قطرے دن میں تین مرتبہ۔

فاسفورک ایسڈ۔ ذیابیطس عصبی کی یہ بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ یعنی جب کہ اعصاب کی کمزوری کی وجہ سے یا اعصاب میں نقص ہونے کے سبب سے یہ مرض پیدا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب غم۔ فکر و ترو دو کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو اور مریض جسمانی و دماغی طور پر کمزور ہو تو یہ دوائی خاص طور پر منظر ہوتی ہے۔ ابتدائے مرض میں یہ دوائی بلا شک و شبہ شافی ہوتی ہے۔ جب کہ بھوک ماری گئی ہو۔ پیاس نہایت شدید لگتی ہو اور مریض کو پھوڑے پھنسیوں کی شکایت رہتی ہو۔

جب دودھ یا زرد پھیکے رنگ کا پیشاب بہت مقدار میں آتا ہو اور پیشاب میں فاسفیٹ بھی خارج ہوتے ہوں تو یہ دوائی ضرور دینی چاہیے۔ ذیابیطس کی بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک :  $5$  یا  $3$  یا  $30$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم : جب مریض بہت کمزور ہو اور پیاس بڑی سخت لگتی ہو۔ بے چینی ہو جسم جلتا ہو تو یہ دوائی نفع کرتی ہے۔

خوراک :  $30$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

پلم بلم : ذیابیطس شکر کی یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے جب کہ قبض سخت ہو اور کمزوری بہت ہو۔ نیز جبکہ گردوں کے فعل میں نقص ہو۔ ڈاکٹر بیرنگ اس دوائی کے بڑے مذاج ہیں۔

خوراک :  $2x$  یا  $4x$  دن میں دو یا تین مرتبہ

فاسفورس : سٹی یا نقرسی مزاج والے مریضوں کے لیے جن کو ذیابیطس کی

شکایت ہو اور بلڈ (پنکر یا س) میں نقص واقع ہونے کی وجہ سے ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ بلبلہ کے نقص میں یہ دوائی خاص طور پر خیال میں رکھنی چاہیے۔

ڈاکٹر جو سٹھ صاحب فرماتے ہیں کہ جب مٹہ خشک ہو۔ پیشاب بار بار اور کثرت آتا ہو اور جسم پر پھنسیاں ہوں۔ یہ دوائی کامیاب ہوتی ہے

خوراک : ۶x یا ۳۰x دن میں دو یا تین مرتبہ -

لیکٹک ایسڈ : ذیابیطس کبدی میں یہ دوائی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ یہ دوائی بار بار آزمائی جا چکی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں۔ پیشاب کھلا اور بکثرت آتا ہو۔ ہلکے زرد رنگ کا ہو۔ شکر آتی ہو۔ پیاس۔ اُبکائیاں۔ کمزوری۔ زبردست اشتہار اور قبض ہو۔ جلد خشک۔ زبان خشک اور معدہ میں درد ہوتا ہو۔ ذیابیطس سادہ کی بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک : ۱x دن میں دو مرتبہ -

ایسی ٹمک ایسڈ : جب پیشاب پیلے رنگ کا بہت مقدار میں آتا ہو۔ شدت کی پیاس ہو۔ جلد گرم خشک ہو اور کمزوری بہت ہو۔

خوراک : ۳x دن میں دو مرتبہ -

برائی اوینا : اس مرض میں اس دوائی کو بھی نہ بھوننا چاہیے۔ ذیابیطس کبدی میں جب کہ ہونٹ خشک ہوتے ہوں۔ منہ کا ذائقہ لگا تار کڑوا ہو۔ مریض سست و کاہل اور پست ہمت ہو۔ چلبے بھوک اور پیاس کی شدت نہ ہو اور مریض بوجہ غذا نہ کھا سکنے کے کمزور ہوتا جا رہا ہو۔ تو ایسے حالات میں برائی اوینا سے بڑھ کر اور کوئی دوا نہیں ہے۔

خوراک : ۶x یا ۳۰x دن میں تین مرتبہ -

چوینٹنٹس : یہ دوائی بھی ذیابیطس شکری میں کام آتی ہے۔ جبکہ جگر میں نقص واقع ہو۔ پیاس زیادہ لگتی ہو۔ پیشاب بار بار اور بکثرت آتا ہو۔ قبض ہو۔ پاخانہ ہلکے رنگ کا آتا ہو اور اس میں پت نہ خارج ہوتے ہوں۔

خوراک : مدرٹنچر (۵) کے ۵ سے ۱۰ قطرے دن میں تین مرتبہ -

آرغٹم ٹیلیکم : ڈاکٹر ہنری مین نے اس کو تسلسل بول میں مفید بتلایا ہے۔ ذیابیطس سادہ میں یہ یقیناً مفید ہوتی ہے۔ پیشاب بکثرت گدلا اور میٹھی بوکا آتا ہو۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہو اور مقدار میں زیادہ آتا ہو۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ -

نیرم سلف : ڈاکٹر ہنس ڈیل نے اس مرض میں بہت مفید بتلایا ہے۔ پیشاب

بکثرت۔ جلد جسم پر خارش خاص کہ رانوں کے اوپر کے حصے میں۔

خوراک: ۳x یا ۶x دن میں دو یا تین مرتبہ۔

سلفر: یہ بھی اس مرض میں مفید دوائی ہے۔ جبکہ نقابت ہو۔ قبض ہو، اور پیشاب زیادہ آتا ہو۔

خوراک: ۳x یا ۳۰x دن میں دو مرتبہ۔

علاوہ ازیں پوڈوفائیلیم۔ کاربالک ایسڈ۔ ٹیری بن تھینا۔ ایس کیلیپاس۔ آرنیکا۔ آر سینکم۔ ڈیجی ٹیلس۔ نکس و امیکا۔ کینتھرس۔ یو پا ٹوریم پر پیوریم اور مرکبوس وغیرہ ادویات اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

غذا: اس مرض میں غذا کا مناسب انتظام ضروری ہے۔ شیریں اور نشاستہ دارانہ غذا سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب مرض زیادہ شدید نہ ہو تو غذا کا مناسب خیال رکھنے سے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن جب مرض کا حملہ شدید ہو تو نشاستہ دارانہ غذا سے بالکل ترک کر دینا مناسب نہیں ہوتا۔ کیونکہ مریض اس سے جلد ناتواں اور لاغر ہو جاتا ہے۔ مریض کو روٹی کم کھانی چاہیے۔ البتہ موٹے آٹے کی روٹی جو کہ آن پھانا ہو یعنی جس میں چھان شامل ہو، گاہے گاہے کھانی چاہیے اور کبھی کبھی چاول کھانے چاہئیں۔ مکھن۔ گھی۔ بالائی۔ تازہ دہی۔ چھچھ۔ پنیر۔ گوشت۔ انڈے وغیرہ کا استعمال مفید ہے۔ نیز بہتر کاریاں ساگ پات مفید ہیں۔ البتہ چھندر۔ شلغم۔ گاجر اور زمین قند وغیرہ کم کھانے چاہئیں۔ آلو بھجھکا گھی میں بھون کر کھا سکتے ہیں۔ میوہ جات بھی مریض استعمال کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان میں شیرینی ہوتی ہے لیکن مختلف قسم کے میوہ جات کے رس جسم میں نمکیات پہنچاتے ہیں۔ قبض کو رفع کرتے ہیں۔ نیز مغزیات مثلاً بادام۔ انروٹ۔ پستہ اور چلغوزہ وغیرہ کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ شراب وغیرہ سے قطعی پرہیز لازم ہے۔ روزانہ پیدل بھی ضرور چلنا چاہیے۔ اگر مرض کا سبب رنج و غم اور فکر و تڑپ یا پریشانی ہو تو مریض کو دل شاد اور خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سردی سے محفوظ رہنا چاہیے۔



# ذیابیطس سادہ - کثرت البول

(DIABETES INSIPIDUS POLYURIA)

اس مرض میں پیشاب بہت آتا ہے۔ لیکن وہ صاف اور بلارنگ کے ہوتا ہے اور اس کا وزن مخصوص بھی کم ہوتا ہے (۱.۰۰۳ - ۱.۰۰۶) اور اس میں شکر یا البیومن نہیں ہوتی۔ پیاس شدت کی لگتی ہے۔ جلد جھم خشک اور کھردری ہوتی ہے۔ اور مریض کو جسمانی و دماغی کمزوری بہت محسوس ہوتی ہے۔

اسباب مرض: تشکرات - ترددات اور دلی سد مات - ناکافی اور ناقص غذا - فاقہ کشی - بکثرت شراب نوشی - آتشک اور دیگر کئی ایک شدید امراض اور سردی کا لگنا - یہ اس مرض کے اسباب محرکہ ہیں - یہ مرض بچوں اور نوجوانوں میں بکثرت ہوا کرتا ہے۔

## علاج

ایپس - کینتھرس - جلسی میم - کو یازوٹ - للیم مگنری نم - فاسفورک ایسڈ - لائیو پوڈیم - لیتھیم کاربونیٹ - پلانٹیکو - سابل سیرو لانا - سکدلا وغیرہ ادویات اس مرض میں زیادہ مستعمل ہوتی ہیں - نیز ویکو مفصل علامات و علاج ذیابیطس شکر کی۔

## استسقاء - جلدھر

(DROPSY)

دورانِ خون کی رکاوٹ کے سبب اور قوتِ حاذبہ کم ہو جانے کے باعث اس مرض میں آبِ خون تراوش پا کر جلد کے نیچے یا کسی عضو اندرونی میں جمع ہو جاتا ہے۔ درحقیقت یہ خود کوئی مرض نہیں - بلکہ یہ بعض امراضِ جگر و گردہ و دل وغیرہ کی ایک علامت ہوتی ہے - مختلف مقامات کے بتلائے مرض ہونے کے لحاظ سے اس مرض کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں:-

۱۔ استسقاءِ عامہ (GENERAL DROPSY) اس مرض میں تمام جسم کی

جلد کے نیچے آبِ خون تراوش پا کر جمع ہو جاتا ہے اور سارا جسم پھول جاتا ہے۔

۲۔ استسقاء شکمی (ASCITES ABDOMINAL DROPSY) اس

مرض میں پیری ٹونیم کے جوف میں آبِ خون جمع ہو کر پیٹ شک کی مانند پھول جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔

۳۔ استسقاء دماغی (HYDROTHORCEPHALUS) اس مرض میں

دماغ کے پردوں کے درمیان سیرم یعنی آبِ خون جمع ہو جاتا ہے۔

۴۔ استسقاء صدری (HYDROTHORAX) اس مرض میں پھیپھڑوں

کے غلاف میں آبِ خون یعنی سیرم جمع ہو جاتا ہے۔

۵۔ استسقاء حجاب القلب (HYDROPERICARDIUM) اس

مرض میں غلافِ دل میں آبِ خون جمع ہو جاتا ہے۔

۶۔ استسقاء نخصیہ (HYDROCELE) اس مرض میں خصیوں کے غلاف

میں آبِ خون یعنی سیرم جمع ہو کر فوطے بڑے ہو جاتے ہیں۔

نوٹ: قادر مطلق نے جسم میں ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہر ایک عضو کو تر رکھنے کے

لیے آبِ خون یا رطوبت تراوش پاتی رہتی ہے۔ پس اگر سیرم مذکورہ کے تراوش

پانے یا اس کے جذب ہونے میں نقص آجائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ

رطوبت وہاں جمع ہونے لگتی ہے اور وہ مقام پانی سے بھر جاتا ہے۔

علامات مرض: جیسا کہ اوپر درج کیا گیا ہے کہ مرض استسقاء بذاتِ خود

کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ بعض امراض کی ایک علامت ہے۔ خصوصاً امراضِ جگر و دل

و گردہ۔ بعض اوقات یہ مرض یکا یک پیدا ہو جاتا ہے اور چند گھنٹوں کے اندر ہی

سارا جسم پھول کر مثل کپتے کے ہو جاتا ہے۔ اس آماس یا سوجن کی ایک علامت یہ

ہے کہ جب اس کو انگلی سے دبائیں تو وہاں گڑھا پڑ جاتا ہے۔ یہ آماس یا سوجن کبھی

تو خفیف ہوتی ہے اور کبھی اتنی شدید ہوتی ہے کہ جلد تنی ہوئی اور چمکتی ہے اور

بعض اوقات زیادہ تناوٹ کے باعث جلد پھٹ بھی جاتی ہے۔ یہ مرض عموماً ایسے

۱۔ یہ ایک بہت بڑی آبِ دار جھتی ہے جو کہ شکم کے تمام عضلات پر حاوی ہوتی ہے۔

مقامات سے شروع ہوتا ہے۔ جو کہ مقامِ دل سے دُور ہوتے ہیں۔ مثلاً پاؤں یا ایسے مقامات سے جو کہ عموماً برہنہ رہتے ہیں اور دھیلے ہوتے ہیں مثلاً پوٹے وغیرہ۔ استسقا عامہ میں تمام جسم پر آماس یعنی سوجن ہوتی ہے اور اس میں گرمی سُرخی یا درد نہیں ہوتا۔ آماس میں انگلی سے دبائے سے گڑھا پڑ جاتا ہے۔ جو تھوڑی دیر کے بعد پھر ہموار ہو جاتا ہے۔ جلد جسم صاف اور چمکدار دکھلائی دیتی ہے اور جلد معمول کی نسبت کسی قدر سرد ہوتی ہے۔ استسقا خشکی میں پیٹ بتدریج بڑھتا ہے اور آخر کار بڑھتے بڑھتے مثل مشک کے پھول جاتا ہے۔

پیٹ کا یہ بڑھاؤ ہموار اور یکساں ہوتا ہے۔ چھاتی پیٹ کے مقابلہ میں بہت چھوٹی معلوم دیتی ہے۔ نچلی پسلیاں باہر کی جانب بڑھی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پیٹ کی جلد صاف اور تنی ہوئی ہوتی ہے اگر ہاتھ سے پیٹ کو دبائیں تو پانی پھلکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

اسبابِ مرض: وریڈوں میں کسی دباؤ یا سُدہ وغیرہ کے اٹکنے کی وجہ سے دواں خون میں رکاوٹ ہو کر یا دل کے کمزور ہونے کی وجہ سے دورانِ خون میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور استسقا کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ عروقِ دمویہ (خون کی نالیاں) کے کمزور اور دھیلے ہونے کی وجہ سے یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

جسم میں کئی خون۔ گردہ کے مزمن مرض۔ سل۔ طیریا کا بخار۔ سرطان اور سکر بوٹ۔ وغیرہ میں بھی ہاتھ۔ پاؤں اور منہ پر آماس آجایا کرتی ہے۔ سردی لگنے یا بھگنے سے بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے۔ بعض امراضِ جلد کے یکایک کم ہو جانے سے یا پسینہ وغیرہ کے یکایک دب جانے سے آماس کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ پیشاب میں البیومن زیادہ خارج ہونے کے باعث بھی استسقا کا غارتہ ہو جایا کرتا ہے۔

نوٹ: ۱۔ جب یہ مرض جگر میں نقص ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو آماس یعنی سوجن پہلے شکم پر ظاہر ہوتی ہے اور پیٹ بتدریج بڑھنے لگتا ہے اور بعد میں پاؤں پر بھی ورم چلی جاتی ہے۔

۲۔ جب یہ مرض دل یا پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہو۔ تو سونہ پہلے پاؤں پر

ہوتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ پیٹ اور تمام جسم پر پھیل جاتی ہے۔  
 ۳۔ جب یہ عارضہ گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آنکھوں کے پوٹوں اور  
 چہرہ پر سوجن نمودار ہوتی ہے اور پھر تمام جسم پھول جاتا ہے۔  
 ۴۔ جب یہ مرض کمی خون وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ تو آماس خفیف ہوتی ہے اور  
 چلنے پھرنے سے مرض زیادہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جب آرام کیا جائے تو ورم نابود  
 ہو جاتی ہے۔ نیز صبح کے وقت ورم جاتی رہتی ہے۔ لیکن برعکس اس کے  
 جب پاؤں پر آماس گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ چلنے پھرنے  
 سے کم ہو جاتی ہے لیکن لیٹنے یا آرام کرنے سے زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔

## علاج

استسقاء عامہ میں ڈیجی ٹیس۔ ایپس۔ آر سینکم۔ برائی اونیا۔ اپوسائیم

وغیرہ۔  
 استسقاء شکمی میں اپوسائیم۔ آر سینکم۔ چائنا۔ کروٹن۔ مگکیم وغیرہ۔  
 استسقاء ٹخنہ میں فرم۔ چائنا۔ آر سینکم وغیرہ۔  
 استسقاء دماغ میں ہیلی بورس۔ مریکپورس۔ بیلادونا۔ ایپس وغیرہ۔  
 استسقاء سینہ میں برائی اونیا۔ ڈیجی ٹیس۔ آر سینکم۔ ہیلی بورس وغیرہ۔  
 استسقاء دل میں ڈیجی ٹیس۔ سپائی جمبلیا۔ آر سینکم وغیرہ۔  
 استسقاء فوطہ میں آیوڈیم۔ روڈوڈنڈرن۔ پٹلا۔ گریفائیٹس وغیرہ۔  
 استسقاء جوڑ میں (گھٹنوں وغیرہ میں) ایکونائٹ۔ پٹلا۔ آیوڈیم وغیرہ۔

## تشریح علامات و دویات

ایپس میلی فیکا: جب شدید بخاروں کے بعد استسقاء کا عارضہ ہو جائے  
 اور مریض کو پیاس نہ لگتی ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ عدم پیاس ایپس کی علامت  
 منقسمہ ہے

گردہ کی خرابی کی وجہ سے اگر استسقاء کا عارضہ ہوا ہو تو یہ دوائی خاص طور پر

نوثر ہوتی ہے۔ جلد پہلی اور مانند موم کے اور شفاف ہوتی ہے۔ پیشاب کم آتا ہے۔ ایپیس کے استعمال سے پیشاب کی مقدار بڑھ جایا کرتی ہے۔ اگر استسقاء دل کی خرابی کی وجہ سے ہوگا تو آماس پاؤں پر ہوگی۔ استسقاء سینہ کی حالت میں کوتاہ دمی ہوگی اور ایسا معلوم ہوگا کہ موت نزدیک آرہی ہے۔ لیکن موت کا خوف مانند آر سینکم یا اکیونائٹ کے نہیں ہوگا۔ دوسری خاص علامت آماس زیرین چشم ہے اور تیسری خاص علامت تمام جسم کا ڈکھنا ہے۔ جب آب خون تراوش پاکر جذب نہ ہوتا ہو۔ تو اس حالت میں ایپیس ایک نہایت ہی مفید دوائی ثابت ہوتی ہے اور اس لیے استسقاء شکم۔ استسقاء سینہ اور استسقاء سر میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔ استسقاء گھٹنے میں بھی یہ کام آتی ہے (نیز آیوڈین) بہتر یہ ہے کہ ایپس ٹری ٹیوریشن (سفوف) میں استعمال کی جاوے۔

**خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔**

**آر سینکم** : یہ دوائی ہر قسم کے استسقاء میں کارآمد ہوتی ہے۔ خاص کر جبکہ استسقاء دل اور پھیپھڑوں کی خرابی کی وجہ سے ہو۔ جب گردوں کی خرابی کی وجہ سے استسقاء ہو۔ تب بھی یہ ایک مشہور دوائی ہے۔ چہرہ سوجا ہوا ہو اور ساتھ ہی آنکھوں کے پوٹوں پر آماس ہو۔ مانند موم کے شفاف جلد جسم ہو۔ پیاس اور تھکے وغیرہ موجود ہوں۔ ٹانگوں کے اوپر زخم ہوں۔ جب آب خون رستا ہو۔ تب بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ (نیز رشتاکس اور لائیو پوڈیم) آر سینکم ایک مشہور مدرالبول یعنی زیادہ پیشاب لانے والی دوائی ہے۔

**خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔**

**ایسی ٹیک ایسڈ** : ٹانگوں اور شکم کے استسقاء میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ جلد جسم موم نما۔ لاغر اور سفید سنگ مرمر کی مانند ہو۔ پیاس کھٹے اور بدبودار ڈکار منہ میں پانی اور اسہال آویں۔ جسم بہت ہی ماندہ ہو چکا ہو۔ یہ دوائی ایپیس اور آر سینکم کے مین بین ہے۔ پیاس بہت زیادہ اور باضمہ میں نقص اس کی مشہور علامات ہیں۔ بہتر سپینہ بھی اس کی خاص علامت ہے۔

**خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔**

ایوپوسائی نم کینابی نم : ہر قسم کے استسقاء میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے مثلاً استسقاء شکم - استسقاء سینہ میں یہ شفا بخش ہوتی ہے اس کی خاص علامات یہ ہیں - معدہ میں ڈوبنے کا احساس - خوراک برداشت نہ کر سکے - زیادہ پیاس لیکن پینے سے تکلیف بڑھے - دل کا فعل بے قاعدہ - بھڑکی اور سست نبض - اس دوائی کی خوراک کافی مقدار میں دینی چاہیے - کیونکہ تھوڑی مقدار میں یہ زیادہ پیشاب نہیں لاتی - استعمال کرتے وقت اس دوائی کو تازہ بتازہ تیار کر لینا چاہیے -

خوراک : ۵ کے دس قطرے دن میں تین مرتبہ -

نکتہ : اس دوائی کو احتیاط سے برتنا چاہیے - کیونکہ بعض ذکی الحس مریضوں میں مدرٹنکچر میں یہ دوائی تھے اور دیگر ناخوشگوار علامات پیدا کرتی ہے -

ڈیجیٹلس : استسقاء قلب میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے - دل کمزور اور بے قاعدہ - ایسا محسوس ہو گیا کہ یہ حرکت بند کر دے گا - گہرا سانس لینے کی بڑی زبردست خواہش ہو - تھوڑا سیاہ اور پُر از البیومن پیشاب آتا ہو - نبض کمزور ہو - فوطہ اور قضیب سو جے ہوئے ہوں - ٹھنڈا پسینہ یعنی تریلی آتی ہو - استسقاء کا رنگ نیلگوں ہو -

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

استسقاء سینہ میں مرکیورس سلفیورٹس کو یاد رکھنا چاہیے -

میور آٹمک ایسڈ : صفر الکبد (جگر کا چھوٹا ہونا) کی وجہ سے جب استسقاء ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے -

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

ہیلی بورس : کئی اقسام کے استسقاء میں یہ دوائی کام آتی ہے - اسہال

لیسدار پیشاب سیاہ اور تھوڑا سا شدید استسقاء اور فوری استسقاء میں جبکہ ساتھ ہی کمزوری بہت ہو - یہ دوائی نافع ہوتی ہے -

استسقاء دماغ میں بھی یہ دوائی دی جاتی ہے -

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

لاس : آماس - پیشاب سیاہ اور پُر از البیومن - جلد جسم سیاہ یا نیلگوں

سفید سکارلٹ بخار کے بعد جب استسقاء سینہ کا عارضہ ہو اور روم گھٹتا ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۳۰x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ٹیری بن تھینا : گردہ میں اجتماع کی وجہ سے جب استسقاء ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے مقام گردہ میں دھما دھما درد ہو اور پیشاب سیاہ اور دھواں دھار آتا ہو۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالچیکم : استسقاء ہو اور سیاہ پیشاب آتا ہو۔ خاص کر جبکہ یہ عارضہ وجع المفاصل کی وجہ سے ہو۔

خوراک : مدرٹنچر (۵) کے ۵ قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

لایسکو پوڈیم : جب کہ استسقاء جگر کی خرابی کی وجہ سے ہو۔ شکم پھولا ہوا ہو

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں پلٹلا۔ کلیریا کارب۔ آر سینیکم۔ آیوڈائیڈ وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات : اس مرض میں خشک اور کسی قدر گرم آب دہوا زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔

اگر مقامی آب دہوا مرض میں زیادتی کا باعث ہو تو مقام کی تبدیلی ضرور ہونا کرتی ہے۔ مرطوب آب دہوا یا نمدار جگہ خاص طور پر ناموزوں ہوتی ہے۔

شدید استسقاء میں خوراک ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے کہ شدید بخاروں میں لیکن مزمن استسقاء میں زیادہ مقوی غذا کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ چونکہ مریض کا معدہ کمزور ہوا کرتا ہے اس لیے اس کو ایسی غذا کھانی چاہیے جو آسانی سے ہضم ہو سکے۔ اگر پیشاب میں لبیون خارج ہوتی ہو اور گردوں میں نقص ہو تو گوشت اور ٹھیلی سے پرہیز لازم ہے۔ مریض کو غذا بے نمک دینی چاہیے کیونکہ مریض کے جسم میں پہلے ہی نمک کی بہتات ہے۔ پیاس کو بجھانے کے لیے ٹھنڈا پانی ایک اعلیٰ چیز ہے۔ پانی کا استعمال مریض کے لیے مفید ہوا کرتا ہے۔ جو لوگ پانی کو نقصان دہ بتلاتے ہیں وہ یقیناً غلطی پر ہیں۔ گرم پانی سے غسل یا حمام میں غسل کرنا مفید ہوا کرتا ہے کیونکہ اس سے پسینہ آنے میں مدد ملتی ہے۔

## موٹاپا - فرہ پن

(OBESITY CORPULENCE)

اس مرض میں جلد کے زیریں اور اندرونی اعضاء کے گرد چربی کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور مریض کی صحت اور اس کے آرام میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حرکات بدنی میں دشواری واقع ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔

### علامات مرض

جلد کے اندرونی اندریں اعضاء کے گرد چونکہ چربی بکثرت جمع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جسم بہت وزنی اور بے ڈول سا ہو جاتا ہے اور نیز اندرونی اعضاء بھی اپنا اپنا فعل بخوبی سرانجام نہیں دے سکتے اور باضمہ میں بھی فتور ہوتا ہے۔ چہرہ بھر پورا ہوا ہوتا ہے اور تمام جسم پھولا ہوا ہوتا ہے۔ اکثر ایسے اشخاص جوڑوں کے دردوں میں مبتلا رہا کرتے ہیں اور جب وہ بخار میں مبتلا ہو جائیں تو ان کی تکلیف زیادہ ہوا کرتی ہے۔

### اسباب مرض

یہ مرض معدوثی بھی ہوتا ہے اور کبھی بچپن سے ہی ایک شخص غیر معمولی طود پر موٹا ہوتا جاتا ہے۔ بعض اشخاص قدرتی طور پر موٹے ہوتے ہیں اور بعض پتلے۔ بعض اشخاص معمولی غذا سے فرہ ہوتے جلتے ہیں اور بعض عیش و عشرت میں بھی لاغر رہتے ہیں۔ یہ باتیں روزمرہ دیکھنے میں آتی ہیں۔ جن کے متعلق ہم کوئی وجوہات پیش نہیں کر سکتے۔ زیادہ تر یہ مرض ادھیر عمر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ بعض مستورات کو جبکہ حیض کا اناموقوف ہو جاتا ہے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

بعض نسلیں مثلاً امریکن اور عرب پتلے دُبے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف انگریز اور اہل ڈنمارک موٹے ہوتے ہیں۔

زیادہ مرغی۔ شیریں اور نشاستہ دار اغذیہ کا کھانا۔ بھینس کا دودھ پینا۔ مکھن کھانا۔ بکثرت شراب پینا۔ عیش و عشرت یا آرام طلبی کی زندگی بسر کرنا۔ یعنی کھانا پینا



زیادہ اور ورزش و ریاضت نہ کرنا۔ بلکہ کابل اور سست پڑا رہنا۔ اس مرض کے عام اسباب خیال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ آم اور انگور کا کھانا بھی موٹاپا کو پیدا کرتا ہے۔

## علاج غذائیہ

ایسی غذا سے جن میں روغن۔ شیرینی اور نشاستہ بہت ہو۔ حتی الامکان قطعی پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلاً آلو۔ شکر۔ مکھن۔ بالائی۔ بیر۔ شیریں میوہ جات اور شراب وغیرہ یہ اشیاء اول تو بالکل نہ کھائیں یا بہت کم کھائیں اور پانی بھی کم پئیں۔ دن رات میں سات گھنٹے سے زیادہ نہ سوئیں اور مناسب ورزش کریں۔ پیدل ہوا خوری کریں۔ موٹا آٹا کھائیں۔ اگر اس طرح سے عمل کیا جائے تو یقیناً مرض کو آرام ہو جاتا ہے۔

## علاج

فائی ٹولا کا بیرمی ٹیبلٹس : چار گولی صبح اور چار گولی شام کو تازہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں۔ اگر ایک ماہ استعمال کرنے کے بعد کوئی فائدہ ہوتا نظر نہ آوے تو

۱۔ امونیم برومیڈم ۳x ہر چھ یا آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

۲۔ کلیر باکس ۳x ۲۰ گریں ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

دس لیٹروں ایک چمچ بھر تھوڑا پانی اور شکر ملا کر دن میں تین مرتبہ استعمال

کیا کریں بشرطیکہ یہ ناموافق نہ ہو)

دیگر ادویات کیپ سی کم۔ گریفائٹس۔ فائٹولا کا۔ مدر ٹینکچر کے دو قطرے ہر

چھ گھنٹہ کے بعد استعمال کرنے بھی مفید ہیں۔

ڈاکٹر جونز (ایم ڈی) لکھتے ہیں۔ اگر پتلا ہونا چاہتے ہو تو تمام میٹھی اشیاء

کھانی چھوڑ دو۔ اور ترش اشیاء استعمال میں لاؤ۔ میدہ کی روٹی۔ مکھن۔ دودھ۔ شکر

آلو۔ بیر۔ شوربا وغیرہ سے پرہیز کرو۔ ان کے علاوہ باقی اشیاء استعمال کرو۔ اس

طرح کرنے سے آدھ سیر وزن ایک ہفتہ میں کم ہو جائے گا۔

# بھس۔ کمئی خون

(ANAEMIA CHLOROSIS)

اس مرض میں یا تو جسم میں خون کی مقدار ہی کم ہو جاتی ہے یا سُرخ دانہائے خون کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ یا ہیموگلوبین کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ نوٹ: جب خون میں سُرخ دانہائے خون کی تعداد یا اُن میں ہیموگلوبین کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو مریض کا رنگ زردی مناسب ہو جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں گرین سکلنس اور اردو میں سبز بھس یا انیمیا کہتے ہیں۔

## علامات مرض

جلد جسم۔ ہونٹوں اور رطوبتی جھلیوں کا رنگ پھیکا یعنی زردی مائل سفید ہو جاتا ہے اور مریض کا چہرہ ایسا پھیکا پڑ جاتا ہے۔ مانو کہ اس میں ذرا بھی خون نہیں ہے۔ مسوڑھوں کی رنگت بھی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ ناخن سفید ہو جاتے ہیں۔ حواریت جسم نارمل سے ذرا کم رہتی ہے ہاتھ اور پاؤں چونکہ مقام دل سے دور تر ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ ہمیشہ سرد رہتے ہیں کیونکہ وہاں تک خون پہنچ نہیں سکتا۔ تھوڑی سی محنت سے مریض تھک جاتا ہے اور اس کو دم پڑھ جاتا ہے۔ اس کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔

جب مریض کو تھوڑی دیر کھڑا رہنا پڑے تو اس کے پاؤں اور ٹخنوں پر آماں آجاتی ہے۔ مریض کی نبض باریک اور کمزور چلتی ہے اور ایک منٹ میں تقریباً ۸۰ مرتبہ چلتی ہے۔ مریض کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ بھوک نہیں اور اکثر قبض رہتی ہے سر میں گرانی ہوتی ہے اور بعض اوقات خفیف درد بھی رہتا ہے۔ اُٹھتے وقت آنکھوں کے آگے اندھیرا بچھا جاتا ہے۔ اور سر میں چکر آتے ہیں۔ مریض سُست و کابل ہوتا ہے اور کام کاج کرنے کو اُس کا جی نہیں چاہتا۔ مستورات میں حیض عموماً بند ہو جاتا ہے یا اگر آتا ہے تو پتلا اور پھیکا خون آتا ہے اور مریض لیسکوری یا یعنی سیلان الرحم کے مرض میں مبتلا رہتی ہے۔ کمئی خون کی وجہ سے مریض پست ہمت ہوا کرتا ہے اور

اُونچی آواز کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔

۱۔ تازہ ہوا کا میٹر نہ آنا اور اندھیری جگہوں میں رہنا۔  
۲۔ خونی بواسیر کا ہونا یا خونی دست آنا۔ یا خونی پیشاب کا آنا یا خونی قے ہونا۔  
یا بذریعہ نکیر خون کا بکثرت خارج ہونا۔ یا چوٹ یا زخم آنے کی وجہ سے بہت سا خون  
خارج ہو جانا۔

۳۔ پچیش یا اسہال یا بخار کے مرض میں عرصہ تک مبتلا رہنا۔

۴۔ کسی پھوڑے یا زخم سے پیپ یا خون کا عرصہ تک خارج ہوتے رہنا۔

۵۔ دماغی محنت بہت کرنا۔ لیکن کھلی ہوا میں ورزش نہ کرنا۔

۶۔ کثرتِ مجامعت یا جلق کرنا۔

۷۔ بد مضمی یا دائمی قبض کا رہنا۔

۸۔ ناقص و ناکافی غذا کھانا۔

۹۔ سست و کابل رہنا اور کھلی و تازہ ہوا میں سیر و ورزش نہ کرنا۔

۱۰۔ رنج و غم اور فکر و تردد میں مبتلا رہنا۔

۱۱۔ پیٹ میں کیڑوں وغیرہ کا موجود ہونا۔

۱۲۔ بعض امراض مثلاً سل اور امراضِ گردہ میں مبتلا ہونا۔

۱۳۔ مستورات کو بکثرت حیض آنا یا وضعِ حمل کے بعد زیادہ خون خارج ہونا۔ یا

عرصہ تک بچہ کو دودھ پلاتے رہنا۔

## علاج

فرم میٹلیکیم : فولاد بھس کی مُسلمہ دوائی مانی گئی ہے۔ خواہ بھس کا کوئی بھی  
سبب کیوں نہ ہو۔ ایلوپیتھک ڈاکٹر فولاد استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔ ہومیو  
پیتھی میں بھی فولاد کا درجہ کمّی خون کے مرض میں کچھ کم نہیں ہے۔ لیکن ہر ایک بھس کے  
کیس میں یہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر ایک کیس میں الگ الگ تشخیص کرنی  
چاہیے۔

جب ایک وقت میں تو مریض کا چہرہ خون سے بھرا ہوا اور تھمایا ہوا نظر آئے

لیکن پھر اس کے بعد چہرے کا رنگ پھیکا اور زرد پڑ جائے اور ہاتھوں اور پاؤں پر آماس ہو جائے تو ایسے کیسیوں میں فیرم نفع کرتی ہے۔

جب بھس کی وجہ جسم سے رطوباتِ زندگی یا خون کا اخراج ہو تو ایسی حالت میں فیرم مفید نہیں ہوتی۔ بلکہ چائنا مفید ہوتی ہے۔ مریض جلد تھک جاتا ہے۔ کھانے کے بعد مریض کھایا پیتے کو چھوڑتا ہو۔ مریض کو لگاتار ٹھنڈ لگتی رہتی ہو اور بعض اوقات سہ پہر یا شام کو خفیف بخار بھی ہو جاتا ہو۔ شدید کیسیوں میں بجائے فیرم ٹیلیکیم کے فیرم فاس زیادہ نافع ہوتی ہے۔

ڈاکٹر سوشلر صاحب ایسے کیسیوں میں اوّل کلکیر یا فاس اور بعد میں فیرم فاس دینے کی ہدایت کرتے ہیں۔ سادہ بھس میں جب کہ اور کوئی مرض ساتھ نہ ہو تو فیرم سب سے بہتر دوائی ہے۔

ڈاکٹر ہیوگنز۔ فیرم ریڈکٹم  $1 \times$  یا  $2 \times$  برتنے کی سفارش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر لڈلم۔ فیرم ایٹ سٹرکینا سٹریٹ  $3 \times$  کے مداح ہیں۔

ڈاکٹر جوسٹھ۔ فیرم ایسی ٹیکم استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

ڈاکٹر ہال کرم فیرم فاس کے شیداء ہیں۔

خوراک:  $3 \times$  کے ۵ گرین ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹلا: یہ دوائی فولاد کی ایک زبردست فادر مصلح (اصلاح کنندہ) ہے

اس لیے جب فولاد کے متواتر استعمال کرنے اور بڑی مقدار میں کھانے کی وجہ سے

کمزوری واقع ہو تو پلسٹلا دینی چاہیے۔

مریض کا جسم تھکاؤنا اور ڈھیلا ڈھالا رہتا ہو اور ٹھنڈ محسوس کرتی رہتی ہو اور نقص

ہاضمہ اور حمض کی بے قاعدگی میں مبتلا ہوتی ہو۔ پلسٹلا اور فیرم کی علامات بہت کچھ ملتی

جلتی ہیں۔ اس لیے ہو میو پیٹیک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ وہ بھس کے اصل سبب کو دریافت

کرے اور اگر مریض ایو پیٹیک ڈاکٹروں کا علاج کرا چکی ہو تو ہو میو پیٹیک ڈاکٹر کو یہ

سمجھ لینا چاہیے کہ مریض کا فی مقدار میں فولاد استعمال کو چکی ہے۔ اس لیے ایسی صورت

میں پلسٹلا یقینی دوائی ہوتی ہے۔

پلسٹلا کے مریض کو کھلی ہوا بہت بھاتی ہے۔ نیز اٹھنے پر دورانِ سر۔ عدم پیاس

اور ڈرپوک مزاج - یہ بھی پٹلا کی علامت ہیں -

سائی کلیمین : یہ دوائی بہت حالتوں میں پٹلا کے مشابہ ہے لیکن فرق یہ ہے - پٹلا کے مریض کو کھلی اور تازہ ہوا بھاتی ہے اور سائی کلیمین کے مریض کو تازہ ہوا مرغوب نہیں ہوتی ہے -

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد -

چائنا یا سکونا : جب کمی خون واقع ہو جو بہ رطوباتِ زندگی کے ضائع ہونے کے مثلاً عرصہ تک بچہ کو دودھ پلاتے رہنا یا اخراجِ خون یا بکثرت حیض یا کثرتِ مجامعت یا لگاتار اسہال کا آتے رہنا - جب خون کمزور ہو تو چائنا دوائی نافع ہوتی ہے -

سرکا وزنی ہونا - کمی بصارت - غشی اور کانوں میں گھنٹی بجنا - پیلا زرد چہرہ - کھٹے ڈکار - کمزور ہانمہ اور پھولا ہوا پیٹ - مریض کو ہوا کے جھونکے نہیں بھاتے تاہم وہ چاہتا ہے کہ اس کو پنکھا کیے جاؤ -

خوراک : ۳x تین گھنٹہ کے بعد -

نیٹرم میور بھی کمزوری اور کمی خون میں کام آتی ہے - جبکہ رطوباتِ زندگی کے ضائع ہونے کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو - خاص کر ایسی ستورات جن کو بے قاعدگی حیض کی شکایت عرصہ سے ہو اور ان کی جلد جسم بہت گندی ہو - نیٹرم میور سے مستفیض ہوتی ہیں -

چینی نم آرس بھی بعض اوقات شدید کمی خون میں شافی ہوا کرتی ہے -

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -

کلکیر یا فاس : سبز جھنس کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے - خاص کر نوجوان لڑکیوں کے مجس کی - جن کی جلد جسم مانند موم کے ہو - ہونٹ اور کان مانند سنگِ مرمر کے سفید اور چمکیلی آنکھیں چہرے کی رنگت سبزی مائل یا پیلی ہو اور اگر ان علامات کے ساتھ مریضہ کو خونِ حیض وقت سے پہلے آیا کرتا ہو - تو پھر کلکیر یا فاس کے منظر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا -

خوراک : ۳x کے ۵ گرین ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد -

کلکیر یا کارب : خنازیری یا سلی مزاج کے مریضوں کے لیے یہ دوائی خاص طور

پرنافع ہوتی ہے جبکہ اس دوائی کی علامات عامہ موجود ہوں۔ مثلاً گوشت سے نفرت۔ ترش اور ناقابلِ ہضم چیزوں کے کھانے کی خواہش۔ پیٹ پھولا ہوا۔ سر میں چکر اور سرٹھیاں چڑھنے سے دل کی دھڑکن زیادہ ہو۔ مریض ہر وقت تھکا ٹھارہتا ہو اور لگاتار مصائب کے تصورات میں مستغرق رہتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

ایلیو مینا : خا زیری مزاج والے سبز بھس کے مریضوں کے لیے اور نیز ایسے بچوں کیلئے کہ جن کی پرورش باقاعدہ نہ ہوئی ہو اور مصنوعی غذاؤں پر ان کو پالا گیا ہو۔ یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ سن بلوغت کے بھس میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔ جبکہ ناقابلِ ہضم اشیاء مثلاً سلیٹ پسل اور چاک وغیرہ کھانے کی خواہش زبردست ہو۔

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم : شدید قسم کے بھس میں یا ایسے بھس میں جو طیر یا فی زہر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہوں۔ اس دوائی کا درجہ صفا اول میں ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں:-  
نقابہت۔ بہت آماس۔ شدید اور بے قاعدہ دل کی دھڑکن۔ ترشیاں اور براڈی کی زبردست خواہش۔ سخت تشویش اور فوراً کمزوری۔ نیز پیاس کی زیادتی۔

خوداک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

ہیلو ٹائیز : کئی خون اور بھس کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب مستورات کو عرصہ تک خون خارج ہوتا رہا ہو اور اس کی وجہ سے کئی خون کا عارضہ ہوا ہو تو یہ دوائی خاص طور پر نافع ہوتی ہے۔

یا ایسی مستورات جو کہ سخت محنت و مشقت کرنے کی وجہ سے تھک ٹوٹ جاتی ہوں اور زیادہ تھکاوٹ کے باعث ان کو غید نہ آتی ہو اور ان کے عضلات دھکتے اور جلتے ہوں۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ خاص علامت اس دوائی کی یہ بھی ہے کہ جب مریضہ کی توجہ کسی خاص امر کی طرف کھچی ہوئی ہو تو پھر وہ بھلی پٹکی ہوتی رہے۔ اس لیے ڈاکٹر کے آنے پر وہ اچھی بھلی ہو جاتی ہے۔ ٹھکی ٹوٹی بھس کی ماری ہوئی اور کردرد والی مستورات کے لیے ہیلو ٹائیز ایک بہتر دوائی ہے۔ یہ دوائی خون پیدا کرتی ہے۔

خوداک : یا x کے ۵ قطرے دن میں تین مرتبہ -

ایٹرس : بھس کی یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے - یہ دوائی اعضائے رحم کے لیے ٹانگ ہے - تھکی ٹوٹی - سست بھدی اور بے قرار مستورات کے لیے نافع ہے بوجہ دیر تک بیمار رہنے کے جو مستورات کمزور ہو گئی ہوں - ان کو یہ دوائی فائدہ کرتی ہے -

خوداک : ۵ کے ۵ قطرے ہر چھ گھنٹہ کے بعد -

سکیل : جب بھس کا عارضہ لگتا رہے بڑھ رہا ہو - تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے - رنگ پھیکا ہو اور ایسا معلوم ہو کہ مریضہ میں خون ہے ہی نہیں -

خوداک : ۳ x صبح اور شام

نیٹرم میور : بھس کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے - مریض کا رنگ زرد ہو - باوجود اس امر کے کہ مریض کھاتا پیتا اچھا ہو لیکن پھر بھی کمزور ہوتا جاتا ہو کتواہ دمی ہو اور خاص کر میٹریاں چڑھتے وقت - سر درد - قبض اور سپت ہمتی ہو اور ہلکائی کرنے سے تکلیف بڑھتی ہو - مذکورہ بالا علامات کے ہمراہ دل دھڑکن ہو اور دل پھڑپھڑاتا ہو - اگر بھس کی مریضہ کو حیض بھی کم آتا ہو - تو یہ دوائی خاص طور پر منظر ہوتی ہے -

خوداک : ۶ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد -

ہنسلیز فزیا لو جیکل مانیکم : کمی خون اور کمزوری کی اعلیٰ دوائی ہے

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے پٹرولیم ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

پاکرک ایسٹ : ۳ x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد اور بیسی لائیم ۳۰ x یا ۳۰۰

ہفتہ میں ایک مرتبہ -

یہ سب اس مرض میں مفید ادویات ہیں -

ضروری ہدایات : مرض کے اصل سبب کو دریافت کر کے نقص

کو دور کریں - ہاضمہ خراب ہو تو اس کو ٹھیک کریں - قبض کو رفع کریں - غذا

زود ہضم اور مقوی دیں - تازہ اور کھلی ہوا میں مریضہ کو رکھیں - مریضہ ہمیشہ

دل شاد اور غم و فکر سے آزاد رہے - جسم پر مالش کرنا اور روزانہ غسل کرنا اور

نہانے کے بعد جسم خشک تولیہ سے خوب ملنا۔ یہ سب مفید اور ضروری باتیں ہیں۔

## ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا۔ رکٹس

(RICKETS RACHITIS)

یہ بیماری شیرخوار بچوں کو ہو جایا کرتی ہے۔ بوجہ اجزائے معدنی کے کم ہونے کے ہڈیاں کمزور اور نرم ہو کر خم کھا جاتی ہے۔ یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔  
علامات مرض : جب بچہ دس ماہ کا ہو جائے۔ اور دانت نکلنے کے کوئی آثار ظاہر نہ ہوں۔ یا ڈیڑھ سال کا ہو کر وہ چل پھرنے کے تور رکٹس کا گمان غالب ہو جاتا ہے۔ دورانِ نیند سر۔ گردن اور اوپر کے دھڑ پر پسینہ بکثرت آتا ہے۔ پسینہ موتی کے دانوں کی مانند پیشانی پر کھڑا رہتا ہے یا سر ہانہ تر ہو جاتا ہے۔ مریض ٹھنڈ پسند کرتا ہے اور موسم گرم یا سردیوں کو کولات مار کر پرے پھینک دیتا ہے۔ چلنا پھرنا دیر میں سیکتا ہے۔ ٹانگوں کی ہڈیاں خم کھا جاتی ہیں اور جوڑوں کے سرے خاص کو ٹخنے اور کلائی کے سرے بڑھ جاتے ہیں سر کی استخوان کے جوڑ آپس میں نہیں ملتے اور سر قدرے چپٹا اور بڑا ہو جاتا ہے اور بچہ چپ چاپ پڑا رہنا پسند کرتا ہے اور اشتہا بہت ہوتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہونے کی وجہ سے غذا کچی ہی بدون کسی تبدیلی کے نکل جاتی ہے۔ پاخانہ پھرتے وقت مریض کو بہت زور لگانا پڑتا ہے اور پاخانہ بہت بدبودار خارج ہوتا ہے۔ بچہ لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے۔ روز روشن میں تو وہ غنودگی میں پڑا رہتا ہے لیکن بوقتِ شب بے چین اور گھبراتا رہتا ہے۔

خراب کیسوں میں نہ صرف ٹانگوں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں بلکہ ریڑھ اور کولہے کی ہڈیاں بھی بد وضع اور بد شکل ہو جاتی ہیں۔ چہرہ چھوٹا اور کونی شکل کا بن جاتا ہے۔ میٹوڑی بمقابلہ پیشانی کے بہت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ سینہ تنگ اور خمیدہ ہو جاتا ہے اور شکم بڑا اور تنا ہوا ہوتا ہے۔

اسباب مرض : اکثر تو یہ مرض موروثی ہوتا ہے اور چھ سے گیارہ ماہ



کے بچوں کو عموماً ہو جایا کرتا ہے۔ غریب خنازیری مزاج کے بچے بالعموم اس میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ جب دودھ پینے والے بچوں کو بجائے شیر مادر کے دیگر غذا دی جاتی ہے جس کو وہ بخوبی مفہم نہیں کر سکتے تو وہ کمزور ہو کر عموماً اس مرض میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ نیز ناقص دودھ۔ خراب غذا اور کثیف آب و ہوا۔ غلیظ رہنا اور مہربان مکان اس مرض کے اسباب ہیں۔ دودھ پلانے کے زمانے میں اگر ماں بیمار اور کمزور ہو۔ خاص کر اگر اس وقت وہ سیلان الرحم و لیکوریا کے عارضہ میں مبتلا ہو تو اکثر اوقات بچہ رکٹس کے مرض میں مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ بہت زمانہ تک چھاتی سے دودھ پلاتے رہنا۔ خاص کر جب کہ دودھ پانی کی مانند پتلا ہو چکا ہو تو اس مرض کے پیدا ہونے کا موجب ہوا کرتا ہے۔ اگر ابتداء ہی میں اس مرض کا علاج کر لیا جائے تو یہ مرض قابلِ

علاج ہے۔  
**نتائج مرض:** تمام قسم کی بد وضع اشکال مثلاً ٹانگوں کا کمان نما ہونا۔ چھاتی کا کیوتر کے سینہ کی طرح آگے کو ابھر جانا۔ ریڑھ کے ستون کا خمیدہ ہو جانا۔ کولہے کا بد وضع ہونا۔ اندرونی اعضا کا دب جانا۔ پھوڑے پھنسیاں اور سل وغیرہ۔  
**عوارض:** اس مرض والے بچے کو چونکہ سردی کی برداشت نہیں ہوتی۔ اس لیے اسے نزلہ۔ زکام۔ کھانسی۔ ذات الریہ وغیرہ وغیرہ عوارض ہو کہ باعثِ ہلاکت ہوا کرتے ہیں اور کبھی اس کے دماغ میں پانی بھر جاتا ہے۔

## علاج

**کلکیریا فاس:** اس مرض کی خاص دوائی ہے۔ مرض کے ابتداء میں یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ جب کہ اسہال آتے ہوں اور ان میں سبز آنوؤں آتی ہو اور نا، مضم شدہ غذا کے اجزاء خارج ہوتے ہوں۔  
**خوراک:** ۳x ہر آٹھ گھنٹے کے بعد۔

**کلکیریا کارب:** دانت نکالنے میں دیر۔ دانتوں کا جلدی گل سڑ جانا۔ ریڑھ کا ستون اور اعضا خمیدہ ہوں۔ جوڑ اور سر بڑے ہوں۔ شکم بڑا ہو۔ اشتباہ بہت زیادہ اور اسہال آتے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد -  
 فاسفورس یا فاسفورک ایسڈ : ہلکا بخار، شکم تنا ہوا، اسہال، دودھیا  
 پیشاب یا گدلا پیشاب جس کے نیچے سفید تلچھٹ تہ نشین ہوتی ہو -  
 خوراک : ۳x یا ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 سلیشیا : سر کی کھوپڑی کے اوپر پھنسیاں - پھوڑے - غدودوں میں مواد -  
 کانوں سے پیپ خارج ہو -

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 ایسا فوٹیدا : جب ماں کی علالت یا کمزوری کے باعث بچہ کو دودھ اچھا  
 نہ ملتا ہو اور بچہ بدیں وجہ رکش کے مرض میں مبتلا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے -  
 خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

فیرم فاس : جب رکشی بچہ کے آلات تنفس میں نقص واقع ہو جائے تو یہ  
 دوائی مفید ہوتی ہے - نیز خون کی کمی کو پورا کرنے میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے  
 ابتداءے مرض میں یہ دوائی اور کلکیر یا فاس اکٹھے استعمال کرائے جاسکتے ہیں -  
 سلفر : اس مرض کے شروع علاج میں سلفر کی چند خوراکیں پہلے دینی چاہئیں  
 نیز جبکہ منتخب کردہ دوائی اپنا مزید اثر دکھلانے میں قاصر ہو جائے تو تین یا چار روز  
 تک سلفر کی دو خوراکیں روزانہ دینی چاہئیں اور بعد میں پھر وہی دوا شروع کر دینی  
 چاہیے -

خوراک : ۲x یا ۳۰ ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد -

ضروری ہدایات : تازہ اور خشک ہوا - سورج کی روشنی اور کھلی ہوا میں  
 ورزش یہ تینوں ضروری باتیں ہیں - ان کا خیال رکھنے سے صحت یابی میں بڑی مدد ملتی  
 ہے جو مریض چل پھر نہیں سکتے ان کو دن کے وقت کافی پارچہ پٹیاں پہنا کر کھلی ہوا میں  
 بٹھانا یا لیٹانا چاہیے - ہوا دار کمرے میں رہائش اور صفائی بھی ضروری ہے -

ہر صبح ٹھنڈے یا شیر گرم پانی میں نہانا اور خاص کر نمکین پانی میں اور اس کے  
 بعد پانچ سے دس منٹ تک پشت پر مالش کرنا مفید ہوتا ہے اور اسی طرح شام  
 کو بھی مالش کرنی چاہیے -

**غذا :** مقوی غذا خوب چبا چبا کر کھانی چاہیے۔ دودھ۔ آٹے کی روٹی اور شوربہ وغیرہ مفید چیزیں ہیں۔ اگر چھان کو آٹے سے الگ نہ کیا جاوے اور اس کی روٹی بنائی جائے تو بڈیوں کو نشوونما دینے میں بہت مددگار ہوتی ہے۔

کوڈ لیور آئیل ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ دس سے بیس قطرے شروع میں دینے چاہئیں اور پھر آہستہ آہستہ مقدار کو بڑھاتے جانا چاہیے۔ اگر کوڈ لیور آئیل کی خوراک دیتے وقت اس میں برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال لیے جاویں تو اس کی بو وغیرہ زائل ہو جاتی ہے۔

کوڈ لیور آئیل کو استعمال کرتے وقت مریض بچہ کے پاخانہ کا بھی امتحان کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس میں تیل کا رنگ دبو ہو تو کوڈ لیور آئیل کی مقدار کم کر دینی چاہیے۔  
**حفظِ مآلہدم :** جب یہ پتہ ہو کہ رکٹس کا مرض موروثی ہے تو حمل کے دوران میں ہی احتیاط شروع کر دینی چاہیے۔ ماں کو ایسی غذا دینی چاہیے جس میں دودھ بالائی اور سبز ترکاریاں بہت ہوں۔

## سکروی۔ گوشت خور

(SCURVY SCARBUTI)

اس مرض میں مریض کے موڑے پیلے یعنی اسفنجی ہو جاتے ہیں اور ان سے اکثر خون بہتا رہتا ہے اور مریض کمزور ہو جاتا ہے۔

**علاماتِ مرض :** موڑے پیلے اور پھولے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے خون باسانی نکل پڑتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہے۔ دانت کمزور ہو کر ہلکے پڑتے ہیں چہرہ کا رنگ پھیکا زرد پڑ جاتا ہے اور مریض کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت سے سانس پھول جاتا ہے اور جسم کے مختلف حصص سے خون خفیف چوٹ لگنے سے جھٹ بہنے لگ جاتا ہے۔

**اسبابِ مرض :** ناکافی و ناقص غذا کھانا۔ گندی ہوا میں سانس لینا۔ گندے اور تنگ مکانات میں رہائش رکھنا۔ جن اشخاص کو عرصہ تک تازہ گوشت اور تازہ سبزی کھانے کو نہیں ملتی وہ اکثر اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

## علاج

مرکب ورس سالو : ۳x کے ۵ گرین ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

براقی آونیا : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : ۳x یا ۲۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رسٹاکس : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایلم کلیٹرو : یہ دوائی اس مرض میں اکیر ہے۔ اس دوائی کو موڑھوں پر ملتے ہیں اور منہ ڈھیلا چھوڑ کر رالیں باہر نکال دیتے ہیں اور بعد میں گرم پانی سے کلی کر دیتے ہیں۔ اس طرح پانچ سات دن کونے سے آرام ہو جاتا ہے۔

ضروری ہدایات : اس مرض میں پرہیز نہایت ضروری ہے۔ پرہیز اور احتیاط کرنے سے مرض کو آرام ہو جاتا ہے۔

مریض کو تازہ ہوا میں رکھیں اور تازہ سبزی ترکاریاں۔ مثلاً آلو۔ گوہی۔ کدو۔ کرلیے۔ توری۔ شلغم۔ مولیٰ گاجر۔ بنگین۔ پیاز۔ سرسوں و پالک کا ساگ وغیرہ کھلاتے رہیں۔ نیز تازہ میوہ جات مثلاً نازنگی۔ سنگترے۔ سیب۔ انار۔ لیموں۔ آلوچہ اور لوکاٹ وغیرہ استعمال کراتے رہیں۔ آلو نہایت ہی مفید ہیں۔ روزانہ ایک یا ڈیڑھ پاؤ آلو کھائے سے سکروڈی کا مرض رُک جاتا ہے۔ گائے کا تازہ دودھ بھی مفید ہے۔ تازہ لائٹ جو س (عرق لیموں) یا سنگترہ کا رس آدمی چٹانک نکال کر اور اس میں تھوڑی سی کھانڈ اور پانی ملا کر مریض کو صبح اور شام ایسی ایک ایک خوراک دینی چاہیے۔ منہ کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے۔

پرہیز : باسی اور خراب غذا اور باسی و گلے سرے گوشت۔ مچھلی سے قطعی پرہیز کرنا چاہیے۔

## باؤگولہ ہسٹیریا۔ اختناق الرم

(HYSTERIA)

یہ مرض عصبی ہے اور نظام عصبی کے افعال میں فتور واقع ہونے سے پیدا ہوتا

ہے۔ یہ مرض صرف عورتوں تک ہی محدود نہیں ہے کیونکہ یہ محض رحم کی خرابی کی وجہ سے ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ مردوں میں بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ قدیم اطباء کا خیال تھا کہ یہ مرض عورت کے رحم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس کو اختناق الرحم کے نام سے نامزد کیا ہے۔ اختناق کے معنی گلا گھونٹنا ہے چونکہ اس مرض میں مریضہ کا گلا گھٹتا ہے۔ اس لیے اطباء نے اس کو اختناق الرحم کا نام دیا ہے۔ یعنی رحم کی خرابی سے گلا گھٹنا۔

باؤ گولہ نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ جب اس مرض کا دورہ شروع ہوتا ہے تو مریضہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک گولہ اٹھ کر اور اوپر کو جا کر اس کے حلق میں ٹمک گیا ہے۔

نوٹ: جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے کہ اطباء قدیم اس کو صرف عورتوں کی بیماری سمجھا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ مرض رحم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ یہ مرض ان عورتوں کو بھی ہوتا ہے جن کے رحم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی بلکہ ان عورتوں کو بھی جن کا رحم ہوتا ہی نہیں۔ نیز عصبی مزاج کے مردوں کو بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ اس مرض میں کسی عضو میں کوئی خاص نقص نہیں ہوا کرتا۔ بلکہ نظام عصبی کے فعل میں عارضی نقص واقع ہو کر اس مرض کا دورہ ہو جاتا ہے۔

علامات مرض : باؤ گولہ کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ خفیف باؤ گولہ۔ جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں ہسٹریا مائیز کہتے ہیں۔

۲۔ شدید باؤ گولہ۔ جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں ہسٹریا میجر کہتے ہیں۔

۱۔ خفیف ہسٹریا کی علامات : مریضہ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک گولہ اٹھ کر اوپر کو جاتا ہوا گلے میں ٹمک گیا ہے۔ اس کو نگلنے کی ود کوشش کرتی ہے۔ اور اس کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ تکایف جلدی ہی دور ہو جاتی ہیں اور مریضہ کو تھوڑا سا سر میں درد اور گردن میں سختی محسوس ہوتی ہے۔ ڈکار آتے ہیں اور شکم پھول جاتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے اور پیشاب پتلا اور بکثرت خارج ہوتا ہے اور اس کو ہل دل کی شکایت رہتی ہے۔

۲۔ شدید ہسٹریا کی علامت : یکایک مریضہ چیخ مار کر رونے لگتی ہے یا زور سے ہنسنے لگتی ہے اور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک گولہ پیٹ میں سے اٹھ کر حلق کو جا رہا ہے اور جو نہی وہ گولہ حلق تک پہنچتا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آہستہ سے گر پڑتی ہے بغور مشاہدہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریضہ بالکل بے ہوش نہیں ہے۔ بلکہ اندرونی اس کو ہوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرتے وقت وہ آہستہ گرتی ہے تاکہ اس کو چوٹ نہ آئے اور نہ ہی مرض سوتے سوتے ہوتا ہے اور نہ ہی اس وقت جبکہ اکیلی ہوتی ہے اور مریضہ کا چہرہ بھی ایسا بد وضع نہیں ہو جاتا جیسا کہ مرگی میں ہوا کرتا ہے۔ سانس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے اور تنفس بے قاعدہ چلتا ہے۔ لیکن سانس بالکل رُک نہیں جاتا۔ دورہ کا کوئی خاص معین عرصہ نہیں ہوتا۔ کسی وقت لمبا ہوتا ہے اور کسی وقت چند منٹ ہی رہتا ہے اور کبھی تین تین چار چار روز تک رہتا ہے۔ ایسی صورت میں مرض کا ایک دورہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ دوسرے دورہ آجاتا ہے۔ جب مرض کا حملہ دُور ہو جاتا ہے تو مریضہ کو بہت نفاہت محسوس ہوتی ہے۔

علامات بعد از دورہ : مرض کے دورے کے بعد مریضہ کئی ایک فرضی امراض کی علامات کا اظہار کیا کرتی ہے۔ یعنی درحقیقت وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوتی جس کی علامات کا اظہار کرتی ہے بلکہ وہ وہی طور پر اپنے آپ کو مختلف امراض میں مبتلا خیال کرتی ہے۔

وہ اپنے مرض کی کیفیت کو بہت مبالغہ سے بیان کرتی ہے اور اپنے فرضی مرض کو بہت شدید خیال کرتی ہے۔ مثلاً جسم کے مختلف حصوں میں وہ درد کی شکایت کرتی ہے اس کو سر میں کیل ٹھوکنے یا برما سے سوراخ کرنے کی مانند محسوس ہوتا ہے کبھی پستان کے زیریں۔ کبھی ریڑھ کے ستون۔ کہہ لے اور گھٹنے میں درد کی شکایت کرتی ہے اور اتنا درد بتلاتی ہے۔ مانو کہ درد اس کو نڈھال کیے جا رہا ہے۔ کبھی ہانگ میں درد کی شکایت کرتی ہے۔ جس کے باعث وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو یہ کہہ دے کہ گھر کو آگ لگ گئی ہے تو وہ دُکڑ چلنے بلکہ دوڑنے لگتی ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو مفلوج بیان کرتی ہے کبھی وہ پیٹ میں

ورد کی شکایت کرتی اور کبھی گردن میں۔ بعض مریضوں کا جی تلاتا ہے۔ ہچکی یا ڈکاریں آتی ہیں سول دھڑکتا ہے۔ پیٹ میں نفخ ہو جاتا ہے۔ کبھی پیشاب زیادہ آتا ہے اور کبھی پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ کبھی سینہ میں درد ہوتا ہے۔ غرضیکہ طرح طرح کی شکایات ہوتی ہیں۔

**اسباب مرض :** یہ مرض موروٹی ہے جن والدین کو مرگی یا باؤ گولہ کا علل نہ ہو۔ ان کے بچوں کو یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ اس مرض میں عموماً بارہ سے ۴۰ سال تک کی عمر کی عورتیں زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں۔ مستورات میں حیض کی خرابی مثلاً حیض کا تکلیف سے آنا یا بند ہو جانا۔ شہوانی خیالات و خواہشات کا غالب ہونا۔ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا۔ عشیقہ قصے کہانیاں یا ناولوں کا پڑھنا۔ رنج و غم۔ فکر و تردد۔ غصہ و خوف۔ عشق میں ناکامی و بدنامی۔ نفخ شکم۔ دائمی قبض۔ یہ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ مردوں میں جلق و مشت زنی اور بکثرت دماغی محنت کرنا۔ بے خوابی وغیرہ اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں۔

**علامات امتیازی و تشخیصی :** باؤ گولہ کے مرض کو مرگی سے تشخیص دینا ضروری ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ دونوں کی امتیازی علامات ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

### علامات مرگی

- ۱۔ یکایک کامل بے ہوشی ہو جاتی ہے اور مریضہ ادگرہ کے آدمیوں کی آواز کو نہیں سنتی اور جب حملہ دور ہو جاتا ہے تو اس کو گوشہ حالات کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔
- ۲۔ مریضہ دانت پیتی ہے اور زبان دانتوں تلے آکر کٹ جاتی ہے۔ منہ سے جھاگ آتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلا ہوتی ہیں۔

### علامات باؤ گولہ

- ۱۔ ظاہراً مریضہ بے ہوش ہوتی ہے لیکن اندرونی اس کو ہوش ہوتی ہے اور ادگرہ کے آدمیوں کی آوازوں کو سنتی ہے مگر جواب نہیں دیتی۔
- ۲۔ مریضہ دانت پیتی ہے مگر اس کی زبان دانتوں کے نیچے آکر کٹ نہیں جاتی۔ روشنی سے آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں۔ یعنی روشنی

## علاماتِ باؤ گولہ

- کا اثر پتلیوں پر بخوبی ہوتا ہے۔  
 ۳۔ پیٹ میں سے ایک گولہ سا اٹھ کر  
 اور اوپر کو جا کر حلق میں اٹکتا ہوا  
 محسوس ہوتا ہے اور مرض کا دورہ  
 ہو جاتا ہے۔  
 ۴۔ مریض لمبے لمبے سانس لیتی ہے اور  
 آپہں بھرتی ہے اور کبھی روتی ہے  
 اور کبھی ہنستی ہے۔  
 ۵۔ جب مرض کا دورہ ختم ہو جاتا ہے تو  
 مریض کو کمزوری بہت محسوس ہوتی  
 ہے۔ نیند نہیں آتی اور پیشاب بکثرت  
 آتا ہے۔

## علاماتِ مرگی

- جو روشنی کے اثر سے سکتی نہیں۔  
 ۳۔ معدہ کے پیچھے سے یا پاؤں سے ایک  
 قسم کی سرسراہٹ شروع ہو کر سر  
 تک پہنچتی ہے اور دورہ ہو جاتا  
 ہے۔  
 ۴۔ سانس خراٹے دار آتا ہے۔ مریض  
 نہ روتی ہے اور نہ ہی ہنستی ہے۔  
 ۵۔ دورہ مرض کے رفع ہو جانے کے  
 بعد مریض کو گہری نیند آتی ہے یا  
 بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ سر درد کرتا  
 ہے۔

نوٹ : جب یہ مرض موروٹی ہو تو آرام ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم بروقت  
 ہومیو پیتھک علاج کرانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر موروٹی نہ ہو  
 تو پھر مناسب ہومیو پیتھک علاج سے کلی آرام آ جاتا ہے۔  
 بعض اوقات کنواری لڑکیوں کو یہ مرض ہو جاتا ہے لیکن جب ان کی شادی  
 ہو جاتی ہے تو پھر یہ شکایت بھی رفع ہو جاتی ہے۔

## علاج

مرض کے دورہ میں کیمفر۔ ماسکس۔  
 وقفہ میں اگنیشیا۔ پلائینا۔ سمی سی فیوگا۔ آرم وغیرہ۔  
 اگنیشیا : ہومیو پیتھک میں ہسٹریا کے مرض کے لیے سب ادویات کی ستراج  
 دوائی اگنیشیا ہے۔ مریض بہت ذکی الحس ہو۔ کبھی چیخنے لگے اور کبھی ہنسنے لگے۔ جذبات



کے خفیف بھڑکاؤ پر بھی چہرہ تمنا جائے۔ مریضہ تشنجی تہقہہ لگائے اور پھر بعد میں رونے اور چیخنے لگے۔ حلق میں گولے کے اٹکنے کا احساس ہو۔ یا سر کی پوٹی میں کیل کے ٹھونکنے کا سا درد ہوتا ہو۔ پیشاب بکثرت اور سفید رنگ کا بہت، مقدار میں خارج ہو اور اکثر پیشاب کے اخراج کے بعد سر درد کو آرام آجائے۔ شکم میں نفخ ہو۔ باؤ گولہ کا احساس کئی ادویات کی علامت ہے۔ لیکن اگنیشیا اور ایسا فوئیڈا کی خاص علامت ہے۔ پتے وقت حلق میں خفیف تشنج ہو۔ یا اتنا شدید تشنج ہو کہ ہاتھوں کی انگلیاں مڑ جائیں اور چہرہ نیلا پڑ جائے۔ (رکوپرم)

ہوش آنے پر مریضہ گہرے سانس لیوے اور آہ بھرے۔ جب خوف و غم کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو تو اگنیشیا ایک خاص دوائی ہے۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
ایسا فوئیڈا۔ حلق میں گولے کا احساس ایسا فوئیڈا کی ایک بڑی بیماری علامت ہے۔ ایسا فوئیڈا کی دوسری مشہور علامت یہ ہے۔ کہ شکم میں ہوا بھری ہوئی ہو اور یہ ہوا اوپر کو خارج ہوتی ہو اور تنفس میں دقت پیدا کرتی ہو۔ گولہ معدہ سے اوپر کی جانب اٹھتا ہوا حلق کو جاتا ہو۔

زیادہ کھانے اور حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہو۔ مریضہ کو ایسا محسوس ہو کہ ہر ایک چیز منہ پھاڑ کر نکل جاوے گی۔ ہسٹریکل قونج کی یہ ایک بہتر دوائی ہے۔ چند علامات میگنیشیا میوہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ یعنی ہوا کا اکٹھا ہونا اور گولہ بن کر حلق میں اٹھنا اور تنفس کو روک دینا اور ڈکاروں کے آنے سے آرام را ایسا فوئیڈا کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ مریض لگاتار نگلتا رہتا ہے تاکہ گولہ نیچے چلا جائے اور ایسا کرنے سے تنفس میں تکلیف واقع ہوتی ہے۔

بے چینی اور تشویش بھی ایسا فوئیڈا کی علامات ہیں۔ عضلات جھپکتے ہوں۔ اور تمام جسم نہایت ذکی الحس ہو۔ اخراج رطوبات کے رُک جانے کے باعث جب ہسٹریکل تشنج ہوں تو ایسا فوئیڈا کام آتی ہے۔ جب علامات حلق زیادہ آشکارا ہوں تو ایسا فوئیڈا کو نہیں بھونا چاہیے۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

ماسکس: غشی اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔ جب غشی کے ہمراہ ہسٹریا کے دورے بھی ہوتے ہو تو کئی ایک ادویات کام آتی ہیں۔ مثلاً ایسا فوٹیڈا کایولس۔ اگنیشیا یا نکس ماشکٹا۔ لیکن اکثر کیسوں میں ماسکس دوائی منظر ہوتی ہے۔ یہ دوائی خاص کر اس وقت کام آتی ہے۔ جب کہ مرض کا دورہ جاری ہو۔ عضلات جھٹکتے ہوں اور سینہ میں شدید تشنج یا کچھاوٹ ہو۔ زرد پیشاب کا بہت مقدار میں آنا۔ حلق میں گولے کا احساس۔ سر درد اور نفخ یہ علامات ماسکس کی بھی ہیں بے تحاشہ تمقہ لگاتے جانا۔ نیز خوشی اور غم کا بار بار ہونا یہ بھی ماسکس کی علامات ہیں۔ نفسانی خواہش بہت زوروں پر ہو۔ یعنی جنونِ جماعت موجود ہو۔ دورانِ حملہ میں جب ہچکی آتی ہو یا عصبی ہسٹریکل مریض کو ڈکار بہ آواز بلند آتے ہوں تو یہ سب سے بہتر دوائی ہوتی ہے۔ ماسکس کے مریض کی دلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حملہ کے دوران میں کو ستا رہا ہے۔ المنقصر ماسکس کی علامات حسب ذیل ہیں۔

بے ہوشی۔ گلے کا گھٹنا۔ رونا اور ہنسا۔ حلق میں گولے کا احساس۔ بکثرت زرد پیشاب اور یکا یک بے ہوشی۔

خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد مرض کے حملہ کے دوران میں۔  
ٹیرن ٹیولاہسپانیہ: ہسٹریا کی یہ بھی ایک دوائی ہے۔ مریض ہنستے ہنستے بس نہ کرتی ہو لیکن سب سے زیادہ مشہور علامت اس دوائی کی بے چینی اور عضلات کا جھٹکنا ہے۔ مریض ہر وقت عضلات کو جنبش دینے کے لیے مجبور ہوتی ہے۔ ذکی الحس بہت ہو۔ نخاع ذکی الحس ہو۔ خصیتہ الرحم ذکی الحس ہوں اور جنونِ جماعت بہت ہو۔

یہ دوائی اس وقت خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ جب کہ ہسٹریا اور مرگی دونوں موجود ہوں۔ جس کو انگریزی اصطلاح میں (HYSTEROEPILEPSY) کہتے ہیں۔ اگرچہ یہ مرض شاذ و نادر ہی دیکھنے میں آتا ہے۔

خوراک: ۲x ہر پار گھنٹہ کے بعد۔

پلاٹینا: مریض پر از غرور ہو اور چلتی ہوئی ایسے انداز سے چلتی ہو۔ گویا کہ وہ

ملکہ ہے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا اس دوائی کی خاص علامت ہے اور یہ غرور کی علامت سارے میٹیریا میڈیکا میں پلائینم سے بڑھ کر اور کسی دوائی میں نہیں ملتی۔ قہقہہ کے دورے باواز بلند ہوتے ہیں۔ آلات تناسل نہایت ذکی الحس ہوں۔ ان میں خارش ہوتی ہو۔ بلکہ جنون مجامعت ہو۔ بوجہ عصبی اکساہٹ جب ہسٹریا کا حملہ ہوتا ہو اور دم گھٹتا ہو اور خوراک کی نالی میں سکڑن ہو تو پلائینا دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

مریضہ غم گین اداس اور بے صبر ہو۔ قانع نہ ہو۔ رونے کی طرف اس کا رجحان ہو۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ولیریاٹا : ایو پٹیک ڈاکٹر اس دوائی کو ہسٹریا میں عام برتتے ہیں۔ مریضہ لگاتار جنبش کرتی رہتی ہو لیکن محنت کرنے سے سرور و پیدا ہو جاتا ہو اور خفیف درد سے غشی ہو جاتی ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ معدہ سے کوئی گرم چیز اوپر کو اٹھ رہی ہے۔ بدیں وجہ تنفس دقت سے آتا ہو۔ نیز خوف لرزش اور دل کی دھڑکن موجود ہوں۔ گرمی کی لہریں اٹھتی ہوں۔ حلق میں گولے کا احساس ہو اور وجع المفاصل کے سے درد ہوتے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نکس ماشکاٹا : ہسٹریا کی خاص ادویات میں سے یہ ایک ہے۔ یہ دوائی خاص کر عصبی مزاج کے مریضوں کے لیے موزوں تو ہوتی ہے۔ جن کی طبیعت غمی سے خوشی میں تبدیل ہوتی رہتی ہو۔ لیکن علامات مخصوصہ نیند۔ نفخ اور منہ کی خشکی ہیں۔ تھوڑی سی محنت سے مریضہ تھک ٹوٹ جاتی ہو۔ نفخ کی علامت جو کہ عموماً کھانا کھانے کے بعد پیدا ہوتی ہو۔ لائیکوپوڈیم اور نکس ماشکاٹا میں بھی پائی جاتی ہے لیکن ہسٹریکل مزاج والے مریض کے نفخ میں ماشکاٹا دوائی ہی کام آتی ہے۔ خشک عصبی ہسٹریکل کالسی۔ سینہ پر دباؤ اور غشی میں نکس ماشکاٹا دوائی مؤثر ہوتی ہے۔ غشی اس دوائی کی عام علامت ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ : ڈاکٹر نیر کا قول ہے کہ جب ہسٹریا کا شدید حملہ ہو تو مصری یا پتاشہ پر رو بینی کیفر کا ایک قطرہ ہر پانچ یا دس منٹ کے بعد دینا نہایت ہی موثر ہوتا ہے۔  
 جلسی میم : ہوا کی نالی کے تشنج میں جب کہ ساتھ ساتھ ہی ہسٹریا کا حملہ بھی ہو تو یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ نیم بے ہوشی اور نقاہت اس کی علامات ہیں۔ مریضہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے حلق میں ایک ڈھیلا ٹکا ہوا ہے۔ جو کہ نگلا نہیں جاسکتا۔ اور پیشاب زروی مانل بکثرت خارج ہوتا ہو۔ مجلوق خواہ مرد ہو خواہ عورت دونوں کے لیے یہ کام آتی ہے۔ لیکن مجلوق عورت کے لیے خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ ٹانگیں اور بازو بہت سس ہوں۔ خوف و ڈر بستی و کابلی تقریباً ہر وقت موجود ہوں۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا : حلق میں کچھاوٹ ہو۔ گویا کہ کوئی چیز گرفتار ہو کر رہی ہے۔ علامات اور جذبات میں متواتر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اور پانی سا پیشاب بکثرت آتا ہو۔ اگنیشیا کی مانند پسٹلا میں بھی اداسی۔ ٹمکنی اور رونا دھونا علامات پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگنیشیا کا مریض تنہائی میں روتا ہے۔ برعکس اس کے پسٹلا کی مریضہ کے آنسو ہر موقعہ پر نکل آتے ہیں۔ اور ہمدردی و تسلی پسٹلا کے مریض کو بھاتی ہے۔ کھلی ہوئی مریضہ کو بہت بھاتی ہو۔ خون حیض کم آتا ہو اور مریضہ لگاتار ٹھنڈک کی شکایت کرتی ہو۔ سن بلوغت میں ہسٹریا کے لیے پسٹلا ایک بہتر دوائی ہے۔  
 خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

بلا ڈونا : جب خون کا دورہ بجانب سر ہو اور مریضہ کا چہرہ سرخ اور تپلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ آنکھیں چمکتی ہوں۔ ایسے حالات میں بلا ڈونا ہسٹریا کی مفید دوائی ثابت ہوتی ہے۔

خوراک : ۲x ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

کالی فاس : باہر نشور میڈیز میں سے یہ ایک خاص دوائی ہسٹریا کی ہے۔ مریضہ چلاتی ہو۔ ہنستی ہو اور جہائیاں لیتی ہو۔ بے ہوشی کے ہمراہ تشنج ہوں۔ شکم متاثر ہوا نہ خفیف دباؤ کو بھی نہ سہار سکتی ہو۔ بھول کسی سبب کے مریضہ کو ڈر

لگتا ہو۔ ہر ایک امر کے سیاہ پہلو کی طرف مریضہ دیکھتی ہو۔ آپہیں بھرتی ہو۔ منہ موم اور کانپتی ہو۔

خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ آگنس کاسٹس - انا کارڈیم - کاکش - کاکیلوس - آرسینکیم - سہی سی فوگا - کالوفائیلیم - سکٹا - کینا بس انڈیکا - ہائیوسائی مس - سٹرامونیم - آرم وغیرہ ادویات اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

مریضہ کو فوراً ہوا دار کمرہ میں لٹائیں اور اس کی گردن اور چھاتی کو ڈھیلا کر کے اس کے چہرے پر سرد پانی کے پھینٹیں ماریں اور سر کے نیچے سر بانہ رکھ دیں تاکہ سر قدرے اونچا رہے کلوروفارم یا امیل نائٹریٹ سنگھانے سے یا روہینی کیمفر کا ایک ایک قطرہ مصری یا پتاشہ پر ڈال کر پانچ پانچ منٹ کے بعد منہ میں رکھنے سے اکثر دورہ مرض فوراً رنج ہو جایا کرتا ہے۔ ابتداء میں جب مریضہ ہاتھ پاؤں مارنے لگے اور بے ہوش ہو جائے تو خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ چنداں فکر کی بات نہیں ہوتی اور جب مریضہ بے ہوش ہو جائے تو اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر کوئی ہمدردی کی گفتگو نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ چونکہ ہسٹریا میں مریضہ کامل طور پر بے ہوش نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے اس کے ارد گرد جو گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ اس کو سمجھتی ہے۔ بعض اوقات خستہ الرحم یا فم معدہ کے مقام پر دبائے سے درد رنج ہو جاتا ہے اگر مریضہ کے جسم میں درد ہو۔ تو مٹھی چا پی کرائیں۔ اور بدن پر مالش کرائیں۔

# باب چہارم

## مردوں کے خاص امراض

### صیق غلفہ - انرو - قانی موسس

(PHIMOSIS)

اس بیماری میں سپاری کا بالائی چمڑہ یعنی گھونگھٹ لمبا اور تنگ ہو جاتا ہے۔ اور بدلی وجہ وہ سپاری (حشفہ) پر سے پیچھے کو ہٹ نہیں سکتا۔ علاماتِ مرض: پیشاب رک رک کر آتا ہے۔ کیونکہ بالائی جلد کو پیچھے ہٹا کر حشفہ کو صاف نہیں رکھا جاسکتا اور کبھی پیشاب میں خون آنے لگتا ہے اور کبھی فوطی میں پانی بھر جاتا ہے۔

اسبابِ مرض: یہ مرض پیدائشی بھی ہوتا ہے اور نیز سوزاک و آتشک بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ پیشاب وغیرہ کی غلاطی کے باعث بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

### علاج

جب یہ مرض پیدائشی ہو تو چمڑے کو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا دیں یا کٹوا دیں۔ اگر آتشک و سوزاک کی وجہ سے ہو تو بذریعہ پچکاری جلد کے اندر سے مواد کو پانی کے ساتھ صاف کریں اور صاف کرنے کے بعد کیلنڈولاکسین کی پچکاری کریں کیلنڈولاکسین چھرا یک ڈرام اور پانی ایک چٹانک اور مندرجہ ذیل

دوائی دیں۔

ایکونائیٹ : ۱x کے پانچ قطرے سوتے وقت اور مرکبوس کار۔

خوراک : ۴x کے ۵ قطرے دن میں دو مرتبہ۔

کالی ہائیڈرائڈیکم : یہ دوائی بھی اس مرض میں کام آتی ہے۔

خوراک : ۱x کے چار قطرے دن میں دو مرتبہ۔

گوائیکم : یہ بھی مفید دوائی ہے۔

خوراک : ۳x کے پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

## پیرافانی موس

(PARAPHYMOSIS)

یہ مرض ضیق غلفہ کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی جب حشفہ کی بالائی جلد یعنی گھونگھٹ اتنا تنگ ہو کہ حشفہ کے اوپر چوڑ نہ سکے یا چوڑ کر پھنس جاوے تو ایسی حالت کو پیرافانی موس کہتے ہیں۔ اس میں سوزش ہو کر درد ہونے لگتا ہے اور سپاری اور گھونگھٹ بہت سوج جاتے ہیں۔ اگر اس کا جلدی تدارک نہ کیا جاوے تو بہت نقصان پہنچے گا اندیشہ ہوتا ہے۔ جن اشخاص میں گھونگھٹ کا چمڑہ قدرتی طور پر چھوٹا ہوتا ہے اور وہ اس کو سپاری پر سے پیچھے ہٹائے رکھتے ہیں۔ ان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے۔ ہتھکی زخم کے باعث چمڑہ کا موٹا اور ارد گرد کے حصے سخت ہو جاتے ہیں۔ بدیں وجہ یہ لچک ہو کہ گھونگھٹ کے چمڑہ میں ہوا کرتی ہے زائل ہو کر اس مرض میں زیادتی کرنے کا موجب ہوتی ہے۔

## علاج

معالج کا پہلا کام رکاوٹ کو دور کرنا ہے۔ یہ اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ کہ ستر پچر کی جگہ سے تھوڑی دُور پیچھے کی طرف دونوں ہاتھوں کی پہلی دو انگلیوں سے پچر کو چمڑے کو آگے کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے اور سپاری کو دونوں انگلیوں سے دبا دیا جائے۔ ایسا کرنے سے تھوڑی دیر میں آلہ تناسل کا خون کم ہو جائے گا اور وہ اتنا

چھوٹا ہو جائے گا کہ بالائی جلد حشفہ کے اوپر پورے طور سے آجاوے گی۔ اس کے بعد ایک چوڑی پٹی لے کر اور کیلنڈر لوشن میں بھگو کر آلت تناسل کے اوپر لپیٹ دینی چاہیے۔ اس سے سوج بھی کم ہو جائے گی اور گھونگھٹ بھی پیچھے کو سرک جاوے تو فوراً مندرجہ بالا ترکیب سے پھر اس کو ٹھیک کر دینا چاہیے۔

## سپاری کی سوجن - ورم حشفہ

(BALNITIS BULANORRHOEA)

یہ مرض اگرچہ متعدی نہیں ہے لیکن اس کے ظہور پذیر ہونے سے بیمار کو وہم سوزاک و آتشک کا ہو جاتا ہے۔ یعنی سپاری کی بالائی اور گھونگھٹ کی اندرین جھلی میں ورم ہو جاتا ہے اور درد ہوتا ہے۔

اسبابِ مرض : غلاظت - جسم میں گرمی - بوقتِ مجامعت زخم آجانا - طوائف کے ساتھ مجامعت کرنا - فرج کو دیگر خراش دار رطوبتوں کا لگ جانا - علاماتِ مرض : گھونگھٹ کے زیرین والی لعاب دار جھلی متورم ہو جاتی ہے - ابتداء میں خارش ہوتی ہے - جگہ ماؤف گرم اور سُرخ ہوتی ہے اور اس میں سے پیپ نکلتی ہے اور تمام جگہ میں زخم ہوتے ہیں - بعض مریضوں کو خراش کم ہوتی ہے اور پیپ بھی کم آتی ہے اور بعض میں خراش اور پیپ بکثرت موجود ہوتے ہیں - بعض میں جھلی پر کہیں کہیں سُرخ اور متورم نشان ہوتے ہیں - جن میں سے نہایت خفیف مادہ خارج ہوتا ہے اور بعض مریضوں میں تمام کی تمام جھلی اور حشفہ سُرخ اور متورم ہو جاتے ہیں اور بکثرت پیپ خارج ہوتی ہے - موخر الذکر حالت میں غدد و جگاسہ بھی متورم ہو جاتے ہیں - لیکن ان میں پیپ شاذ و نادر یا بالکل ہی پیدا نہیں ہوتی - اس مرض کو اصل سوزاک و آتشک سے تشخیص کرنا ضروری ہوا کرتا ہے - یہ مرض اس وقت پیدا ہوتا ہے جبکہ گھونگھٹ کا اگلا چمڑا سپاری سے چمٹا رہے - اور پیچھے کو نہ ہٹ سکے اور غلاظت اندر ہی رہ کر ورم گھونگھٹ و سوجن حشفہ پیدا کر دے -

یہ مرض پیدائشی بھی ہوتا ہے اور حاصل کر وہ بھی اور اس سے سوزاک کا شک



پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب یہ پتہ مل جائے کہ پیپ آنے کا منبع کیا ہے تو پھر یہ شک دور ہو سکتا ہے۔ پس گھونگھٹ کا زیریں حصہ پچکاری کے ساتھ گرم پانی سے خوب صاف کر کے اور پھر گھونگھٹ کو پیچھے ہٹا کر (جہاں تک وہ ہٹ سکے) یعنی نائیزہ کا سوراخ نکال کر کے دیکھنا چاہیے کہ آیا پیپ نائیزہ کے سوراخ سے آتی ہے یا گھونگھٹ کے اندر سے۔ اگر نائیزہ کے سوراخ سے نہیں آتی تو اصلی سوزاک نہیں سمجھنا چاہیے۔

آتشک کے زخم اور دیگر زخم میں بھی پہلے پہل امتیاز کرنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ خراش دونوں میں ایک جیسی ہوتی ہے اور زخم بھی کئی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب موخر الذکر زخم دو بصحت ہو جائیں۔ تو پھر شک و شبہ نہیں رہتا۔ کیونکہ آتشک کا زخم قائم رہتا ہے اور اتنی جلدی ٹھیک ہونے میں نہیں آتا۔ جب تک کہ اس کا خاص علاج نہ کیا جائے۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ مجامعت کرنے کے بعد اگر خند گھنٹوں میں ہی زخم ظاہر ہو جائے تو اس کو بیلاناٹیس کا مرض سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ آتشکی زخم مجامعت کرنے کے تین چار روز سے پہلے شاید ہی ظاہر ہوتا ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ مریض نے مجامعت کی ہی نہیں اور خراش پیدا ہو کہ زخم بن گیا ہے تو پھر بیلاناٹیس کے مرض میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔ ایسی حالتوں میں اس مرض کا باعث اندرونی جسمانی گرمی یا غلاظت ہوا کرتی ہے۔

## علاج

اس مرض کے علاج میں صفائی کا درجہ افضل تر ہے۔ شیر گرم پانی اور صابن سے خوب اچھی طرح سے دین میں تین مرتبہ صاف کرنا چاہیے۔ نیز کپڑے کا ٹکڑا یا روئی کا پھایا سرور پانی یا نرم کیلنڈر لاؤشن میں تر کر کے سپاری اور گھونگھٹ کے درمیان رکھنا چاہیے۔

۱۔ کیلنڈر لاؤڈر ٹنکچر ایک ڈرام اور پانی دو اونس ایک چھٹانک، ملا کر کیلنڈر لاؤشن تیار کریں۔

ایکونائیٹ x کی ایک خوراک بوقت خفتن اور مرکبوس کار x ۳ دن میں دو مرتبہ استعمال کرنا مفید ہوا کرتا ہے۔ ہر قسم کی خشیات سے قطعی پرہیز لازم ہے۔ اگر ورم حشفہ کے ساتھ ضیق غلقہ کا مرض بھی شامل ہو گیا ہو۔ تو اس صورت میں جگہ ماؤف کو صاف کرنا اور روشن لگانا مشکل ہوا کرتا ہے۔ بدین حالات پچکاری کے ساتھ گرم پانی جہاں تک ہو سکے۔ اندر پنچا کر صاف کرنا چاہیے اور اسی طرح کیلنڈر لا روشن بھی چھڑکنا چاہیے۔ اگر یہ عمل کیا جاوے اور مذکورہ بالا ادویات بھی دی جائیں تو مرض کے شفا یاب ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا۔

## سپاری کی پھنسیاں - تہور حشفہ

(HERPES OF THE GLANDS)

اس مرض میں سپاری کی جھلی پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو کر باعث سوزش و خارش ہوا کرتی ہیں۔

### علاج

مقام ماؤف کو ستھرا رکھیں اور اندر مرکبوس x ۶ ہر چار گھنٹہ بعد دیں۔

## فوطوں کی سوجن

(OEDEMA OF THE PEROTUM)

اس مرض میں فوطے متورم ہو جاتے ہیں اور بخار بھی ہوتا ہے

### اسباب مرض

امراض سوزاک و آتشک - میلا کچھلا رہنا۔

## علاج

مرکیورس بن آیوڈائیڈ : اس مرض کی خاص دوائی ہے۔ اس کے استعمال سے سوزش بہت کم ہو جاتی ہے۔  
 خوراک :  $3 \times$  دن میں ۳ مرتبہ۔  
 آرنیکا : جبکہ یہ مرض چوٹ یا صدمہ کی وجہ سے ہو۔  
 خوراک :  $1 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
 نیز آرم۔ کونیم۔ کلیمٹس۔ بیلادونا۔ برائی ادینا۔ فاسفورس۔ پٹلا۔  
 لائیکو پوڈیم۔ میزیریم۔ کالی ہائیڈراڈیم بھی کام آتی ہے۔

## فوطہ کی وریدوں کا پھول جانا

(VARICOCELE)

اس مرض میں خصیہ کے اوپر ایک اُبھار سا معلوم ہوتا ہے۔ جو نیچے سے فراخ اور اوپر سے تنگ اور گرہ دار محسوس ہوتا ہے۔ کھانسنے یا بولنے یا کھڑا ہونے سے اُبھار زیادہ ہو جاتا ہے اور اس جگہ درد ہوتا ہے۔ مریض کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے اور درد کی ٹیسیں رانوں اور چٹدوں تک جاتی ہیں۔

اسباب مرض : موٹے آدمیوں کو یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ امراض جگر قبض اور کثرتِ مجامعت وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

پٹلا :  $3 \times$  ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد شدید درد میں یہ بہت نافع ہوتی

ہے۔

ہما میل :  $3 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔ نیز ہما میل لوشن رہا میل

① ایک ڈرام اور پانی ایک چھٹانک ۱۰ میں کپڑے کا ٹکڑا تڑکر کے بجائے ماؤف پر رکھیں۔

فیرم فاس : ۳x سفوف کے ۵ گرین ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
پلم بک : ۶x سفوف کے ۵ گرین ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

### ضروری ہدایت

بذریعہ پچکاری رحشہ قبض کو دور کریں۔ لنگوٹ ڈھیلا باندھیں۔ سرد پانی سے روزانہ نہائیں۔ قابض و گرم اغذیہ سے پرہیز کریں۔ نیز جماع سے قطعی پرہیز لازم ہے۔

## فوطوں میں پانی بھر جانا

(HYDROCELE)

اس مرض میں فوطے بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن درد نہیں ہوتا۔ چراغ کو خسیوں کے ایک طرف رکھیں تو خسیوں کی دوسری جانب روشنی معلوم پڑتی ہے۔ اور یہی تشخیصی علامت اس مرض کی ہے۔

### علاج

آیو ڈیم : ۳x روڈو ڈرن : ۳x  
پسٹلا : ۳x گریفائٹس : ۶x  
آرم : ۶x نیز برائی آونیا : ۳x جب کہ پیدائشی ہو  
آرنیکا : ۱۲x زچو : ۱ یا صدمہ کے باعث ادویات کام میں آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

۱۔ نوٹا در کے لوشن دنوٹا در ایک ڈرام۔ ریکی فائیڈ سپرٹ ایک

اونس - پانی آٹھ اونس) سے بار بار خسیوں کو تر کرتے جائیں - یا  
۲ - شکیر آبیوڈین اوپر پیٹ کریں - اگر کسی دوائی سے فائدہ نہ ہو تو عمل  
جراحی کا خیال کریں -

## فوطوں کی کھجلی (خارش)

(PRURIGO SCROTI)

اس مرض میں فوطوں پر اتنی سخت خارش ہوتی ہے کہ مریض کھجلا کھجلا کر  
زخمی کر دیتا ہے -

اسباب مرض : دائمی قبض - بواسیر - میلا کچھلا رہنا - گرم اشیاء  
بکثرت کھانا - کبھی جوئیں بھی کھجلی کا باعث بنتی ہیں -

### علاج

گرفیٹائیس : اس مرض میں عمدہ دوائی ہے -

خوراک : ۶ x ۱ ہر چار گھنٹہ کے بعد -

کروئین ٹیملیم : یہ بھی ایک مفید دوائی ہے -

خوراک : ۳ x ۱ ہر چار گھنٹہ کے بعد -

ہائیڈروکورتائیل : یہ اس مرض میں بہت مفید دوائی ہے -

خوراک : مدد شکیر ۵ کے دس قطرے صبح اور دس قطرے شام کو -

ضروری ہدایات : مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو

دور کریں -

گرم مصالحہ اور گرم اشیاء سے پرہیز کریں -

## خصیوں کا درد

(NEURALGIA OF THE TESTICLES)

اس مرض میں ایک یا دونوں خصیوں میں عصبی درد ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہے۔ چھونے سے درد نہایت شدت کا ہوتا ہے۔ سوزش یا درم نہیں ہوتا۔  
اسباب مرض : وجع المفاصل یا نقرس۔ بد ہضمی۔ حلق۔ کثرت جماعت  
ریگ گردہ وغیرہ۔

## علاج

آرم میٹیلکیم : ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
ہیامیلس : ۳ x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
کوہنیم : ۳ x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

قبض ہو تو بذریعہ پچکاری (حقنہ) دور کریں۔ برف یا سرد پانی میں کپڑا  
بجھو کر ماؤف مقام پر رکھیں۔

## خصیوں کی سوجن۔ درم خصیہ

(GREHITIS)

اس مرض میں خصیہ میں سوزش واقع ہو کر شدت کا درد ہوتا ہے اور  
درد کی ٹیسیں۔ مکر۔ شکم اور رانوں تک جاتی ہیں۔ بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔  
اور جی تلاتا ہے۔

اسباب مرض : امراض سوزاک و آتشک۔ خصیہ پر چوٹ آنا۔ گلوئے  
سنگِ مثانہ۔ سوزشِ مثانہ۔ وجع المفاصل یا نقرس اور سردی لگنا۔ یہ سب اس

کے اسباب ہیں۔

نوٹ: کن پیرے یا گلوے پر سرد: شیاؤ کا لپ کرنے سے کبھی ورم منتقل ہو کر خسیوں میں چلی جاتی ہے اور خیسے متورم ہو جاتے ہیں۔

علامات مرض: خصیہ میں ورم اور شدید درد ہوتا ہے۔ پہلے دو تین روز خصیہ بڑھتا رہتا ہے اور بعض اوقات بند مٹھی کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔

یہ درد خسیوں سے جگہ سے میں جاتا ہے اور اسی جانب کی کمر کے حصے میں درد ہوتا ہے اور منی کی ڈوری بہت موٹی ہو جاتی ہے۔

ایسے کیسوں میں نبض باریک اور تیز چلتی ہے اور چھونے سے جھٹکا دیتی ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے اور بھوک ماری جاتی ہے۔ جب مرض کا زور ہوتا ہے تو پیپ آنی قطعی بند ہو جاتی ہے اور اگر آتی بھی ہے تو بہت خفیف۔

جوں جوں خصیہ کی سوچن کم ہوتی جاتی ہے توں توں پیپ مقدار میں زیادہ آتی ہے۔ مگر بعض اوقات خصیہ کی سوچن کے ساتھ ہی مرض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر مرض اپنی پہلی جگہ میں نمودار نہیں ہوتا۔

## علاج

درم خصیہ کے علاج میں ہومیو پیتھک ادویات کا اثر جیسا حیرت انگیز اور یقینی ہوتا ہے ایسا اور کسی طریقہ علاج میں نہیں ہوتا۔ اس لیے ایو پیتھک ڈاکٹروں، طبیوں اور ویدوں کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ ہومیو پیتھک ادویات کے جادو اثر کو اس مرض کے علاج میں مزور آزمائیں۔

ایکونائٹ: اس مرض میں خاص دوائی ہے۔ جونہی کہ اس مرض کی ابتدائی علامات آشکارا ہوں۔ اس دوائی کو شروع کر دینا چاہیے۔ یعنی اس دوائی کے ۵ قطرے ہر تیس گھنٹے بعد استعمال کرنے چاہئیں اور اس طرح سے یہ دوائی چوبیس یا پچیس گھنٹوں تک جاری رکھنی چاہیے۔ اکثر حالتوں میں یہ دوائی اکیسلی ہی شفا بخش ثابت ہوتی ہے۔ لیکن جب مقامی علامات میں ایکونائٹ کے دینے سے بہت کچھ کمی واقع ہو جائے تو پھر پلسٹا دوائی شروع کر دینی چاہیے۔

پلسٹلا: ۱x یا ۲x پانچ قطرے دوائی کے ہر دوسرے یا تیسرے گھنٹے دینے چاہئیں۔ بعض اوقات اکیونائٹ اور پلسٹلا ادویات کو باری باری سے بھی دیتے ہیں۔ یہ زیادہ موزوں رہتا ہے۔ ان ادویات کے دینے سے فوری شفا میں تاخود نادر ہی ناکامی ہوتی ہے۔ اس لیے جلدی میں آکر ان ادویات کا دینا بند نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ان کو دیتے رہنا چاہیے۔

مرض کی تیزی کے دوران میں مریض کو چپ چاپ چار پانی پر پڑے رہنا چاہیے اور نرم اور زود اثر غذا جیسی کہ آیام بخار میں مریض کو دی جاتی ہے۔ اس مرض میں بھی ویسی ہی دینی چاہیے۔ فوطہ کے اوپر برف یا سرد پانی میں بھگو یا ہوا کپڑا لپیٹنا مفید ہوا کرتا ہے۔ اگر مریض کو کسی وقت بستر پر سے اٹھنا مطلوب ہو تو خصلوں کو سہارا دے کر اٹھنا چاہیے۔ اس لیے بہتر تجویز یہ ہے کہ فوطے کے اوپر ایک ایسی تھیلی پڑھائی جاوے جو خصلوں کو اوپر اٹھائے رکھے۔ تاکہ وہ ڈھیلے نہ ٹپکتے رہیں۔ جب مرض کے شدید علامات کا آرام آجاتا ہے۔ تو بعض اوقات خصیہ اپنے اصلی قد سے زیادہ بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ ان کی سوجن یا تو خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ یا بعض اوقات مریکپورس اور سلفر کے استعمال سے وہ اپنے اصلی قد پر آجاتے ہیں۔

ایکونائٹ اور پلسٹلا کے دینے سے اس عارضہ میں کبھی ناکامیابی نہیں ہوتی لیکن اگر کچھ کچھ میں لمبا جثہ مریض یا دیگر حالات ایکونائٹ اور پلسٹلا جلدی آرام دینے میں قاصر رہیں تو بیلادونا کے دینے سے بہت جلدی آرام ہو جاتا ہے یا اگر مرض بہت ترقی یافتہ ہو تو آرام دوائی مفید پڑتی ہے۔

بیلادونا: اس وقت زیادہ مفید ہوتی ہے جب کہ نظام عصبی زیادہ ذکی احساس ہو اور درد ناقابل برداشت ہو اور جب کہ درد عصبی شدید ہو۔

خوراک: ۲x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے ہر تیسرے گھنٹے بعد دیتے جانا چاہیے۔

آرام: جب کہ عصبی دردوں کا زور ہو اور خصیہ کی نسبت منی کی دوری میں زیادہ دردی ہوتی ہوں۔ یہ دردی بعض اوقات نہایت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔



ڈوری بڑھ جاتی ہے اور اپنے اصل قد سے دگنی یا تگنی موٹی ہو جاتی ہے۔ جب ایسی حالت ہو تو آرنیکا لوشن میں کپڑا بھگو کر اوپر رکھنا چاہیے یا اسی کی پٹس درد والی جگہ پر باندھنی چاہیے۔

## ضروری ہدایات

ڈاکٹر یلڈھم صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ "متورم" خیمہ پر صابن کا پستر لگانا نہایت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔ یہ عموماً اس موقع پر زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جب کہ مرض نہایت شدید ہو اور سوجن پوری ترقی پر ہو۔ یعنی اظہارِ مرض سے دوسرے تیسرے روز اس کی ترکیب حسب ذیل ہے۔

ایک ایک اپنچ چوڑے کئی ٹکڑے کپڑے کے جن کی لمبائی اتنی کافی ہو کہ فوطے کے آثار پر بخوبی آسکے لیتے ہیں۔ اور ان پر صابن پھیلا کر پھیلاتے ہیں۔ یہ پلستر کے ٹکڑے ایسی ترکیب سے فوطے کے اوپر لگائے جاتے ہیں کہ تمام فوطا کن سے ڈھک جاتا ہے اور یہ پلستر کئی دن تک لگا رہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ درم کم ہو جائے۔ یہ بڑی مفید چیز ہے۔

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے مندرجہ ذیل ادویات بھی بعض اوقات مفید ثابت

ہوتی ہیں۔

کینا بس۔ مرکبوریس۔ کلیمیش۔ نکس و امیکا۔ سپائی جیلیا۔ شانی یگریا۔ سلفر۔  
نائٹرک ایسڈ۔ کینتھرین۔ کاکیولس۔ کالوسنتھ۔ آرسینکیم۔ برائٹا کارب۔ سپنجیا۔  
میزیریم۔

لے آرنیکا مد ٹنکچر ایک درم اور پانی ایک چٹانک پانی ملانے سے آرنیکا لوشن تیار کیا جاتا ہے۔

# درم غده قدامیہ۔ ندی کے غدود کی شدید سوجن

## PROSTATITIS INFLAMMATION OF THE PROSTATE GLAND

اگرچہ یہ بیماری گاہے گاہے واقع ہوتی ہے لیکن بے بڑی تکلیف وہ اور درناک اکثر یہ مرض سوزاک کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ لیکن گاہے گاہے امراض مقعد یا پتھری یا خراش مقعد کی وجہ سے یا بڑھاپے میں شانہ میں سر دی لگنے کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

**علاماتِ مرض :** علامات اس مرض کی یہ ہیں کہ مقامِ سیون پر بہت بوجھ پڑا ہوا معلوم ہوتا ہے اور درد مقعد تک محسوس ہوتا ہے جس سے پاخانہ جانے کی جھوٹی حاجت بنی رہتی ہے۔ غده قدامیہ پر بوجھ ناقابلِ برداشت ہوتا ہے اور مریض بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ غدود سوج جاتی ہیں اور چھونے سے درم کا پتہ لگتا ہے۔ بعض اوقات متذکرہ بالا علامات کے علاوہ شانہ میں خراش شروع ہو جاتی ہے اور پیشاب کا آنا بالکل بند ہو جاتا ہے۔ یا تھوڑا آتا ہے اور کبھی کبھی خون بلا ہوا آتا ہے۔ یہ عارضہ خنانہیری مزاج والوں میں بہت دیر تک رہتا ہے۔ شدید حالت سے تخفیف ہو کر مرض مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔

اس عارضہ میں پیپ کا پیدا ہو جانا ایک عام بات ہے۔ جب مرض کا درد شدید ہو اور غدود میں پیپ پڑنی شروع ہو جائے تو درد نہایت شدید ہوتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی اور پیشاب رکا رہتا ہے۔

**نوٹ :** پراسٹیٹ اخروٹ کے برابر ایک غدود ہوتا ہے جو کہ شانہ کے سرے پر واقع ہوتا ہے۔ اس غدود میں ایک قسم کی سفید یا بے رنگ رطوبت پیدا ہوتی ہے۔ جسے ندی کہتے ہیں۔ اس لیے بعض طب کی کتب میں اس کا نام غدود ندی لکھا ہے۔ یہ بوقتِ مجامعت منی کو خارج کرنے میں مدد دیتی ہے۔

اسباب مرض : سوزاک - پتھری یا کیتھی لٹر کی خراش یا امراض متعد اس کے اسباب بنوا کرتے ہیں۔ یہ غدود بڑھاپے میں اکثر آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے یا شانے کو سر دی لگنے سے یکایک درم بہت بڑھ جاتی ہے۔

## علاج

ایکونائٹ - مرکبوس - بیلادونا - پٹلا - سلفر اور آیوڈیم مرض کے درجہ شدید میں ایکونائٹ اور مرکبوس کو باری باری سے دیتے جانا چاہیے۔  $2 \times$  یا  $3 \times$  ڈائی یوشن کے ۵ قطرے ہر چوتھے گھنٹے باری باری سے تین یا چار یوم تک دینے چاہئیں۔ چونکہ یہ بیماری جلدی جلنے والی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے علاج میں ادویات کو جلدی جلدی تبدیل نہ کرنا چاہیے۔

ایکونائٹ اور مرکبوس کے باقاعدہ استعمال کے بعد پٹلا کی باری آتی ہے۔ اس دوائی کے  $1 \times$  ڈائی یوشن کے ۵ قطرے ہر چوتھے یا پانچویں گھنٹے بوقت دن دیتے جانا چاہیے اور بوقت نختن ایکونائٹ کی خوراک دینی چاہیے۔ بشرطیکہ مریض کو بخار اور بے چینی ہو۔ ادویات کو باری باری دینے کی بجائے یہ طریقہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دن کے وقت تو ایک دوائی دی جائے اور رات کے وقت دوسری اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوائی دوسری کے راستہ میں مغل نہیں ہو سکتی اور ہر ایک دوائی کو کافی وقت اپنا کام کرنے کا مل جاتا ہے۔

ڈاکٹر یڈتھم صاحب فرماتے ہیں کہ اس مرض میں سلفر مدرٹنگر (۵) اور مرکبوس کار  $2 \times$  کی خوراکوں کو باری باری سے دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ مرض کی مزمن حالت میں کالی بائیڈراڈیکم کے دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بہت قلیل مقدار اس کی کام نہیں دے گی۔ ایک گرین مدرٹنگر مرچوتھے گھنٹے دیتے جانا چاہیے۔

سالی ڈاگو اور ساپال میٹریہ دونوں ادویات شدید مزمن درم غدہ قدیمہ ہیں

۱۰ پشاپ خارج کرنے کے لیے رپڑ کی نلکی۔

نہایت کارآمد ہوتی ہیں اور ان کے استعمال سے درم جلدی کم ہو جاتی ہے اور بعض اوقات کیتھی ٹر پاس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی  
علاوہ ازیں تھو جا - آر جنٹم - آرم - کلیریا - چامپلا اور کونیم بھی اس مرض میں گاہے گاہے مفید پڑتی ہیں -

## علامات مخصوصۃ الادویہ

ایکونائٹ : جبکہ جسم گرم اور خشک ہو - نبض بھری ہوئی اور زور سے چلے - پیاس اور بے چینی ہو - شانہ کی گردن کے پاس جلن ہو - پیشاب کی حاجت بار بار ہو اور دردناک ہو - پیشاب کی رنگت بہت سیاہ اور توش ہو اور اکثر اوقات سرخ مادہ پیشاب کی تہ میں بیٹھ جاوے -

خوراک : ۱x ڈائی یوشن کے ۵ قطرے ہر دو گھنٹوں کے بعد -

مرکیورس : غدد سخت معلوم ہوں اور مقام سیون میں گرمی اور درد ہو اور نیز ایسا معلوم ہو کہ اس جگہ بہت بوجھ پڑا ہوا ہے اور پیشاب کے نیچے سفید اور گاڑھا مادہ جمع ہو جائے -

خوراک : ۳x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر چوتھے گھنٹے -

پسٹلا : اس بیماری میں نہایت مفید ہے - خاص کر گورے رنگ کے اشخاص کے لیے مقام سیون میں گرمی اور بوجھ ہو - آلات ناسل کی خیزش زیادہ ہو اور رطوبت مذی دہرا سٹیٹ گلینڈز کی رطوبت زیادہ خارج ہو - شانہ میں درد - جیسا کہ پتھری کا بوجھ پڑا ہوا ہے - پیشاب کی جھوٹی حاجت بکثرت اور بار بار ہو -

خوراک : ۱x ڈائی یوشن کے ۵ قطرے ہر تیسرے گھنٹے بعد -

تھو جا : اس کی علامت بھی پسٹلا سے مشابہت رکھتی ہیں - لیکن پیشاب اس میں خونی ہوتا ہے - یا پیشاب کے نیچے سرخ تلچھٹ بیٹھ جاتی ہے -

خوراک : ۳x ڈائی یوشن کے تین قطرے ہر چوتھے گھنٹے بعد -

سایپال میٹو : پیشاب نہایت تکلیف سے آتا ہو - دوران پیشاب میں جلن ہوتی

ہو۔ درم ندہ قدامیہ ہو۔

خوراک : مدر ٹکچر کے ۵ قطرے ہر دو تین گھنٹے کے بعد۔

ضروری ہدایات : اس عارضہ میں آرام سے لیٹے رہنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ ہر قسم کی منتیات سے پرہیز لازم ہے۔ مقام سیون پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھنا یا گرم گرم اسی کی پلٹس باندھنا مفید ہے۔ گرم پانی کے ٹب میں کولہے تک بیٹھنا مفید ہے۔ جب پیشاب رُک گیا ہو اور تکلیف زیادہ ہو تو کیتھی ٹر سے پیشاب خارج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قبض ہو تو بذریعہ انیما دور کریں۔

غذا : دودھ۔ چاول۔ کچھڑی۔ ساگوانہ یا دال چپاتی دیں۔

## جرمان ندی۔ سیلان ندی

(PROSTATORRHOEA)

اس مرض میں پراسٹیٹ گلینڈ سے سفید چمکدار غلیظ رطوبت نکلتی رہتی ہے۔ بعض اخصاص اس کو جریان منی سمجھتے ہیں لیکن اصل میں یہ غدود قدامیہ کی رطوبت ہوتی ہے۔

اسباب مرض : سنگ مثانہ۔ سوزش مثانہ۔ قبض۔ پرنے۔ خراش متعہ اور خراش نائیزہ وغیرہ۔

## علاج

تھوجا۔ کلکیریا کاسب۔ اناکارڈیم۔ سی پیا۔ ہیرپلسف۔ سلیشیا۔ کونیم۔ پٹرو لیم فاسفورس اور ساپال بیٹو وغیرہ۔

ضروری ہدایات : مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے علاج کریں۔ قبض ہو تو انیما کریں۔

# جریان منی سیلان منی سپرے ٹوریا

(SPERMATORRHOEA)

(SEMINAL EMISSION)

(NOCTURNAL EMISSION)

جب بلا ارادہ نازہ سے منی خارج ہو جائے تو اس کو جریان منی کہتے ہیں۔ یہ عموماً بوقتِ شب ہوتا ہے۔ یا آلتِ تناسل کی خراش کے سبب سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔

**علاماتِ مرض :** جب قبض یا خراش نازہ یا خراش مقعد وغیرہ کے سبب یہ مرض پیدا ہو تو بول و براز کرتے وقت منی کے ایک دو قطرے خارج ہو جایا کرتے ہیں۔ جب سہلیق و کثرتِ جماع کے باعث جریان منی ہو تو ابتدا میں مریض کو کستی کاہلی اور اعضاء شکنی ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت جلن سی محسوس ہوتی ہے۔ پیشاب بکثرت اور زیادہ مرتبہ آتا ہے۔ کمزور دماغ اور پٹھے کمزور اور عام کمزوری بہت محسوس ہوتی ہے۔ مزاج چڑچڑا ہوا جاتا ہے۔ سر چکرانا ہے اور درد کرتا ہے۔ کام کاج کرنے سے دل اکتا جاتا ہے۔ پشت پر چوینٹیاں رنگتی محسوس ہوتی ہیں۔ خیالات منتشر رہتے ہیں۔ نیند حرام ہو جاتی ہے اور دماغ کمزور اور مریض کند ذہن ہو جاتا ہے چہرہ اندوگین رہتا ہے۔ اشتہا ماری جاتی ہے۔ کھانا منہم نہیں ہو سکتا۔ قبض عموماً دھیرے دھیرے رہتی ہے۔ ہاضمہ بگڑ جاتا ہے۔ شہوتِ جماع ناقص بلکہ زائل ہو جاتی ہے۔ جب مرض زیادہ عرصہ تک رہے اور بہت ترقی پکڑ جائے تو لذتِ جماع معدوم ہو جاتی ہے۔ سرعتِ انزال کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بلکہ محض مس کرنے اور بلا دخول انزال ہو جایا کرتا ہے اور بالآخر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ تھوڑی سی بھی تحریک یا پا جامہ وغیرہ کی رگڑ سے یا کسی محبوبہ و حسینہ کے دیدار سے یا محض جماع کے خیال سے بلا خیزش کچھ حظ آکر یا بلا حظ ہی منی خارج ہو جایا کرتی ہے۔ مریض ہریشان و مغموم رہتا ہے۔ مجمع میں بیٹھنے یا جلسہ وغیرہ میں شامل ہونے سے وہ پرہیز کرتا ہے۔ ہمیشہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے اور کبھی یہاں تک حالت بگڑ جاتی

ہے کہ مریض کو زندگی بے لطف معلوم ہوتی ہے اور وہ خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اگر بیمار ان بد عادات کو ترک نہ کرے اور مرض کا قرار واقعی علاج نہ کرادے تو ضعف و کمزوری یہاں تک ہو جاتی ہے کہ مریض جلد ہی راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض :** جلق یا کثرتِ مجامعت اس مرض کا بڑا بھاری سبب ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ اعضائے تناسل ایسے ذکی الحس ہو جاتے ہیں کہ ذرا سی تحریک سے منی خارج کر دیتے ہیں۔ قبض بھی بعض اوقات اس مرض کا موجب ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ پاخانہ خارج کرتے وقت زور لگانے کے باعث بعض اوقات کچھ نہ کچھ منی خارج ہو جایا کرتی ہے۔ بعض اوقات نائیزہ۔ مثانہ یا گودہ کی خراش اس مرض کا سبب ہوا کرتی ہے۔ بواسیر یا چھونوں کے سبب سے مقعد میں جو خراش ہوا کرتی ہے وہ بھی جریان منی کا موجب ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات مقوی اور گرم اشیاء مثلاً گوشت۔ پلاؤ۔ مٹھائی۔ شراب۔ قہوہ۔ چائے کا زیادہ استعمال اس مرض کو پیدا کرتا ہے۔ گندے شیعہ خیالات۔ تہذیب سے گڑے ہوئے قہقہے کہانیاں پڑھنے اور سننے یا بعض اوقات کسی حسین اور خوب صورت نازنین کو دیکھ کر اس کی رات کو خوابیں لینا یا دماغ اور نخاع میں خراش کا ہونا۔ یہ سبب اس مرض کے اسبابِ مؤدہ ہوا کرتے ہیں۔

**نوٹ :** ۱۔ جب تو انا و تندرست کنوارے اشخاص میں ایک ماہ کے عرصہ میں ایک یا دو مرتبہ منی خارج ہو جاوے تو یہ کوئی خطرناک بات نہیں سمجھی جاتی۔ لیکن جب اس کا اخراج ایک ماہ میں کئی بار ہو تو پھر یہ مرض فوری توجہ کا مستحق ہوتا کرتا ہے۔

۲۔ جب بدول خیزش کے پیشاب کرتے وقت منی پیشاب کے ہمراہ خارج ہو جاوے اور مریض کو پتہ تک بھی نہ لگے تو یہ مرض بڑا خطرناک ہوتا کرتا ہے۔ ۳۔ ابتداء میں اس مرض کا آغاز دل خوش کن خوابوں و خیزش قضیب کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور مریض کو کسی قدر خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جوں جوں مرض ترقی کرتا جاتا ہے۔ دل خوش کن احساس معدوم ہوتے جاتے ہیں اور منی بلا ارادہ خارج ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا پتہ کپڑے پر داغ

لگنے یا نگی سے چلتا ہے۔ ابتداء میں تو منہ میں دو یا تین بار اور پھر ہر شب کو بلکہ رات میں کئی مرتبہ یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ منی اپنا لگاؤ ہٹاتا ہے۔ کھو بیٹھتی ہے اور منی کے کپڑے تعداد میں کم ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مریض اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو جاتا ہے۔

اس مرض کا علاج بڑی کامیابی سے ہو سکتا ہے بشرطیکہ مریض ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرے اور وہ تمام بد عادات ترک کر دیوے۔ جن کا کہ وہ عادی ہو۔ جب اس مرض کا سبب جلتی نہ ہو تو بیشک بہت جلد ہی آرام آجایا کرتا ہے۔ جن نوجوانوں کو جلتی کی بد عادت ہو ان کے والدین اور معالجوں کو واجب ہے کہ وہ اس بد عادت کے نقصانات اپنے شاگردوں اور بچوں کے دل پر بخوبی نقش کر دیں اور ان کو بتلا دیں کہ یہ عادت کیسی زندگی کو تباہ کرنے والی ہے۔ بہت سے بچے بوجہ نادانیت اس مرض میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اور اگر آغاز میں ہی اس بد عادت کے نتائج اور بربادیوں سے ان کو آگاہ کر دیا جائے تو کئی ایک بچوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ سکتی ہیں۔

**بکس و امیکا :** خاص طور پر ان مریضوں کے لیے جو شراب کا استعمال زیادتی کے ساتھ کرتے ہوں۔ قبض ساتھ ہو۔ پاخانہ کی حاجت برقرار رہے۔ کثرت جماع کے بد نتائج۔ سر درد۔ کمزور۔ عموماً صبح ہوتے اختلام ہو جائے۔ خوراک : ۱x دن میں دو مرتبہ۔

**سی لینی ام :** خواب میں خود بخود اختلام ہو جائے۔ صبح جاگنے کے بعد سر درد پاخانہ کے بعد یا پیشاب کرنے کے بعد اخراج منی۔

**خوراک :** ۳x دن میں تین مرتبہ۔

**سٹانی سیکیریا :** دماغی کمزوری۔ پیشاب کی نالی میں خرافض جس کی وجہ سے پراسٹیٹ گلی کی رطوبت رستی رہتی ہے۔ مریض مغموم چڑچڑی طبیعت کا۔ جلتی کے با اثرات۔ حافظہ کمزور۔ لاغری۔

**خوراک :** ۵x کا ایک قطرہ صبح اور ایک قطرہ شام کو۔

**چائرس :** متواتر کئی دن تک اختلام ہو جانے سے کمزوری پیدا ہو جائے



کمزوری جو حلق یا کثرتِ جماع کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہو۔

خوراک : ۱x یا ۲x دن میں تین مرتبہ۔

نیٹرمیم مہمور: باوجود جماع کرنے کے بھی احتلام ہو جایا کرتا ہے۔ اعصابی کمزوری۔ قبض۔ مہاشرت کا محض خیال ہی منی خارج کر دے۔ کئی خون ہو لیکن خواہش متواتر رہے۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ۔

کینتھرس: جب سوزاک کی وجہ سے جریان ہو جائے۔ عضو تناسل میں خراش اور استادگی فوراً ہو جائے۔

خوراک : ۳x دن میں ۳ مرتبہ۔

کلکیریا کارب: اوائل عمر میں حلق لگانے کی خرابیاں اخراج کے بعد پسینہ آئے۔ یوں بھی پسینہ کی زیادتی۔ دماغی کمزوری ہر دفعہ ہم بستری کے بعد نمایاں طور پر معلوم ہو۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ۔

فاسفورک الیڈ: بغیر کسی قسم کی خواہش کے عضو میں استادگی واقع ہو جانا۔ جماع میں یا احتلام کے بعد کمزوری پیشاب زیادہ دودھ کے رنگ کا۔ حلق کی مزمن خرابیاں۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ۔

جاسی میم: جریان منی کے باعث سر میں درد ہو۔ چکر آویں اور بوجھل ہو۔ کمزوری بہت ہو۔ تھوڑی سی تحریک سے منی خارج ہو جائے۔ مریض زرد و اور زندگی سے بیزار ہو۔ اعضائے تناسل ڈھیلے ڈھالے ہوں اور بوقتِ شب کئی مرتبہ احتلام ہو جاتا ہو۔ حلق کے مہاشرت ہوں۔

خوراک : ۱x ڈائی لیوشن کے ۵ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

ڈیکچی ٹیلیس: سوتے میں بے اختیار بدن خواب کے احتلام ہو جاتا ہو بعدِ سخت نفاہت ہوتی ہو۔

خوراک : ۳x ٹری ٹیورین دن میں دو مرتبہ صبح و شام

**کلاڈیم** : حلق کی بدعات کے باعث آلہ تناسل پھیلا ہو گیا ہو۔ احتلام رات کو خواب کے ہمراہ یا بغیر خواب کے ہو جاتا ہو۔ جب مرض بہت ترقی یافتہ ہو اور آلہ تناسل میں خیزش نہ ہوتی ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ خواہش مجامعت کے بغیر منی خارج ہو جاتی ہو۔ آلہ تناسل ٹھنڈا ہو اور ٹھنڈے پسینہ سے تر ہوتا رہتا ہو۔

**خوراک** : ۵ کے پانچ قطرے صبح اور ۵ قطرے شام  
**ایگنس کاسٹس** : خواہش نفسانی اور خیزش دونوں ہی کم ہوں۔ آلات تناسل ٹھنڈے ہوں۔ بوڑھے مریضوں کے لیے یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے جنہوں نے اپنی زندگی کثرت عیاشی میں گزاری ہو۔ جب مرض سوزاک کے بعد جریان منی کا عارضہ ہو گیا ہو تو بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

**خوراک** : ۵ پانچ قطرے صبح کو اور پانچ قطرے شام کو۔  
**کونیم** : مریض مغموم اور چڑچڑی طبیعت کا ہو۔ جب قدرتی خواہش مجامعت کو روکنے سے احتلام کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو اور خیسے درد کرتے ہوں۔ تھوڑی سی تحریک سے جریان ہو جاتا ہو۔ تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

**خوراک** : ۳x دن میں دو مرتبہ۔  
**لائسکوپوڈیم** : بالکل نامردی ہو چکی ہو۔ خیزش بہت کم ہو۔ بالکل نہ ہوتی ہو۔ آلات تناسل ٹھنڈے اور سکڑ گئے ہوں بدوں خیزش کے منی خارج ہو جاتی ہو۔ بوڑھے کی نامردی میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔

**خوراک** : ۲۰۰ یا ۱۰۰۰ دن میں ایک مرتبہ۔  
**سپال میٹو** : ۵ اور ۱۰ یونیا سٹیوا ۵ کے دس دس قطرے اکٹھے ملا کر صبح اور اسی طرح شام کو نصف چھٹانک تازہ پانی میں ملا کر پینے سے جریان منی کا آرام آ جاتا ہے۔ یہ کئی ڈاکٹروں کا آزمودہ نسخہ ہے۔

**ڈیجیٹلس** : جریان منی و احتلام کی یہ ایک نہایت ہی مشہور دوائی ہے جب کہ حلق کی بدعات سے یہ عارضہ پیدا ہو۔ اس کے استعمال سے منی کا جریان ختم جاتا ہے اور جسم و دل جو کہ کمزور ہو چکے ہو۔ تندرست و توانا ہو جاتے ہیں۔

خوراک : ۵ کے ۱۵ سے ۲۰ قطرے صبح اور شام دو مرتبہ روزانہ۔

## امراض منی کے مریضوں کے لئے بیش قیمت ہدایات

- ۱۔ صبح طلوع آفتاب سے پہلے اٹھو اور فوراً ہی ایک گلاس پانی کا گرمیوں میں باسی اور سردیوں میں تازہ یا گرم پی لو اور باہر چلی ہو، میں جا کر رفع حاجت کرو۔ اگر موسم سخت سردی اور برسات کا ہو تو کمرے میں ہی اٹھ کر ٹہلنے لگو۔ اس طرح کرنے سے پاخانہ با فراغت آئے گا اور بوقت حاجت منی کا گزرا موقوف ہو جائے گا۔
- ۲۔ صبح جب نیند کھل جاوے تو اس کے بعد بستر پر سست بیٹے رہنا بڑا مضر ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے نظامِ عصبی دروسِ سسٹم سست پڑ کر اعضائے تناسل کی صحت میں فرق آتا جاتا ہے اور اکثر اوقات جلق وغیرہ کی بدعات پڑ جاتی ہے۔
- ۳۔ تازہ اور کھلی ہوا، دریاندی کے کنارے سبزہ زار یا باغ باغیچہ میں سیر کرنا یا ورزش کرنا نہایت مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کی سبب بھرت پلنے سے سرخ خون میں اضافہ ہوتا ہے اور صحت عامہ درست رہتی ہے اور اس لیے اعضائے تناسل کے امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔
- ۴۔ ٹھنڈے اور تازہ پانی سے روزانہ غسل کرنا اعصاب کو طاقت بخشتا ہے اور اس لیے مرضِ جربان کے روکنے میں مدد دیتا ہے۔
- ۵۔ عشقیہ ناولوں، بے ہودہ لٹریچر اور سینما بینی سے قطعی پرہیز لازم ہے۔
- ۶۔ نیک صحبت میں رہنا اور عالموں اور دانائوں کی مجلس کرنا۔ عمدہ اور اخلاقی و مذہبی کتب کا مطالعہ۔ نماز وغیرہ کا روزانہ انجام دینا۔ یہ سب باتیں بدعات سے روکے رکھتی ہیں۔ مقوی مگر سادہ غذا۔ مثلاً گھی۔ دودھ۔ لسی۔ سیب۔ انگور میٹھے پھل۔ ساگ۔ سبزی ترکاری۔ گیہوں یا کئی کی رٹی

چاول - کھیر - شلغم - گاجر وغیرہ کا استعمال کرنا مفید ہوا کرتا ہے۔ اگر قبض کی شکایت عام ہو تو کھانے کے ساتھ زیادہ سبزی کا استعمال فائدہ بخش ہوتا ہے۔

۷۔ احتلام کے پیدا کرنے میں قبض کا بہت سا حصہ ہوتا ہے۔ یعنی قبض کے باعث ۹۰ فی صدی مریضان جریان و احتلام وغیرہ امراض سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے قبض کو دور رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے بہتر تجویز یہ ہے کہ کھانے میں دودھ - تازہ پھل اور سبزی کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے۔ صبح سیر کرنا - ورزش کرنا - کھلی ہوا میں پھرنا - گھر سے باہر جا کر میدان یا کھیتوں میں پاخانہ پھرنا قبض کشاں میں مددگار ہوتے ہیں قبض کشاں گولیوں کا استعمال غیر مفید ہوا کرتا ہے اور یہ بجائے فائدہ مند ہونے کے مرض کو افاقہ دینے کی بجائے اکثر اوقات زیادہ کر دیتی ہے۔ اگر قبض کشاں گولیوں کی بجائے نکس و امیکا  $1 \times$  کے چار قطرے مریض سونے سے دو یا تین گھنٹے پہلے کھالے۔ جبکہ اس کو قبض کی شکایت ہو تو قبض کشاں میں یہ مفید پڑتا ہے۔ اگر بوقتِ ضرورت حقنہ (انیما) کے ذریعے کولن کو صاف کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ہوتا بلکہ مفید پڑتا ہے۔

۸۔ رات کو سوتے وقت نہ تو دودھ پینا چاہیے اور نہ ہی پانی پی کر سونا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سو رہنا مناسب نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس طرح معدہ پر بوجھ پڑنے سے اعصاب محرک ہو کر منی کا اخراج ہو جاتا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہ سونے سے پیشتر تین یا چار گھنٹہ کھانا کھا کر فارغ ہو جانا چاہیے اور کم از کم ایک یا دو گھنٹہ سونے سے پیشتر پانی یا دودھ پی کر فارغ ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک نہایت سادہ طریقہ اس مرض سے بچنے کا ہے۔

۹۔ جریان منی کے مریض کو لازم ہے کہ وہ کمر کے بل ہرگز نہ سوتے بلکہ ہمیشہ پہلو کے بل سوتے اور بستر مریض کا نہ تو بہت نرم ہونا چاہیے اور نہ ہی گرم کیونکہ اس طرح حرارت بڑھ جانے سے اکساہٹ ہو کر منی کا اخراج ہو جاتا ہے۔

- ۱۰۔ رات کو کھٹائی۔ وہی یا تیل کی چیزیں نہ کھانی چاہئیں۔
- ۱۱۔ ٹھنڈے پانی سے صبح اور رات دونوں وقت نہخاع اور اعضائے تناسل کو اچھی طرح سے مل کر دھونا اس مرض سے محفوظ رہنے کے لیے ایک اعلیٰ نسخہ ہے۔
- ۱۲۔ سوتے وقت پیشاب کر کے سونا چاہیے اور جب رات کو پیشاب کی حاجت ہو تو فوراً اُٹھ کر پیشاب کر لینا چاہیے تاکہ مثانہ کا بوجھ کیسٹہ منی پر پڑ کر اُکساہٹ پیدا کر کے باعث اخراج منی نہ ہو۔
- ۱۳۔ زیادہ خراب کیسوں میں بھلی کا استعمال بھی مفید ہوا کرتا ہے لیکن یہ کچھ عرصہ جاری رکھنا چاہیے۔
- ۱۴۔ چائے۔ کافی۔ کوکو اور دیگر محرک مشروبات سے پرہیز لازم ہے۔

## مُرعِتِ انزال

(PREMATURE EJACULATION)

**علاماتِ مرض :** بوقتِ جماع فوراً بعد از دخول یا بوقت دخول انزال ہو جاتا ہے۔ نیز پیش از دخول بھی صرف جماع کا خیال کرنے سے ہی منی خارج ہو جاتی ہے۔ کبھی بعد از انتشار بھی انزال ہو جاتا ہے۔ قوتِ باہ کمزور ہو جاتی ہے اور چونکہ مریض کو اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ہوتی اس لیے وہ بہت ترمندہ ہوتا ہے۔

**نوٹ :** بحالتِ صحت عام طور پر جماعت کے لیے دو یا تین منٹ یا زیادہ سے زیادہ چار یا پنج منٹ کا وقت کافی ہوتا ہے اور اس سے کم دیش غیر طبعی حالت ہوا کرتی ہے۔

**اسبابِ مرض :** حلق یعنی مشت زنی یا کثرتِ جماعت کے باعث آلاتِ تناسل کا ذکی الحس ہو جانا۔ شہوانی خیالات کا ہر وقت دل میں جاگزیں رہنا۔ سوزاک۔ سنگِ مثانہ۔ بواسیر۔ کرمِ امعاء سے مقعد میں خراش ہونا۔ خشفہ

پرمیل جہنا - عضبی کمزوری - گھونگھٹ کا لمبا ہونا - طبیعت میں وہم ہونا وغیرہ -

## علاج

- ۱- ایگنس کاسٹس ۵ کے ۵ قطرے صبح اور ۵ قطرے شام کو -
  - ۲- برائٹ کارب ۳x
  - ۳- کلاڈیم ۳x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ - یعنی صبح اور شام -
  - ۴- کاربوئیجی ۱۲x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ -
  - ۵- چائنا ۱x کے ۵ قطرے صبح - دوپہر اور شام یعنی دن میں تین مرتبہ -
  - ۶- کو بالٹم ۶x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ -
  - ۷- کونیم ۳x دن میں دو مرتبہ -
  - ۸- گریفائٹس ۶x دن میں دو مرتبہ -
  - ۹- لائیکوپوڈیم ۲۰۰ یا ۱۵۰۰ دن میں ایک مرتبہ -
  - ۱۰- اونوس موڈیم ۳x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ -
  - ۱۱- فاسفورک ایڈ ۳x صبح - دوپہر اور شام -
  - ۱۲- فاسفورس ۳x یا ۳۰ صبح اور شام -
  - ۱۳- سلینیم ۳x صبح دوپہر اور شام -
  - ۱۴- سلفر ۳x کے ۵ قطرے بوقت صبح -
  - ۱۵- زنک میلیکم ۲x دن میں دو مرتبہ یعنی صبح اور شام
- نوٹ: چند ادویات کی تشریح علامات جریان منی کے بیان میں درج کی گئی ہے - وہاں مطالعہ فرمائیں -

ضروری ہدایات: مرض کے اصل سبب کو دریافت کر کے علاج کریں  
 اگر خشفہ (سپاری) پرمیل جا ہوا ہو - یا غلفہ لمبا ہو - تو ان کا مناسب علاج کریں -  
 اگر سوزاک یا سنگِ مثانہ یا بواسیر یا کرمِ معاد میں سے کوئی عارضہ ہو تو اس کو دور کریں - اگر کثرتِ عجمعت یا جلق اس کا باعث ہو تو اس کو ترک کریں ورنہ

علاج میں جماع سے قطعی پرہیز لازم ہے۔  
غذا: مریض کو لطیف اور زود ہضم کھانی چاہیے۔

## مشت زنی۔ حلق اور اُس کے بدنتائج

(ONANISM OR MASTURBATION AND NERVOUS DEBILITY FROM SELF ABUSE)

یہ بد عادت جسم میں بد اثرات پیدا کر کے کئی ایک خوفناک امراض کا موجب ہوا کرتی ہے۔ جس سے جسم اور دل و دماغ تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عادت کسی خاص عمر کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ جو بچے بد قسمتی سے اس بد عادت کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے چہرہ کا نور اور چمک دمک کھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندر دب جاتی ہیں اور ان کے گرد نیلیوں حلقے پڑ جاتے ہیں وہ ہمیشہ اندو گین سر پیچے پھینکے ہوئے کھیل کود سے نفرت۔ ایسا معلوم پڑتا ہے۔ گویا کسی گہرے خیال میں مستغرق ہیں۔ ان کی طبیعت چرد چرخی اور سرکش ہو جاتی ہے۔ وہ ذرا سے ٹھٹھا نچول کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آہستہ آہستہ تمام اعضاء خاص کر قوائے ہاضمہ ماؤف ہو جاتے ہیں۔ زبان اور دانتوں پر فرجھی ہوئی۔ جسم نحیف اور دماغی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اگر بد قسمتی سے کوئی مرض ان پر حملہ آور ہو۔ تو اس کا حملہ عموماً نہایت شدید ہوا کرتا ہے۔ معمولی بخار بھی تپ محرقہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اگر یہ عادت سن بلوغت کے بعد بھی جاری رہے تو دل و حافظہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ خیالات متوحش ہو جاتے ہیں۔ مریض مالنخولیا کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جسم تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کا نشوونما پانا مسدود ہو جاتا ہے۔

سرور۔ معدہ پر بوجھ۔ درد قلعج۔ آبکایاں اور چھاتی میں درد۔ تمام اعضاء سست۔ یہ سب امراض آگھیرتے ہیں اور مریض کی زندگی کو تلخ کر دیتے ہیں ناک اور چہرہ پر خراشدار پھنسیاں نکل آتی ہیں یا ناک چھاتی اور رانوں پر پھپھولے آنسو وار ہوتے ہیں۔ بعض مریض کھڑا ہونے کی طاقت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ بعض میں

منی نہایت خفیف محرک سے بھی خارج ہو جاتی ہے۔ احتلام اور جریان کے ہر وقت شکار بنے رہتے ہیں۔ بعض مریضوں کا پیشاب بلا ارادہ خارج ہوتا رہتا ہے یا برعکس اس کے حبس ابول میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

مستورات میں بھی مردوں کی مانند حلق کے نتائج کچھ کم تکلیف دہ نہیں ہیں۔ جوان مستورات میں عصبی کمزوری تو اس کا اول پھل ہوا کرتا ہے۔ جس کا باعث سر درد۔ دل کی کمزوری۔ سرکش مزاج۔ اداسی۔ دنیاوی خوشیوں سے بیزاری اندوہ گین اور دل و دماغ کی کئی اقسام کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حواس خمسہ بھٹیے پڑ جاتے ہیں۔ خاص کر آنکھیں سرخ اور دھندلی ہو جاتی ہیں اور کئی اقسام کے تشنجی علامات مثلاً ہسٹیریا۔ دل دھڑکن۔ رعشہ سر کی۔ سکتہ۔ تشنج وغیرہ عصبی کمزوری کے باعث آظاہر ہوتے ہیں۔ چہرہ زرد اور تپلا۔ جلد جسم سخت خشک پھٹی ہوئی اور پھنسیوں سے پڑے ہوئے پیلے اور دانت خراب ہو جاتے ہیں اور اس نامراد عادت کا آخری نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ یا تو رحم سخت ہو جاتا ہے اور یا اس میں سرطان پھوٹا پیدا ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض:** سپاری (خشخ) پر میل جہنا۔ سنگِ شانہ۔ گھونگھٹ کا لمبا یا تنگ ہونا۔ کرم امعاء بعض عصبی امراض۔ بچے کو سلانے کے لیے اس کی پیشاب کی جگہ کو ہلاتے رہنا۔ نوجوانوں میں بڑی صحبت۔ گندے اور عاشقانہ افسانے و قصے اور فحش ناول پڑھنا یا سننا۔ تھپڑ ورنڈی کا ناچ دیکھنا۔ لغو شہوانی خیالات۔ جوانی میں تجرد اور کثرتِ شہوت مذکورہ بالا اسباب سے عضو مخصوص میں خراش ہو کر بد عادت پڑ جاتی ہے۔

## علاج

حلق کے بد نتائج یا موقع اور مناسب ادویات کے دینے سے اور مریض کے دل پر اخلاقی اثر پڑنے سے بہت کچھ دور اور ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آب و ہوا اور منظر کی تبدیلی۔ دل و جسم کی مصروفیت۔ ٹھنڈے پانی سے غسل۔ یہ سب ضروری ہیں۔ شادی بھی اکثر درستی کا موجب ثابت ہوتی ہے۔



اس بدعات کی طرف سے طبیعت کے میلان کو روکنے کے لیے سلفر ایک نہایت ہی کارآمد دوائی ہے۔ اس کی خوراک روزانہ استعمال کوئی چالیس اور ایک ہفتہ کے بعد کلکیر یا استعمال کرنا چاہیے۔

خوراک: ۳x ڈائی یوشن کے پانچ قطرے ایک چھٹانک پانی میں بوقت صبح استعمال کرنے چاہئیں۔

نکس و امیکا: یہ ایک نہایت ضروری دوائی ہے۔ جب کہ قوائے ہاضمہ میں نقص واقع ہوا ہو۔ خاص کر دن کا کھانا کھانے کے بعد بے چینی۔ جی ملانا۔ اعضا شکنی ہو۔ جسم کی کمزوری ہو۔ قزیب کی بار بار خیزش اور منی کا اخراج ہو۔ خاص کر بوقت صبح قزیب ڈھیلا پڑ جائے۔ ٹانگوں میں سردی اور کمزوری محسوس ہو اور مجامعت کی خواہش زیادہ ہو۔

خوراک: ۱x ڈائی یوشن کے ۳ قطرے ایک چھٹانک پانی میں نہیں دو مرتبہ۔ چائنا: جب مریض اس بدعات کا بہت عرصہ تک عادی بنا رہا ہو یا کئی روز متواتر اس نامراد عادت میں مبتلا رہا ہو تو یہ دوائی کمزوری اور سستی کو دور کر دیتی ہے۔ خاص کر جب کہ خیالات بکھرے ہوئے ہوں۔ کسی چیز کی طرف رجحان نہ ہو۔ دل کمزور ہو۔ فیکر و انگیر ہو۔ نیند خراب۔ بھوک میں کمی۔ معدہ میں بوجھ اور سردی کا احساس ہو۔ نفخ کی زیادتی۔ پاخانہ تپلا۔ بزرگ سفید۔ خاص کر باہم شدہ غذا خارج ہو۔ جسم سرد۔ نبض چھوٹی نرم اور تیز۔

خوراک: ۱x ڈائی یوشن کے ۵ قطرے دن میں چار مرتبہ۔

فاسفورس: جب کہ مریض نہایت نحیف اور امراض سینہ میں مبتلا ہو۔ سر بھی زیر اثر ہو۔ قوت حافظہ کمزور ہو یا بالکل زائل۔ دماغ اور کئی حصہ جسم میں نبض کی تپکن کا احساس۔ آنکھیں سرخ اور دبی ہوئیں۔ قوت سانیہ اور بنیائی کمزور۔ استہایا تو نملدو یا بہت زیادہ۔ کھانا کھانے کے بعد متلی اور آکساہٹ۔ بدوں درد اسہال۔ سینہ میں بکثرت درد۔ کھانسی اور دل کی دھڑکن ساتھ یہ دوائی بہت مفید پڑتی ہے۔ مستوراً میں دوجیا سیلان الرحم میں جبکہ نیچے کی جانب بوجھ پڑا ہوا ہو۔

خوراک: ۶x ڈائی یوشن کے پانچ قطرے نصف چھٹانک پانی میں دو مرتبہ

روزانہ۔  
کلیر یا کارب : جب کہ دل نہایت کمزور۔ مریض نہایت ذکی الحس ہو۔ تھوڑا کام کرنے سے بھی تھکاوٹ پیدا ہو۔ مختلف اعضاء کی بے قاعدگی اور بیماری کا احساس ہو۔ سر میں جکڑ۔ تھوڑی سوچ بچار کرنے سے سر درد پیدا ہو جائے۔ سوچ بچار مشکل ہو۔ سر کے بال گرتے جاویں۔ کانوں سے پیپ بہے۔ شنوائی مشکل۔ ناک سے خون جاری ہو۔ چہرہ خراشدا پھنسیوں سے پڑے ہو۔ منہ کا ذائقہ خراب ہو۔ بھوک جاتی رہے۔ پیاس متواتر ہو۔ قبض یا خاد سخت اور تھوڑا۔ بعض اوقات ایسا سفید کہ جیسے مٹی۔ نفخ بہت ہو۔ دودھیا پشاب بار بار آوے۔ مجامعت کی خواہش میں کمی۔ حیض پیش از وقت اور مقدار میں زیادہ۔ اکثر اس کے ہمراہ سیلان رحم۔ پاؤں میں سوجن۔ ٹھنڈ بڑی لگے۔ کھانسی اور بلغم زیادہ ہو اور دل کی دھڑکن شدید ہو۔

خوراک : ۶ کے ۶ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

پلسٹلا : یہ مستورات کے لیے خاص طور پر مفید ہے۔ جبکہ عادت بد کے باعث لیسکوریہ (رحم سے سفید رطوبت آنا) یا ہسٹریکے امراض پیدا ہو جائیں۔ لیسکوریہ عموماً دودھ کی مانند سفید اور ہلکا درو کے آتا ہو۔ کمر میں درد ہو۔ حیض عموماً بکثرت بزرگ سیاہ۔ پیٹ میں تشنجی دردی۔ مجامعت کی خواہش پر بل اور دردی ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ زچگی کے وقت میں ہوا کرتی ہیں۔

خوراک : ۱ کے ۱۰ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

ہما میلس : اخراج منی بہت ہو۔ پہلے اکساہٹ ہو۔ بعد میں نامردی خصلوں میں درد عصبی۔ فوراً ٹھنڈا اور سپینہ سے تر بتر۔ مذکورہ بالا علامات کے ہمراہ مریض غمگین اور اندوگین رہتا ہو۔

خوراک : ۱۰ ڈائی یوشن کے تین قطرے دن میں تین مرتبہ۔

ایونیا سلٹوا : ۵ کے ۵ قطرے صبح اور ۵ قطرے شام کو نصف چھٹانک گرم پانی میں ڈال کر پینے سے اعصاب میں طاقت آتی ہے۔

اور می گینیم میجوریا : بوجہ کثرت شہوانی خیالات، عضو تناسل میں اکساہٹ رہتی ہو۔ حلق مارنے رشت زنی کی خواہش ہر وقت رہتی ہو۔ مریض تنہائی پسند کرتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد ۔

بفو : عضو تناسل کو چھونے کی ہر وقت خواہش رہتی ہو۔ مرض تنہائی پسند کرتا ہو۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹے کے بعد۔

سائنس : کرم امعا کی وجہ سے خرافش رہتی ہو۔ خیالات دل میں جاگزیں رہتے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

شافی سیکیریا : ۵ ایک قطرہ صبح اور ایک شام کو مفصل تشریح علامات دکھو جریان منی کے بیان میں )۔

اناکارڈیم : مریض کو اپنے اوپر بھی بھروسہ نہ رہا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نیزنڈیم میور۔ کالی برومیٹم۔ ایکٹس کاسٹس۔ بلیس۔ کلاڈیم۔ ٹھایا سکوریا۔ جلسی میم۔ گریفائیٹس۔ گرے ٹیم۔ سیلکس نکرا۔ تھوجا۔ اسٹی لاگو اور زکیم وغیرہ وغیرہ ادویات بھی کام آتی ہیں۔

## خارجی یا مقامی علاج

بعض معالج کینتھرائڈس کا پستر قصبہ پر لگاتے ہیں۔ اس کے لگانے سے چند گھنٹوں کے بعد عضو تناسل پر آبلہ پڑ جاتا ہے اور اسے سوئی سے چھید کر پانی نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ اگر پستر لگانا ہو۔ تو صرف قصبہ کے اوپر ہی لگانا چاہیے۔ نیچے ہرگز نہیں لگانا چاہیے۔ رات کو پستر لگا کر اوپر اس کے تھوڑی سی روئی باندھ دی۔ صبح آبلہ نمودار ہونے پر اسے سوئی سے چھید کر پانی نکال دیں اور بعد اس پر دو تین مار گھٹن لگائیں۔ بعض کیسوں میں بجلی لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

## ضروری ہدایات

مرض کے اصل سبب کو دریافت کر کے اس کو دور کریں۔ سنگِ مثانہ۔ یا کرمِ معاً

ہوں۔ تو اُن کا مناسب علاج کریں۔

چھوٹے بچے کا اگر گھونگھٹ لمبا ہو تو اس کو کٹوا دیں۔ سپاری (حشفہ) کو صاف ستھرا رکھیں۔ نوجوانوں کو اس عادت بد کے تباہ کن نتائج اور طبعی مہزاسے پورے طور پر باخبر کر دیں۔ نوجوانوں کو اکیلا نہیں سونا چاہیئے۔ والد یا کسی بزرگ کے نزدیک سونا چاہیئے اور والدین و بزرگوں کا یہ فرض اولین ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں کی پوری نگرانی کریں۔ اُن کو بڑی صحبت سے بچائیں۔ قصے کہانیاں یا فحش ناول، سینما وغیرہ سے دور رکھیں۔ بدقسمتی سے طالب علموں میں یہ بد عادت بہت ترقی یافتہ ہے۔ بورڈنگ ہاؤس میں اس امر کا پورا خیال رکھنا لازم ہے۔ کہ ایک کمرہ میں دو طالب علم نہ سوئیں بلکہ دو سے زیادہ سوئیں۔

خیالات کی پاکیزگی کے لیے نیک لوگوں سے صحبت رکھنا۔ نماز پڑھنا، قرآن شریف اور دیگر مذہبی کتب کا مطالعہ۔ وعظ و نصیحت سُننا چاہیئے۔ سکولوں میں اخلاقی تعلیم کا خاص انتظام ہونا چاہیئے۔ زیادہ محرک اغذیہ و اثر بہ مثلاً کباب۔ کوفتہ۔ انڈس۔ گوشت۔ پلاؤ۔ چائے۔ قہوہ۔ شراب وغیرہ سے پرہیز لازم ہے۔ زیادہ مصالحہ و اشیاء مثلاً پکوڑے۔ چٹنی وغیرہ بھی نہ کھانے چاہئیں۔ غذا سادی اور سبزی ترکاری زیادہ استعمال کرنی چاہیئے۔ ہانمہ کو درست رکھیں اور قبض نہ ہونے دیں۔ روزانہ سر و پانی سے غسل کرنا اور تازہ ہوا میں سیر کرنا مفید ہے۔

## نامردی۔ ضعفِ باہ۔ کمزوریِ باہ

(IMPOTENCE SEXUAL DEBILITY)

اس مرض میں قوتِ مجامعت یا تو بالکل کم ہو جاتی ہے یا بالکل ہی نائل

۱۔ بچے کی ختنہ کرا دینے سے وہ تمام عمر اس قسم کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں میں یہ بیماریاں غیر مسلموں کی نسبت بہت کم ہوتی ہیں۔ یہودی بھی اپنے مذہب کی کو سے ختنہ کرا نے پر مجبور ہیں۔ بقایا غیر مسلم صرف بیماری کے علاج کے طور پر ہی گھونگھٹ کٹواتے ہیں اور یہی ختنہ ہے۔

ہو جاتی ہے۔ جماع کی طرف رغبت ہوتی ہی نہیں۔ یا توڑا سا انتشار ہو کر طبیعت رہ جاتی ہے اور مریض کے خیالات بہت منتشر رہتے ہیں اور وہ پست ہمت ہوتا ہے۔

**اسباب مرض:** عضو تناسل یا خضیوں میں کوئی پیدائشی نقص ہونا۔ کثرتِ مباشرت۔ مشت زنی۔ کثرتِ جریان منی و احتلام۔ بعض امراض زہر آشک و سوزاک۔ قلتِ منی۔ تفکرات۔ زیادہ دماغی محنت و سوچ بچار کرنا۔ غم۔ و ہم۔ مثاہ۔ جسمانی کمزوری۔ مدک یا چرس یا بھنگ یا شراب پینا اور افیون کھانا وغیرہ۔

## علاج

**ایگنس کاسٹس:** اس مرض کی یہ ایک مشہور دوائی ہے۔ آلاتِ تناسل دھیلے ڈھالے پیلے اور ٹھنڈے ہوں اور خواہش شہوانی معدوم ہو۔ جب بار بار سوزاک کا مرض ہو جانے کے باعث نامروی ہو جائے۔ تو یہ دوائی اکیر کا حکم رکھتی ہے۔

**خوراک:** ۵ کے ۵ قطرے صبح اور ۵ قطرے شام کو نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر۔

**ایونیا سٹیوا:** نامروی کی یہ ایک خاص دوائی ہے جب کہ یہ مرض جلق کی بدعات یا کثرتِ مجامعت کے باعث پیدا ہوا ہو۔ نیز جب بوجھ ٹکڑ و غم اور تشویش و رنج یا کثرتِ مطالعہ کے اعصاب کمزور ہو چکے ہوں تو یہ دوائی نہایت سودمند ہوتی ہے۔

**خوراک:** مد ٹیکرہ کے ۵ قطرے صبح اور ۵ قطرے رات کو سوتے وقت نصف چھٹانک گرم پانی میں ڈال کر۔

**ڈیمیانہ:** نامروی کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ خواہ یہ نامروی کثرتِ مجامعت یا کثرتِ جریان منی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو۔ خواہ سوزاک یا آشک کے باعث اور خواہ اس کا اور ہی کوئی سبب ہو۔

خوراک : ۵ کے ۳۰ قطرے صبح اور تیس قطرے شام کو نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر۔

سٹانی سیگمہ یا : جب کہ مریض کثرتِ مجامعت یا مشت زنی کا شکار رہ چکا ہو۔ قوتِ جماع کمزور ہو چکی ہو۔ لیکن شہوتِ خیالات ہر وقت دل میں جاگزیں رہتے ہوں۔ بہت ہمت اور مغموں رہتا ہو اور صحت سے گہرے کرتا ہو۔

خوراک : ۵ کے ۵ قطرے شام کو تازہ پانی میں ڈال کر۔

سیلکس ننگرا : بوجہِ جلق جب جریانِ منی بکثرت ہو اور قوتِ مردی کمزور ہو چکی ہو۔ جسم و جان بہت کمزور ہو چکے ہوں تو یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۵ کے ۲۰ سے ۳۰ قطرے صبح و شام۔

سایپال میٹو : (سابل سر یو لانا) نامردی کی یہ ایک نہایت مؤثر دوائی ہے۔ جبکہ نوجوانوں کو بوجہِ جلق یا کثرتِ مجامعت یہ عارضہ ہو گیا ہو۔ قوتِ باہ کی کمزوری کے باعث جبکہ مجامعت سے نفرت پیدا ہو چکی ہو اور اعصاب کمزور پڑ گئے ہوں تو یہ نہایت سودمند ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے اعصاب میں طاقت آتی ہے اور قوتِ باہ بڑھ جاتی ہے۔ نیز جب قوتِ باہ کے زائل ہونے کے ساتھ ہی خبیثے بھی سکرپ گئے ہوں یا انزال کے وقت بہت درد ہوتا ہے تو یہ دوائی اکیس کا حکم رکھتی ہے۔

خوراک : ۵ کے ۱۵ قطرے صبح اور ۱۵ قطرے شام کو نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر۔

نوٹ : سایپال میٹو اور سیلکس ننگرا کو اکٹھا استعمال کرنے سے نامردی دور ہوتی ہے۔ دس دس قطرے ہر ایک دوائی کے دن میں دو مرتبہ۔

لائیکو پوڈیم : پوڈھے مریضوں کے لیے یہ دوائی بہت سودمند ہوتی ہے۔ جبکہ قوتِ مردی زائل ہو چکی ہو یا خواہشِ مجامعت بہت کم رہ گئی ہو۔

خوراک : ۲۰۰ یا ۱۵۰۰ دن میں ایک مرتبہ۔

سیلینیم : خواہشِ مجامعت بہت ہو اور خیالات شہوتی زوروں پر ہوں۔

لیکن عملی طور پر نامردی ہو۔ قوتِ باہ کمزور ہو۔ منی اور غدہ قدامیہ کا رس قطرہ  
قطرہ گرتا رہتا ہو۔ مجامعت کے بعد مریض بہت کمزوری محسوس کرتا ہو اور بد مزاج  
ہو جاتا ہو۔ دخول کے وقت قصب و صیلا پڑ جاتا ہو۔ سرعتِ انزال ہو۔  
قبض ہو۔ دھوپ ناقابلِ برداشت ہو۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ۔  
آرنیکا : چوٹ یا صدمہ کی وجہ سے نامردی کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ یا  
قوتِ باہ کمزور ہو گئی ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
ہائی پریکٹیم : نخاع پر چوٹ آنے کی وجہ سے نقص پیدا ہو گیا ہو۔  
خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورک ایسڈ : نامردی کی یہ بھی ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے جبکہ عضو  
تناسل نہایت ذکی الحس ہو اور انتشار کے قبل یا فوراً ہی انزال ہو جاتا ہو۔ کثرت  
مجامعت اور حلق کے بد نتائج کے لیے یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ہے۔ نقابت  
بدرجہ کمال ہو۔

خوراک : ۱x کے دو قطرے ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔  
کالی برومیٹم : نامردی ہو اور خصبے زائل ہو چکے ہوں۔  
خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : نقصِ ہاضمہ۔ قبض ہو اور عام عصبی کمزوری ہو۔ مزاج  
چڑچڑا ہو اور ساتھ ہی نامردی ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
کلاڈیم : نامردی میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ قصب و صیلا ڈھالا  
ہو۔ بوسہ لینے یا پیار کرنے سے بھی قصب میں خیر من نہ آتی ہو اور بوقتِ مجامعت  
نہ شہوت ہوتی ہو اور نہ انزال ہوتا ہو۔

خوراک : ۵ کے ۵ قطرے صبح اور ۵ قطرے شام کو۔  
علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے۔

- ۱۔ جب کہ انتشار نہ ہوتا ہو۔ کونیم۔ کالی آیو ڈاٹمڈ۔
  - ۲۔ قضیب ٹھنڈا اور ڈھیلا ڈھالا ہو۔ جلسی میم۔ ہیر سلف۔ لائیکو پوڈیم۔ سلیشیا۔ سلفر۔
  - ۳۔ فوٹے ٹھنڈے ہوں۔ کیپ سی کم وغیرہ۔
- نیز اسٹی لاگو ۲x، سینگونیریا، بغور اور آر جینٹم نائٹریکم ادویات بھی کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

جو ہدایات جبریاں منی کے بیان میں دی گئی ہیں اُن کا بغور مطالعہ کر کے ان پر عمل کریں۔ ہر قسم کی منشیات سے پرہیز لازم ہے۔

---



# باب پنجم

## عورتوں کے خاص امراض

### شرمگاہ کی خارش

(PRURITIS VULVA)

اس مرض میں شرمگاہ میں خارش بہت ہوتی ہے اور رات کے وقت خارش زیادہ ہوا کرتی ہے۔ کبھی اس مرض کے باعث مجامعت کی خواہش بہت بڑھ جاتی ہے۔

**اسباب مرض :** امراض رحم یا خصیتہ التجم۔ سوزش اندام نہانی نقص حیض۔ گندگی اور ناپاکیزگی۔ قبض۔ بواسیر۔ ذیابیطس۔ چھوٹے یا گرم معارجوں وغیرہ۔

### علاج

ایمبراگوشیا : شرمگاہ میں خارش ہو اور ساتھ ہی مقعد میں بھی خارش ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پوریکس : اس مرض میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے۔ اندھونی

اورد خارجی دونوں طریقوں پر استعمال کی جاتی ہے -

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ -

کریوزوٹ : خارش شرمگاہ میں اور ساتھ ہی بدبو دار اور جلن دار سیلان الرحم (سفید رطوبت) خارج ہوتی ہو -

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

گریفائٹس : اندام نہانی میں زخم یا پھالے ہوئے خارش سخت ہوتی ہو - یہ دوائی اندر بھی دی جاتی ہے اور خارجی طور پر اندام نہانی کو اس سے دھوتے ہیں -

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد -

پلائمینا : خارش شرمگاہ کے ہمراہ رحم یا خصیۃ الرحم کے امراض بھی شامل ہوں -

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ -

سی پیا : ورم شرمگاہ ہو - لیکوریا کی شکایت ہو اور ماؤف، مقامات پھل گئے ہوں - بوجھ نیچے کی جانب پڑ گیا ہو -

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ -

کلاڈیم : مستورات کی شرمگاہ و اندام نہانی کی خارش کے لیے یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے - جبکہ یہ خارش آیام حمل میں ہوتی ہو اور گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہو - نیز جبکہ اندام نہانی میں خارش ہونے کے باعث جلق کی بد عادت پڑ گئی ہو - تو یہ دوائی نفع کرتی ہے -

خوراک : ۵ کے ۵ قطرے صبح اور پانچ قطرے شام کو -

نیز کونیم - سرکیورس اور ریڈیم ادویات بھی کام آتی ہیں -

## ضروری ہدایات

اندام نہانی کو پہلے گرم پانی اور صابن سے دھونا چاہیے اور پھر بورکس

۳۰ گرین اور پانی ایک اونس یا کاربالک ایٹ دو حصے اور پانی ۹۸ حصے

کا روشن بنا کر اس میں صاف پیرے کا ٹکڑا توڑ کے دن میں کئی مرتبہ اندام نہانی میں رکھنا چاہیے۔

کار بالک صابن اور گرم پانی سے دھونا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ بپ بائوڈ (کوہے) تک گرم پانی میں بیٹھنا، دن میں کئی مرتبہ کرنا بہت مفید ہوتا ہے اور اس تکلیف دہ مرض کو رفع کرتا ہے۔ مریض کو غذا سادہ اور ہلکی دینی چاہیے۔ چائے، قہوہ، گوشت اور مصالحہ دار اغذیہ سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ قبض نہیں ہونے دینی چاہیے۔

## شرمگاہ کی سوچن۔ ورم الفرج

### اندام نہانی کی سوچن

(VAGINITIS VULVITIS)

اس مرض میں شرمگاہ سُرخ اور متورم اور دردناک ہوتی ہے۔ کبھی سوزش سوراخ بول میں ہوتی ہے اور پیشاب کرتے وقت سخت درد ہوتا ہے۔ ورم بڑھ جائے تو پیپ پڑ جاتی ہے۔ اندام نہانی کی سوچن میں پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ درد سخت ہوتا ہے۔ چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے اگر مرض شدید ہو تو بخار بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض:** گندہ و کثیف رہنا۔ پیٹ کے کرم۔ سردی لگنا۔ جسمانی کمزوری یہ سب اسباب چھوٹی لڑکیوں میں ہوتے ہیں۔ لیکن جوان مستورات میں سوزش یا خارش اندام نہانی میں مرض لیکوریا (سیلان الرحم) سوزاک۔ ذیابیطس۔ تقطیر البول وغیرہ اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں۔ نیز اندام نہانی کی سوچن کبھی کثرتِ مجامعت اور کثرتِ حیض اور چوٹ و زخم کے باعث بھی ہو جاتی ہے وغیرہ۔

۱۔ شرمگاہ سے مراد بہائے اندام نہانی اور ان کا درمیانی سوراخ ہے۔ اندام نہانی سے مراد وہ نالی ہے جو کہ فرج سے لیکر رحم کی گود تک جاتی ہے اور انگریزی میں اس کو وائنا کہتے ہیں

## علاج

ایکونائٹ - ایپس - بیلادونا - آرنیکا - کینتھرس - کلکیریا کارب - کالین سونیا -  
ہیلو نائزر - ہائیڈراسٹس - کرپوزوٹ - مرکبوریس کار - رشاکس - سی پیا اور تھو جا ادویات  
بھی کام آتی ہیں -

## ضروری ہدایات

گرم پانی میں کو لہے تک مرصیہ کو ٹھلانا چاہیے - اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے -  
مقام ماؤف کو نرم لیڈ لوشن سے دھونا چاہیے - قبض ہو تو بذریعہ پچکاری دور کریں  
غذائلی اور زودام دیویں -

## اندام نہانی کی امیٹھن

(VAGINISMUS)

اس مرض میں اندام نہانی کے عضلات کچھ کر سخت ہو جایا کرتے ہیں اور شرمگاہ  
ایسی ذکی الجھن ہو جاتی ہے کہ بوقت مباشرت سخت تکلیف ہوتی ہے بلکہ مجامعت  
محال ہو جاتی ہے کیونکہ خفیف سی چھوت سے بھی عضلات میں امیٹھن ہو کر وہ سکڑ  
جاتے ہیں -

اسباب مرض : اندام نہانی میں سوزش - یازخم - کبھی نئی دلہنیں بغیر  
کسی ظاہری سبب کے اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں -

## علاج

پلم بم : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
الیشیا : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
البیومن : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

کو پریم میٹلیکم : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
ہیما میلن : ۵ کے پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
سٹانی سیگریا : ۳۰x دن میں دو مرتبہ -

## مقامی علاج

ہیما میلن وشن، ہیما میلن مدرٹکچر ایک ڈرام - پانی چھ اونس) میں صاف کپڑے کا  
ٹکڑا بھگو کر سوتے وقت اندام نہانی میں رکھنا چاہیے اور صبح کو نکال لینا چاہیے۔

## ضروری ہدایات

بجاعت سے قطعی پرہیز لازم ہے اور مریضہ کو چند روز تک پورا آرام  
دینا چاہیے۔

## حیض کا بند ہو جانا۔ احتباس الطمث

(AMENORRHOEA)

اس مرض میں یا تو شروع سے ہی حیض نہیں آتا۔ یا کچھ مدت آکر بند ہو  
جاتا ہے۔

اسباب مرض : ایام حیض میں بارش میں بھیگنا یا سردی لگنا۔ سیلانِ رحم  
(لیکوریہ) یعنی سفید رطوبت کا آنا۔ بعض امراض مثلاً سل یا خنازیرہ یا امراضِ جگر یا  
گروہ وغیرہ کا ہونا۔ مریضہ میں خون کا کم ہونا۔ خستہ الرحم میں سوزش۔ رحم یا خستہ الرحم  
میں پیدائشی نقص۔ مریضہ کا موٹا تازہ اور دموی مزاج کا ہونا۔

## علاج

پسٹلا : ہومیو پیتھک علاج میں جس دوائی کا سب سے پہلے خیال آتا  
ہے وہ پسٹلا ہے۔ یہ دوائی اس وقت منظر ہوتی ہے۔ جب کہ خونِ حیض

رُک رُک کر بہتا ہو۔ یا جبکہ پاؤں بھگونے کے باعث حیض رُک گیا ہو۔ یا جبکہ بھس کی ماری ہوئی لڑکیوں کو ابتدا میں حیض وقت پر جاری نہ ہوا ہو بلکہ دیر سے ظاہر ہوا ہو تو دوائی سود مند ہوا کرتی ہے۔ جب حیض کا آنا پاؤں بھگنے کے باعث رُک گیا ہو۔ تو ڈلکا مارا دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ اس وقت ڈلکا مارا اور پٹلا میں تمیز لازمی ہوا کرتی ہے۔ اگر مریضہ کی طبیعت پٹلا کی ہے تو پٹلا دوائی مفید ثابت ہوگی وگرنہ ڈلکا مارا۔ پٹلا کی مریضہ ورزش کرنے سے قنفر ہوتی ہے۔ کمی اشتہا کی شاکہ اور ترشیات کی خواہش کرتی ہے۔ اور اس پر جھٹ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ بھس کے ہمراہ جب جس حیض کا عارضہ ہو تو سینیٹیو دوائی مدر شکپر میں مفید ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۱x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

کلکیر یا کارب : یہ دوائی بھی پٹلا کے جس حیض میں اس وقت کام آتی ہے جب کہ ابتداء میں حیض کے ظاہر ہونے میں دیر واقع ہو رہی ہو اور ساتھ ہی سر اور سینہ میں اجتماع خون ہو۔ جس کے باعث پھیپھڑوں میں شکایات پیدا ہو گئی ہوں۔ موٹی خزانہیری مزاج والی خوبصورت لڑکیوں میں یہ دوائی خاص طور پر منظر ہوتی ہے۔ جن کو سینہ باسانی آ جاتا ہو اور معدہ میں تڑنشی کی شکایت رہتی ہو۔ جو مستورات خزانہیری مزاج کی ہوں یا پھیپھڑوں کے عوارض میں مبتلا ہوں۔ ایسی مستورات کے جس حیض میں اگر دل کی دھڑکن ساتھ ہو اوپر چڑھتے وقت کوتاہ دمی ہو جائے اور پاؤں تر اور ٹھنڈے ہوں تو یہ کلکیر یا کارب کی مزید علامات ہوا کرتی ہیں۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ۔

گلو نامین : سر میں تپکن بہت ہو اور پیشاب میں البیومن بہت خارج ہوتی ہو جب یہ دوائی منظر ہو تو فوراً اپنا اثر دکھلاتی ہے۔

خوراک : ۱x یا ۲x دن میں دو مرتبہ۔

فرم میٹیلیم : ابتداء میں اگر حیض دیر کر کے ظاہر ہوں اور ساتھ ہی نقاہت۔ سستی۔ دل دھڑکن اور ٹخنوں کے پاس سوجن ہو تو یہ دوائی منظر ہوتی ہے۔ کمزور بھسی مستورات جن کے چہرے تھمتاتے جاتے ہوں یا زرد رنگ

والی جن کی آنکھوں کے گرد نیلے حلقے پڑے ہوئے ہوں۔ ایسی مستورات کے لیے یہ دوائی مفید ہوتی ہے جن مریضوں کو کوئین زیادہ مقدار میں کھلائی جا چکی ہو۔ ان کو یہ دوائی ضرور دینی چاہیے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

سیپیا : جن مستورات کی جلد جسم نرم اور رنگ سیاہ ہو اور لقاحت و کمزوری بہت ہو۔ ان کے لیے یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

برائی ادنیا : جب بجائے حیض کے ناک سے نکمیر چھوٹ نکلے اور ساتھ ہی اس کے آیام حیض میں خشک کھانسی سخت قبض۔ زیادتی پیاس اور جوڑوں میں درد ہو۔ ہر ایک تکلیف حرکت کی وجہ سے زیادہ ہو جاتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : نازک مزاج پتلی۔ لمبی اور دہلی رطکیاں۔ رنگ سفیدی مائل جن کا رجحان تپ و ق کی طرف ہو اور بجائے حیض کے حلق سے خون آتا ہو۔ ان کے لیے یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

گریفٹھائٹس : عورتیں جو موٹی اور فربہ ہوں۔ حیض کبھی کبھی ظاہر ہو اور حیض کی بجائے زرد رنگ کا پانی نکلے۔ جسم پر پھنسیاں ہوں جن سے لیس وار رطوبت نکلتی ہو اور خارش بھی۔

خوراک : ۶x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ۔

سمی سی فیوگا : ڈاکٹر کو پروٹ اس مرض میں اس دوائی کے بہت ملاح ہیں۔ جب کسی خاص دوائی کی علامات منظر نہ ہوں تو یہ دوائی ضرور دینی چاہیے۔ عصبی مزاج والی مستورات جن کو وجع المفاصل کی شکایت رہتی ہو۔ ان کے لیے یہ دوائی خصوصاً مفید ہوتی ہے۔

خوراک : مدرنکچر کے پانچ سے لیکر تیس قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : جب سردی وغیرہ کی وجہ حیض کا آنا بند ہو گیا ہو تو

مقام رحم پر سینک کریں یا مریضہ کو گرم پانی میں تا بہ کمر بٹھلائیں۔ گرم گرم دودھ پلائیں  
 کئی خون کی وجہ سے حیض کا آنا بند ہو گیا ہو۔ یعنی مریضہ ضعیف و نحیف ہو۔ تو اسے  
 مقوی اغذیہ دیں۔ صاف اور کھلی ہوا میں رکھیں اور اسے رنج و غم سے آزاد رکھیں  
 اور نیز چائنا۔ فیرم فاس۔ ہیلو نائٹز اور نیٹرم میور وغیرہ ادویات دیں۔  
 مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو رفع کریں۔ قبض کو دور کریں  
 قبض کشا ادویات کے ذریعہ قبض کشائی ہر موقعہ پر درست نہیں ہوا کرتی بلکہ غذا  
 کو باقاعدہ کریں۔ میوہ جات بہت استعمال کرائیں۔ موٹے آٹے کی روٹی دیں۔  
 اور ورزش کرائیں۔ ان ذرائع سے قبض کشائی ہو جاوے گی۔

## حیض کا تکلیف اور درد سے آنا

(DYSMENORRHOEA)

اس مرض میں خونِ حیض تھوڑی مقدار میں اور تکلیف کے ساتھ خارج ہوتا  
 ہے۔ کبھی درد اتنا سخت ہوتا ہے کہ مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔

### اقسامِ مرض

#### ۱۔ اجتماعِ خون یا ورم کے باعث حیض کا تکلیف سے آنا

اس مرض میں رحم میں اجتماعِ خون یا ورم کی وجہ سے حیض دقت سے آیا کرتا  
 ہے۔ یہ حالت اکثر موٹی تانہ زی اور دموی مزاج کی مستورات میں پائی جاتی ہے  
 جو کہ مرغن اور مجرب اغذیہ بہت کھاتی ہوں۔

#### ۲۔ عصبی کمزوری سے حیض کا تکلیف سے آنا

یہ علامات کمزور اور لاغر مستورات میں پائی جاتی ہیں۔ عرصہ تک دودھ پلانے یا  
 اسہال کے مرض میں مبتلا رہنے یا دیگر وجوہات سے مریضہ کمزور ہو جاتی ہے۔



یہ بیماری اکثر نازک مزاج اور کمزور جسم والی لڑکیوں میں پائی جاتی ہے۔ اس مرض میں خون تھوڑا تھوڑا اور تشنجی درد کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ گرمی سے درد میں کمی سردی سے زیادتی ہوتی ہے۔

### ۳۔ تشنج سے حیض کا تکلیف سے آنا۔

اس بیماری میں رحم میں تشنج ہونے کی وجہ سے حیض تکلیف سے آتا ہے۔ نازک اندام مستورات اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ بد ہضمی۔ عصبی اگساہٹ وغیرہ بھی اس کے اسباب ہیں۔ کمر اور شکم کے نچلے حصہ میں مریضہ کو تکلیف بہت رہا کرتی ہے۔

### ۴۔ رکاوٹ سے حیض کا تکلیف سے آنا

اس بیماری میں اندام نہانی یا رحم میں کسی قسم کی رکاوٹ ہونے کے باعث حیض تکلیف سے آتا ہے۔ یہ مرض اکثر زیادہ پایا جاتا ہے۔ درم یا رسولی وغیرہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ یا رحم پیچھے کی طرف مائل جاتا ہے اور رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔

**علامات مرض :** مقام رحم میں سخت درد ہوتا ہے اور گرائی و بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ درد ٹھیر ٹھیر کر ہوتا ہے اور کمر۔ جنگامہ۔ پیڑ اور بعض اوقات ٹانگوں تک جاتا ہے۔ سردی۔ رخسارے سرخ۔ قبض تیز۔ دل دھڑکن اور شکم میں کاٹنے والی اور دبانے والی دردی ہوتی ہوں۔ درد بدرتج بڑھتا ہے اور بالآخر اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ مریضہ چل نہیں سکتی بلکہ لیٹنے پر مجبور ہوتی ہے اور بعض اوقات جانکنی کی حالت میں فرش پر لوٹتی ہے۔ خون آنے کے قبل کئی گھنٹوں بلکہ کئی یوم پہلے دردی شروع ہو جاتی ہیں اور خون کے اخراج تک ہوتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات دردی بند نہیں ہوتی جب تک کہ رحم کی اندرونی لعاب دار جھلی کے ٹکڑے خون حیض کے ساتھ خارج نہیں ہو جاتے۔ بعض کیسوں میں مستورات کے پتھان و دیگر آلات تولیدی نہایت ذکی الحس ہو جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ اس مرض میں قبض کی شکایت بالعموم

ہوا کرتی ہے۔

**اسباب مرض**۔ اقسام مرض کے بیان میں مرض کے مختلف اسباب کا ذکر آچکا ہے۔ یہاں بھی مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔ رحم میں اجتماع خون، امراض خبیثہ الرحم، سخت قبض اور رحم کی گردن کی نالی کا تنگ و سکڑا ہوا ہونا۔ جب قبض سخت ہوتی ہو تو مقعد میں براز آنا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ وہ رحم کی گردن پر دباؤ ڈال کر اخراج خون کو مشکل اور دردناک بنا دیتا ہے۔ عصبی ہسٹیریکل اور وجع المفاصل مزاج والی مستورات عموماً اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں

## علاج

- ۱۔ اجتماع خون یا ورم سے حیض کا تکلیف سے آنا: ارنیکا۔ آرنیکا۔ آرسینکیم۔ بیلادونا۔ برائی ادینا۔ کونیم۔ ہیرسلف۔ لائیکوپوڈیم۔ مرکوریس کارمرکوریس سالو۔ پٹلا۔ سبانا۔ سی بیٹا۔
- ۲۔ عصبی کمزوری سے حیض تکلیف سے آنا: کالوفائیلیم۔ کیومیلدا۔ سمی سی فیوگا۔ کافیا۔ جلیبی میم۔ ہامیلس۔ سکیل۔ این تھراکسی نم۔
- ۳۔ تشنج سے حیض کا تکلیف سے آنا۔ آرنیکا۔ آرسینکیم۔ کیومیلدا۔ کلکیریا۔ اگنیشیا۔ نکس دامیکا۔ فاسفورس۔ پٹلا۔ وائی برنم آپوس۔
- ۴۔ رکاوٹ سے حیض کا تکلیف سے آنا۔ بورکیس۔ کلکیریا کارب۔ کونیم۔ ہامیلس۔ تموجا۔

## چند ادویات کی تشریحی علامات

**سمی سی فیوگا**: اس مرض میں اس دوائی کی علامت مخصوصہ یہ ہوا کرتی ہے کہ دردیں پیڑوں کے ایک جانب سے دوسری جانب کو اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ جب وجع المفاصل اور عصبی کمزوری کی وجہ سے حیض تکلیف سے آتا ہو۔ تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔ نیز اجتماع خون کی وجہ سے جب یہ مرض ہو یہ دوائی بہر اسی بیلادونا اور وراٹرم ورائیڈ لفع کرتی ہے۔ خون حیض آنے کے قبل سر میں درد ہوتا ہے۔ دوران حیض میں دردیں شکم کے آریار دوڑتی ہوں

مریضہ مارے دردوں کے دوہری ہو جاتی ہو۔ مانند زچگی کے دروے ہوتی ہوں۔ کمزوری بہت ہو۔ سہی سی فیوگا کی دروے اتنی شدید اور مند نہیں ہوتیں۔ جتنی کہ کمیو میلا کی۔

**خوراک :** مدرٹشکچر ۵ کے پانچ سے دس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
**کالوفانیلیم :** جب تشنج سے حیض تکلیف سے آتا ہو تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ درووں کا دباؤ نیچے کی جانب ہو۔ رحم میں متواتر تشنج پڑتے ہوں۔ جیسا کہ زچگی کی ابتدائی حالت میں ہوتا ہے۔ خون اکثر پوری مقدار میں آتا ہو۔ جتگا سہ نیز سینہ۔ کمزور ٹانگوں اور بازوؤں میں تشنجی دروے ٹھیر ٹھیر کر ہوتی ہیں۔ اس مرض میں یہ دوائی مجرب مانی گئی ہے۔ دوران حیض میں دینے سے یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور دوران وقفہ میں دینے سے یہ تشنج بخش ہوتی ہے۔ جب یہ رحم کا منہ سخت ہو اور گردن رحم سکڑی ہوئی ہو تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

**خوراک :** ۵ یا ۱ دوران حیض میں ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد اور دوران وقفہ میں دن میں دو مرتبہ یعنی صبح اور شام۔

**جلسی میم :** اس دوائی اور کالوفانیلیم کی بہت سی علامات مشابہ ہیں۔ جب عصبی کمزوری اور اجتماع خون کی وجہ سے یہ مرض ہو اور بوجھ نیچے کی جانب بہت ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ دروے میں تشنجی اور مانند روزہ کے ہوتی ہوں اور ساتھ ہی پیلا پیشاب بہت مقدار میں خارج ہوتا ہو۔ عسر الطمث تشنجی کی بہترین ادویات میں سے یہ ایک ہے اور یہ گرم پانی میں استعمال کرنے سے بہت نفع کرتی ہے۔ یقیناً یہ ابتداء میں درووں کو روک دیتی ہے۔

**خوراک :** ۵ یا ۱ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

**بیلا ڈونا :** اجتماع خون یا درم کی وجہ سے حیض تکلیف سے آتا ہو تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔ اخراج خون کے قبل دروے ہوتی ہوں اور اتنا بوجھ محسوس ہو کہ گویا ہر ایک چیز براستہ رحم خارج ہو جاوے گی۔ سیدھا بیٹھنے سے

۱۰ تشنج سے حیض کا تکلیف سے آنا۔

آرام معلوم ہوتا ہو۔ دروین فوراً نمودار ہوتی ہوں اور فوراً ہی چلی جاتی ہوں خون بدبودار اور جما ہوا خارج ہوتا ہو۔ دروین نہایت شدید ہوتی ہوں اور اندام نہانی گرم اور خشک ہو۔

خوراک : ۱x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

دوائی برٹم ورائیڈ : دموئی مزاج والی مستورات میں جب یہ عارضہ بوجہ اجتماع خون ہو تو یہ دوائی نفع کرتی ہے۔ نیز ادھیڑ پن کی عمر میں جب عسر اطمث تشنجی ہو تو اس دوائی کو نہیں بھوننا چاہیے۔

خوراک : ۱x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

دوائی برٹم آپولس : خون حیض آنے کے قبل مقام رحم میں یکایک درد شروع ہو جاتا ہو اور دوران حیض میں کمر بہت دکھتی ہو۔ عصبی اور تشنجی عسر اطمث میں اس دوائی کو خاص شہرت حاصل ہے۔ بلکہ ڈاکٹر ہل صاحب تو اس قسم کی عسر اطمث و حیض کا تکلیف سے آنا، میں اس کو اکیر بتلاتے ہیں۔ دروین کا تشنجی ہونا اس دوائی کی خاص علامت ہے۔

اس کی علامات مخصوصہ یہ ہیں۔ نیچے کی جانب بوجھ۔ ستون ریڑھ کے نچلے حصہ اور مقام پیڑھ میں دکھن اور نات اور پیڑھ کے درمیانی مقام میں کڑل وار اور قونج کی سی دروین۔ سخت چوڑا پن اور خصیۃ الرحم میں گاہے گاہے گولی مارنے کی دردیں۔ یہ دوائی اس مرض میں مجرب مانی گئی ہے۔

خوراک : مدٹکمپر (۵) کے ۱۰ قطرے سے لے کر ۳۰ قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

میگنیشیا فاس : اس مرض میں شاید اور کسی دوائی کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہے جتنی کہ میگنیشیا فاس کو۔ عصبی اور کڑل وار دروین خون آنے کے قبل ہوتی ہوں۔ گرمی سے آرام ہوتا ہو۔ لیکن حرکت کرنے سے تکلیف بڑھتی ہو۔ امراض رحم میں جب کڑل وار دروین ہوتی ہوں تو اس دوائی کو بھی نہیں بھوننا چاہیے۔

عسر اطمث غشائی میں بھی جبکہ رحم کی اندرونی لعاب وار جھلی کے ٹکڑے حیض کے ساتھ خارج ہوتے ہوں۔ یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد لے

پلسٹلا : خون حیض وقتِ معینہ سے بہت دیر کر کے آتا ہو۔ بزرگ سیاہ اور دروناک ہو۔ جتنی درویں زیادہ ہوتی ہوں اتنی ہی مریضہ کو ٹھنڈ زیادہ لگتی ہو۔ مارے درووں کے مریضہ دوسری ہوتی جاتی ہو۔ دورانِ حیض میں اس دوائی کا استعمال زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ پاؤں بھگینے کی وجہ سے جب یہ غارضہ ہو گیا ہو تو یہ دوائی مشکل کشائی کرتی ہے۔ اکیونائیٹ بھی ایسی حالت میں مفید ہوتی ہے۔ لیکن اکیونائیٹ کا خون چمکیلا مٹخ ہوتا ہے۔ برعکس اس کے پلسٹلا کا خون سیاہ ہوتا ہے۔ پلسٹلا کی دیگر علامات کا بھی خام خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی مریضہ نرم دل۔ کھلی ہوا کی خواہشمند اور بات بات میں رو دیتی ہو۔ گرمی بالکل نہ سہا رہ سکتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

کاکیولس : عسراطمث حیض کا تکلیف سے آنا، اور خون حیض کے بمقدار خفیف اور بے قاعدہ آنے میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ رحم میں کوئل پڑتے ہوں جما ہوا خون بکثرت خارج ہوتا ہو۔ سرد و شدید اور جی متلاتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

ایسپس میلانیکا : حیض بہت کم مقدار میں خفیہ الرحم کے مقام پر ڈنگ مارنے کی سی ہوتی ہے۔ دائیں طرف کے یا دونوں اطراف کے بیضہ الرحم میں پیش رفتی کا سادرو یا حیض جب یکایک رُک جاوے تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

آرینیکم : جلن دار درو ابے چینی اور کمزوری بہت۔ سیلان الرحم تیز۔ رحم کی موزش حیض کے دنوں میں اعصابی درد ہو۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد

نکس وامیکا : حیض جلد اور کثیر المقدار آتا ہو۔ جس میں لوتھرے بہت

لے میں نے اس دوا کی سی۔ ایم پوٹینیسی سے ایک مریضہ کو شفا یاب کیا تھا۔

خارج ہوں۔ جما ہوا خون۔ متلی اور قے کی نہ ختم ہونے والی خواہش۔ قبض ہو اور پاخانہ کی حاجت بار بار ہو۔

خوراک:  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیل: سخت درد مثل دروزہ کے رانوں میں پھاڑنے والا درد۔ سیاہ جما ہوا خون۔ مریضہ تند مزاج۔ ایک رخسارہ زرد اور دوسرا سرخ۔ مثل قولنج کے درد۔

خوراک:  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب: درد جلن دار۔ خون حیض بمقدار کثیر اور عرصہ تک آتا رہتا ہو حیض سے پہلے پستان میں درد۔ سیلان الرحم۔ رحم کی سوزش کی وجہ سے نیچے کی طرف طرف گرتا ہوا بوجھ معلوم ہو۔ پاؤں ٹھنڈے اور سرد پسینہ۔

خاندیری مزاج کی مستورات کے لیے یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $6 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

سکیل کار: سخت درد جس کے بعد سیاہ رنگ کا خون نکلے۔ مقدار خون

زیادہ ہو۔

خوراک:  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

روزانہ کھلی ہوا میں رہنا۔ سادہ اور زود ہضم غذا کھانا۔ کافی۔ شراب اور مہر چائے سے پرہیز کرنا۔ طبیعت کو درہم برہم کرنے والی باتوں سے اجتناب کرنا۔ یہ سب ضروری امور ہیں۔

دوران وقفہ میں ہر صبح ٹھنڈے پانی سے نہانا۔ کمر و شکم کو تین منٹ تک بھیکے

ہوئے تو لیے سے نلتے رہنا مفید ہوتا ہے۔ دوران حیض میں گرم پانی کی بوتلوں یا فلائین کے ٹکڑے کو گرم پانی میں بھگو کر اور نچوڑ کر شکم کے نچلے حصہ میں ٹکور کرنا۔ یا کو بے تک گرم پانی میں بیس یا تیس منٹ تک بیٹھنا یا گرم پانی کی پچکاری کرنا۔ یہ سب درد اور تکلیف کو دور کرنے کے ذرائع ہیں۔

# حیض بکثرت آنا - زیادتی حیض - استحاضہ

(MENORRHAGIA METRORRHAGIA)

اس مرض میں خون حیض کثرت سے خارج ہوتا ہے۔ کبھی ایک ہی مرتبہ زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے اور کبھی مقدار میں تو کم خارج ہوتا ہے۔ لیکن بار بار آتا ہے گا ہے گلبے خون بہت زیادہ مقدار میں خارج ہونے کی وجہ سے مریضہ کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔

خون بکثرت خارج ہونے کی وجہ سے مریضہ کمزور اور لاغر ہو جاتی ہے۔ اس کا چہرہ زرد اور پیکا پڑ جاتا ہے۔ سر چکراتا ہے۔ بھوک اچھی طرح سے نہیں لگتی۔ قبض رہتی ہے اور کبھی پاؤں پر درم آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔

اسباب مرض : رحم میں اجتماع خون یا سوزش۔ رحم کا مل جانا یا جھک جانا۔ رحم کی رسولی یا سرطان۔ رحم میں آنول کا ٹکڑا رہ جانا بار بار اسقاط ہونا زیادہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے رحم کا ڈھیلا پڑ جانا اور دیگر کئی امراض رحم وغیرہ کثرت مجامعت بھی اس مرض کا سبب ہے۔ اس سے رحم اور اس کے متعلقہ اعضا میں اکساہٹ اور خراش پیدا ہو کر بکثرت خون خارج ہونے کا موجب ہوتا ہے۔

نوٹ : جب خون حیض زیادہ مقدار میں خارج ہو تو اسے ڈاکٹری میں منورا جیا اور طب میں کثرت الطمث کہتے ہیں۔ لیکن جب حیض کے دنوں کے علاوہ رحم سے خون خارج ہو تو اسے ڈاکٹری میں میٹرو راجیا اور طب میں استحاضہ کہتے ہیں۔

مرض سل اور سوزش گودہ اور دیگر امراض گودہ بھی اس مرض کا سبب ہوتے ہیں۔ نیز زیادہ دماغی محنت کرنا۔ عیاشی۔ مزمن بد مضمی۔ ورم جگر اور امراض دل بھی اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

### دوران اخراج خون میں :

آرنیکا - کورکس - اری جیرن - ہامیلس - اپی کاک - اسٹی لاگو - ملی فولیم تھلاپی  
پسٹلا - سبائنا - سیکیل - ہائیڈراسٹس - چینیم سلف وغیرہ

### دوران وقفہ میں :

امونیم - برومیٹم - آرسینیکم - کلکیریا کارب - چائنا - سسی سی فینوگا - فرم پلاٹینا  
فاسفورس - سبائنا - سیکیل - اگنیشیا اور سلفرو وغیرہ -

## بچہ ادویات کی تشریحی علامات

بلا ڈونا : حیض جلد جلد اور بہت دیر تک آتا رہتا ہو - خون سرخ - گرم اور  
تیز بھر پور رنگ کا - رحم کا درم - سر میں سخت درد - ایسا معلوم ہو کہ اندام نہانی سے  
کچھ باہر نکل جائے گا -

خوداک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

برائی ادویا : خون کا رنگ سرخ - خون حیض بکثرت - سرور و شدید - جوڑوں  
میں درد - حرکت کرنے سے زیادتی - قبض - پاخانہ سخت - پیاس کی زیادتی -

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

سلفر : حیض بہت زیادہ دیر تک جاری رہے - سیلان الرحم بکثرت -

خوراک : ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

فاسفورس : حیض بہت جلدی ظاہر ہوں اور بکثرت ہوں - پتلے لمبے مریضوں  
کے لیے یہ خاص دوائی ہے -

خوراک : ۲x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

سی پیاس : حیض بہت مقدار میں اور جلد جلد ہو - رنگت سرخ سیاہی مائل -

خروج الرحم - ناک پر سیاہ دھبے - پاؤں سرد -



خوراک: ۲x یا ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سببنا: حیض بکثرت کمر سے لے کر پیڑ تک درد۔ خون کبھی پتلا کبھی گاڑھا۔

خوراک: ۵ کا ایک قطرہ ہر دو گھنٹہ کے وقفہ پر۔

کروکس سٹیوا: جریان الرحم کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ خون ہرنگ سیاہ گیس وار اور منجمد ریشوں میں آتا ہو۔ اکثر اوقات مستورات کو جریان خوں کی شکایت ادھیڑپن کی عمر میں ہو جایا کرتی ہے اور ساتھ ہی ٹیکن کا سر درد بھی ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۵ کے پانچ سے لے کر دس قطرے دو گھنٹہ کے بعد۔

اسٹی لاگو: بکثرت حیض کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ خون سیاہ رنگ

کا آتا ہو۔ جریان خون آہستہ ہو۔ اور لگاتار آتا رہتا ہو۔ سیاہ خون خارج ہوتا رہتا ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سیاہ لوتھرے بھی نکلتے ہیں۔

خوراک: ۵ کے ایک سے لے کر بیس قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرنیکا: جب چوٹ آنے یا گہر پڑنے کی وجہ سے یہ عارضہ ہوتا ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سیکیل: رحم سے اخراج خون کو روکنے کے لیے یہ ایک بڑی قیمتی دوائی ہے

خاص کر مریضہ جبکہ بکثرت اخراج خون کی وجہ سے کمزور و نحیف ہو چکی ہو۔ اس کے

ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ چہرہ زرد اور نبض جھوٹی ہو۔ ایسی مستورات جو کہ

گرم آب و ہوا میں زیادہ عرصہ رہنے سے کمزور ہو گئی ہوں۔ ان کو خاص کر یہ

دوائی زیادہ فائدہ بخش ہوتی ہے۔ مثل سببنا یہ دوائی بھی دوران حیض نیز دوران

وقفہ استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک: ۱x ٹری ٹیوریشن (سفوف) ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

اپی کاک: یہ دوائی اخراج خون کے دوران میں دی جاسکتی ہے جب کہ

خون چمکیے سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہو۔ جی ملتا ہو۔ سانس تکلیف سے آتا ہو۔ تمام

رحم میں بہت دباؤ ہو۔

خوراک: ۱x ٹری ٹیوریشن ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ : جب خون کا اخراج بہت زیادہ ہو تو دورانِ اخراج میں انتخاب کردہ دوائی کی خوراک ہر دس پندرہ یا بیس منٹ کے وقفہ پر دینی چاہیے۔ حتیٰ کہ خون آنا بند ہو جاوے اور خفیف کیسوں میں ہر دوسرے یا تیسرے یا چوتھے گھنٹے دوائی کی خوراک دہرائی جاسکتی ہے۔

**ضروری ہدایات :** مریضہ کو چپ چاپ بڑے آرام سے چت لٹائے رکھیں۔ خاص کر جب کہ خون بکثرت خارج ہو رہا ہو اور اس کی چار پائی یا بستر کو پانچ کی طرف سے ذرا اونچا کر دیں۔ اٹھنے بیٹھنے یا چلنے پھرنے اور خاص کر کسی چیز کو اوپر اٹھانے۔ بلکہ کسی قسم کی حرکت کرنے کی اجازت نہ دیں۔ نشیات اور گرم اثر بہ اور نیز زیادہ کھانے سے پرہیز کرائیں۔ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی اور آتش جو دیں۔

کھانے اور پینے کے لیے جو بھی دیں گرم گرم نہ دیں۔ بلکہ ٹھنڈا کر کے دیں۔ اگر مریضہ کو قبض ہو تو ٹھنڈے پانی کی پچکاری کریں۔ اندام نہانی میں ٹھنڈے پانی میں بھیکے ہوئے کپڑے کو مریضہ کے پیٹ پر رکھنا بھی مفید ہوتا ہے۔

صاف روئی یا صاف ملائم کپڑا گلیسرین میں بھگو کر اندام نہانی میں ٹھونس دیں یعنی پلگ کریں۔

**غذا :** مریضہ کو دودھ یا ساگودانہ یا پتلی کھجڑی اور آتش جو وغیرہ دیں۔

## سفید رطوبت آنا۔ جریان الرحم۔ سفید پانی سیلان الرحم۔ لیکوریا

(LEUCORRHOEA WHITES)

اس بیماری میں عورتوں کی اندام نہانی سے سفید یا زرد رنگ کی رطوبت نکلا کرتی ہے۔ کبھی گاڑھی، کبھی پتلی، دودھیے سفید رنگ کی یا زرد۔ کبھی کبھی چھچھرے بھی نکلا کرتے ہیں اور بو آتی ہے۔

**علامات مرض۔** اس مرض کی عام علامات یہ ہیں :-

عورت کے اندام نہانی سے سفید زردی مائل یا سبزی مائل تیلی یا گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ بودار ہوتی ہے اور بعض اوقات بو نہیں ہوتی۔ مکر میں درد ہوتا ہے اور پردہ میں بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ طبیعت سست اور کابل ہوتی ہے اور کمزوری بہت ہوتی ہے۔ جب تک یہ مرض رہے اکثر حمل قرار نہیں پاتا۔ شدید کیسوں میں صحت عامہ بہت بگڑ جاتی ہے۔ چہرے کا رنگ پیلا۔ زرد پڑ جاتا ہے۔ ہاضمہ میں نقص واقع ہوتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی مشقت سے دم چڑھ جاتا ہے اور دل دھڑکتا ہے اور آیام ماہواری میں بھی نقص واقع ہوتا ہے۔ بعض اوقات لیسکوریہ بجائے خون حیض کے آیا کرتا ہے۔ لیسکوریہ کے خفیف کیسوں میں رطوبت سا ہا سال تک آیا کرتی ہے اور کوئی خاص نقص صحت میں واقع نہیں ہوتا۔

**اسباب مرض :** بکثرت خون حیض آنا۔ عرصہ تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا۔ رحم کا نکل جانا۔ ورم رحم۔ سوزاک یا آتشک یا نقرس یا وجع المفاصل وغیرہ۔ جو مستورات عیاشانہ زندگی بسر کرتی ہیں۔ کھاتی اچھا ہیں اور کام کم کرتی ہیں۔ اور جو مستورات زیادہ گنجان شہروں میں رہتی ہیں وہ اکثر اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ بمقابلہ ان مستورات کے جو کہ محنت کش اور باقاعدہ زندگی بسر کرتی ہیں مقامی اسباب : اس مرض کے یہ ہیں :

کثرت مجامعت اندام نہانی میں خراش یا کوئی دیگر مرض ہونے کی وجہ سے بھی لیسکوریہ کا مرض شروع ہو جاتا ہے۔ مثلاً مقعد کے چرنے خاص کر چھوٹی لڑکیوں میں، بواسیر، سنگ مثانہ یا نزلہ مثانہ۔ اندام نہانی میں کسی خراشدار شے کا داخل کرنا وغیرہ۔

## علاج

- ۱۔ جبکہ زرد یا سفید رطوبت خارج ہو۔ کلکیر یا کارب۔ چائنا۔ کوپے وا بائیڈرائسٹس۔ آیوڈیم۔ مرکبوس۔ نیٹرم میور۔ پستلا۔ سی پیا۔
- ۲۔ جبکہ تیل پانی خارج ہو : ایوینا۔ آرسینکیم۔ فیرم۔ گریفائٹس۔ آیوڈیم

سببنا - سینم -

- ۳۔ جب کہ گاڑھی رطوبت خارج ہو : میزیم - سی پیا - زنگم -  
 ۴۔ جب کہ تیز کڑوی خراش دار رطوبت خارج ہو - ایڈنائٹک -  
 آر سینکیم - ہلیو نائیز - کرپوزوٹ - لائیکوپوڈیم - پستلا - سی پیا -  
 ۵۔ جب کہ دودھیا رطوبت خارج ہو : کلیریا کارب - لائیکوپوڈیم  
 پستلا - سلینیا -

- ۶۔ جب کہ رطوبت بدبودار ہو : کاربوویچی - کاسٹی کم - آیوڈیم - سیپا -  
 کرپوزوٹ -

- ۷۔ جبکہ رطوبت خوشی ہو - کلیریا کارب - چائنا - کرپوزوٹ - لائیکوپوڈیم  
 ۸۔ جبکہ رطوبت سبزی مائل ہو - کاربوویچی - کرپوزوٹ - مرکورس  
 سبائنا - سلفر -

## چند ادویات کی تشریح علامت

الیومینا : جب مرض بہت دیر سے جاری ہو - سفید رطوبت کافی مقدار  
 میں خارج ہوتی ہو - حیض کے قبل اور بعد سیلان الرحم زرد پھیلنے والی رطوبت  
 اس قدر زیادتی سے کہ ٹانگوں تک قطروں میں گرنی شروع ہو جاتی ہو اور  
 ایریوں تک پہنچ جاتی ہو -

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

آر سینکیم : رفیق جلتا ہوا مادہ یا خارش پیدا کرنے والی اور گاڑھی زردی  
 مائل رطوبت جس کے ساتھ حیض بکثرت اور بار بار آتا ہو - رات کو بے چینی اور کمزوری  
 ہو -

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

کلیریا کارب : کم عمر کی لڑکیوں میں سفید رطوبت کی شکایت مستورات  
 جو کمزور اور خا زیری مزاج کی ہوں - حیض جنہیں کثرت سے اور زیادہ دیر رہتا ہو  
 رطوبت دودھ کے رنگ کی سی - حیض آنے سے پہلے رطوبت زیادتی کے ساتھ

خارج ہو۔ اس وقت غارش بھی ہو۔ ٹھنڈی ہوا نقصان کرتی ہو۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

پلسٹلا: پتلی جلتی ہوئی رطوبت - دودھیا رطوبت جو جلن کے ساتھ ہو خصوصاً  
حیض کے بعد۔ گاڑھی رطوبت سفید یا زرد۔ حیض دیر سے اور قلیل درد کے ساتھ  
آتا ہو۔ اُن عورتوں کو جنہیں جاڑا زیادہ لگے۔ لیکن گرمی سے بھی متنفر ہوں۔ یہ  
دوائی زیادہ مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

بورکیس : صاف رنگ کا گاڑھا پانی۔ مقدار جس کی زیادہ ہو اور جو گرم ہو۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : جلن اور درد پیدا کرنے والی رطوبت۔ خنازیری مزاج والی عورتوں  
میں جب یہ مرض مزمن صورت اختیار کر جائے جب دیگر منظر ادویات کے دینے  
سے اچھے نتائج نہ پیدا ہوتے ہوں۔ تو اس دوائی کے دینے سے کیس صاف ہو جاتا ہے  
اور منظر دوائی اپنا اثر ٹھیک ظاہر کرنے لگ پڑتی ہے۔ رطوبت پتلی۔ زردی  
مائل۔ فرج میں جلن۔ غشی۔ ہاتھ اور پاؤں میں جلن۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ۔

سی پیما: زرد۔ سبز اور بدبودار اخراج جو زیادہ تر قبل حیض کے ہو۔ سن  
بونٹ یا ایام حمل میں جب کہ سیلان الرحم کا عارضہ۔ رحم کی گردن والے مقام میں  
کوئجن اور کھجلی۔ خروج رحم۔ زرد پانی۔ دودھیا رطوبت۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ یا ۲۰۰ پھتے ہیں ایک مرتبہ۔

چائنا : کمزور عورتیں جن کا خون بکثرت خارج ہو چکا ہو۔ اس دوائی سے  
مستفید ہوتی ہیں۔ رطوبت حیض کے قبل خون کی مانند خارج ہو کبھی کبھی سیاہ لوتھر  
نکلیں۔ مریضہ کو کمزوری عام ہو اور بدبغی کی شکایت ہو۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ہائیڈراسٹس : سیلان رحم جس کی وجہ سے نزدیکی مقامات چھل گئے ہوں۔

حیض کی شکایت نمایاں طور پر اور عام کمزوری۔

خوراک : ۱x کے چار قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

مریکورس : زرد رنگ کی رطوبت جو پیپ کی طرح ہو۔ حیض بکثرت۔ کمزوری زیادہ۔ پیاس بہت اور منہ میں تھوک کی زیادتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کمریوزوٹ : زرد رنگ کا بودار سیلان الرحم جس کی وجہ سے خارش پیدا ہو اور حلق اور سوزش تک نوبت پہنچے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ادواٹوسٹا : جب کہ سیلان الرحم بافراط آتا ہو اور عموماً بدبودار ہوتا ہو۔ کمزور دگرتی ہو۔

خوراک : ۳x دن میں تین مرتبہ۔

نوٹ : مذکورہ بالا ادویات کی خوراکیں تین یا چار مرتبہ روزانہ ہفتہ عشرہ تک دینی جانا چاہیے۔ مزمن کیسوں میں ایک خوراک صبح اور ایک خوراک شام کو عرصہ تک جاری رکھنی چاہیے۔

ضروری ہدایات : مقامی طور پر اندام نہانی کو پاک و صاف رکھنا

نہایت ضروری ہے۔ وگرنہ رطوبت کی وجہ سے اندام نہانی میں زخم ہو جانے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ بذریعہ اینا سرج (جس کے ساتھ دجائیل ٹیوب لگا دینا چاہیے) گرم پانی کے ساتھ اندام نہانی کو دو تین بار دن میں دھونا چاہیے۔ خواہ (۱) گرم پانی آدھ سیر میں پھٹکری ایک ڈرام ہلا کر (۲) گرم پانی آدھ سیر میں پر میگنیٹ آف پوٹاش دس گرین ہلا کر۔

زیادہ شدید کیسوں میں مریضہ کو چپ چاپ لیٹے رہنا چاہیے۔ محنت و مشقت کہنے سے یہ مرض زیادتی اختیار کرتا ہے۔ کھلی ہوا اور صاف ستھرا رہنا ضروری ہے۔

مریضہ کو مقوی غذا دینی چاہیے۔ کثرتِ جماعت بھی منع ہے۔ روزانہ اندام نہانی کو کئی بار دھونا اور صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔

# چھوٹی لڑکیوں میں لیکوریا

(LEUCORRHOEA IN THE LITTLE GIRLS)

اس مرض میں چھوٹی لڑکیوں کے اندام نہانی سے سفید رطوبت نکلا کرتی ہے۔  
خاص کر خنزیری مزاج والی لڑکیوں میں۔

علامات مرض : اندام نہانی میں خراش۔ بعض اوقات پیشاب کرتے  
وقت درد کا ہونا اور پتلی سفید یا گاڑھی رطوبت کا خارج ہونا۔ کمزور اور بیمار لڑکیوں  
میں جو کہ صاف ستھری نہیں رہتیں۔ لیکوریا بکثرت اور تیز خارج ہوتا ہے  
جس کے باعث اندام نہانی کی لعاب مار بھلی میں زخم ہو جاتا ہے۔ اس رطوبت  
کی چھت اگر آنکھوں میں یا دوسری جگہ لگ جائے تو درم پیدا ہو جاتا ہے اور  
سخت تکلیف ہوتی ہے۔

اسباب مرض : پسینہ کا یکایک رک جانا یا سردی لگنا۔ تیز کڑوا پیشاب  
ناپائیزگی۔ گرم امعاء و مقعد وغیرہ۔

## علاج

گلکیریا کارب : خنزیری مزاج والی لڑکیوں کے مزمن مرض میں یہ دوائی  
بہت مفید ہوتی ہے۔ جبکہ رطوبت دودھیا خارج ہوتی ہو۔

خوداک : ۳۰ یا ۲۰ دن میں تین مرتبہ۔

کینا بس سٹیوا : رطوبت زردی مائل اور مقامات ماؤف متورم۔ گرم اور

سرخ ہوں۔ پیشاب خارج ہوتے وقت درد ہوتا ہے۔

خوداک : ۵ یا ۱۰ دن میں تین مرتبہ۔

ایو ڈیم : خنزیری مزاج والی لڑکیوں کے لیکوریا میں یہ دوائی مفید ہوتی

ہے۔ رطوبت عموماً پتلی اور بدبو دار اور مرضیہ بہت لاغر ہو۔

خوداک : ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

مرکیورس کار: تیز تلخ اور زرد رطوبت خارج ہو اور پشیا ب درد کے ساتھ اور جل کر آتا ہو۔

خوراک: ۱x یا ۲x دن میں تین یا چار مرتبہ۔

پلسٹلا: خوب صورت رنگ والی لڑکیوں میں دودھیا رطوبت خارج ہو اور بدبوی یا نزلہ کی شکایت بھی ساتھ ہو۔

خوراک: ۳x دن میں تین مرتبہ۔

سانا اور ٹیو کریم: چرنوں کے خراش کرنے کی وجہ سے لیکوریا خارج ہو۔

خوراک: ۱x یا ۳ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

نوٹ: دیگر ادویات لیکوریا کے بیان میں مطالعہ فرمائیں۔

ضروری ہدایات: ماؤن مقامات کو بار بار شیر گرم یا ٹھنڈے پانی

سے دھونا چاہیے اور با احتیاط خشک کر کے تھوڑا باریک پسا ہوا میدہ چھڑک دینا چاہیے۔

غذا: زود ہضم اور مقوی دینی چاہیے۔

تازہ ہوا بہت مفید ہے۔ خنازیری مزاج والے بچوں کو کاڈلور آئیل استعمال

کرانا چاہیے۔

## ناف کی سوچن - ورم رحم

(METRITIS)

یہ مرض جوان عورتوں کو ایام حمل یا بچہ جننے کے وقت ہو جاتا ہے۔ اس

مرض کی دو قسمیں ہیں:-

۱- شدید

۲- مزمن

پہلے عموماً رحم کا منہ متورم ہوتا ہے اور پھر بتدریج یہ ورم رحم کے اندر فی حصوں

میں چلا جاتا ہے۔

علامات: شدید مرض میں لوزہ کے ساتھ بخار چرہ جاتا ہے۔ بغض بھری



ہوئی اور جھکے دار چلتی ہے۔ پیاس زیادہ لگتی ہے۔ آبکائیاں اور قہیں بھی آتی ہیں بعض اوقات اسہال مروڑ کے ساتھ آتے ہیں۔ شانہ میں اگساہٹ برسر جاتی ہے اور رحم متورم اور دردناک ہوتا ہے۔ پیشاب اور پاخانہ کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ رحم سے لعاب دار یا قدرے خون آمیز رطوبت خارج ہوتی ہے جو بعد میں پیپ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اندام نہانی میں خارش ہوتی ہے۔ اگر مرض زیادہ ترقی کر جائے تو بے ہوشی یا ہڈیاں ہوجانا ہے اور پردہ صفاق میں ورم ہو کر مریضہ کی ہلاکت کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خفیف کیس میں علامات زیادہ شدت اختیار نہیں کرتیں اور صحت جلدی ہو جاتی ہے

**اسباب مرض:** سردی لگنا۔ ٹھنڈی اور بھگی ہوئی گھاس پر بیٹھنا یا کھڑے ہونا۔ حبس حیض۔ غراش رحم۔ کثرت جماعت اور رسولی وغیرہ۔

## علاج

ایکونائیٹ : سخت بخار۔ نہایت بے چینی۔ گھبراہٹ۔ نبض تیز۔ موت کا ڈر۔ پیٹ میں درد۔

خوراک : ۱x کے چار قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایلیس : بعض وقت مریضہ چپ ہو جائے۔ لیکن تھوڑی دیر گزرنے پر چیخ پڑے۔ رحم یا بیضہ الرحم کے قریب درد محسوس ہو۔ نیش زنی کی طرح کے درد۔

خوراک : ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بلا ڈونا : مرض کی ابتدائی حالت میں اجتماعِ خون دل کی جانب۔ سخت درد۔ خون آنکھوں سے نکلنے کے قریب ہو۔ نفاس رک جائے یا بدبودار ہو۔ درجہ جھکوں میں ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم : رحم کے مقام پر جلن۔ لرزہ اور سردی۔ بے چینی بہت زیادہ۔ پیاس تھوڑی تھوڑی مقدار میں ہو۔ تیز پانی اندام نہانی سے خارج ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس : گھبراہٹ - نیم بے ہوشی میں مریضہ باتیں کرتی ہو - ادھر ادھر کر دھڑکیں بدلتی رہتی ہو -

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

علاوہ ازیں مرکبوریس - میرسلٹ - سائنا - نکس و امیکا - آیوڈیم - پلائینا - سلفر وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں -

ضروری ہدایات : پورا آرام - سادہ غذا اور ٹھنڈا پانی پینا - گرم پانی کی منکور کرنا سب لازم اور ضروری ہیں - ابتدائے مرض میں مریضہ کو گرم پانی میں بینا یا تیس منٹ تک بیٹھنا چاہیے اور اس کے کندھے اور پاؤں ڈھانپ رکھنے چاہئیں جب تک پورا آرام نہ آجائے اور ورم مدہم نہ پڑجائے - تب تک اس کو چپ چاپ لیٹے رہنا چاہیے -

غذا : مریضہ کو جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے - سادہ اور لطیف و زود ہضم غذا دینی چاہیے - مثلاً دودھ - آش جو اور دودھ دسا گودانہ - پتلی کھجڑی - مونگ کی دال کا پانی -

## ناف کا بڑھ جانا - ناف کا کم سکرنا

عظم الرحم استرخاء الرحم

(SUBINVOLUTION OF THE UTERUS)

اس مرض میں وضع حمل یا استقاط حمل کے بعد رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتا - اس لیے وہ معمول سے بڑا اور وزنی رہ جاتا ہے اور بہت تکلیف کا موجب ہوتا ہے -

نوٹ : باکرہ عورتوں کا رحم قریباً دو انچ لمبا اور ایک اونس (نصف چھٹانک) وزن میں ہوتا ہے - دوران حمل میں یہ قسار وزن میں بڑھتا جاتا ہے - وضع حمل کے فوراً بعد رحم قریباً لمبائی میں چودہ انچ اور وزن میں ۲۵ اونس (۱۲ ۱/۲)

چھٹانک کے قریب ہوتا ہے۔ پھر قد اور وزن میں گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت جلد ہی یہ قد اور وزن میں نصف سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ پانچ یا چھ ہفتوں کے عرصہ میں سکڑ سکڑ کر قریباً تین انچ لمبائی میں اور دو اونس وزن میں رہ جاتا ہے۔ رحم کے اس طرح سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آ جانے کو ڈاکٹری میں ”انودیوشن آف وی یوٹرس“ کہتے ہیں۔ لیکن جب رحم بخوبی سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتا اور کسی قدر بڑا اور ڈھیلا رہ جاتا ہے تو اسے ڈاکٹری میں ”سب انودیوشن“ کہتے ہیں۔

**علامات مرض :** پیڑوں میں بوجھ اور نیچے کی جانب دباؤ معلوم ہوتا ہے۔ اور مریضہ کو خونِ حیض بکثرت اور بار بار آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جتنا رحم بڑا رہ جاتا ہے۔ اُمی کے مطابق حیض کی شکایت بھی زیادہ یا کم ہوتی ہے۔ لیکن کثرتِ حیض ناف کے بڑھے رہنے کی ایک تکلیف دہ اور خطرناک علامت و نتیجہ ہے۔ رحم کی دیواریں موٹی ہو جاتی ہیں اور اس کا جوف کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں اجتماعِ خون ہو کر اس سے رطوبت بکثرت خارج ہوتی رہتی ہے۔ کمر میں درد رہتا ہے اور بہت کمزوری ہوتی ہے۔ مثانہ میں اکساہٹ کو نتھن اور مروڑ پڑتے ہیں۔ اندامِ نہانی میں انگلی داخل کرنے سے رحم کا منہ کشادہ۔ موٹا اور دردناک معلوم ہوتا ہے اور گردن رحم بھی سخت اور بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔

**اسباب مرض :** ۱۔ مریضہ کا کمزور ہونا اور مرض کا سب سے بڑا سبب ہے۔

۲۔ زچہ کا جلدی چلنے اور کام کاج میں لگ جانا۔ اس سے بھی رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر نہیں آتا۔

۳۔ زچہ کا کھانے پینے میں بد پریزی کرنا۔

۴۔ رحم کے آس پاس کا ورم۔

۵۔ رحم کا ٹل جانا یا اس کا ٹیڑھا ہو جانا۔

۶۔ کثرتِ جماعت اور بار بار حمل ٹھیرنا۔

۷۔ وضعِ حمل کے بعد آنول کے ٹکڑے کا رحم میں رہ جانا۔

۸۔ رحم میں رسولی وغیرہ کا ہوتا۔

۹۔ زیادہ عرصہ تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا وغیرہ وغیرہ اس مرض کے اسباب ہیں۔

## علاج

کالوفائیکم: اس مرض کی بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ اس دوائی کے استعمال سے رحم سکڑ کر وزن اور حجم میں کم ہو جاتا ہے اور نیز بکثرت اخراج خون جو کہ اس مرض کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اس کے روکنے کے لیے بھی یہ دوائی بڑی کارآمد ہے۔

خوراک: ۱۰ کے دو قطرے تین مرتبہ روزانہ دس پندرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ دنوں تک دیتے جانا چاہیے۔

فراکسیئس امریکانہ: اس مرض کی یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے اور اس مرض میں مجرب مانی گئی ہے۔

خوراک: ۵ کے دس سے پندرہ قطرے تین مرتبہ روزانہ۔

دیگر ادویات الیٹرس فری لوسا۔ سکیل۔ اسٹی لاگو۔ ارگٹ۔ سی پی۔ کلیریا۔ کارب۔ کالی بائیڈراڈیکیم اور سلفر ہیں۔

ضروری ہدایات: وضع حمل کے وقت دایہ کو اپنے ہاتھ خوب دھو کر صاف کر لینے چاہئیں۔ تاکہ گندے اور گھٹیا ہاتھوں سے رحم میں ورم ہو کر اس مرض کا باعث نہ ہو۔

وضع حمل کے بعد اس امر کی پوری احتیاط کر لینی واجب ہوتی ہے کہ رحم میں آنول کا ٹکڑا یا خون کا لوتھڑا باقی نہ رہ جائے۔ وضع حمل یا حمل کے بعد زچہ کو جلدی چلنے پھرنے یا کام کاج کرنے نہیں لگ جانا چاہیے۔ بلکہ چالیس دن تک جیسا کہ پاکستان اور ہندوستان میں رواج ہے۔ زچہ کو پورا پورا آرام ملنا چاہیے۔ جماع سے قطعی پرہیز لازم ہے۔ غذا مرینہ کو زود ہضم اور مقوی دینی چاہیے۔

# ناف کا ٹل جانا۔ ناف پڑ جانا

(DISPLACEMENT OF THE UTERUS)

اس مرض میں رحم آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف گر جاتا ہے یا صرف جھک جاتا ہے۔

**علاماتِ مرض :** کمر اور پیڑوں میں بوجھ اور درد کی شکایت ہوتی ہے۔ چلنے پھرنے سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ پیشاب تکلیف سے اور رک رک کر آتا آتا ہے۔ کبھی رحم میں سوزش ہو جاتی ہے اور خونِ حیض بڑی تکلیف سے آتا ہے اور کبھی بالکل بند ہو جاتا ہے۔

**اسبابِ مرض :** رحم میں ورم یا اجتماعِ خون کا ہونا۔ وضعِ حمل یا استقاط کے بعد رحم کا اپنی اصلی جگہ پر نہ آنا اور رحم میں رسولی کا ہونا۔ اندامِ نہانی میں ورم کا ہونا یا اندامِ نہانی کا باہر نکل آنا۔ صدر یا چوٹ آنا۔ خلاً گرہ پڑنا یا زور سے کھونا یا الجھنا۔ رفعِ حاجت کے وقت بہت کونھنا۔ کمزوری عامہ۔ حمل وغیرہ۔

## علاج

فراکسیس امریکانہ۔ ہیونائیر۔ الٹرس فری نوسا۔ بیلادونا۔ ہائیڈروکورتائیل۔ وائی برنم آپولس۔ فرم آیوڈائیڈ۔ پٹلا۔ سی پیا۔ پوڈوفائیم۔ نیٹرم میور۔ سینٹی شیلو۔ سکیل اور ساپال میٹو وغیرہ ادویات کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

مریضہ کی عام صحت کو بحال کرنے کے لیے اس کو مقوی غذا دینی چاہیے۔ قبض نہ ہونے دیں اور اگر قبض ہو تو فوراً بذریعہ حقنہ (پچکاری) رفع کریں۔

# ناف کا باہر کو نکل آنا۔ رحم کا باہر نکل آنا

## نور الرحم

### PROLAPSUS UTERI

وضع حمل یا اسقاط کے بعد فوراً ہی جو عورتیں سخت جسمانی محنت شروع کر دیتی ہیں۔ تو اس حالت میں رحم کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور بالآخر کمزور ہو کر پورے طور پر رحم کو سہارا نہیں دے سکتے بدیں دب پڑا اور کمر میں بوجھ اور درد کی شکایت ہوا کرتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔

## علاج

آرنیکا : بوجھ ضرب یا چوٹ آنے کے رحم میں سوجن پیدا ہو گئی ہو۔ اکثر ان عورتوں میں یہ حالت پائی جاتی ہے۔ جو فوراً ہی کام کاج شروع کر دیتی ہیں۔  
خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اندام نہانی سے ہر ایک چیز باہر نکل جائے گی۔ رحم میں سوجن اور اجتماع خون۔ چھوٹا نمک ناگوار ہو۔  
خوراک : ۱g یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لی لی ام ٹائیکریٹینم : ایسا معلوم ہو۔ گویا کہ کوئی شے رحم سے نیچے کو گری جاتی ہے۔ یہ تکلیف چلنے پھرنے یا حرکت کرنے سے زیادہ ہو۔  
خوراک : ۱g یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سی پیا : مفید رطوبت بکثرت خارج ہوتی ہو۔ حیض کی بے ترتیبی اور قلت قبض۔ دباؤ۔ کمزور عورتیں جنہیں ہر وقت رحم کا دباؤ نیچے کی طرف معلوم ہو اس سے مستفید ہوتی ہیں۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پوڈوفائیلیم : خروج رحم کے ساتھ خروج متعقد بھی ہو۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ہیلونائیز : رحم باہر نکل آتا ہو اور رحم کے عضلات بہت ڈھیلے ڈھالے

ہوں۔

خوراک : ۵ یا ۱x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : جب کہ اس مرض کے ہمراہ بد معنی - نفخ اور بواسیر بھی ہوں - کمر

میں درد اور کولہوں پر دباؤ - پاخانہ جلنے کی حاجت بار بار ہو سخت پاخانہ تھوڑی مقدار میں خارج ہوتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں شلیم اور سلفر بھی کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

مریضہ کو آرام سے لیٹے رہنا بہت ضروری ہے۔ کولہ مریضہ اُونچے رکھے تاکہ رحم اپنی جگہ پر واپس چلا جاوے۔ مریضہ کو چلنے پھرنے کی اجازت نہ دیں۔ جب رحم باہر نکلا ہوا ہو تو آہستہ آہستہ اس کو اپنی اصلی حالت پر لائیں اور پیٹ پر پٹیاں باندھ کر اس کو سہارا دیں تاکہ پیٹ کا بوجھ اُوپر کورہے۔

سردیانی میں بیٹھنا اور پیٹ کو ملنا بہت مفید ہوتا ہے۔ سخت محنت کرنا۔ بوجھ کو اُوپر اٹھانا۔ کونھنا یا بہت دیر تک ٹانگیں سکیر کو بیٹھے رہنا غیر مفید ہیں۔ موٹے آٹے کی روٹی اور مہزیات وغیرہ کھانی چاہئیں تاکہ قبض نہ ہونے پائے۔

## بانجھ پن (STERILITY)

بے اولاد ہونا عورت کے لیے بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ ایسی عورت اپنے آپ کو بڑی بد قسمت خیال کرتی ہے۔

**اسباب مرض :** رحم و خصیتہ الرحم میں پیدائشی نقص ہونا۔ مثلاً رحم نہ ہونا یا بہت چھوٹا ہونا۔ رحم کی گردن یا منہ کا بند ہونا یا بہت تنگ ہونا۔ رحم کا ٹل جانا۔ یا جھک جانا یا باہر نکل آنا۔ رحم کی رسولی۔ ورم رحم۔ فتور حیض مثلاً حیض کا بہت کثرت سے آنا یا حیض کا نہ آنا۔ یا حیض کا بہت تکلیف اور بمقدار خفیف آنا۔ لیکور یا دسیلان الرحم، اندام نہانی کی سوزش یا اس کا بند ہو جانا۔ آتشک اور سوزاک بھی اس کا سبب ہوا کرتے ہیں کمزوری عامہ بہت موٹاپا یعنی فریبہ پن۔ بہت دماغی محنت کرنا اور اس عمر کی شادی بھی بعض اوقات بانجھ پن کا سبب ہوا کرتی ہے۔ زیادہ عیاشی کی زندگی بسر کرنا۔ خاص کر بکثرت شراب نوشی بانجھ پن کا سبب ہوا کرتی ہے زیادہ مرغن و مچرب غذا کی کھانی اور ورزش نہ کرنا۔ اس سے رحم میں بہت چربی بڑھ جاتی ہے اور بانجھ پن کا موجب ہوتی ہے۔ نیز خاوند اور بیوی کی آپس میں نامطابقت یا ایک دوسرے سے نفرت کرنا یا زیادہ غمگین رہنا یہ بھی بہت حد تک بانجھ پن کو پیدا کرتے ہیں۔

### علاج

اگر عورت کے رحم یا خصیتہ الرحم میں کوئی پیدائشی نقص ہو تو یہ مرض عموماً لا علاج ہوتا ہے۔ مرض کا اصل سبب معلوم کر کے مناسب علاج کریں۔ ادویات جو اس مرض میں کام آتی ہیں۔

ایٹرس فیری زوسامہ - ہورمیس - سیلونائیز - کونیم - ۲x نیز  
ایوڈیم - برائٹا کارب - کلکیریا کارب - کینابلس - فرم - نکس فامیکا -



فاسفورس - ایڈ فاس - پلائینا - سبائینا - سینی ٹیلو - سی پیا اور سلفر وغیرہ۔  
اسباب اور علاماتِ مرض کا بخوبی مطالعہ کرنے کے بعد مندرجہ بالا ادویات  
میں سے مناسب دوائی انتخاب کر کے دیوں۔

## ضروری ہدایات

حفظانِ صحت - ورزش اور غذا کا مناسب انتظام کرنے سے یہ مرض بالعموم  
دور ہو جاتا ہے۔

۷۔ نیز ایگنس کاسٹس - امونیا کارب - اورم میور - کالوفالٹم - میڈورنیم -  
نیٹرم فاس اور سیبل سیرولائٹا اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں بڑی مفید  
ادویات ہیں۔ راقم نے بانجھ پن کا ایک کیس اورم میٹیلیم سی - ایم سے  
بھی درست کیا تھا۔

# فصل دوم

## ایام حمل کے امراض اور اُن کا علاج

۱۔ حاملہ کا رنج و غم کرنا اور خوف و وہم کرنا :

سمی سی فیوگا۔ اگنیشیا۔ پلائینا۔ پلسٹا وغیرہ ادویات کام آتی ہیں۔ غم غلط کرنے اور وہم دور کرنے کے اسباب پیدا کرنے چاہئیں۔ کھلی ہوا میں چلنا پھرنا۔ اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنا نیک صحبت اور دل خوش کن کاموں میں مشغول رہنا۔

۲۔ غشی اور مستی یا کے دورے -

اگنیشیا۔ کیفیر۔ چائنا۔ ڈیجی ٹیلیس۔ آیوڈیم۔ ماسکس۔ اوپیم وغیرہ (منفصل دیکھو ہسٹیریا اور غشی کا بیان مندرجہ کتاب ہذا صفحہ ۳۹۸)

۳۔ حاملہ کا سر درد :

ایکونائیٹ۔ بیلادونا۔ بوائی ادینا۔ سمی سی فیوگا۔ جلیسی میم۔ گلونائین۔ نکس و امیکا وغیرہ (نیز دیکھو سر درد کا بیان مندرجہ باب ہفتم کتاب ہذا) پیشانی پر منتھال لگانے یا گلاب میں صندل گھس کر طلاء کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔

۴۔ حاملہ کا دردِ دندان :

ایکونائیٹ۔ بیلادونا۔ کیومیلا۔ کانیا کریوزوٹ۔ میگنیشیا کارب۔ مرکورس سٹانی سیکریا اور سمی سی فیوگا وغیرہ۔

(نیز دیکھو دانت درد مندرجہ باب سیزدہم کتاب ہذا)

ایام حمل میں اگر کسی دانت میں درد ہو تو اُسے ہرگز نہیں نکلوانا چاہیے۔ کیونکہ کبھی کبھی دانت نکلوانے سے عمل گر جاتا ہے۔

۵۔ حاملہ کا دل دھڑکنا :

ایکونائیٹ۔ بیلادونا۔ کاکٹس۔ ڈیجی ٹیلیس۔ نیٹرم میور۔ نکس و امیکا اور

پسٹلا وغیرہ۔

(نیز دیکھو بیان دل کا دھڑکنا مندرجہ باب دوازدہم کتاب ہذا) مریضہ کو آرام سے ٹائے رکھیں۔ گرم اور تیز مصالحہ داراغذیہ و اشربہ سے پرہیز کرائیں۔  
۶۔ حاملہ کی وریدوں کا پھول جانا :-

ہامیلس - پسٹلا - سلیشیا - لائیکوپوڈیم - سلفر وغیرہ۔  
ہامیلس لوشن (ایک حصہ مدرٹسکچر اور چار حصہ پانی) میں کپڑے کا ٹکڑا تڑکے ماؤف وریدوں پر رکھیں۔ مریضہ کو ٹائے رکھیں اور ماؤف اعضاء کو اونچا رکھیں۔

۷۔ حاملہ کی ٹانگوں کا پھول جانا۔

ایپس - آر سینیم - چائنا - فیرم اور سلفر۔ مریضہ کو آرام سے ٹائے رکھیں اور ٹانگوں کو تھوڑا اونچا رکھیں۔

۸۔ حاملہ کی کمر درد :-

(۱) کالی کارب ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۲) بلیس ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(نیز دیکھو بیان درد کمر مندرجہ باب ہفتم کتاب ہذا)۔

۹۔ حاملہ کو نیند نہ آنا :-

سمی سی فیوگا - کافیا - اگنیشیا - نکس و امیکا اور ورائٹم ایلمیم۔

(نیز دیکھو بیان نیند نہ آنا - بے خوابی مندرجہ باب ہفتم کتاب ہذا)  
فکر و تردد دل سے دور کریں۔ روغن کدو یا روغن خشخاش یا بادام روغن کی سریر مالش کریں۔ کمقن - رنگ بلا کر مٹھیلیوں اور تلوؤں پر ملیں۔

۱۰۔ حاملہ کو کرمل پڑنا :-

(۱) ورائٹم ایلمیم ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۲) نکس و امیکا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔ ٹانگوں اور پاؤں کو ہر وقت گرم رکھنا چاہیے۔

۱۱۔ حاملہ کو بکثرت تھوک آنا :- (۱) جبرندی ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۲) مریکوریس سال  $9 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۳) سلفر  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

۱۲۔ حاملہ کی متلی اور قے : (۱) اپیکاک  $3 \times$  ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

(۲) پستلا  $2 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

(۳) نکس و امیکا  $1 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

(۴) کریوزوٹ  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

(۵) ٹمبیکم  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

(۶) پٹرولیم  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نیز دیکھو بیان متلی اور قے مندرجہ باب چہارم کتاب ہذا

تازہ اور کھلی مچا۔ غذا کی باقاعدگی اور ٹھنڈی اشیاء مفید ہوتی ہیں۔

۱۳۔ حاملہ کا درد قولنج : کیمومیلہ - بیلادونا - کالوسنتہ - ڈایا سکوریا

نکس و امیکا - پلم بم - ورائٹم ایلیم وغیرہ۔

نیز دیکھو بیان درد قولنج مندرجہ باب چہارم کتاب ہذا

۱۴۔ حاملہ کی قبض : کالونوینا  $1 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

نیز دیکھو بیان قبض مندرجہ باب چہارم کتاب ہذا

رفع قبض کے لیے حاملہ کو ہرگز کوئی تیز دوا خصوصاً کیلول وغیرہ نہیں دینی چاہیے۔

غذا میں مناسب اصلاح کرنے سے قبض رفع ہو جاتی ہے۔ اگر ضرورت لاحق ہو۔ تو

ایک یا ڈیڑھ تولہ بادام روغن یا روغن زیتون ایک یا ڈیڑھ پاؤ گرم پانی میں ملا کر

پلائیں۔ ہر زکامرتہ یا گلقد ڈویاڑھائی تولہ کھلا دیں۔ یا نیم گرم پانی کی پچکاری

کریں۔

۱۵۔ حاملہ کو دست آنا : پستلا  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نیز دیکھو بیان اسہال و دست مندرجہ باب چہارم کتاب ہذا۔

حاملہ کو غذا بطیف اور زود ہضم دینی چاہیے۔ مثلاً اراروٹ یا ساگودانہ وغیرہ۔

۱۶۔ حاملہ کو نفخ شکم کی شکایت ہونا : (۱) کلیریا۔ (۲) نکس و امیکا۔

نیز دیکھو بیان نفخ شکم مندرجہ باب چہارم کتاب ہذا

۱۷۔ حاملہ کو جھوٹی دیروزہ کا ہونا : (۱) سیل ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

(۲) کالوفائیلیم ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مریضہ کو پورا آرام دیں اور وہ چپ چاپ لیٹی رہے۔

۱۸۔ حاملہ کی کھانسی : (۱) نکس و امیکا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔ رجب کے

سانس تکلیف سے آتا ہو،

(۲) برائی اونیا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ربیع کی کھانسی، کاسٹی کم ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد دھڑکی کھانسی اور کھانسی کے

ہمراہ پیشاب نکل جاتا ہو، ریز و کیو بیان کھانسی مندرجہ باب یا زوہم کتاب ہذا،

۱۹۔ حاملہ کی بوا سیر : رحم کا بوجھ پیڑ پر پڑنے کے باعث دوران خون میں

کسی قدر رکاوٹ واقع ہو جاتی ہے۔ اور مقصد کی دریدیں پھول کر بوا سیر پیدا کر دیتی ہیں،

دیگرہ وغیرہ۔

علاج (۱) کالین سونیا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔ ہما میل ۵ یا ۱x ہر دو گھنٹہ

کے بعد۔

۲۰۔ حاملہ کو بار بار پیشاب آنا : حمل کے ابتدائی دنوں میں نیز آخری

دنوں میں مثانہ میں خراش ہو کر پیشاب بار بار آیا کرتا ہے اور بعض اوقات بڑی تکلیف

تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔

(۱) بیلادونا ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۲) نکس و امیکا ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۳) پستلا ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

(۴) کینتھرس ۲x ہر چار گھنٹہ کے بعد رجب کے پیشاب جل کر اور قطرہ قطرہ

آتا ہو۔

(۵) کاسٹی کم ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔ جب کہ تقطیر بول ہو۔ کھانسنے اور چھینکنے

سے پیشاب نکل جاتا ہو ریز و کیو بیان مسلسل بول مندرجہ باب شانزدہم کتاب ہذا،

۲۱۔ حاملہ کا پیشاب بند ہو جانا : رحم کا بوجھ مثانہ پر پڑنے سے کبھی پیشاب

کا آنا رک جاتا ہے۔ ریز و کیو منقصل بیان پیشاب کا بند ہو جانا مندرجہ باب شانزدہم

کتاب ہذا

ایکونائٹ - بیلا ڈونا - کیمفر - کنٹرس - ایوسائیٹس - نکس وامیکا اور رٹاکس ادویات کام آتی ہیں -

ڈوائنگلیوں سے رحم کو اوپر اٹھائیں تو پیشاب خارج ہو جائے گا -  
بعض اوقات تولیہ کو سرد پانی میں بھگو اور نچوڑ کر پیٹ کے اوپر رکھنے سے متانہ میں سکڑاؤ ہو کر پیشاب خارج ہو جاتا ہے - نیز بعض اوقات شکم پر محرم پانی میں تولیہ بھگو کر اور پھر سرد پانی میں تولیہ بھگو کر باری باری رکھنے سے پیشاب خارج ہو جاتا ہے مریض کو آش جو یا صرف ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دینا چاہیے -

۲۲ - حاملہ کے پستان میں درد ہونا : (۱) کونیم ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
(۲) برائی اونیا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد - نیز ایکونائٹ - بیلا ڈونا - سمی سی فیوگا -  
ہیپر سلف اور پٹلا ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں -  
ہامیلز مدرٹکچر ایک حصہ اور دوغز زیتون دس حصے ملا کر چھاتیوں پر آہستہ آہستہ ملنے سے اکثر فوری آرام ہو جاتا ہے -

نیز کلوروفارم ایک حصہ اور گلیسرین ۲۰ حصے ملا کر چھاتیوں پر مالش کرنے سے درد کا آرام ہو جاتا ہے -

۲۳ - حاملہ کی شرمگاہ کی خارش : ایمبراگوشیا ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد  
نیز دیگر ادویات مثلاً ایکونائٹ - بیلا ڈونا - بورکس - کالین سونیا - کونیم - گرنفائیس -  
کریو نوٹ - لائیکو پوڈیم - مرکیورس - پلاٹینا - سی پیا - سلفر اور حقو جا بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں -

۶ ماشہ پشٹکڑی سیر بھر نیم گرم پانی میں ملا کر اس سے اندام نہانی کو دھوئیں ، یا  
بورکس اور پانی کا سولوشن بنا کر اندام نہانی کو دن میں دو تین بار دھوئیں - کو بے تک  
پانی میں دن میں کئی بار بیٹھنا تکلیف کو فوری آرام بخشتا ہے -

۲۴ - حاملہ کو سفید رطوبت آنا : زیزو دیکھو بیان سیکوریا ، سرد پانی  
سے دن میں کئی مرتبہ اندام نہانی کو دھونا چاہیے اور مریضہ کو غذا زود ہضم اور لطیف  
دینی چاہیے -

۲۵۔ حاملہ کے رحم میں درد اور تکلیف ہونا: کبھی رحم کے جھک جانے یا ٹل جانے سے اور کبھی اندام نہانی میں سوزش کی وجہ سے رحم میں درد ہونے لگتا ہے۔ چنانچہ ہوشیار دایہ سے رحم کو ٹھیک کرائیں۔ سوزش اندام نہانی کا مناسب علاج کریں۔  
ر مفصل دیکھو اس مرض کے بیان میں،

نیز اثیرس فری نو سا ۵، جلی میم ۵، پی پی فلورا ۵ اور سائی پری پیٹیم ادویات اندرونی چاہئیں۔

۲۶۔ حاملہ کو رحم کے اندر خنین کی حرکت دردناک معلوم ہونا: پیٹلا توجا۔

۲۷۔ حاملہ کا دل کوئلہ وغیرہ کھانے کو کڑوا: کاریو دیجی ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد جب کہ حاملہ کا دل کوئلے کھانے کو کرتا ہے، کلیریا کارب ۶x ہر چار گھنٹہ بعد جب کہ حاملہ کا دل کھریا مٹی چاک وغیرہ کھانے کو کرتا ہے،

## حمل کا گر جانا۔ استقاطِ حمل (ABORTION MISCARRIAGE)

قرارِ حمل کے بعد جب حمل اپنی مدت کو پورا کرنے کے قبل خارج ہو جائے۔ تو اسے استقاطِ حمل کہتے ہیں۔

نوٹ: حمل قرار پانے کے تیسرے ماہ کے اندر اندر اگر حمل گر جائے اسے ڈاکٹری اصطلاح میں ابارشن کہتے ہیں اور اس کے بعد ساتویں ماہ تک حمل گر جائے تو اسے مس میرج کہتے ہیں۔

قرارِ حمل سے تین ماہ تک استقاطِ حمل کا بہت اندیشہ رہا کرتا ہے۔ کیونکہ اس مدت تک خنین رحم میں مستحکم نہیں ہوا کرتا۔

علاماتِ مرض: حمل گرنے سے پہلے حاملہ کی طبیعت سُست ہوتی ہے بدن ٹوٹتا ہے اور کمر اور پیڑوں میں بے چینی اور دیگر ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں جیسی کہ خونِ حیض کے آتے وقت ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ بعدہ خون کم و بیش خارج ہونے لگتا ہے

پیرمو اور شکم میں کلٹنے والی دردیں ہوتی ہیں جو کہ اکثر نوبت بہ نوبت ہوتی ہیں اور آخر یہ دروین شدت اختیار کر لیتی ہیں اور دردِ دزد کی سی ہونے لگتی ہیں سینے کی جانب بوجھ کا دباؤ ہو جاتا ہے۔ پانی خارج ہوتا ہے اور جنین گر جاتا ہے۔

**اسبابِ مرض:** کئی خون یا عام کمزوری۔ رحم کی دیواروں کا بہت سخت ہونا۔ سیکوریا۔ کثرتِ مجامعت۔ رحم اور شکم کے کئی ایک شدید امراض۔ دیگر کئی ایک امراض مثلاً چھیک۔ سرخ بخار۔ نمونیا۔ سہل۔ خناق و بانی وغیرہ اور خصوصاً والدین کا یا ان میں سے کسی ایک کا مرض آتشک میں مبتلا ہونا۔ حاملہ کا حفظانِ صحت کا پوری پابندی نہ مثلاً تنگ و تاریک اور نمناک مکان میں رہنا۔ کسی بیمار کی تیمارداری کرنا اور ساتھ ہی غم کرنا۔ مسکرات اور منشیات کا بکثرت استعمال کرنا۔ وزنی چیز اٹھانا۔ گر پڑنا۔ چوٹ آنا۔ میز صیوں پر چڑھتے یا اترتے وقت پاؤں کا نیچے اور اوپر پڑ جانا۔ ٹھوکر کھانا۔ اچھلنا۔ کودنا۔ لمبا پیدل سفر کرنا۔ کتے یا گاڑی وغیرہ کی خراب نظر کوں پر سواری کرنا۔ جس میں زیادہ ہچکولے لگیں۔ دُور سے اچھلنا۔ کودنا۔ ناچنا۔ زیادہ دیر تک کپڑے سینے والی مشین پر کپڑے بیا کرنا۔ کس کر پوشاک پہننا خصوصاً شکم پر۔ تیز مہل لینا۔ رنج و غم اور فکرو تردد کرنا وغیرہ وغیرہ۔ بعض مستورات کو بدوون کسی خاص سبب کے استقاطِ حمل کی عادت ہو جایا کرتی ہے۔

## علاج

جب استقاط کا ڈر ہو: ایکونائٹ۔ آرنیکا۔ ہامیلِس۔ سبائنا۔ سکیل وائی برنم آپولس۔

دورانِ استقاط میں: کودس۔ اپنی کاک۔ سبائنا۔ سکیل مانع استقاط: ایٹرس۔ کلکیریا کارب۔ کالوفایلم۔ پستلا۔ سبائنا۔ سکیل وائی برنم آپولس وغیرہ۔

سبائنا: جب عورت کو حمل کے تیسرے مہینے حمل گرنے کا اندیشہ ہو جائے۔ یعنی خون کا داغ لگنے لگے۔ (جو کہ اکثر استقاط کی پہلی علامت سمجھی جاتی ہے) پھر کمر میں درد ہونے لگے۔ جو کہ شرمگاہ تک پھیلتا ہو اور کوہے سے شرمگاہ تک پھیلتا



ہو۔ اور کوہے سے شرمگاہ تک کھینچنے والی درویں ہوں۔ خون چمکیلا مٹرخ جما ہوا ہو۔  
تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ یہ دوائی سوزشِ رحم کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ  
ساتھ ہی اسقاط کے بعد خون کی ندیاں بہتی ہوں۔

خوراک: ۱ کے ۵ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سکیل: کمزور اور پتلی۔ دُوبلی مستورات کے لیے خصوصاً اور دیگر مستورات  
کے لیے عموماً یہ دوائی منظر ہوتی ہے۔ جبکہ اسقاطِ حمل کا ڈرخواہ حمل کے ابتدائی مہینوں  
میں پیدا ہو جاوے اور خواہ پچھلے مہینوں میں۔ اس کی علامات یہ ہیں۔

دروِ زہ کی مانند اکثر درویں ہوتی ہیں اور سیاہ تیل خون بکثرت خارج ہوتا  
ہو۔ چہرہ اندر کو محسوس کیا ہو اور ٹانگوں اور بازوؤں میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو اور  
ایسا محسوس ہوتا ہو گویا کہ اُن کے اوپر چیونٹیاں رنگ رہی ہیں اور ہوا کی بڑی  
طلب ہو۔

خوراک: ۱ کے ۵ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ڈاکٹر ہارٹ مین سکیل ۱۲ طاقت میں استعمال کرنے کی سفارش کرتے

ہیں۔  
وائی برنم آپولس: اسقاطِ حمل کو روکنے میں یہ دوائی خاص حصہ رکھتی  
ہے۔ جب کہ درویں کمرے شکم کے نیچے حصہ اور رانوں میں جاتی ہوں۔  
اس دوائی کے دینے سے یہ تشنگی درویں بند ہو جاتی ہیں۔

جن مستورات کو اسقاطِ حمل کی عادت پڑ گئی ہو۔ اُن کے لیے یہ ایک بڑی  
اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک: ۵ کے ۵ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کالوفانیلم: خاصہ دروزہ رجھوٹی درویں میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی  
ہے اور نیز یہ مانع اسقاطِ حمل بھی ہے۔

نہایت سخت دردِ کمر اور شکم سے پہلوؤں میں ہوتا ہو۔ رحم کا سکڑاؤ  
بہت کمزور ہو۔ اور خون تھوڑا نکلتا ہو۔

ڈاکٹر میڈن صاحب کے تجربہ میں یہ دوائی نہایت ہی کارآمد ثابت ہوئی

ہے۔

خوراک : ۵ کے ۵ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 سی پیلا : یہ دوائی بھی ایک مشہور مانع اسقاط حمل ہے۔ اس کی علامات یہ  
 ہیں۔ اعصابی اکساہٹ۔ ڈھیلا پن اور مقعد میں بوجھ کا احساس۔

خوراک : ۱۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 سناموم : جب اعضاء کو کچھاوٹ پہنچے۔ یا غلط قدم رکھنے کے باعث اسقاط  
 کا ڈر پیدا ہو جائے۔ خون بکثرت خارج ہو اور درد خفیف ہو تو یہ مفید ہوتی  
 ہے۔

خوراک : ۵ کے دو قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 آرنیکا : ضرب یا چوٹ لگنے یا گر پڑنے کے بعد خصوصاً جب دروزہ شروع  
 ہوں اور ساتھ ہی خون بھی خارج ہو۔ تمام جسم دھکے اور بتر سخت معلوم ہو تو یہ  
 دوائی کار آمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد  
 اکنیشیا : بوجھ یک دم صدمہ پہنچنے یا کسی قریبی رشتے دار کی موت کے سبب  
 سے جب خطرۂ اسقاط ہو۔ مریض سرد آہیں بھرتی ہو۔ اس کی طبیعت پریشان رہتی ہو  
 تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۱ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 انی کاک : سرخ رنگ کا خون مثل سیلاب کے خارج ہو اور اس کے ساتھ  
 متلی اور تھکے کی بھی شکایت ہو۔ ناف کے گرد کاٹھنے والی درویں ہوں۔ غشی ہو  
 اور ٹھنڈک معلوم ہو۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 ایکو نائیٹ : خوف لگنے یا دہشت کی وجہ سے یا ایک حمل کے گر جانے کا اندیشہ  
 ہو اور گھبراہٹ۔ بے چینی اور بخار بھی ہو۔ جلد خشک۔ پیاس زیادہ اور  
 خطرۂ موت ہو۔

خوراک : ۳ x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

بلا ڈونا: چہرہ تمہتا یا ہوا۔ آنکھیں سُرخ۔ اجتماعِ خون سر کی طرف۔ کمر میں ایسا درد گویا وہ ٹوٹ جائے گی۔ نیچے کی جانب بوجھ بہت معلوم ہو۔ گویا ہر ایک چیز اندامِ نہانی سے باہر نکل جاوے گی۔ درد دفعتاً شروع ہو اور فوراً کم ہو جائے سدھنی اور غل برداشت نہ ہو سکتے ہوں۔

خوراک: x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

سمی سی فیوگا: استقاطِ حمل کے روکنے میں جو ادویات بہت زیادہ موثر ہوتی ہیں۔ اُن میں سے ایک سمی سی فیوگا بھی ہے۔ درویں شکم کے آر پار کبھی ایک طرف سے دوسری طرف اور کبھی دوسری طرف سے پہلی طرف اڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اور مریضہ دوہری ہوئی بھاتی ہو۔ وجع المفاصل کے مزاج والی مستورات کو جب استقاطِ حمل کی غایت پہنچ چکی ہو تو یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ کے ۵ سے ۱۰ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ: دوائی کی خوراکیں ہر ۲۰ یا ۳۰ منٹ کے بعد دی جاتی ہیں۔ جبکہ مرض کا زور ہو اور جب مرض کمی پر ہو۔ تو ہر دو یا چار گھنٹہ کے بعد انتخاب کردہ دوائی کی خوراک دی جاتی ہے۔

ضروری ہدایات: جو نہی خطرہ کی ذرا سی علامات کا اظہار ہو تو فوراً حاملہ کو ایک سرد ہوا دار کمرہ میں لٹا دیں اور اُسے چلنے پھرنے یا اٹھنے کی اجازت نہ دیں حتیٰ کہ استقاط کی تمام علامات غائب نہ ہو جائیں۔ غذا ہلکی اور زود ہضم دیں۔ مثلاً اباروٹ یا ساگو دانہ۔ کچھ پیڑی وغیرہ۔

گرم اشیا پینے سے اجتناب کریں۔ مثلاً کافی یا گرم گرم چائے وغیرہ۔

مجامعت سے قلعی پرہیز کریں۔ سرد پانی میں کپڑا بھگو کر پیڑو پر رکھیں۔ یا اندامِ نہانی میں رکھیں یا برف پیڑو پر لگائیں اور اسبابِ مرض میں جن جن باتوں کا ذکر آیا ہے اُن سے بچے رہیں۔

استقاط ہو جانے کے بعد: جب استقاط ہو جانے تو اس کے بعد ویسی ہی احتیاط کرنا لازم ہوتی ہے۔ جیسی کہ وضعِ حمل کے بعد کی جاتی ہے۔ مریضہ کو آرام

سے بستر پر لٹے رکھیں اور اگر مرضیہ کافی آرام کرنے کے بغیر بستر پر سے اٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے لگے تو کئی قسم کے امراض مثلاً رحم کا اپنی اصلی جگہ سے ٹل جانا۔ رحم کا باہر نکل آنا۔ ناف کا بڑا ہو جانا۔ نیز استقاط کا عادی ہو جانا۔ ان امراض میں مبتلا ہو جایا کرتی ہے۔

### حفظ مآل قدم

ایسی مستورات کو جن کو استقاط کا ڈر لگا رہتا ہو۔ یا جن کو پہلے استقاط ہو چکا ہو۔ جو نہی کہ اُن کو حمل قرار پا جائے مندرجہ ذیل ادویات میں سے بموجب علامت دعائی انتخاب کر کے دعیا تین ماہ تک ایک یا دو مرتبہ روزانہ استعمال کوافی چاہئے۔  
کالوفانیلم۔ سمی سی فیوگا۔ ہیلو نائیزہ۔ پلسٹلا۔ سبانا۔ سیکل اور نیز کلکیریا اور سپیا وغیرہ۔

# باب ششم

## بچہ کے امراض

### کثرتِ نفاس، ولادت کے بعد خون جاری ہونا

(POSTPARTUM HAEMORRHAGE FLOODING)

اس قسم کا جریان خون ولادت کے چند منٹ کے بعد اور آنول کے گرنے سے پہلے ہوا کرتا ہے اور بعض اوقات آنول کے نکلنے وقت یا ولادت کے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے بعد ہوا کرتا ہے اور محنت خطرناک ہوتا ہے اور بعض اوقات زچہ کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے

علاماتِ مرض : زیادہ خون خارج ہو جانے کی وجہ سے مریض کا چہرہ زرد نبض چھوٹی۔ بینائی و منہلی سر میں شور و غل اور بعض اوقات غشی ہو جایا کرتی ہے۔

اسبابِ مرض : آنول کو نکالنے کے لیے اسے ہاتھ سے کھینچنا۔ آنول کا کوئی ٹکڑا رحم کے اندر رہ جانا۔ وضع حمل کے بعد رحم کا سکڑ کر اپنی اصلی جگہ پر نہ آنا۔ بلکہ ڈھیلا ڈھالا اور پھیلا ہوا رہنا۔ زچہ کا زیادہ گرم چیزیں استعمال کرنا۔ رفع حاجت کے وقت بہت زور لگانا۔ ولادت کے وقت رحم میں زخم کا ہو جانا وغیرہ وغیرہ

### علاج

کافو فائلم ۵ یا ۱۰ گرس ۵ یا ۱۰ ہمایلس ۵

اپنی کاک ۱x ہر پانچ منٹ کے بعد - سبانا - سکیل وغیرہ  
 آری جیرن - ۱x سفوف - شامویم ۵ کے تیس سے ۶۰ قطرے ہر ۱۵ منٹ  
 کے بعد -  
 کینالس انڈیکا ۱x کے ۵ قطرے ہر ۱۵ منٹ کے بعد -  
 اسٹی لاکو ۱x ملی فولیم ۵ (نیز ویکو بیان حیض بکثرت ۱۲)

## ضروری ہدایات

مریضہ بڑے آرام سے چار پانی پر لیٹی رہے - اس کا پیڑو اور کوٹھے تھوڑے  
 اونچے رہیں - سر ہاتھ صبر کے نیچے سے نکال دینا چاہیے - کسی قسم کی حرکت کرنی ممنوع  
 ہے - کمرے کے اندر مرد ہوا آنے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے کھول دینے چاہئیں  
 اور مریضہ کو چٹکا کرنا چاہیے - دایہ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رحم کو دبائے تاکہ رحم سکڑ  
 جائے - اگر رحم کے اندر آفل یا جھلی کے ٹکڑے یا خون کے چھچھڑے موجود ہوں -  
 رہو مشابہ دایہ رحم کے اندر انگلی پہنچا کر معلوم کر سکتی ہے ، تو کار بالک لوشن سے  
 رحم کو بذریعہ قوش سرخ دھو کر نکال دیں اور پیٹ کے اوپر کس کر مٹی باندھ دیں -  
 انگوری سرکہ میں پانی ملا کر مریضہ کو پینے کے لیے دیں - حسب ضرورت کئی بار  
 مریضہ پیئے -

انگوری سرکہ یا لائم خوس میں پانی ملا کر اور اس میں صاف پیرے کا ٹکڑا بھگو  
 کر ہاتھ سے رحم کے اندر داخل کریں اور ایک منٹ تک دایہ پیرے کے ٹکڑے کو  
 رحم کی دیواروں کے ساتھ لگائے رکھیں اور پھر باہر نکال دے -  
 اگر مریضہ زیادہ کمزور نہ ہو تو برف کے ٹکڑے اس کو چھونے کے لیے دیں - نیز  
 برف کے ٹکڑے اندام نہانی میں بھی رکھیں -

اخراجِ خون کے بعد مریضہ کو غیدہ عموماً آجایا کرتی ہے - غیدہ میں خلل انداز نہیں  
 ہونا چاہیے اور اس کو سونے دینا چاہیے - کیونکہ غیدہ سے ضائع شدہ طاقت بحال ہو  
 جاتی ہے -

## نفس کا بند ہو جانا

بعض اوقات ولادت کے بعد رحم سے خون وغیرہ اچھی طرح سے خارج نہیں ہوتا۔ خون کے ٹوٹھڑے رحم میں پھنس جاتے ہیں اور اسی لیے نفس نہیں آتا یا کم آتا ہے اور اس صورت میں پرسوت کا بخار اور نیز سمیت خون کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

### علاج

جب نفس آتے آتے رک گیا ہو۔ یا کم مقدار میں آتا ہو تو برائی ادویہ سہی سی فیوگا۔ فیرم فاس۔ فانی ٹولا کا۔ سکیل اور سٹرا مونیم ادویات کام آتی ہیں۔ جس دوائی کی علامات موجود ہو۔ وہی دوائی استعمال کرائیں۔ اگر نفس بدبودار ہو تو بیپ ٹیشیا۔ بیپر سلف۔ کریوزوٹ۔ نکس و امیکا۔ فانی ٹولا کا ۳x یا سکیل دیں۔

### ضروری ہدایات

دایہ رحم میں انگلی داخل کر کے خون کے ٹوٹھڑے وغیرہ باہر نکال دے اور اوپر سے زچہ کے پیٹ کو دبائے تاکہ رحم سکڑ جائے اور اگر اس طریق سے کام نہ چلے تو نیم گرم کاربائک لوشن سے رحم کو دھو ڈالیں اور پیڑا اور اندام نہانی پر سینک کر دیں۔

### ولادت کے بعد کی دردیں

(AFTER PAINS)

پہلے بچے کی پیدائش پر دردیں اتنی نہیں ہوتیں۔ جتنی کہ بعد میں بچوں کی پیدائش پر ہوا کرتی ہیں۔ بعض اوقات یہ دردیں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ مریضہ مار

دردوں کے سونہیں سکتی۔ اس لیے ایسا علاج کریں کہ دردیں سختی نہ اختیار کرنے پائیں بچے کی پیدائش کے بعد رحم سکڑ کر اپنی اصلی حالت پر آنا چاہتا ہے اور اس لیے اس کے عضلات کے سکڑاؤ سے یہ دردیں پیدا ہوتی ہیں۔

## علاج

آرنیکا : یہ ایک نہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ خاص کر جبکہ بچے کی پیدائش بہت تکلیف سے ہوئی ہو۔

خوراک : ۲x ہر ۵ منٹ کے بعد۔

نیز اسی دوائی کو خارجی طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ۲۰ قطرے آرنیکا مدرٹ کچر کے ایک چھوٹے پیالہ بھر گرم پانی میں ملا کر اور اس میں صاف کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر شکم کے نچلے حصہ پر گرم گرم کپڑے کے ٹکڑے کو رکھ کر اوپر اس کے خشک فلائین کی پٹی باندھ دی جاتی ہے۔ اس سے دردوں کو بہت آرام ہوتا ہے۔

کالوفاسیلم : ۳x ہر نصف گھنٹہ کے بعد۔

نیز دیگر ادویات مثلاً بیلاڈونا۔ کیوفر۔ کیوبیلا۔ کافیر۔ جلیسی نیم۔ نکسن امیکا سبانا۔ سکیل اور این تھراکسی نم بھی کام آتی ہیں۔

## دودھ کا بخار

(MILK FEVER)

بچہ کی پیدائش کے بعد بعض اوقات زچہ کی پھیاتیوں میں دودھ سے تناؤ ہو جاتا ہے اور لرزہ کے ساتھ بخار چڑھ جاتا ہے۔ سر۔ کمر اور اعضا میں درد ہوتی ہیں۔

## علاج

پھیاتیوں سے دودھ نکلنے کے ساتھ ہی بخار رفع ہو جاتا ہے۔ اگر بتاؤں



میں دودھ کی بہت زیادتی ہو اور بچہ آٹا دودھ نہ پی سکتا ہو۔ تو بذریعہ بریسٹ پمپ کے دودھ نکال دیں (بریسٹ پمپ ایک دودھ نکالنے والا آلہ ہوتا ہے جو کہ انگریزی ادوا فروشوں سے مل سکتا ہے) اور مندرجہ ذیل ادویات کا استعمال حسب ضرورت کریں۔

ایکونائٹ : ابتدائے مرض میں یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔ جبکہ بخار تیز ہو اور مریض بے چین ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : بخار کم ہو لیکن تنفس تنگی اور تکلیف سے آتا ہو۔ سر درد ہو اور قبض ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : چھاتیاں متورم اور دردناک ہوں اور نیز مریض کے دماغ پر بھی اثر ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورک ایسڈ : بخار تو کم ہو گیا ہو۔ لیکن پسینہ بکثرت آدے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹلا : دودھ کو باقاعدہ حالت میں لانے کے لیے یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی

ہے۔ خاص کر بخار کے ہمارے عضلات، میں وجع المفاصل کی مددیں بھی ہوتی ہوں۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

زچہ کا کمرہ گرم اور بند نہ ہو۔ بلکہ سرد ہو اور تازہ ہوا کی آمد و رفت اس میں بخوبی ہو۔ مریض کو غذا نرم اور زود ہضم مثلاً اماروٹ اور آتش جو وغیرہ دینی چاہیے۔ جب تک زچہ کو بخار رہے۔ تب تک، بچہ کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ باقی سے یا بذریعہ بریسٹ پمپ خارج کرنا چاہیے۔

## پرسوت کا بخار (PUERPERAL FEVER)

دیکھیے صفحہ نمبر ۴۸۰۔

## دودھ کی کمی (INSUFFICIENT SUPPLY OF MILK)

زچہ کی چھاتیوں میں بعض اوقات دودھ اتنا پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے بچے کی پرورش بخوبی ہو سکے۔ پس دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے انگلیس کا سٹس ۵ کے ۵ قطرے دن میں تین مرتبہ یا ایسا فوٹیڈا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد دینی چاہئیے۔ دودھ بڑھ جائے گا اور اگر مرینہ کمزور ہو اور جریان خوں یا اسہال یا سیکوریا کے امراض میں مبتلا رہ چکی ہو تو چائنا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد استعمال کرنی چاہئیے۔

## ضروری ہدایات

- ۱۔ ازندے پتوں کی بھجیا پکا کر گرم گرم پستانوں پر باندھیں۔
- ۲۔ پتوں کو جوش کما اور اس میں صاف کپڑا بھگو کر پستانوں پر اس کی ٹکڑ کر دیں۔ دودھ بڑھ جائے گا۔
- ۳۔ کسٹرائیل یا روغن زیتون کی پستانوں پر مالش کریں۔ زچہ کو غذا مقوتی اور نعدا منعم دیں۔

بلہ اس کے علاوہ سیس کونس ۶x، اریٹیکا یورنس ۵، پشٹلا - ایڈ فاس - تھائیڈائٹیم - سیٹیا - یک کینیم حسب علامات بہت مفید ہیں۔

# دودھ کی زیادتی

(EXCESSIVE SECRETION OF MILK)

بعض اوقات زچہ کی چھاتیوں میں دودھ بہت اُتر آتا ہے جس سے زچہ کی صحت پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں دودھ کو کم اور خشک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

## علاج

- ۱۔ پیٹلا : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔
- ۲۔ کلکیریا کارب : ۳x یا ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔
- ۳۔ برائی آونیا : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔ نیز  
چائنا ۱x یا  
فاسفورک ایسڈ ۱x کمزوری کو دُور کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔

## ضروری ہدایات

پستانوں پر بیلا ڈونا گلیسرین ایک حصہ بیلا ڈونا مدرشکچر اور اٹھ حصے گلیسرین ملا کر یسپ کریں اور غذا مریضہ کو معمول کی نسبت کم دیں اور دودھ بھی کم پلائیں۔

# چھاتیوں سے دودھ بے اختیار نکلتے رہنا

(INVOLUNTARY ESCAPE OF MILK)

بعض اوقات زچہ کی کمزوری؛ وجہ سے چھاتیوں سے دودھ خود بخود نکلتا

رہتا ہے -

## علاج

بورئیس - برائی اونیا - کلکیریا کارب - چائنا اور پستلا ادویات کام آتی ہیں -

## ضروری ہدایات

تیز ایسی ٹمک ایڈ ایک حصہ اور سرد پانی بارہ حصے ملا کر صبح اور شام چھاتیوں کو اس سے دھونا چاہیے اور پھر صاف تولیہ سے جلدی خشک کر لینا چاہیے -

## زچہ کا دودھ خراب ہونا

(DETERIORATED MILK)

بعض اوقات زچہ کا دودھ بہت تپلا ہوتا ہے یا برخلاف اس کے بہت گاڑھا ہوتا ہے - تپلا ہونے کی صورت میں بچہ کی پرورش بخوبی نہیں ہو سکتی اور زیادہ گاڑھا ہونے کی صورت میں بچہ دودھ کو ہضم نہیں کر سکتا اور بد معنی کا شکار بنا رہتا ہے - اگر بچہ دودھ پینے کے بعد قے کر چھوڑے یا وہ دودھ پینے سے انکار کرے تو سمجھنا چاہیے کہ ماں کا دودھ خراب ہے -

## علاج

کلکیریا کارب : دودھ تپلا پانی کی مانند ہو - زچہ کمزور ہو -

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

پستلا : دودھ کو درست حالت میں لانے کے لیے یہ ایک بڑی

زبردست دوائی ہے -

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

ضروری ہدایات : زچہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں - گھر کے تفکرات

اور خانگی جھمیلوں سے مریضہ کو بچانے رکھیں۔ تازہ ہوا اور صاف پانی پینے کے لیے دیں۔

## زچہ کا تشنج

(PUERPERAL CONVULSIONS)

علاماتِ مرض : مرض کے شروع میں سر میں درد ہوتا ہے اور چکر آتے ہیں۔ طبیعت بوجھل اور سست ہوتی ہے۔ چند یا میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ چہرہ تپتا جاتا ہے۔ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ سُن ہو جاتے ہیں۔ چہرے ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات جھٹکتے ہیں۔ نبض کی رفتار بے قاعدہ اور سست پڑ جاتی ہے۔ کانوں میں گھنٹی بجنے کی سی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ مقامِ دل پر بوجھ اور درد ہوتا ہے اور بے چینی اور تشویش بہت ہوتی ہے جب مرض پورے زوروں پر ہو تو مریضہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اُس کے چہرے، ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات میں سخت تشنج پڑتے ہیں۔ چہرہ پھول جاتا ہے۔ منہ میں جھاگ آتی ہے۔ مریضہ دانت پیستی ہے۔ سانس بظاہر رُک جاتا ہے۔ یا بہت چھوٹا سا اور تیز ہوتا ہے۔ پاخانہ اور پیشاب بے اختیار نکل جاتے ہیں اور مریضہ بکثرت سرد پسینہ (تریلی) سے تر ہو جاتی ہے تشنج کا دورہ دو سے پانچ منٹ تک رہتا ہے اور بعد مریضہ بے ہوشی میں پڑی رہتی ہے۔ یا خرابے لیتی ہے اور یکایک چونک اُٹھتی ہے اور اس کو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ کہ اُس کے ساتھ کیا گزر چکا ہے۔ یا تو تشنج کا دورہ نہیں ہوتا اور مریضہ دن بدن طاقت و صحت حاصل کرتی جاتی ہے اور اگر مرض بہت شدید ہو تو ہر چندرہ منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد تشنج کے دورے بار بار ہوتے رہتے ہیں اور مریضہ کو ہوش میں نہیں آتے دیتے۔

## علاج

ہائپوسائی مس : جب کہ تشنج تمام جسم میں پڑتے ہوں۔ یعنی آنکھوں سے

لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک تمام عضلات متشنج ہوتے ہوں۔

خوراک : ۳۰ ہرنیم گھنٹہ کے بعد۔

سائی کیوٹا وائی روسا : تشنج نہایت ہی شدید ہوں اور گردن ایک جانب

کو مڑ گئی ہو

خوراک : ۳۰ ہرنیم منٹ کے بعد۔

جلسی میم : شکم میں کڑل رعشہ اور تشنج ہوتے ہوں اور آنکھوں کی بینائی

میں بھی نقص ہو گیا ہو۔ یعنی ایک کے دودو نظر آتے ہوں۔

خوراک : ۳۰ ہرنیم گھنٹہ کے بعد۔

نیز ہائیڈروسیانک ایسڈ ۳x - بیلاڈونا ۳x - کیومیل ۳x - کافیہ ۳۰ - اگنیشیا

۳۰ - اہیم ۲۰ -

اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

زچہ کا کمرہ سرد اور اندھیرا ہونا چاہیے لیکن تازہ ہوا کا گزر اس میں بخوبی ہونا چاہیے۔ پاؤں اور جسم کو گرم رکھنا چاہیے۔ لیکن سر پر برف یا سرد پانی میں کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر رکھنا چاہیے۔

## جنون زچہ - زچہ کی دیوانگی

(PUERPERAL MANIA)

اس مرض میں مریضہ کے کوائے داعی میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ مرض آیام حمل میں ہو تو مریضہ پڑمردہ خاطر۔ غم گین اور بعض اوقات اس کی طبیعت خودکشی کی طرف مائل رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ مرض وضع حمل کے بعد ہو تو بعض اوقات شدید سمورت اختیار کر لیتا ہے۔ مریضہ بے ہودہ بکواس کرتی ہے اور کئی قسم کی وحشیانہ حرکات کرنے لگ جاتی ہے۔ نیند اس کی خواب

ہو جاتی ہے۔ بول و براز بے اختیار نکل جاتے ہیں۔ نفاس اور دودھ کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ عموماً مریضہ کو قبض رہتی ہے اور وہ کھانے پینے سے انکار کر دیتی ہے اور کبھی مریضہ اپنے آپ کو یا بچے کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن جب مرض خفیف ہو تو مریضہ غم گین اور پتہ مردہ رہا کرتی ہے اور خیالات فاسد اس کے دماغ میں رہا کرتے ہیں۔

**اسباب مرض :** اکثر تو یہ مرض موروثی ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات وضع حمل میں خون کا زیادہ خارج ہونا۔ آنول کارک جانا۔ خوف و سابقہ صدمہ دماغ یا عرصہ تک بچے کو دودھ پلاتے رہنا۔ یرقان یا دیگر امراض دماغ بھی اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔

## علاج

ہر سینکم۔ آرم۔ بیلادونا۔ کینابس انڈیکا۔ چائنا۔ سسی سی فیوگا۔ ہائیوسائمس۔ اگنیشیا۔ پلائینا۔ شرانومیم۔ ورائٹرم اٹیم۔ ورائٹرم درائیڈ۔ رنیز دیکھو میان جنون و مایخولیا باب ہفتم،

## ضروری ہدایات

ایام حمل کا جنون عموماً وضع حمل کے بعد خود بخود دور ہو جاتا ہے لیکن ایام زچگی کا جنون بالعموم نہایت تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ بہر حال مریضہ کی حفاظت کے لیے کوئی ہوشیار و تجربہ کار دایہ کو مقرر کرنا چاہیے اور مریضہ کو ہوا دار کمرہ میں جہاں زیادہ روشنی نہ ہو رکھیں اور اس کے نزدیک شور و غل نہ ہونے دیں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے حقنہ ریچکارمی کریں اور غذا مریضہ کو زود مضمم اور لطیف مثلاً دودھ۔ ساگوانہ۔ الاروٹ۔ دودھ اور سوڈا واٹر۔ شوربہ۔ نیچنی وغیرہ دیویں۔ جب مرض شدید ہو تو گرم پانی میں غسل دینا بہت مفید ہوتا ہے۔ بچہ کو الگ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ مریضہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اور بچے کا دودھ پھڑا دیں۔

# زچہ کی ٹانگ کا سفید ورم

MILKLEG (PHLEGMASIA) DOLINS

اس مرض میں زچہ کی ٹانگ میں سوزش ہو جاتی ہے اور رنگت عموماً اس کی سفید ہوا کرتی ہے۔

علاماتِ مرض : یہ مرض عموماً وضع حمل کے چند دنوں کے بعد زچہ کی ایک یا دونوں ٹانگوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ ماؤٹ ٹانگ میں شدت کا درد ہوتا ہے۔ سردی لگ کر بخار ہو جاتا ہے۔ اور سخت بے چینی ہوتی ہے۔ نیند نہیں آتی۔ کبھی ورم ران سے شروع ہو کر اوپر اور نیچے دونوں جوانب پھیلتا ہے اور کبھی ورم ران سے شروع ہو کر پاؤں کی انگلیوں تک پھیلتا ہے۔ اس ورم میں خاص خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ انگلی سے دبائے سے اس پر نشان یا گڑھا نہیں پڑتا اور رنگت اس کی سفید ہو جاتی ہے۔ بارہ چودہ یوم کے بعد مرض میں تخفیف ہونے لگتی ہے لیکن پاؤں میں سختی عرصہ تک رہتی ہے اور کبھی ورم میں پیپ پڑ کر پھوڑا بن جاتا ہے۔ اسبابِ مرض : وضع حمل کے بعد اگر بے احتیاطی سے متعفن مادہ خون میں جذب ہو جائے تو اکثر یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹانگ کی وریدوں میں خون جمع ہو کر ورم پیدا ہو جاتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ : ابتدائے مرض میں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا : ایکونائٹ کے بعد نیز جب کہ وریدوں میں گانٹھیں پڑ گئی ہوں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نیز ہامیلز ۵ اندر دی جاتی ہے اور اس کا لوشن بنا کر خارجی طور پر بھی اس

کو استعمال کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں بیلا ڈونا۔ آرنیکا۔ برائی ادینا۔ رشاکس وغیرہ



ادویات بھی اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

جوشاندہ پوست میں نڈالین یا کھدر کے ٹکڑے کو بھگو اور پھوڑ کر ماؤف مقام پر رکھیں یا اسی کی گرم گرم پلٹس باندھیں۔ جب مرض کی سختی کم ہو جائے تو ماؤف مقام پر لنی منٹ بیلہ ڈونا کی مالش کریں یا سنکچر آپیوڈین لگا دیں اور اوپیمس کے چاروں طرف روئی رکھ کر پٹی باندھ دیں۔ اگر مریضہ کو قبض ہو تو بذریعہ پچکاری رفع کریں۔ چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہ دیں۔  
غذا: مریضہ کو غذا لطیف اور نودہ مضمم دیں۔ مثلاً ساگودانہ۔ اراروٹ وغیرہ۔

### باب ہفتم

## امراض نظام عصبی

### امراض سر و دماغ

#### سر درد

(HEAD ACHE)

سر درد بذات خود کوئی بیماری نہیں۔ بلکہ بعض امراض کی یہ ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ بالخصوص امراض دماغی کی۔ جو لوگ زیادہ کھاتے پیتے ہیں۔ مثلاً شراب و کباب اور ثقیل غذا وغیرہ یا جو لوگ حفظانِ صحت کی پابندی نہیں کرتے اور گنجان آبادی اور کشیف ہوا میں رہتے ہیں یا جو اشخاص دماغی محنت زیادہ

کرتے ہیں، یارنج و غم، فکر و تردد میں مبتلا رہتے ہیں، یا غیظ و غضبہ میں آکر برا فروخت ہو جاتے ہیں، یا جو اشخاص تیز دھوپ میں پھرتے رہتے ہیں، یا جن کو گرم لو لگتی رہتی ہے، ان کو اکثر سردرد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے، بعض شدید بخاموں مثلاً تپ محرقہ، چیچک، انفلو انزہ وغیرہ میں سردرد ایک ابتدائی علامت ہوا کرتی ہے، کبھی کمزوری، خصوصاً کمزوری دماغ یا خرابی خون اور بعض دیگر امراض مثلاً آتشک، نقرس، بھس باؤ گولہ، وجع المفاصل اور دیگر بیماریوں کی وجہ سے سردرد کھنے لگتا ہے۔ مستورات میں جب حیض کا ذرا بھی نقص ہو تو سردرد نہایت سختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب بار بار سردرد کی شکایت ہو، یا یہ مرض پرانا ہو گیا ہو تو اس کے سبب کو معلوم کر کے شکایت کی اصل وجہ کو دور کرنا چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات بھاری پگڑی یا وزنی ٹوپی پہننے سے یا سر پر زیادہ بال ہونے سے سردرد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ کبھی دانت کے بوسیدہ ہونے، کبھی کان کی بیماری اور کبھی معدہ کی خرابی سے سردرد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ پس دردِ سر کے علاج میں اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو دور کرنا چاہیے۔ مختلف اسباب کے لحاظ سے دردِ سر کی کئی ایک قسمیں ہیں مثلاً :-

NERVOUS HEAD ACHE NEURALIGIC

۱- دردِ سرِ عصبی

CONGESTIVE HEAD ACHE

۲- دردِ سرِ دموی

BILIOUS HEAD ACHE

۳- دردِ سرِ صفراوی

RHEUMATIC HEAD ACHE

۴- دردِ سرِ وجع المفاصل

MIGRAINE HEMICRANIA

۵- آدھا سیسی دردِ شقیقہ

دردِ شقیقہ کا حال و علامات اور اسباب امراض وغیرہ مفصل لکھے جاتے ہیں

دردِ شقیقہ - آدھا سیسی

(MIGRAINE HEMICRANIA)

یہ سردرد عموماً نصف سر میں ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا نوبتی سردرد ہے

اس میں ابکیاں آتی ہیں، جی ملتا ہے اور آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑتی نظر آتی ہیں۔

**علاماتِ مرض :** دردِ سر شروع ہونے سے پہلے طبیعت سست ہو جاتی ہے۔ سر گھومتا ہے اور آنکھوں کے آگے چنگاریاں اڑتی نظر آتی ہیں، ان علامات کے ساتھ دردِ سر شروع ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں دھیمادھیم ہوتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد نہایت شدت کا درد ہونے لگتا ہے۔ گویا سر پھٹا جاتا ہے، حرکت کرنے سے درد زیادہ ہوتا ہے۔ مریض کو نہ تو شور اچھا لگتا ہے اور نہ روشنی برداشت ہو سکتی ہے، اکثر تو دردِ سر کے ایک جانب ہی ہوتا ہے، یعنی ایک جانب زیادہ اور دوسری جانب اس سے کم۔ جی ملتا ہے، اور ابکیاں آتی ہیں اور آخر کار دردِ سر میں یا ایک جانب کی کن پٹی میں مقیم ہو جاتا ہے اور دو تین گھنٹے سے لے کر عموماً سارا دن اور رات رہتا ہے اور کبھی کبھی دو تین یوم تک متواتر رہتا ہے۔ جب یہ درد جانے لگتا ہے تو مریض کو نیند آ جاتی ہے اور جب وہ جاگتا ہے تو اپنے آپ کو بالکل تندرست پاتا ہے۔ پھر چند روز کے بعد لیکن عموماً تین یا چار ہفتے کے بعد درد کا دورہ ہو جاتا ہے۔

**اسبابِ مرض :** زیادہ تر یہ مرض عورتوں کو ہوتا ہے۔ خونِ حیض کا بکثرت آنا یا عرصہ تک بچہ کو دودھ پلاتے رہنا اور گاہے باؤ گولہ بھی اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے، خون کی خرابی، بد معنی و بے خوابی، فاقہ کشی و کمزوری ماندگی و تکان، تیز روشنی و تیز بو۔ کثرتِ مجامعت، امراضِ گمراہ اور بالخصوص نقصِ بصارت، سمیت طیرا اس کے اسباب موند ہیں۔

## علاج

۱۔ دردِ عصبی (NERVOUS HEAD ACHE)

آرسینکیم برومیٹم ۳x گلوٹامین، اگیشیا، نیٹرم میور، میل لولس، پیسی فسفورا ان کارناما ۵ زخم دلیریا ۲x دوگرین، فاسفورس، سپاٹی جیلیا، تھوجا، زخم فاس ۲x دوگرین۔

۲۔ دردِ سردِ موی (CONGESTIVE HEAD ACHE)

ایکونائٹ بیلڈوٹا۔ برائی اونیا۔ زیرم فاس، گلوٹائین  $۳ \times$  مجلسی میم میلی لٹس سفر۔ کانٹس۔ نکس و امیکا۔ سینگونیریا، وراٹرم ورائیڈ۔

۳۔ دردِ سر صفراوی (BILIOUS HEAD ACHE)

چوننتیس، گلوٹائین، جوئے نیم، ہائی ڈرائسٹس، آرس ورسہ کور، نکس و امیکا۔ فانی ٹولا کا۔ سینگونیریا، وراٹرم الیم، اپی کاک وغیرہ۔

۴۔ دردِ سر وجع المفاصلی (RHEUMATIC HEAD ACHE)

برائی اونیا۔ کالجی کم۔ گوائیکم، سمی سی فیوگا۔ مجلسی میم۔ فانی ٹولا کا۔ سپانی جلیا۔ لائیو پوڈیم۔ رشائس۔ سی پیا۔

## تشریح علامات الادویات

ایکونائٹ : دہانے والے درد، ایسا معلوم ہو کہ ہر ایک چیز ماتھے کے رستے باہر نکل جائے گی یا کھوپڑی کو اوپر سے دیا جا رہا ہے۔ دردِ سر کے ساتھ ہی بینائی میں کمی واقع ہو۔ آنکھوں کے اوپر والے مقام تک درد، ناک کی جڑ کے قریب تنگی معلوم ہو، مریض فکر مند ہو، بخار کی حالت، سر درد سخت، جلد خشک، نبض بھری ہوئی پیاس زیادہ۔ بیٹھنے کے بعد جب مریض اٹھے تو سر چکرائے، مریض ناامیدی کی حالت میں ہو اور درد بھی ناقابلِ برداشت ہو۔

خوراک :  $۳ \times$  ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلڈوٹا : درد کن پٹیوں کی ہڈیوں میں اور ماتھے پر زیادہ معلوم ہونا، اور چہرہ بھرا ہوا۔ آنکھوں کی پلکیں جاری لگیں، بینائی بوجہ درد کم ہو گئی ہو، یا آنکھوں کے سامنے روشنی کی چنگاریاں اڑتی ہوئی نظر آویں، سر درد، چہرہ پر اجتماعِ خون، آنکھ کے ڈھیلوں میں جلن اور تپکن ہر ایک علامت میں زیادتی، روشنی، شور، حرکت یا لیٹنے سے پیدا ہو۔ مریض کا جی مجبوراً آنکھیں بند کر لینے کو چاہتا ہو۔ تین بجے سہ پہر کو زیادتی ہو۔

خوراک :  $۱ \times$  یا  $۳ \times$  ہرنیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : درد ماتھے پر زیادہ محسوس ہو، ایسا معلوم ہو کہ سر چھٹ جائے

گا۔ دہانے والے درد، آگے کی طرف جھکنے سے ایسا محسوس ہو گویا دماغ باہر نکل جائیگا۔

صفرادی قے، قلی زیادہ اور درد خصوصاً دائیں طرف کو ہو، ہر دفعہ حرکت سے زیادتی ہو آنکھوں کے ہانے سے بھی، صبح اٹھتے ہی سر درد ہو، ہونٹ خشک، زبان خشک، پیاس زیادہ، قبض، مزاج چڑچڑا۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : سر بھاری معلوم ہو، دبانے والے درد، چکراتے ہوں، چہرہ پر اجتماعِ خون، بہت خوراک کھا لینے کے بعد یا شراب کے استعمال کے بعد سر درد شروع ہو گیا ہو۔ قبض یا خانہ کی حاجت، لیکن پاخانہ خارج نہ ہو سکے، کھانا کھانے کے بعد یا دماغی کام سے زیادتی، صبح کے وقت شکایت ہو، قے کی خواہش ہو لیکن خارج کچھ نہ ہوتا ہو۔

خوراک : ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم ایلیم : سر کی چوٹی پر جلن کا احساس، آنکھ کے اوپر والے مقام پر درد۔ سر درد دورہ سے ہو، حملہ کے بعد کمزوری زیادہ ہو یا بوجہ کمزوری سر درد ہو زبان سرخ، ہلکا ہلکا بخار بھی ہو، ٹھنڈی ہوا میں یا سر کے بھگونے سے آرام معلوم ہو پیشانی میں درد ہو، کھانے یا پینے کے بعد نہایت زور سے قے ہو۔ پیاس از حد، لیکن برابر تھوڑا تھوڑا پانی پینے کی خواہش بے چینی، کمزوری، موت کا ڈر۔

خوراک : ۳x یا ۳۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

الکیشیا : محدود جگہ پر دبانے والے درد، ناک کی جڑ میں یا پیشانی پر دباؤ معلوم ہو، فکر یا رنج سے درد شروع ہو گیا ہو، بینائی میں فتور پڑ جائے، چہرہ زرد، جب سر درد کا دورہ ختم ہو جائے تو زیادہ مقدار میں زرد پیشاب خارج ہو۔

خوراک : ۱x یا ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم : چند یا پر نہایت سخت درد جو دبانے والے ہوں۔ کن پٹی کے مقام پر نیچن زرد زرد سے ہو، حملہ کے وقت بینائی کم ہو جائے، سر بڑا معلوم ہو، اعصابی مزاج والی عورتیں جنہیں مہربانیا کی شکایت ہو، زرد پیشاب زیادہ مقدار میں آنے کے بعد سر درد کم ہو جائے۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کالی بانی کمر و میکم: آنکھ کے اوپر والے مقام پر درد۔ خاص کر دائیں طرف کی آنکھ پر سرد درد کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی بنیائی کم ہو جائے اور جوں جوں درد بڑھتا جائے بنیائی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جائے۔

خوراک: ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر: درد کے ساتھ دھڑکن اور سر میں دباؤ بھی ہو، چند یا کے مقام پر جلن کھانسی سے اس میں زیادتی ہو، یا سونے کے وقت بھی حالت بدتر ہو جائے، صبح جاگنے پر بھی زیادتی ہو، لیکن دبائے سے کمی واقع ہو، سرد درد کے ساتھ اجتماع خون سر کی جانب ہو سرد روکا دورہ ہفتہ میں ایک بار ہو، صبح اٹھتے ہی مریض کو دست آئے جس کے لیے اُسے جلد بھاگنا پڑے، دُبے تپے مریض خبیث جلد کے دلتے بیرونی ادویات سے دب جانے کے بعد سرد درد کی شکایت ہو گئی ہو۔ بواسیر کی شکایت ساتھ ہی ہو۔

خوراک: ۳x یا ۴x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کلیر یا کارب: جب سرد درد بہت دیر کا ہو۔ ماتھے والے مقام پر آہستہ آہستہ درد رہے۔ سر میں ٹھنڈک معلوم ہو اور ماتھے کے مقام پر پسینہ زیادتی کے ساتھ آئے۔ مستورات میں حیض بہت زیادہ مقدار میں اور زیادہ دیر تک آتا رہے اور پاؤں ٹھنڈے ہوں خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

گلوناٹین: سخت دھوپ میں بہت دیر تک چلنے کے باعث سرد درد، یا گرمی کے تاؤ لگ جانے کے بعد شکایت ہو گئی ہو، تپکن بہت زیادہ، ہر ایک حرکت سے حالت بدتر ہو جائے چہرہ سرخ ہو کہ سر بچھٹ جائے گا۔

خوراک: ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ٹیرم میور: صبح اٹھتے ہی سرد شروع ہو اور دن میں بہت زیادہ دیر تک جاری رہے۔ کھانے سے سرد ہو، مریض میں کمی خون ہو اور کمزوری ہو، نمک والی اشیاء کو کھانے کے لیے زیادہ طبیعت چاہے۔

خوراک: ۳x ہر گھنٹہ کے بعد۔

آئرس ورس: جب سرد شروع ہو تو آنکھوں کے سامنے دھند سی دکھائی دے۔ سر میں بوجھ اور تپکن معلوم ہو، خاص کر ماتھے کے مقام پر گول ماہنے کا صا درد

ہو، سر درد کے ساتھ متلی اور قے بھی ہو۔ طبیعت بہت پٹھ مرہ ہو، سر درد کی وجہ  
معدہ کی خرابی ہو، ترش قے آوے۔

خوراک: ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سینگو نیریا: ایک طرف کا سر درد ہو، سر کے پیچھے اور گردن کے اوپر والے  
جستہ سے درد شروع ہو اور دائیں آنکھ پر جا کر مقامی ہو جائے۔ سونے سے یا لیٹنے  
سے کمی ہو، صفراوی قے اور دانت درد و کان درد بھی ساتھ، بھلی کی طرح دھک  
سر میں معلوم ہو، مریض اندھیرے کمرے میں لیٹنا پسند کرے۔

خوراک: ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سی لی شیا: مزمن سر درد ہو۔ مریض دباؤ حرکت اور روشنی کو برداشت  
نہیں کر سکتا، گرمی سے کمی معلوم ہو، گرم کپڑے میں سر کو لیٹنے سے آرام ہو، جب  
دماغی کام کی زیادتی کی وجہ سے سر درد شروع ہو گئے ہوں اور یادداشت کم ہو گئی ہو  
اور گردن کی پھلی طرف سے ہو اور ایسا معلوم ہو کہ اس مقام کے عضلات سر کو نہیں  
سہار سکتے۔ ازاں بعد دو آگے کی طرف چلا آئے اور سر کی چوٹی سے ہوتا ہوا ماتھے  
یا آنکھ پر ٹھہرے اور انہیں درد اور دھن سی محسوس ہو۔

خوراک: ۳x یا ۴x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

سپائی جیلیا: سر درد عصبی، خصوصاً بائیں طرف کو مقررہ وقت پر سر درد شروع  
ہو جائے، پیشانی سے شروع ہو کر چہرہ اور گردن تک پھیلے اور آنکھوں تک بھی جائے  
معمولی سی حرکت سے بھی زیادتی ہو جائے اور خاص کر آگے کی طرف جھکنے پر چہرہ زرد،  
بے چینی زیادہ اور دل کی دھڑکن۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پلٹلا: درد کی شکایات عموماً رات کو زیادہ ہو، اوپر کی طرف دیکھا نہ جائے  
سر درد کی وجہ تغیر غذا یا مرغن اشیاء ہوں۔ قے متلی پھیکا ذائقہ، غذا سے نفرت، صبح  
کے وقت منہ کا ذائقہ بہت خراب ہو۔ ٹھنڈی ہوا اچھی معلوم ہو۔ اور کھلی ہوا میں درد  
کی کمی ہو لیکن بند کمرہ اور گرم اشیاء سے زیادتی واقع ہو۔ اٹھ کھڑے ہونے سے سر میں چکر  
آجائیں، حیض کم مقدار میں اور تھوڑے دنوں تک رہے، جس کے ساتھ درد بھی ہو

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس: کھانا کھانے کے بعد بہت ڈکاریں آئیں اور سردی شروع ہو جائے۔ ایک دن چھوڑ کر دوسرے روز، مغز میں سردی محسوس ہو۔

خوراک: ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

چائنا: سردی کی وجہ کمزوری یا کئی خون ہو، ہاضمہ خراب، پیٹ میں ہوا زیادہ پیدا ہوتی ہو۔ درد نہایت سخت اور تپکن سی معلوم ہوتی ہو، کانوں میں شائیں شائیں پیدا ہو۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورک ایسڈ: مریض کمزور ہو، خصوصاً اعصابی کمزوری، جریان منی کی وجہ سے سردی پیدا ہو گیا ہو۔ پسینہ شدت سے آئے، دست بغیر درد کے شروع ہو گئے ہوں۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سی پیسا: پیشانی اور کن پٹی کے مقام پر درد زیادہ ہو، درد اتنا سخت ہو کہ مریض کو سر بھٹتا ہو محسوس ہو، تلی اور قے، چہرہ زرد، قبض پاخانہ سخت اور سدا کی شکل میں۔ عورتوں میں سفید رطوبت کا اخراج ہو، پیشاب نہایت بدبودار۔

خوراک: ۳x یا ۳۰ ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

مریض کو چپ چاپ کرہ میں لیٹ جانا چاہیے اور روشنی کو مدھم کر دینا چاہیے کسی قیم کا شور اس کے نزدیک نہ ہونے پائے، تاکہ نیند آنے سے اس کو سردی کا افادہ ہو جائے، آرام اور نیند قدرتی ذرائع ہیں۔ بعض اوقات گرم گرم چائے پینے سے فوری آرام ہو جاتا ہے، اگرچہ زیادہ استعمال تکلیف کا موجب ہوتا ہے۔ اگر دبانے سے آرام معلوم ہو تو کپڑے کی تروٹی سے سر کو مضبوط کس کر باندھ دینا چاہیے۔ جب سردی کا حملہ شدید ہو تو اس کے دوران میں کسی قیم کی غذا نہیں لینی چاہیے۔ لیکن جب حملہ لمبا ہو تو نرم غذا مثلاً دودھ، شوربا وغیرہ استعمال کرنا چاہیے، جو اسباب



سرور کو پیدا کرتے ہیں ان کو دور کر دینا چاہیے۔ حفظانِ صحت کے اصولوں کی پابندی غذا میں اعتدال کھلی اور تازہ ہوا۔ یہ سب درو کے حملے کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ باریک پڑھنے یا لکھنے سے یا سینے پر وزن کا کام کرنے سے جن لوگوں کو سرور کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ ان کو بعض اوقات عینک کا استعمال سرور سے رہائی دلاتا ہے۔

## سرچکر۔ دورانِ سر۔ سرگھومتا

(VERTIGO GIDDINESS)

اس مرض میں مریض کو چکر آتے ہیں اور اُسے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جب مریض کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، یا تو کسی چیز کا سہارا لیتا ہے یا بیٹھ جاتا ہے یا گر پڑتا ہے۔

علاماتِ مرض : جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے، مریض کو اپنے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں بلکہ اس کو اپنا جسم بھی گھومتا ہوا معلوم ہوتا ہے، یہ مرض جلتے پھرتے یا اٹھتے بیٹھتے زیادہ ہوا کرتا ہے، جب مرض کا حملہ تیز ہوتا ہے۔ تو آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگر اس وقت مریض بیٹھ نہ جائے تو گر پڑتا ہے، جی ملتا ہے اور قے آجاتی ہے، قے کے آنے سے چکروں کا افاقہ ہو جاتا ہے لیکن جب مرض خفیف قسم کا ہوتا ہے تو تھوڑا سا سرچکراتا ہے، کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض امراضِ دماغی مثلاً مرگی، سکٹہ اور دروشقیقہ کی یہ بیماری ایک علامت ہوا کرتی ہے، یہ مرض اکثر دورہ سے ہوا کرتا ہے۔

اسبابِ مرض : مستورات میں ماہوار حیض کا کثرت سے آنا یا بچے کو عرصہ تک دودھ پلانا، سرچکر کا موجب ہوا کرتا ہے، کھانے پینے میں بد پرہیزی، بد معنی نشیلی چیزوں کا کثرت استعمال کثرت تمباکو نوشی کثرت جماعت۔ خرابی خون، کمزوری جسم، دل جگر اور گردوں کے بعض امراض کا نول کی بیماری، دونوں آنکھوں کی بنیائی کایاں نہ ہونا، بعض عصبی امراض مثلاً مرگی، سکٹہ، دروشقیقہ وغیرہ سب اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

کوٹنیم : پیری (بڑھاپے) میں سرچکڑے کی یہ خاص دوائی ہے نیز جبکہ دورانِ سر بوجہ تمباکو نوشی اور دماغی کمزوری کے سبب سے پیدا ہوا ہو۔ مریض جب ایک چیز کی طرف لگاتار دیکھے تو وہ چیز اس کو دائرہ میں گھومتی ہوئی محسوس ہو۔ اور چڑھتے وقت یا سیرطریاں نیچے اترتے وقت چکڑے آویں اور ساتھ ہی نقاہت بہت ہو اور سونے کی طرف طبیعت راغب ہو۔ دماغ سن معلوم ہو۔

(ایمبراگوشیا پیری کے عصبی سرچکڑے میں خاص طور پر مفید ہوا کرتی ہے)  
(ایوڈین بھی بڑھاپے کے مزن دورانِ سر دماغی میں نافع ہوتی ہے)  
خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فیرم میٹیلکیم : جب بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے یکایک اٹھنے پر بوجہ کمی خون سر میں چکڑے آئیں، پہاڑی سے نیچے اترتے وقت یا پانی کو عبور کرتے وقت سر میں چکڑے آئیں۔ خواہ پانی ساکن ہو۔

(دروماہن اس وقت مفید ہوتی ہے جب کہ چلتے پانی کو دیکھنے سے سرچکڑے)  
خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کاکولیس : جب نقصِ اضمہ کی وجہ سے سر میں چکڑے آئیں تو یہ دوائی کام آتی ہے چہرہ تھماتا ہو اور سر گرم ہو، بیٹھنے پر اور گاڑی میں چڑھتے وقت تکلیف زیادہ ہو کھانے کے بعد بھی تکلیف میں زیادتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : نقصِ اضمہ کے باعث سر میں چکڑے آئیں، جی متلائے اور غشی تک نوبت آجائے۔ حرکت کرنے اور اٹھنے پر تکلیف زیادہ ہو۔

خوراک : x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

چائنا : نقصِ اضمہ کے ساتھ جب کہ نقاہت یا کمی خون بھی موجود ہو تو ایسے حالات میں دورانِ سر کے لیے یہ ایک مفید دوائی ہے۔ کمزوری اور رطوبتوں کے اخراج سے چکڑے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 نکس و امیکا اور پٹسلا : ادویات بھی نقص باضمہ کی وجہ سے جب سرچکر اتنا  
 ہو تو مفید ہوتی ہیں۔

فاسفورس : ڈاکٹر ولیم بورک کا قول ہے کہ خواہ کسی قسم کے سرچکر ہوں فاسفورس  
 دوائی شافی ہوا کرتی ہے خصوصاً جب کہ عصبی نقابت کثرت مجامعت کی وجہ سے یہ مرض ہو  
 بوقت صبح خالی شکم سرچکر اوئے ساتھ ہی غشی اور کپکپاہٹ ہو۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 رٹاکس : دوائی بھی پیری میں مفید ہوتی ہے۔ جب کہ بیٹھے ہوئے اٹھنے پر مریض  
 کو چکر آئیں۔ ہاتھ پاؤں بوجھل محسوس ہوں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 کاسٹیکیم : فالج کے قبل جبکہ دوران سر کا عارضہ ہو جائے تو یہ دوائی مفید  
 ہوتی ہے۔ سر میں کمزوری اور تشویش بہت ہو اور مریض آگے کی طرف یا پہلو کی  
 جانب گرتا جاتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 ارجنٹم نائٹرکیم : یہ دوائی اس قسم کے سرچکر میں مفید ہوتی ہے جب کہ ساتھ  
 ہی نقابت اور کپکپاہٹ بہت ہو اور ذہن میں بقراری ہو اور پھیلاوٹ کا احساس  
 ہو۔ مریض کو ایسا محسوس ہو کہ گلی میں سے گزرنے پر مکانات اُس کے اوپر آ گئیں  
 گے۔ جب امراض دماغ و چشم کی وجہ مرض ہو تب بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
 نیرم سلی سائی لیکم : جب دوران سر کا عارضہ عصب سماعت میں  
 نقص کی وجہ سے ہو تو یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ دیگر ادویات جو اس حالت  
 میں مفید ہوتی ہیں یہ ہیں، چینم سلفیورکیم، جلیسی میم کاسٹی کم۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
 تھری ڈی ان : یہ دوائی خاص عصبی سرچکر میں کام کرتی ہے۔ خاص کر  
 آنکھیں بند کرنے پر جب چکر آویں ساتھ ہی جی تلائے اور شور یا حرکت سے تکلیف

زیادہ ہو۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں جلسی میم، کلیریا کارب، بورکیس، سلفر، بیلا ڈونا، نیرم میور، کویکولس ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

نوٹ : جب امراض گوش کے سبب سر چکراتا ہو۔ جی متلاتا ہو، قیئیں آتی ہوں، مریض سست اور مڑھ ہو جاتا ہو، کان بجیں یا برسے ہو جاتے ہوں تو اس مرض کو میسر ڈیزیز کہتے ہیں۔

ضروری ہدایات : مرض کے اصل سبب کو دور کریں۔ فعل مفہم کو درست رکھیں اور قبض نہ ہونے دیں، اگر امراض دماغی مثلاً مرگی یا درونیم سر یا نقرس وغیرہ کی وجہ سے دوران سر کا عارضہ ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ اگر عصبی کمزوری یا کمی خون کی وجہ یہ عارضہ ہو تو مریض کو فسکر و ترود دیگر دماغی محنت سے پرہیز کرائیں شراب یا چائے یا قہوہ یا تمباکو پینے سے باز رکھیں، مجامعت سے بھی پرہیز لازم ہے اور اغذیہ مقوی ہوں۔

اگر امراض گوش کی وجہ سے دوران سر کا عارضہ ہو اس کا مناسب علاج ہونا چاہیے اور اگر نقص بصارت اس مرض کا باعث ہو تو اس کو دور کریں۔

## دماغ کا ہل جانا

(CONCUSSION OF BRAIN)

اس مرض میں دماغ کے دوران خون میں خلل واقع ہو کر اس کے افعال میں نقص واقع ہوتا ہے۔ جس کے باعث دل کا فعل کمزور ہو جاتا ہے اور دماغ میں خون کی کمی ہو جاتی ہے۔

علامات مرض : ۱۔ جب خفیف قسم کا صدمہ دماغ کو پہنچے تو مریض کا سر چکراتا ہے۔ اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور یہ تکلیف چند منٹوں تک رہتی ہے۔ بعض اوقات ضعف و غشی غالب آکر مریض کے لیے کھڑا ہونا محال ہو جاتا ہے۔ جی متلاتا ہے اور قیئیں آتی ہیں۔

۲۔ شدید قسم کے صدمہ دماغ میں مریض پر مکمل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ جاتی ہیں جسم سرد اور زرد ہو جاتا ہے، سانس بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے نبض کی رفتار بہت سست ہو جاتی ہے اور عالم بے ہوشی میں بول و ہاز بے خبر نکل جاتے ہیں۔ عضلات جسم سست ہو کر ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور اسی حالت میں چند منٹوں سے لے کر چند گھنٹوں تک مریض پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ یا تو اس کی بحالی ہونے لگتی ہے، دورانِ خون درست ہو کر جسم گرم ہو جاتا ہے اور کچھ عرصہ کے بعد قے ہو کر مریض ہوش میں آ جاتا ہے یا فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔

اسباب مرض : سر پر چوٹ لگنا یا زور کا دھکا لگنا یا ریل گاڑی کے ٹکرا جانے سے مسافروں کا ٹکرا نا وغیرہ۔

## علاج

آرنیکا مونٹ : اس مرض میں یہ ایک مجرب دوائی ہے جبکہ یہ عارضہ چوٹ آنے کی وجہ سے ہو۔

خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائٹ : اگر بخار ہو جائے تو ایکونائٹ اور آرنیکا ادویات باری باری سے دینی چاہئیں۔ لیکن اگر دماغ میں بھاری نقص واقع ہوا ہو جس کے باعث سرد اور چہرہ تمہتا ہوا یا دیگر علامات موجود ہوں تو ایکونائٹ اور بیلادونا باری باری دینی چاہئیں۔

خوراک : ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اوپیم : مریض خراٹے لیتا ہو اور قبض سخت ہو۔

خوراک : ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : مریض کو بالکل آرام سے ہوا دار کمرے میں لٹائے رکھیں اور سرد پتھر رکھیں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ دیں، چپ چاپ آرام سے پڑا رہنے دیں اور جگانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اس کا جسم سرد ہو جائے تو گرم پانی کی بوتلیں اس کی بغلوں اور رانوں میں رکھیں اور جسم کو کبل میں لپیٹ دیں جب مریض ہوش میں آنے لگے تو تھوڑا تھوڑا دودھ پلائیں۔ قبض ہر گز نہ ہونے

دیں۔ مریض کے کمرے میں شور و غل اور اونچی اونچی باتیں نہیں کرنی چاہئیں اور روشنی بھی کمرے میں مدہم ہونی چاہیے۔

## دماغ میں خون کی زیادتی

(CEREBRAL HYPERAEMIA)

علاماتِ مرض: تمنا ہوا، سرخ چہرہ، گردن کی شرائین بہت تڑپتی ہیں۔ اور سخت سر درد ہوتا ہے۔ بعد ہذیان اور تشنج، بے ہوشی اور دیگر علامات مانند سکتہ رونما ہوتی ہیں، بخار اس مرض میں موجود ہوتا ہے۔

اسبابِ مرض: یہ مرض مردوں کو بمقابلہ مستورات کے زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور خصوصاً نوجوانوں کو کھانے پینے میں بے اعتدالی ایون نوشی کی عادت، دماغ میں چوٹ آنا یا دماغی محنت زیادہ کرنا یہ سب اس مرض کے اسباب ہیں نیز شدید کھانسی دم کشی، ٹوگنا، شدت جذبات دماغ کی شریانوں کا مفلوج ہونا وغیرہ بھی اس مرض کے اسباب ہیں۔

## علاج

خفیف قسم کے مرض میں بیلا ڈونا یا ایکونائٹ کی چند خوراکیں دینے سے شفا ہو جاتی ہے۔ سر درد کانوں میں بھنبھناہٹ، بے خوابی وغیرہ کی شدت بیلا ڈونا کی چند خوراکیں دینے سے دور ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بخار تیز ہو، جلد خشک اور سخت بے چینی اور موت کا ڈر موجود ہوں تو ایکونائٹ بہت موزوں ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۲x یا ۳x ہر نیم گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم: اس مرض میں یہ بھی ایک مفید دوائی ہے، دورانِ سر عضلاتی کمزوری، مدہوشی اور خفیف بخار اس کی علامات ہیں۔

ڈاکٹر جوہر اس دوائی کو نکالتے ہوئے بچوں اور عصبی مزاج والے اشخاص کے لیے مفید بتلاتے ہیں۔

خوراک: ۲x یا ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

گلوٹامین : ٹو لگنے کی وجہ سے جب یہ عارضہ ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ شدید سر درد، خون حیض یکایک بند ہو جانے کی وجہ سے جب یہ عارضہ ہو جائے تو بھی یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۲x یا ۳x ہر پندرہ یا تیس منٹ کے بعد۔

اوپیئم : اس مرض میں یہ بھی ایک مفید دوائی ہے، چہرہ سرخ اور پھولا ہوا، مدہوشی، سانس خراٹے دار۔

خوراک : ۲x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اگر یہ مرض بیرونی چوٹ آنے کی وجہ سے ہو تو آرنیکا دوائی دینی چاہیے اور اگر یہ کافی دشانی ثابت نہ ہو تو ہائی پریم دوائی استعمال کرنی چاہیے۔

اٹروپینیم : ۳x بھی خراب کیوں میں شافی ہوا کرتی ہے۔

ضروری ہدایات : مرض کے اصل سبب کو دور کریں۔ مریض کو ایک اندھیرے

کمرے میں رکھیں اور اس کے گریبان اور گلو بند کو ڈھیلا کر دیں اور سر کو تھوڑا اونچا رکھیں۔

سرد پانی میں کپڑا تو کر کے اس کے سر پر رکھیں یا برف لگائیں۔ ہاتھ، پاؤں، بازوؤں اور ٹانگوں کو گرم رکھیں، دودھ میں سوڈا واٹر یا آتش بخور ملا کر دیں۔

## ضعف دماغ - کمی خون دماغ

(CEREBRAL ANAEMIA)

اس مرض میں سارے دماغ یا اس کے کسی حصہ میں خون کی کمی واقع ہو جاتی

ہے۔

علامات مرض : مدہوشی، سستی، اس کی خاص علامات ہیں۔ تھوڑا سا کام

کرنے سے مریض بہت تھک جاتا ہے، بلکہ غشی طاری ہو جاتی ہے۔ قوائے عقلیہ و دماغی بے حس ہو جاتے ہیں۔

اسباب مرض : عام کمی خون، ضعف قلب و شرائین، دماغی شریانوں میں

سدہ وغیرہ کا ہونا۔ جریان خون، سخت مشقت، رسولی بواسیر۔

## علاج

امونیم کارب : اس مرض میں یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ سستی و کابلی، بھوک کا مارا جانا وغیرہ اس کی علامات ہیں۔

خوراک :  $3 \times$  ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
 فیرم میٹیلکیم : اس مرض کی یہ ایک بڑی قیمتی دوائی ہے۔ غشی، سخت کمزوری اُٹھنے پر سر جھکنا، درد چہرہ، دل کا پھر پھر انا اس کی علامات ہیں۔ ظاہر طور پر مریض میں بہت خون معلوم ہو۔ لیکن حقیقت میں خون کی کمی ہو اور مریض بہت سست اور کابل ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم : جب طبعی طور پر علاج ناکام ہو تو یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے، طاقت زسیت کمزور ہو، جی متلاتا ہو، ہاتھ پاؤں اور چہرہ پھولے ہوئے ہوں اور نقاہت بدرجہ کمال ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

چائنا : جب رطوبات زندگی کے جسم سے لگاتار اخراجات کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہو گیا ہو تو چائنا دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔

خوراک :  $1 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : اس مرض کی یہ بھی ایک مفید دوائی ہے۔ دماغی محنت و دیگر صدمہ کی وجہ سے مادہ سستی ترقی پذیر ہو جائے اور ان حالات میں دماغ میں کمی خون کا عارضہ ہو۔

خوراک :  $6 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹا : نوجوان مستورات کے لیے یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ ٹھنڈک سر چکر کھلی ہوئی آرام۔ جس حیض اور اسہال اس کی علامات ہیں۔

خوراک :  $3 \times$  یا  $30$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا فاس : یہ دوائی اس مرض میں خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔ جب



غذا تحلیل ہوتی ہو۔

خوراک : ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

زنگم میٹیلکیم : مزمن مرض میں یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے، خاص کر جبکہ پوٹاشیم برومائیڈ زیادہ استعمال کرنے کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں نکس دامیکا۔ اگنیشیا۔ نیٹرم میور۔ سلیشیا اور سلفر ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات : عام کمزوری کا علاج کریں اور مرض کے سبب کو دور کریں مریض کے سر کو اس کے جسم کی نسبت نیچا رکھیں اور پاؤں سے لے کر انوں کی طرف اور ہاتھوں سے لے کر پاؤں کی طرف یعنی نیچے سے اوپر کو مالش کریں تاکہ خون دماغ کی طرف زیادہ جاوے۔ غذا لطیف اور مقوی دیں اور مریض کو کھلی اور تازہ ہوا میں رکھیں تبدیلی آب و ہوا بھی نافع ہوتی ہے۔ دماغی کام منع ہے۔

## سر میں پانی بھر جانا

### استسقاء الدماغ مزمن

(CHRONIC HYDROCEPHALUS)

سر کی کھوپڑی کے اندر میرم یعنی آب خون جمع ہو جاتا ہے جس کے باعث بیمار کا سر بڑا ہو جاتا ہے۔

علامات مرض : جب یہ مرض پیدائشی ہو تو ابتدا میں اس کے علامات پورے طور پر واضح نہیں ہوتے، سوائے اس کے کہ بچہ کی آنکھوں میں جھینگا بن جاتا ہے۔ یا آنکھوں کے دھیلے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں لیکن بعد ازاں سر بڑا ہونے لگتا ہے اور تشنج ہوتے ہیں، موٹی موٹی علامات مرض کی یہ ہوتی ہیں :-

سر کی کھوپڑی اور چہرے کی قد و قامت میں تناسب نہیں ہوتا۔ یعنی سر بڑا ہوتا

ہے اور چہرہ بہت چھوٹا۔ چند یا کی ہڈیاں بہت کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور انگلیوں کے ساتھ دبائے سے سر کی ہڈیاں پتلی معلوم ہوتی ہیں۔ بچہ اگرچہ دودھ کافی اور بخوبی پیتا ہے۔ لیکن اس کا جسم نشوونما نہیں پاتا۔ سر بتدریج بڑا ہوتا جاتا ہے اور سر میں گرمی ہوتی ہے اور بچہ بے چین ہو جاتا ہے۔ چہرہ چھوٹا و کمزور شکل کا ہوتا جاتا ہے۔ اور مریض یٹا رہتا پسند کرتا ہے۔ جب مریض بچہ موت کے منہ میں جا رہا ہو تو اس کے ہوش و حواس میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور منسلوج ہو کر رہی ملک عدم ہوتا ہے۔ تشنج یا تشنجی ڈبر ایسے بچوں کو عموماً ہوتا ہے۔ بعد پیدائش کے جب یہ مرض شروع ہوتا ہے تو مقوی غذا کھانے کے باوجود بھی مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ سر قد میں اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ بلا سہارے ٹھہر نہیں سکتا۔

اسباب مرض: یہ مرض عموماً سال سے کم عمر کے بچوں کو ہوتا ہے۔ جب کہ چند یا کی ہڈیاں ابھی کھلی ہوتی ہیں اور آپس میں جڑی ہوئی نہیں ہوتیں، بعض اوقات جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، جب جنین مبتلائے مرض ہو تو وضع حمل کے وقت بہت وقت ہوتی ہے۔ سات یا آٹھ سال کی عمر کے بچے بھی اس مرض میں مبتلا دیکھے گئے ہیں، لیکن جوانی میں یہ مرض شاذ و نادر ہی ہوتا ہے سر دی گنا، صدمہ دماغ۔ دماغ تک کان کی سوزش کا پھیل جانا۔ دانتوں کا نکلنا۔ چیچک۔ خسرہ۔ کالی کھانسی، تخرخ بخار۔ کرم امعاء۔ گندی مٹوا۔ کسی جلدی مرض کا یکایک غائب ہو جانا دماغ کے نشوونما میں نقص واقع ہونا وغیرہ وغیرہ یہ اس مرض کے اسباب ہیں۔ شرابی اور آشکی والدین کی اولاد اس مرض میں مبتلا ہوا کرتی ہے۔

## علاج

کلکیر یا فاس: مریض بچوں کا رنگ پیلا اور چہرہ سا نولا۔ ناک اور کان سرو۔ دانتوں کا دیر سے نکلنا۔ پاخانے ڈھیلے برنگ سبز اور لمبی دار آتے ہیں اور بچہ لگاتار دودھ پینے کی خواہش کرتا ہو۔

خوراک: ۳x یا ۶x دن میں تین یا چار مرتبہ۔

کلکیر یا کارب بھی مندرجہ بالا علامات کی موجودگی میں مفید ہوتی ہے۔ خاص کر جبکہ

مرض کا حملہ شدید ہو اور بیلہ ڈونا کے دینے سے آرام نہ ہوا ہو۔ سوتے سوتے بچہ کا سر پسینہ سے تر ہوتا جاتا ہو۔ شکم تنا ہوا اور ٹانگیں سوکھی ہوئی ہوں۔  
خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

بیلہ ڈونا : جب مرض کا حملہ شدید ہو، بخار ہو اور چہرہ متمایا ہوا ہو بے چینی چھیلی آنکھیں پتلیاں پھیلی ہوئیں اور مریض سر اٹانے کے ایک سرے سے لیے کر دوسرے سرے تک سر کو گھماتا ہو، خوف زدہ ہو کر سوتے سوتے چونک اٹھتا ہو، تشنج ہوں سرگرم اور پاؤں ٹھنڈے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایلی بورس : بے ہوشی طاری ہو۔ بچہ سوائے پانی کے اور کچھ خواہش نہ کرے۔ لیکن جب پانی دیا جاوے تو بڑی تیزی سے اس کے پینے کی خواہش کرے۔ پیشاب رک گیا ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایپیس میل فیکا : دماغ کے پردوں کی سلی دم میں جبکہ بچہ سر کو سر ہانے میں گھسیڑتا ہو اور کبھی ادھر اور کبھی ادھر سر کو مارتا ہو اور پیشاب مقدار میں کم آتا ہو، یہ دوائی آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے اور جب پیشاب مقدار میں زیادہ آنے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ دوائی نے اپنا اثر کرنا شروع کر دیا ہے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

زنگم : مریض بچہ سر کو گھماتا ہو اور خوفزدہ ہو کر نیند سے بیدار ہو جاتا ہو۔ سر کا پچھلا حصہ گرم اور پیشانی ٹھنڈی ہو۔ دانت پٹتا ہو۔ آنکھیں گڑھی ہوئیں اور تارے لگی ہوئی اور روشنی سے بیزار ہوں۔ ناک خشک ہو اور سوتے میں عضلات جھکتے ہوں۔

خوراک : ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : جب جلدی مرض یکایک غائب ہو جائے تو یہ دوائی جادو نما اثر دکھاتی ہے۔ جو مریض بچے خنزیری مزاج کے ہوں ان کے لیے یہ دوائی مفید تر ہے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بسی لائیم : شدید مرض کا علاج اس دوائی سے شروع کرنا چاہیے۔ دوائی کے چند قطرات نیم پاؤ پانی میں ڈال کر اس میں سے ایک ایک چھوٹا چمچ ہر چار گھنٹہ کے وقفہ پر مریض کو پلاتے جانا چاہیے۔ اگر یہ دوائی موثر معلوم ہو تو اسی کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ دوائی کافی دشانی ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x یا ۱۰۰ یا ۲۰۰

ایوسائیٹیم : جب مریض کی ایک ٹانگ اور ایک بازو لگاتار بے اختیار ہلتے رہتے ہوں۔ پیشاب نہ آتا ہو۔

خوراک : ۵ کا ایک قطرہ ایک چمچ پانی میں ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آیوڈیم : خنازیری مزاج کے بچے جن کے غدود بڑھے ہوئے ہوں اور سلی مادہ موجود ہو۔ اس دوائی سے بہت مستفیض ہوتے ہیں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی آیوڈائیڈ : جن مریض بچوں کے خون میں آتشکی مادہ موجود ہو اور جن کو بوقت شب تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ ان کے لیے یہ دوائی زیادہ موثر ہوتی ہے۔

خوراک : ۱۰ کا ایک قطرہ ایک چمچ پانی میں ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سلیشیا : سر بڑا۔ پسینہ صرف کھوپڑی پر ہی نہیں بلکہ سارے سر پر آتا ہو مریض سوتے ہوئے یکایک چونک اٹھتا ہو۔ گندے ڈکار۔ چہرہ مٹرخ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے۔ یہ اس دوائی کے خاص علامات ہیں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ان کے براہ کارب۔ برائی ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

احتیاط : اس مرض میں مبتلا بچے جس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس خاندان کی عورتوں کو مرض کی روک تھام کے لیے سلفر ۶x ایک روز اور کلیریفاس ۶x

۱ ڈاکٹر نیشن نے ٹوبرکولینم کو بھی اس مرض میں مفید بتایا ہے۔

دوسرے روز لگاتار دورانِ حمل میں دیتے جانا چاہیے۔

سکتہ

(APOPLEXY)

اس مرض میں دماغ کے اندر بعض مقامات میں خون کی رگ پھٹ جاتی ہے اور ان مقامات میں خون جمع ہو جاتا ہے جس کے باعث حواس و حرکات جسمانی معطل ہو جاتے ہیں۔

علاماتِ مرض : اصل مرض سے پہلے بعض اوقات علاماتِ تذکرہ پیدا ہوا کرتی ہیں۔ چنانچہ بار بار سر درد ہونا خصوصاً سر کے پچھلے حصہ میں۔ سر جھکاتا ہے جی تھکتا ہے۔ نبض عموماً بھری ہوئی اور سخت چلتی ہے۔ مریض کے حواس اور گفتگو میں نقص واقع ہو جاتا ہے یا بالکل بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ فالج اور تشنج ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ مرض کا حملہ سخت ہوا کرتا ہے۔ مریض عالم بے ہوشی میں گر پڑتا ہے اور خراٹے دار سانس لیتا ہے۔ بعدہ سانس وقت سے آتا ہے اور مریض چند گھنٹوں میں چل بتا ہے

حرارتِ جسم ابتداء میں نارمل ہوتی ہے، لیکن پھر ۱۰ یا اس سے بھی زیادہ درجہ کا بخار چڑھ جاتا ہے، جب مریض کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے تو اس کو ہوش آ جاتی ہے۔ لیکن اس کا گلا بیٹھ جاتا ہے اور فالج رہتا ہے، عموماً فالج نیم جسم کو ہوا کرتا ہے، خواہ بائیں طرف خواہ دائیں طرف کا یہ فالج کچھ عرصہ کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ فالج ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے۔

اسبابِ مرض : جوانی کی نسبت بڑھاپے میں مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ بد معنی، کثرتِ بے خواری اور دماغی الجھن رفع حاجت کے وقت بہت زور لگانا، نقرس اور آتشک اس کے اسبابِ مؤثرہ ہیں۔ چھوٹی مضبوط اور موٹی گردن والے اور دموی مزاج والے اشخاص عموماً اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں، دماغ کو صدمہ آنا۔ چوٹ یا گر پڑنا یا سر پر کمرہ مارنا اکثر دماغ میں جریانِ خون کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔

## • علاج

جب ابتدائی علامات ظہور پذیر ہوں تو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ مضم نہ ہونے والی غذا۔ شراب و دیگر منشیات دماغی اور جسمانی محنت اور فکر و تردد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابتدائی حالت میں (۱) نکس و امیکا اور (۲) فاسفورس کام آتی ہیں۔ بدھیمی۔ قبض۔ ترشی معدہ اور ورزش نہ کرنے کی خرابی کو دور کرنے کے لیے نکس و امیکا بہتر دوائی ہے۔ لیکن بکثرت دماغی محنت وغیرہ کی حالت میں فاسفورس۔ جب مرض کا حملہ فوری اور شدید ہو تو ایسی حالت میں بیلا ڈونا اور اوہیم بہترین ادویات ہیں۔ بیلا ڈونا اس وقت جب کہ چہرہ سرخ ہو۔ شرابین تڑپتی ہوں اور مدہوشی ہو اور اوہیم اس وقت جب کہ مدہوشی ہو۔ مریض سانس خراٹے دار لیتا ہو اور دماغ کے فالج ہونے کا ڈر ہو۔ لیکن جب درمی علامات ترقی پذیر ہوں نبض سخت اور بھری ہوئی ہو۔ بے چینی وغیرہ موجود ہوں۔ تو ایکونائیٹ فوراً استعمال کرنی چاہیے۔

ہائیڈروسیانک ایسڈ اور لاراسی راسس دو بڑی مفید ادویات ہیں جو کہ بدقت سانس آنے، نبض کے گم ہونے، جسم کے ٹھنڈا ہونے، نفخ اور موت کے پنجہ میں گرفتار ہونے کی حالت میں کام آتی ہیں۔ اگر فالج باقی رہ جاوے تو مندرجہ ذیل ادویات مفید ہوتی ہیں۔

کاسٹیکم : فالج عامہ کے لیے سب سے بہتر دوائی ہے۔ پلم بک بھی مفید دوائی ہے۔ اس کو اونچی طاقت میں دینا چاہیے۔

علامہ ازیں آر جیٹم نائٹریٹیم، گریفامیٹس۔ رٹاکس اور اناکار ڈیم بھی کام آتی ہیں۔

آرنیکا : اس وقت مفید ہوتی ہے۔ جب کہ فالج بوجہ صدمہ کے واقع ہوا ہو۔ دماغ میں جمع شدہ خون کو جذب کرنے میں یہ دوائی بہت موثر ہوتی ہے۔ شدید کیسوں میں ادویات کی خوراکیں جلدی جلدی دہرائی جائیں۔ لیکن جب منہ کے راستہ سے دوائی نگلنی مشکل ہو تو انتخاب شدہ ادویات کو سونگھنا چاہیے۔

حفظہ ماتقدم : جب اس مرض کا احتمال ہو تو شراب خوری سے قطعاً پرہیز

کہیں، دماغی و جسمانی محنت کم کریں، رفع حاجت کے وقت زور نہ لگائیں۔ جماعت سے حتی الامکان بچیں، قبض نہ ہونے دیں۔ لطیف و زود مضامین غذا میں کھائیں اور ہوا دار مکان میں بود و باش رکھیں۔

علاج بوقت حملہ مرض: مریض کو فوراً آرام سے لٹادیں۔ گلے اور سینہ کے مٹن کھول دیں اور تازہ ہوا مریض کو پہنچائیں۔ کمرے کی کھڑکیاں وغیرہ کھول دیں، آب سرد میں کپڑا تکر کے سر پر رکھیں۔ ارد گرد لوگوں کا مجمع نہ ہونے دیں۔ مریض کے پاؤں گرم پانی میں رکھیں۔ یا گرم پانی کی بھری ہوئی بوتلیں تلوؤں پر لگائیں اور مریض کو فوراً انیما کو دیں۔

## دماغ کا نرم پڑ جانا

(SOFTENING OF THE BRAIN)

جوانوں کی نسبت بوڑھوں کو یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ سخت دماغی محنت کرنے یا سُدہ دماغ کی وجہ سے یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

علامات مرض: سر میں اور خصوصاً پیشانی پر تھوڑا بہت درد ہوتا رہتا ہے گلابے آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں میں جھونٹیاں رہتی ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ گاہے وہ سن معلوم ہوتے ہیں اور گلابے سخت۔ مریض کا مزاج چڑچڑھا ہو جاتا ہے اور وہ اتنا پست ہمت ہوتا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف سے بھی رو پڑتا ہے۔

## علاج

فاسفورس ۶x اور برائٹا کارب ۶x۔ کالی فاس ۳x اور زینکم فاس ۳x ادویات اس مرض میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات: مریض کو غذا ملنی اور مقوی دیں اور آرام سے ہوا دار کمرے میں لٹائے رکھیں اور اسے سنج و غم، فکرو تردد سے آزاد رکھیں مریض کے سر کو اُونچا رکھیں اور اس کو قبض نہ ہونے دیں۔

# دماغی پردوں کا درم

(MENINGITIS-INFLAMMATION OF THE BRAIN)

اس مرض میں دماغ کے پردوں میں درم ہو جاتا ہے۔  
 علامات مرض : مرض کے شروع ہونے سے پہلے کبھی سر میں درد ہوتا ہے۔  
 مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے اور فینہ نہیں آتی۔ لیکن عموماً مرض کا حملہ یکایک ہو جاتا  
 ہے۔ یعنی تیز بخار چڑھ جاتا ہے۔ شدت کا سر درد قیئیں اور قبض ہوتی ہے۔  
 جلد جسم اور حواس خمسہ مثلاً بصارت اور شنوائی وغیرہ بہت ذکی الحس ہو جاتے ہیں۔  
 اور سخت ہڈیاں ہو جاتا ہے۔ مریض بحالت ہڈیاں پارچات بستر کو نہ چتا ہے یا ہوا کو  
 پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ پتلیاں پھیلتی اور سکڑتی ہیں اور روشنی کو محسوس نہیں  
 کر سکتیں۔ مریض دانت پیتا ہے۔ سر کو ادھر ادھر گھماتا ہے اور عالم بے ہوشی  
 میں پڑا رہتا ہے۔ جب مرض کی بہت تندی ہو تو سانس بے قاعدہ آتا ہے۔  
 پیشاب رک جاتا ہے۔ قبض ہوتی ہے اور شکم تن جاتا ہے۔ عضلات جھٹکتے ہیں  
 تشنج یا فالج ہو جاتا ہے۔ مریض بالکل بے ہوش پڑا رہتا ہے۔ پتلیاں بہت پھیل جاتی  
 ہیں اور روشنی کو محسوس نہیں کرتیں۔ آنکھیں نیم وا چہرہ ڈراؤنا اور اندر کو دھنس جاتا  
 ہے۔ جلد جسم سرد اور چمکی ہو جاتی ہے۔ بول و براز بے اختیار نکلتے ہیں۔ نبض پہلے  
 کی نسبت زیادہ تیز ہو جاتی ہے اور مریض خراٹے لیتا ہے اور آخر کار موت کے  
 منہ میں چلا جاتا ہے۔

اسباب مرض : سر کو چوٹ آنا، یا گر پڑنا، سخت گرمی، تمازت آفتاب  
 ناک یا کان کے درم کا دماغ میں چلا جانا۔ چیچک یا جلدی امراض یا آتشک یا گنٹھیا  
 وغیرہ امراض کے مادہ کا دماغ کی طرف رجوع کرنا۔ کثرت شراب خوری یا کثرت دماغی  
 محنت غیظ و نفثہ وغیرہ اس کے اسباب ہیں، مادہ سل کا دماغ میں موجود ہونا بھی اس  
 کا ایک بھاری سبب ہے۔



## علاج

بلاڈ وٹا : شروع مرض میں یہ دوائی بہت کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ جسم خوب تپتا ہے۔ نبض تیز، چہرہ چمکیلا، سرخ اور بذیان موجود ہو سر میں سخت درد غیند سے چلا کر چونک اٹھنا اور دانت، پسینا وغیرہ علامات موجود ہوں۔ یہ درم پردہ دماغ سادہ کی دوائی ہے لیکن جب یہ مرض بوجہ مادہ سل ہو۔ یا جب کہ راس پھٹنا شروع ہو گیا ہو تو پھر یہ کارآمد نہیں ہوتی۔

خوراک : ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائیٹ : جب یہ مرض بوجہ تھلاؤ، آفتاب یا دھوپ میں زیادہ دیر کھڑا رہنے کے ہو یا بوجہ غنیمت و غصہ یہ مرض پیدا ہو گیا ہو تو ابتدائے مرض میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔ بے چینی تیشویش اور درشتت پیاس اس کی علامات ہیں۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ورٹرم ورائیڈ : پردوں میں شدت کی درم۔ نبض تیز اور تشنج کا درہوا اور لقا بہت بہت ہو۔ بے ہوشی۔ پتلیاں پھیلی ہوئیں اور سست و بے قاعدہ نبض یہ اس کی علامات ہیں۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : مریض لگاتار منہ کو ہلاتا رہے گویا کہ کچھ چبا رہا ہے۔ ہلکے جھلانے سے مریض چیخے چلائے۔ شکم تھلا ہوا اور زبان سفید دروں بہت تیز اور چھین کی سی بخار تیز اور پسینہ کثرت آتا ہو جب چھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو۔ تب برائی اونیا خاص دوائی ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایپس : مریض بچہ چیخے چلائے اور اپنے ہاتھوں سے رکھے اور چلائے۔ چہرہ پھولا ہوا۔ پیشاب تھوڑا آتا ہو اور پیاس نہ لگتی ہو، چھوٹے بچوں کیلئے یہ دوائی زیادہ موزوں ہوتی ہے اور خاص کر جب کہ مادہ سل کی وجہ سے مرض پیدا ہوا ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ہیلی بورس : ترقی مرض میں یہ دوائی کام آتی ہے جب کہ سوزش میں سے رس چھنا شروع ہو گیا ہوگا۔ ماتھے پر شکن پتلیاں پھیلی ہوئی ہوں۔ جب مریض کی ایک طرف کی ٹانگ اور دوسری طرف کا بازو بے اختیار ہلتے رہتے ہوں تو یہ ہیلی بورس کی خاص علامت سمجھنی چاہیے سخت سرور و یکایک چلا اٹھنا۔ سرانے پر سر کو مارنا یہ سب اس کی علامات ہیں۔

خودراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

زنگم میٹیلیکم : جب مرض کا حملہ بہت تیز نہ ہو یعنی مدہم ہو تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ خصوصاً جب کہ مادہ سِل کی وجہ سے ہو اور چھانٹ کے دب جانے کے باعث ہو۔ بخار یا تو بالکل نہ ہو۔ اگر ہو تو بالکل حقیف۔

خودراک : ۶x ٹری ٹورلین (سفوف) ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرنیکا : جب مرض کا باعث چوٹ کا آنا یا صدمہ دماغ ہو۔

خودراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ سائی کیوٹا۔ کیمفورا۔ سلفر۔ ٹیوبر کیولاٹینم۔ کوپرم

اور کلیریا کارب بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات : مریض کو ایک فراخ ہوا دار لیکن اندھیرے کمرے میں لٹائے رکھیں اور اس کے سر کے بال ترشوا دیں اور اس کی ٹانگوں کو گرم رکھیں۔ کمرے میں کسی قسم کا شور و غل نہ ہونے پائے۔ دودھ اور سوڈا واٹر دیں۔ لیکن کوئی ٹھوس غذا ہرگز نہ دیں۔ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بہ افراط دیں۔ قبض کو دور کرنے کے لیے گرم پانی اور صابن کا انیما یعنی حقنہ کریں۔

# لو لکنا سکتہ شمس گرمی سے بیہوش ہو جانا

(SUNSTROKE HEAT STROKE)

اس مرض میں شدت حرارت کی وجہ سے خون جوش میں آ جاتا ہے۔ دماغ اور نخاع

(دریڑھ کاستون) کو صدمہ پہنچتا ہے اور سخت ضعف ہو کر غشی طاری ہو جاتی ہے۔

اور دم بند ہو کر موت واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔  
**علامات مرض:** جسم سے پسینہ خارج نہ ہونے کی وجہ سے جلد جسم خشک ہو کر جلتی رہتی ہے۔ اگر پسینہ جلدی نہ آئے تو نظامِ عصبی پر بڑا برا اثر پڑتا ہے اور کمال کا ضعف ہو جاتا ہے۔ پھر تشنج ہوتے ہیں عرض کے دوران میں مریض چپ چاپ آنکھیں بند کیے ہوئے یا بالکل عالم بے ہوشی میں پڑا رہتا ہے۔ مریض بچہ یکا یک ماں کی گود میں چونک اٹھتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی پٹلیاں پھیل جاتی ہیں اور دو تین گہرے سانس لے کر عالم بے ہوشی میں راہی ملکِ عدم ہوتا ہے۔

**اسباب مرض:** تمازتِ آفتاب شدت کی گرمی اور بعض اوقات سخت گرمی کے موسم میں ہوا کے بند ہونے سے۔ نیز تیز دھوپ میں دیر تک رہنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے، موسم گرما میں سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا یا گرمی میں سفر کرنا۔ یا ریل کی سواری کثرتِ شراب خواری یا گرمی کے دنوں میں ورزشِ جسمانی یا ریاضتِ جانی کا بکثرت کرنا اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں یا گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ کا انارک جاتا ہے۔ کیونکہ پسینہ کے غدود شل ہو جاتے ہیں۔

## علاج

مریض کو فوراً دھوپ میں سے ہٹا کر سایہ دار ٹھنڈی جگہ میں لے جانا چاہیے اور اس کی گردن اور کندھوں پر ٹھنڈے پانی کی دھار ڈالنی چاہیے۔ حتیٰ کہ بخار کی حرارت ۱۰۲ ڈگری سے نیچے آجائے۔ نیز مشک کا فوراً سونگھانا چاہیے۔ اگر مریض کو تشنج ہوتے ہوں تو اس کو گرم پانی میں بٹھادینا چاہیے اور اس پانی میں ٹھنڈا پانی ملاتے جانا چاہیے حتیٰ کہ حرارتِ جسم ۹۸ ڈگری پر آجائے۔

۱۔ عرب میں مریض کو ننگا کر کے ایسے ٹب میں ٹاڈیتے ہیں جس میں برف کا سخت ٹھنڈا پانی بھرا ہوتا ہے۔ صرف سانس لینے کے لیے چہرہ باہر رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر میں درجہ حرارت ۱۰۲ سے نیچے آ جاتا ہے اور مرض ہوش میں آ کر آنکھیں کھول دیتا ہے۔

گلوٹامائن : یہ دوائی اس مرض میں نہایت موثر ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں -  
چہرہ زرد، آنکھیں گڑھی ہوئیں۔ زبان سفید۔ بھن بھری ہوئی اور سانس تکلیف سے  
آتا ہو۔ معدہ ڈوبتا جاتا ہو۔ حرارت جسم بہت تیز ہو اور بے ہوشی بھی اکثر اوقات ہو  
یہ دوائی بعد کے عوارض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔

خوراک : ۳x ہر پانچ منٹ کے وقفہ پر اور جوں جوں آرام ہوتا جائے توں  
توں دوائی کی خوراکیں دیر دیر سے دینی چاہئیں۔ لیکن بعد کے عوارض کے لیے ہر چار گھنٹہ  
کے وقفہ پر اس کی خوراک دینی چاہیے۔

ایکونائیٹ : جب حرارت بہت تیز ہو اور فالج کا خطرہ ہو۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے وقفہ پر بعد ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : یہ دوائی گلوٹامائن کے مشابہ ہے۔ غنودگی بے ہوشی، کانوں کا بجنا

اور سینہ میں کچھاوت 'یہ اس کی علامات ہیں۔

خوراک : ۳x ہر پانچ منٹ کے بعد اور جوں جوں آرام آتا جائے، توں

توں دیر کے بعد۔

جلسی میم : دماغ میں اجتماع 'ہڈیان' سردرد، تیز بخار اور بے ہوشی۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔ بعد ہر ایک گھنٹہ کے وقفہ پر۔

نیٹرم کارب : یہ دوائی سن سٹروک کے مریض امراض کے لیے نیز ایسے سر

درد کے لیے جو کہ موسم گرما میں ہو جایا کرتا ہو بہت مفید ہے۔ نیز دھوپ کی وجہ سے

کمزوری اور سردرد کے عوارض میں یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x حسب ضرورت

## مرگی - صرع

(EPILEPSY)

اس مرض میں فوری اور مکمل غشی یا بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اختیاری عضلات

میں تشنج ہوتا ہے۔ قوائے حس و حرکت بے نظام ہو جاتے ہیں اور مریض بے ہوش

ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔

اقسام مرض: مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔

۱۔ گرینڈ مال یا ہاٹ مال یعنی شدید مرگی۔

۲۔ پیٹ مال یعنی خفیف مرگی۔

علامات مرض: پیٹ مال یعنی خفیف مرگی کی علامات خفیف ہوا کرتی ہیں

مریض کو بہت خفیف تشنچ ہوتا ہے۔ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور ایک یا دو لمحہ کسے اس کے قوائے دماغی کا نظام بکڑ جاتا ہے۔ لیکن نہ تو مریض اپنی زبان کاٹ لیتا ہے اور نہ ہی اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ بعض اوقات مرگی کا دورہ خواب میں ہو جاتا ہے۔ جس کی مریض کو یا کسی دوسرے کو خبر تک نہیں ہوتی اور بعض اوقات خفیف مرگی شدید مرگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

شدید مرگی کی علامات سخت ہوا کرتی ہیں۔ مریض عموماً چیخ مار کر اور بے ہوش

ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے اور تڑپنے لگتا ہے۔ عضلات تشنچ ہو کر چہرہ ڈراؤنا اور نیلا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی جانب پھر جاتے ہیں۔ دل دھڑکتا ہے۔ سانس بدقت آتا ہے۔ منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ زبان دانتوں کے نیچے آکر گاہے کٹ جاتی ہے۔ بے خبر مریض کا پیشاب اور پاخانہ خارج ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک جھٹکا سالگ کر تشنچ جاتا رہتا ہے اور مریض کچھ عرصہ تک ایک آہ سرد بھر کر عالم بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب ہوش بجا ہوتے ہیں تو مریض پورے طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا بلکہ سر درد یا سر چکر یا بد مضمی یا مقامی تشنچ یا فتور عقل یا فالج کی شکایت باقی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرگی کے دورہ کے بعد مریض کو ذیوانگی کا دورہ ہو جاتا ہے اور مریض کئی قسم کے مجرمانہ کام بلکہ قتل تک کو گزرتا ہے۔ مرض کا دورہ تین چار منٹ سے لے کر دس منٹ تک اور گاہے نصف گھنٹہ تک رہتا ہے۔ اس مرض کی نوبتوں کی کمی بیشی بہت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی تو رات میں کئی دورے ہو جاتے ہیں اور کبھی دن رات میں صرف ایک کبھی اس سے بھی دیر کے بعد۔

علامات مندرہ یعنی وہ علامات جو کہ دورہ سے پہلے واقع ہوتی ہیں۔ بعض

اوقات یہ علامات فوریہ کے نہایت قریب واقع ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ مریض اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اور بعض دفعہ یہ علامات مرض کے فوریہ کے ایک یا دو روز پہلے واقع ہوتی ہیں۔ علامات مندرجہ ذیل ایک علامت یعنی مریض کو اپنے جسم کے کسی خاص حصہ مثلاً ہاتھ کی انگلیوں یا پاؤں یا شکم پر سرسراہٹ معلوم ہوتی ہے جو اس مقام سے شروع ہو کر اوپر کی طرف چڑھتی ہوئی سر تک پہنچتے ہی مریض کو بے ہوش کر دیتی ہے اور مرض کا دورہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی سرسراہٹ کو فاکٹری مصلاح میں آراپنی پیٹیکا (AURA) یعنی مرگی کی سرسراہٹ کہتے ہیں علاوہ ازیں مرض کے دورہ سے پہلے سر چکر یا درد کی شکایت ہوتی ہے یا ایک خاص قسم کی بوناک سے آنے لگتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے چنگاریاں سی دکھائی دیتی ہیں۔

**اسباب مرض:** اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ بچوں میں دانت نکالنا اچانک خوف کھا جانا اور پیٹ کے کیرے اس کا موجب ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جوانوں میں حلق، صدیہ دماغ، کثرت محنت دماغی، زیادہ رنج و غم، مے خواری، تشک، نقرس و وجع المفاصل یا سمیت خون وغیرہ انٹریوں یا عضلے تناسلی میں کسی مزمن خراش دار مرض کا موجود ہونا اور مستورات میں نقص حیض اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

## علاج دورہ مرض

مریض کی زبان کو دانتوں کے اندر کر کے اس کے دانتوں کے درمیان کوئی چیز مثلاً کارک یا کپڑے کا ٹکڑا رکھ دینا چاہیے اور ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ اس کو تازہ اور کھلی ہوا برابر لگتی رہے۔ اس کا سر بانہ تھوڑا اونچا رکھنا چاہیے اور گلے اور سینہ کے بٹن کھول دینے چاہئیں۔ مریض کے سر پر پاپ سرو یا برف لگائیں اور چہرے پر سرد پانی کے چھینٹے ڈالیں جس مقام پر سرسراہٹ شروع ہو۔ اس مقام کے اوپر کی طرف مضبوط پٹی باندھ دیں یا ایل نائٹریٹ کو فوراً سونگھا دیں۔ ایسا کرنے سے اکثر اوقات دورہ رک جاتا ہے۔ اگر مریض بے ہوش ہو چکا ہو تو اس کو ویسے ہی لیٹے رہنے دیں۔ فوراً ہوش میں لانے کی کوشش نہ کریں۔

## علاج وقفہ مرض

مرض کے سبب کو جان کر اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔ چنانچہ بچوں میں اگر پیٹ کے کیڑوں یا دانت نکلنے کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ جوانوں میں معدہ و امعاء کے نقائص کو درست کریں۔ قبض نہ ہونے دیں۔ کیونکہ قبض کے باعث مرض کا دورہ ہو جایا کرتا ہے، ہر قسم کے نشہ بلکہ تمباکو چائے وغیرہ سے بھی پرہیز کریں اور دماغی محنت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ جلق وغیرہ کی بدعات اور مباشرت سے باز رکھیں۔ مستورات میں اگر نقص حیض ہو تو اس کو دوستی پر لائیں۔ مریض کو گرم اغذیہ مثلاً گوشت، اندا وغیرہ سے پرہیز لازم ہے۔ دودھ سبزی۔ ترکاری مناسب غذائیں ہیں۔ صاف ستھری ہوا میں رہنا۔ روزانہ سر و پانی سے غسل کرنا۔ الغرض حفظِ صحت کی پوری پوری پابندی کرنا بہت مفید ہے۔

نوٹ: مرگی کے مریض کی شادی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ مرض موروثی ہے۔ اس لیے اس کی اولاد بھی اس مرض میں مبتلا ہوگی۔

## علاج الادویہ

کلکیر یا کارب: مرگی کے علاج میں اس کا پایہ اعلیٰ ہے، کیونکہ جو علامات عموماً مریض مرگی میں پائی جاتی ہیں وہ اکثر کلکیر یا کارب کی علامات سے مشابہ ہوتی ہیں۔ مثلاً دل کی دھڑکن۔ تشویش۔ غمناکی۔ بے قراری اور دل میں اگساہٹ۔ حافظہ کی کمزوری بے ہوشی، سرچکر اور تشنج وغیرہ، اگر خوف کی وجہ سے یا جھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے جلق یا کثرتِ مباشرت کے سبب سے یہ مرض ہو تو کلکیر یا کارب کا استعمال خالی از فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایسے حالات میں سلفر کے بعد کلکیر یا کارب دی ہوئی نفع کرتی ہے۔ مثل سلفر کے کلکیر یا میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ مرگی کے دورہ کے قبل مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا اس کے بازو پر چوہا دوڑ رہا ہے۔ کاسٹیکم بھی اس

سے بیلا ڈونا میں بھی یہ احساس ملتا ہے۔

مرض میں کلیدی کارب کی مشابہ ہے۔ خاص کر جب کہ یہ مرض نقص حیض کی وجہ سے پیدا ہوا ہو۔

**خوراک:** ۳x دن میں دو مرتبہ۔

**بفورا نا:** خوف یا جلق یا کثرت مباشرت کے باعث جب یہ عارضہ پیدا ہوا ہو تو یہ دوائی از حد مفید ثابت ہوتی ہے۔ سرسراہٹ قبل از دورہ آلات تناسل سے شروع ہوئی ہو۔ یا دوران مجامعت میں مریض کو سخت تشنج کا دورہ ہو جاتا ہو نیز جب سرسراہٹ معدہ کے پچھلے حصہ سے شروع ہوتی ہو تب بھی بفورا نا ایک مفید دوائی ثابت ہوتی ہے۔ دورہ کے قبل مریض بہت چڑچڑاتا ہوتا ہے۔ اکثر وہ لالغنی گفتگو کرتا ہے۔ اور بہت جلدی ناراض ہو جاتا ہے۔ جب جلق کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو تو بفورا نا ایک خاص دوائی ہے۔ بچوں میں جب یہ مرض شدید دورہ لاتا ہے اور تشنج میں سر تھپنے کی جانب مچھ جاتا ہے۔ تو بھی یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔

**خوراک:** ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

**انڈیگو:** جب پیٹ کے کرموں کی وجہ سے مرگی کا دورہ ہوتا ہو اور مریض بہت ہمت و اداس رہتا ہو۔ ایسا نیلا جیسا کہ نیل کا رنگ تو یہ دوائی صحت بخش ہوتی ہے ڈاکٹر کوٹینی کے کہنے کے مطابق انڈیگو دوائی ایلوپتھیک کے برومائیڈس سے کہیں بڑھ چڑھ کر اعلیٰ ہے۔ گرمی کے غبارے معدے کی پھپھی جانب سے سر کی طرف پڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور دماغ میں موجزنی کا احساس ہو یعنی لہریں اٹھنے کا احساس ہو (سی فیوگا)۔ جب سرسراہٹ معدے کی پھپھی جانب (SOLAR- PLEXUS) سے اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہو۔ تو اس کے لیے بفورا نا۔ انڈیگو۔ سلیشیا اور کلکیر یا کارب چار ادویات ہیں۔

**خوراک:** ۲x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

**کو پرم میٹیلیکیم:** مرگی کی اور خاص کر بچوں کی مرگی کی یہ خاص دوائی ہے چہرہ اور ہونٹ بہت نیلے ہوں۔ آنکھوں کے ڈھیلے ادھر ادھر حرکت کرتے ہوں

۱۰ اور نکس و امیکا بھی۔



منہ میں جھاگ آتی ہو اور عضلات میں غصب ناک کڑل پڑتے ہوں۔ مرض کا حملہ صبح سے شروع ہوتا ہے۔ اور دورہ بڑا شدید اور مسلسل ہوتا ہو۔ جب مرگی کا دورہ رات کو ہوتا ہو اور دورے باقاعدہ وقفہ کے بعد مثلاً آیام حیض میں ہوتے ہوں تو بھی یہ دوائی نافع ہوتی ہے دانت نکالنے کے عرصہ میں جب بچہ کو مرگی کا دورہ ہوتا ہو۔ یا پھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے مرگی کا دورہ ہوتا ہو تو ایسے حالات میں کوپریم دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہلبرٹ لکھتے ہیں کہ مرگی کے دوروں کو کم کرنے میں جتنی کوپریم دوائی مفید نہیں ہے۔ مزمن اور سخت کیسوں میں یہ دوائی رہنمائی کرتی ہے۔ ڈاکٹر جیکر بھی مرگی کے مرض میں کوپریم کے بہت مداح ہیں۔

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

آر جینٹم نائٹریکیم : مرگی کی یہ بھی ایک دوائی ہے۔ زبردست علامت اس کی یہ ہے کہ مرض کا حملہ ہونے کے قبل بیمار یا بچہ روز مریض کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور دورہ کے بعد بے چینی اور ہاتھ کانپتے رہتے ہیں، بوجہ نقص حیض یا باعث خوف جب مرگی کا دورہ ہوتا ہو تو یہ دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ یہ خاص علا سرسراہٹ کی موجود ہو یعنی سرسراہٹ حملہ سے کئی گھنٹے قبل ہوتی ہو، دماغی علامات بھی خاص قابل غور ہیں مریض بہت ہمت اور جلدی ہی خوف زدہ ہو جاتا ہو اور حوصلہ توڑ بیٹھتا ہو۔

خوراک : ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

اونینتھی : شاید میٹریامیدیکا میں اور کوئی دوائی مرگی کے لیے اونینتھی کروکاماسے بڑھ کر نہیں ہے خاص علامات سب ذیل ہیں :-

یکایک اور مکمل بے ہوشی کا طاری ہو جانا، سو جانا، نیلا چہرہ، منہ میں جھاگ پتلیاں پھیلنا، تشنج کے ساتھ کزاز، ٹانگیں اور بازو سر دھو۔ ڈاکٹر ٹسکاٹ نے اپنا تجربہ اونینتھی کروکاماسے متعلق یوں بیان کیا ہے۔ آپ مڈل ٹون سرکاری ہسپتال کے انچارج تھے۔

۱۔ دوروں میں ۴ سے ۵ فی صد تک کمی ہو جاتی ہے۔

۲۔ دوروں میں تشنج پہلے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔

- ۳ - دوروں سے قبل کے جوش اور جنونی آکسائٹ میں کمی ہو جاتی ہے۔
  - ۴ - بے خوابی - ہڈیاں - بڑا ہٹ اور دورے کے بعد کے جمود میں کمی ہو جاتی ہے اور مریض کے دورے کے بعد کی کمزوری جلد دور ہو جاتی ہے۔
  - ۵ - جن مریضوں کا علاج اونٹنی سے کیا جاتا ہے - ان کے مزاج میں شک - دم چڑچڑاہٹ اور دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی عادت بہت کم ہو جاتی ہے۔
  - ۶ - مریضوں کی تیمارداری آسان ہوتی ہے۔
- ڈاکٹر ڈوسی صاحب بھی اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ اونٹنی کو دکاٹنا سے مرگی کے دورے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ بجائے مدرنگچر کے  $3 \times$  یا  $4 \times$  طاقت میں اس دوائی کو استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اونٹنی کو دکاٹنا نے مرگی کے بے شمار مریضوں کو شفا دی ہے۔

خوراک:  $5$  یا  $3 \times$  یا  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

سلیشیا: یہ بھی مرگی کی خاص ادویات میں سے ایک ہے، بالخصوص خنازیری اور کٹی بچے زیادہ مستفید ہوتے ہیں، سرسراہٹ معدہ کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ ریفو - نکس و امیکا) جب مرگی کے دوروں پر چاند کا خاص اثر ہوتا ہو تو سلیشیا دوائی نافع ہوتی ہے۔ شبینہ مرگی نیز دورے سے پہلے ٹھنڈ کا سامحوس ہونا اور دورہ کے بعد گرم پسینہ کا آنا۔ اس دوائی کی خاص علامت ہے۔ شبینہ مرگی کی کوپریم بھی اعلیٰ دوائی ہے۔ مرگی کے دورے نیا چاند نکلتے پر زیادہ ہوتے ہوں سخت قسم کے مزمن کیسوں میں یہ دوائی کلیریا کے بعد استعمال کی جاتی ہے۔ اور خاص علامت اس کی یہ ہوا کرتی ہے کہ مریض کے جسم کا باہاں حصہ ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔

خوراک:  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا: فتور باضمہ کی وجہ سے جب یہ مرض پیدا ہوا ہو تو نکس و امیکا دوائی کام آتی ہے اور ایک خاص علامت اس کی یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ مریض کو چہرے پر چیونٹیاں رنگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $30$  ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

ساتی کیوٹا وروسا: سانس بہت دقت سے آتا ہوا کواز ہوا چہرہ نیلگوں

سرخ ہوا منہ میں جھاگ آوے اور گردن پیچھے کی جانب مڑ کر اکڑ گئی ہو۔ آنکھیں تارے لگی ہوں اور سخت نفاہت ہو۔

خوراک : ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : ۶x یا ۳۰ - خازیری مزاج کے مریضوں کے لیے یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ کلکیریا کی مانند یہ دوائی بھی اُن کیسوں میں کام آتی ہے جو کہ بوجہ کثرتِ مجامعت یا پھانٹ کے دب جانے کے باعث پیدا ہوئے ہوں۔ تشنج کے بعد نفاہت بہت ہوتی ہو اور یوں بھی علاج کے دوران میں گاہے گاہے سلفر کی خوراک دینی مفید ہوا کرتی ہے۔

علاوہ ازیں ہائیوسائی مس - سٹرامونیم - بیلادونا - اگاری کس، ہائیڈروسیانک ایسڈ کاسٹیکم، ہیرسلف - کالی میور - کالی برومیٹم - آرٹی میٹھا و لگرس اور سولائم کاروغیرہ اپنی علاماتِ مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

حفظانِ صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے لیکن ورزش اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے تھکان پیدا ہو۔ کیونکہ تھکان مرگی کے حملہ آور ہونے کا باعث ہوتی ہے۔ مصروع مریضوں کو آرام کی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مریض لٹو کر یا لڑکیوں کو تین چار گھنٹے متواتر محنت دماغی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر خوف مایوسی - تشویش یا دیگر امور مرض کا باعث ہوں تو ان اسباب کو دور کرنا لازمی ہوتا ہے۔ غذا مقوی اور وقت مقررہ پر تقوڑی مقدار میں دینی چاہیے۔ چونکہ بھوک اکثر زیادہ لگا کرتی ہے۔ اس لیے مناسب طریقہ اور مناسب وقت پر غذا دینی چاہیے۔ سرد پانی سے غسل اور بعدہ حجم کو خوب ملنا مفید ہوتا ہے۔ کثرتِ مجامعت سے پرہیز لازمی ہے۔



۱۔ اینتھیم - اٹروپن - کفر - چامنا آرس - سمی سی فیوگا - پیمہم - سوراینم - سکیل کار - سینٹم - سٹرامونیم - زنگم پر بھی غور کریں۔

## رعشہ

کوریا (CHOREA)

## لرزنا - کانپنا - ارتعاش

اس مرض میں جسم کے ایک یا دو جانب اختیاری عضلات میں غیر منظم حرکات ہوتی ہیں جو بالخصوص ہاتھ پاؤں اور چہرہ کے عضلات میں واقع ہوتی اور خواب کی حالت میں دفع ہو جاتی ہیں۔

**علامات مرض:** جب مرض کا حملہ خفیف ہو تو مریض چلنے پھرنے میں تھوڑا لڑکھڑاتا ہے اور پاؤں گھیسٹ کر چلتا ہے۔ اگر کسی چیز کو اٹھانے لگتا ہے تو ہاتھ کانپتا ہے۔ جب مرض کا حملہ شدید ہو تو پہلے چہرہ کے عضلات پھر کھینچنے لگتے ہیں۔ پھر بازو اور ٹانگ وغیرہ خود بخود عجیب طرح سے حرکت کرتے ہیں اور بعض اوقات سارا جسم ہی ہلنا رہتا ہے۔ بعض حالتوں میں مریض نہ تو کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور نہ ہی چل پھر سکتا ہے اور بمشکل بستر پر پڑا رہ سکتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت مریض کا ہاتھ جھٹکا کھا کر بجائے منہ میں جلنے کے اس کے سر پر چلا جاتا ہے۔ لکنت اور مہکلا پن اس مرض کی خاص علامات ہیں۔

**اسباب مرض:** یہ مرض عموماً بچوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پانچ سال سے لے کر دس سال کی عمر کے بچوں میں یہ مرض عام ہے۔ دس سے پندرہ سال کے بچے زیادہ مبتلا پائے گئے ہیں۔ شیر خوار بچوں میں یہ مرض نہیں پایا جاتا بلکہ پانچ سال کی عمر سے پہلے شاید ہی کوئی کیس دیکھنے میں آتا ہو۔ بیس سال سے زائد عمر کے اشخاص کو یہ مرض بہت ہی کم ہوتا ہے۔ البتہ حاملہ مستورات اس شرط سے مستثنیٰ ہیں۔ چند کیس ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ زائد از ساٹھ سالہ عمر بھی اس مرض میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ مگر وہ تمام کے تمام وجع المفاصل کے مریض تھے۔ بمقابلہ مردوں کے مستورات اس مرض میں دگنی تعداد میں مبتلا ہوتی ہیں۔ خوف۔ دانت نکلنے۔ کرم امعاء۔ جلق (دست رسی) کی

برعادت، فتور حوض، کمی خون، باؤ گولہ، ہسٹریا اس مرض کے اسباب ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوا کرتا ہے۔ عصبی مزاج والدین یا باؤ گولہ والی عورت کی اولاد اس مرض میں مبتلا ہونے کے لیے زیادہ مستعد ہوتی ہے۔ وجع المفاصل اس مرض کا اکثر اوقات سبب ہوا کرتا ہے۔ جب ایک بچہ کسی مریض کو اس مرض میں مبتلا ہوا دیکھتا ہے تو یا تو اس کی نقل اتارنے سے یا کبھی ویسے ہی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بائع ٹرکیوں میں پہلی بار حمل قرار پانا بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے۔ کبھی نوجوان اور بوڑھے اشخاص بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کثرت چائے نوشی اور شراب خواری سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ : جب مرض کا باعث خوف یا سردی لگنا ہو اور خاص کر جب بخار بھی ہمراہ ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x یا ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

اگاری کس : مرض کے شروع میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ سردی اور جھنجھٹ کا محسوس ہونا اور ٹانگوں کا لڑکھڑانا اس کی خاص علامات ہیں۔

خوراک : ۲x یا ۳x ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد۔

سمی سی فیوگا : جب اس مرض کا سبب وجع مفاصل ہو یا فتور حوض ہو تو یہ دوائی شفا دینے والی ہوتی ہے۔

خوراک : ۵ یا ۱x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

سائینا : جب کرم معارف اس مرض کا باعث ہوں تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x یا ۳x دن میں چار مرتبہ۔

فیرم فاس : بھس یا کمی خون کی وجہ سے اگر یہ عارضہ ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

خوراک :

اگنیشیا : ہسٹریکل مزاج والی مستورات کو اگر رعشہ کا عارضہ ہو تو یہ دوائی

نافع ہوتی ہے۔

خوراک: ۲ یا ۳ دن میں تین مرتبہ۔

علاوہ ازیں مندرجہ ذیل ادویات بھی اس مرض میں کام آتی ہیں۔ آرسینکم۔ بیلہ  
ڈونا۔ کوپرم۔ ہائیوسائی مس۔ فاسفورس۔ سٹرامونیم اور زنگم وغیرہ۔  
ضروری ہدایات: مرض کے سبب کو معلوم کر کے پہلے اس کا علاج کریں۔  
تبدیلی آب و ہوا بھی مفید ہے۔ چند یوم کے لیے بستر پر آرام کرنا بھی مفید ہوا کرتا  
ہے۔

غذا: نہایت لطیف اور زود ہضم دینی چاہیے۔ مثلاً دودھ، ساگودانہ۔  
اراروٹ۔ فرنی۔ کھجڑی اور چنے کا شوربا وغیرہ۔

## بے خوابی 'نیند نہ آنا

(SLEEPLESSNESS INSOMNIA)

رات کو نیند نہ آنا۔ یہ اکثر کسی نہ کسی بیماری سے تعلق رکھتا ہے۔ جب کئی  
روز نیند نہ آوے تو دماغ میں خرابی واقع ہوتی ہے اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا  
ہوتی ہیں۔

اسباب مرض: اس مرض کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ مثلاً شدت بخار  
در دماغ شکم۔ بد ہضمی۔ قبض، رنج و غم، فکر و تردد۔ زیادہ چائے و قہوہ نوشی۔  
جگر میں فتور۔ دلی جوش کثرت مطالعہ بعض امراض دماغ و دل، یرقان۔ کمی خون،  
جوڑوں کا درد۔ خون میں زیادہ جوش ہونا وغیرہ وغیرہ۔

## علاج

مرض کے اصل سبب کو دور کریں، چنانچہ اگر شدت بخار یا درد کی وجہ سے بے خوابی  
ہو تو ان کا مناسب علاج کرنے سے بے خوابی کو بھی آرام آجایا کرتا ہے اور اگر طبیعت  
میں جوش ہو اور اس کے باعث نیند نہ آتی ہو تو جوش کے اسباب کو دور کر دینے سے  
نیند آجایا کرتی ہے۔ ادویات جو اس بیماری میں مفید ہوتی ہیں وہ یہ ہیں:-

ایکونائٹ : آدھی رات کے بعد نیند نہ آنا۔ سخت فکر و ترود اور خون میں جوش کا زیادہ ہونا۔ یہ دوائی بچوں اور بڑھوں کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے۔  
خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد :

بیلادونا : جب نیند کی خواہش ہو اور نیند نہ آئے۔ شام کے وقت نیند محسوس ہو لیکن نیند نہ آئے۔ دل میں کوئی غم، بے چینی اور جھوٹا ڈراؤنا خیال ہو اور بُرے بُرے خواب آتے ہوں اور بدیں وجہ نیند نہ آتی ہو چہرے اور دماغ میں خون کا جوش ہو چہرہ اور آنکھیں سرخ ہوں۔  
خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کافیا : دل میں فکر، کسی امر کا خیال رہنے پر، یا بہت دنوں تک بیمار کی تیمارداری میں رہنے سے یا جاگتے رہنے سے، یا زیادہ خوشی کے باعث جب نیند نہ آئے تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
نکس و امیکا : رات کو زیادہ دیر بڑھنے کے سبب سے بد مضمی کے باعث نیند نہ آوے۔ شام کو مریض سو جائے اور رات کو تین بجے اچھی طرح سو کر پھر جاگ اٹھے اور صبح پانچ بجے تک جاگتا رہے اور ما بعد پانچ بجے سوئے اور پھر نیند بھر کر نہ آوے اور دل احساس نہ ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
انیشیا : جب دل میں رنج ہو اور غم ہو۔ یا دل میں خوف یا غم اندر ہی ماند ہو اور باہر اس کا اظہار نہ کیا جائے تو ایسی حالت میں نیند نہ آنے پر انیشیا دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
آر سینکم : آدھی رات کے بعد نیند نہ آنا۔ بے چینی نہایت زیادہ اور سخت عصبی اور جسمانی کمزوری۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔  
فاسفورس : سر میں درد ہو اور طبیعت بھاری ہو، جگر میں فتور ہو، نیز بڑھاپے

میں جب نیند نہ آوے تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فیرم یا تھوجا : جب چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے نیند نہ آئے تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیل : جب بچوں کو رات بھر بے چینی کے باعث نیند نہ آئے۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

لایکو پوڈیم : رات کو جاگتا رہے اور دن بھر سویا رہے دل میں اکساہٹ ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پیسی فلوران کارناتا : جب علامات صاف نہ ہوں یا سمجھ میں نہ آویں۔ تو یہ

دوائی تیس تیس قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر دن میں تین یا چار مرتبہ دینی چاہیے۔ اس سے نیند خاطر خواہ آجاتی ہے۔

خوراک : ۵ کے تیس قطرے نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر تین یا چار

مرتبہ۔

سلفر : نیند کم و بیش آوے۔ جلدی اکھڑ جاوے اور پھر نیند نہ آوے۔

خوراک : ۳۰x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ایونیا سٹیوا مدرٹنگر کے ۱۵ قطرے نصف چھٹانک شیر گرم پانی میں ڈال

کرات کو سوتے وقت پی لیں، نیند آجائے گی۔

ضروری ہدایات : شام کے وقت غسل کرنا۔ یا ٹھنڈے پانی سے بدن پونچھنا

سونے کے کمرہ میں ہوا کی آمزورفت کا ہونا۔ زیادہ رات گزرے کھانا کھانے سے بچے

۱۵ اس کے علاوہ ہائیوسائنس۔ جلیسی میم۔ کینا بس انڈیکا۔ کوکا۔ کمفورامانوبرومینا

بہت مفید دوائیں ہیں۔



رہنا۔ سونے سے چند گھنٹے پہلے سے ہی دل مطمئن رکھنا صبح اٹھنا۔ مناسب محنت یا ورزش کو ضروری ہیں۔ جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ ان کو تکیے پر نہ سونا چاہیے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو کسی اچھی بات پر خوب دھیان دینے سے نیند آجائے گی۔ اگر طبیعت میں کسی وجہ سے غیر معمولی جوش ہو تو اسباب جوش کو دور کر دینا چاہیے۔ شام کو چائے یا قہوہ بالکل نہ پینا چاہیے سونے کے کمرے میں شورغل یا بو وغیرہ نہ ہونی چاہیے۔ سوتے وقت گرم پانی سے پاؤں کو دھو کر نیند آجائے۔ مٹھی چا پی کرانا یا قصہ کہانی سننا۔ سر پر تر کپڑا رکھنا یہ سب مفید تدابیر ہیں۔ نیز روغن بادام یا خستخام کا تیل سر پر ملنے سے بھی نیند آجایا کرتی ہے۔ نوٹ: نیند لانے کے لیے ایلیو پیٹھک خواب آور ادویات کا استعمال بڑا مضر ہے اور نہ ہی افیون، بھنگ، کلورل، شراب وغیرہ کا استعمال میں لانا چاہیے۔ بعض ہومیو پیتھک ڈاکٹر ایلیو پیٹھک ڈاکٹروں کی دیکھا دیکھی نمونیا۔ تپ محرقہ وغیرہ میں رات کو نیند لانے کے لیے مریض کو خواب آور ادویات دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہومیو پیتھک دوائی کے اثر میں نقص واقع ہو کر نقصان ہوتا ہے جب علامات کے مطابق سوچ کر دوائی اصل مرض کے لیے دی جائے۔ تو رات کو نیند خود بخود آجاتی ہے۔

## دیوانگی، جنون، پاگل پن

(INSANITY MELANCHOLIA)

عقل میں فتنہ آجانے کو دیوانگی کہتے ہیں، جب انسان کی عقل میں فتنہ آجاتا ہے تو وہ وہی تباہی اور بے ہودہ باتیں کرنے لگتا ہے اور وہی دوسوا سی ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں توہمات، جھوٹے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

علامات مرض: مرض دیوانگی میں مبتلا ہونے سے پہلے مندرجہ ذیل علامات اکثر ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ مریض کا سر کھومتا رہتا ہے اور اکثر اس کو سر درد رہتا ہے خیالات پریشان رہتے ہیں، طبیعت کا روبرو میں نہیں لگتی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، دماغ میں ضعف اور تکان کا احساس ہوتا ہے۔ مریض بے چین اور اداس

رہا کرتا ہے۔ رات کو نیند نہیں آتی اور بدحواسی میں کٹتی ہے۔ پھر بعدہ بوجوں بوجوں مرض بڑھتا ہے مریض کا مزاج چڑچڑا ہوتا جاتا ہے۔ اس کا جوش اور غصہ بڑھ جاتا ہے۔ راتیں بے خوابی میں کٹتی ہیں اور پریشان خوابوں سے چونک کر اٹھ بیٹھتا ہے اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ اکثر تن بدن سے بے خبر ہو جاتا ہے اور خستہ حال رہتا ہے۔ سبب ضعف حافظہ ایک بات کی بار بار تکرار کرتا ہے اور وہی بات ہی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر قبض کی شکایت رہتی ہے۔ کبھی جی متلاتا ہے۔ اور آبکائیاں آتی ہیں۔ سر لگتا رہتا ہے اور متواتر دوسری شکایت رہتی ہے۔ کبھی حالت بیداری میں اسے خواب کی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے

**اسباب مرض :** منشیات مثلاً پیرس وغیرہ کا بکثرت استعمال۔ کثرت مے خواری۔ کثرت محنت دماغی۔ کثرت مباشرت، جلق کی بدعات۔ مادہ آشک۔ صدمات و حوادث، صدمات عصبی، تکالیف خانگی، ملکی یا مذہبی خیالات میں مستغرق رہنا۔ نفسانی خواہشات کی زیادتی، فاقہ کشی۔ محتاجی۔ بعض امراض معدہ و جگر و دماغ۔ مستورات میں رحم کے امراض۔ وضع حمل کی تکالیف وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔ اکثر یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ بعض امراض دماغی مثلاً مرگی وغیرہ کے بعد بھی دیوانگی ہو جایا کرتی ہے۔

## علاج

**بیلادونا :** سب سے پہلی دوائی یہ ہے۔ غصہ، بے چینی، سرور، پتلیاں پھیلی ہوئیں اور مریض نہایت تند مزاج۔ یہ اس کی علامات ہیں :-  
خوداک : ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

**پلائینیا :** مریض خیال کرے کہ وہ تمام انسانوں سے بالاتر ہے اور کہے کہ وہ بہت دولت مند اور فاضل ہے۔ موت کا ڈر ہو، مستورات میں مجامعت کے لیے اکساہٹ ہو یا نقص حیض ہو۔

خوداک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

**لاکسس :** خیالات ایک مضمون سے جھٹ دوسرے مضمون کی طرف چلے

جائیں - شک - باتونی - دسوا سی ہو اور اس کو شکلیں نظر آئیں -  
 خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 سٹرامونیم : یہ دوائی بیلادونا کے بہت مشابہ ہے - مریض بہت تند ہو مارنے  
 اور کاٹنے کی خواہش کرتا ہو - چوہے اور سانپ دیکھتا ہو - بڑا خوف زدہ ہو -  
 خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 ورائٹم ایلمیم : اس دوائی کی علامات سٹرامونیم کی علامات سے ملتی جلتی ہیں -  
 مریض چڑچڑاہٹا اور بے چلیبی ہو - مذہبی جنون کے لیے ورائٹم بہت مفید دوائی ہے - نیز  
 سلفر بھی -

خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 انا کارڈیم : مریض کو ایسا معلوم ہو کہ اس کی دو ضمیریں ہیں - ایک اس کو ایک  
 کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے اور دوسری منع کرتی ہے - لعنت ملامت کرنے پر  
 طبیعت کا رجحان ہو حافظہ کمزور ہو - عودت خیال کرتی ہو کہ بچہ اُس کا اپنا نہیں ہے -  
 خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 کلکیریا کارب : آنکھیں بند کرنے پر اُس کو بہت سی تصویریں نظر آتی ہوں -  
 خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 آرمٹیکم : زندگی سے بیزار ہو - خودشی کرنے کی کوشش کرتا ہو -  
 خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 آرسینکم : نا اُمید ہو - مریض خیال کرتا ہو کہ کوئی شخص اُس کی پرواہ نہیں کرتا  
 تمام دوست اُس کو چھوڑ گئے ہیں - حافظہ کمزور ہو - غصہ یا بحث مباحثہ سے مریض  
 تند ہو جاتا ہے -

خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -  
 کینا بس انڈیکا : وقت اور فاصلہ کے متعلق بہت دھوکا لگتا ہو - ایک منٹ  
 سال کے برابر معلوم دیتا ہو اور تھوڑا سا فاصلہ بہت لمبا معلوم ہوتا ہو - مریض خیال  
 کرتا ہو کہ وہ پھول رہا ہے اور اس کا جسم بہت بڑا ہو رہا ہے اور بے شمار گھنٹیوں  
 کی آواز سن رہا ہے اور دُور کی آواز بھی اس کو بہت بھاتی ہو -

خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں اوپیم - کوکین - کالی بروٹیم - ہائیوسائیمس - کیوفر - نکس ماشکانا - کینقرس - آر جینٹم - نائیریکیم - گلونائین - سلفر - پٹسلا - نائٹرک ایسڈ - سمی سی فینوگا - ایومینا - آیوڈین - کلکیریا فاس - نیرم میور - نیرم کارب - سی پیا - سنیم - تقوجا - اگنیشیا - فاسفورک - ایسڈ - نکس وامیکا - لائیکوپوڈیم - ساگاری کس - پلاڈیم - بیپ ٹیشیا - سٹانی سیکریا - کالو - سنٹھ - برائی اوینا - سلیشیا ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔ ضروری ہدایات : ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں کہ جس سے مریض کو نیند آجائے۔ مریض کو صاف ستھرے، سرد ہوا دار اور تاریک کمرے میں رکھیں اور اس سے بڑی محبت اور خوش اسلوبی سے پیش آئیں اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اس کی طبیعت میں جوش پیدا ہو جائے۔ مریض کے سر پر سرد پانی میں کپڑا تکر کر کے یا برف رکھیں۔ ہر روز سرد پانی سے غسل کرائیں اور اس امر کا خیال رکھیں کہ مریض کو قبض نہ ہونے پائے۔ ثقیل اور نفخ پیدا کرنے والی غذائیں اور گرم اشیاء نہ دیں۔ زود مخم اور لطیف غذا مثلاً دودھ - چاول - کچھڑی - ساگودانہ - فرنی - آش جو وغیرہ دیں۔ سرکار کی طرف سے پاگل خانے بڑے بڑے شہروں میں بنے ہوئے ہیں۔ مناسب ہے کہ پاگل کو پاگل خانہ میں بھیج کر وہاں ہی اس کا علاج کرائیں۔ کیونکہ وہاں خاطر خواہ حفاظت کی جاتی ہے۔ لاہور اور گدو رحیدر آباد سندھ میں ایسے شفا خانے بڑے امراض دماغی موجود ہیں۔

## ہزیان - بھکنا - بڑانا

(DELIRIUM)

اس مرض میں قوائے عقلیہ میں فتور واقع ہوتا ہے جس کا اظہار کلمات و حرکات

سے ہوتا ہے۔

علامات مرض : شدید ہزیان میں مریض دیوانہ وار بھکنے لگتا ہے اور جن اشیاء کا وجود نہیں ہوتا ان کی بابت باتیں کرتا اور ان کو موجود بتلاتا ہے اور ہاتھوں اور چہرہ

سے ایسی حرکات کرتا ہے کہ دیکھنے والا جھٹ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے قوائے عقلیہ میں فتور ہے۔ نحیف ہذیان میں گاہے گاہے مریض ایسی حرکات و گفتگو کرتا ہے۔ جو کہ ہر موقع کے لحاظ سے بالکل خلاف عقل ہوتی ہیں اور کبھی کبھی درست باتیں بھی کرتا ہے۔

اسباب مرض : شدت کا بخار۔ سمیت خون۔ ضعف اعصاب۔ جنون۔ مایوگیا اور دماغ کی ساخت میں نقص

## علاج

بیلادونا : ہذیان میں سب سے پہلے جس دوائی کا خیال آتا ہے وہ بیلادونا ہے۔ شدید ہذیان ہو اور مریض با آواز بلند قہقہہ لگانا ہو اور چیخا چلاتا ہو، دانتوں کو پیتا ہو اور چھپنے یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہو۔ خوف اور تصورات سے پُر ہو غصہ اور تندی بہت ہوں۔ چہرہ اور سر سرخ ہو اور اکساہٹ بہت ہو، بعض اوقات مریض کو گرنے کا خوف ہو۔ اور ہوا کو کپڑے کی کوشش کرتا ہو بعض اوقات مریض بے ہوشی میں پڑا رہتا ہو اور جب اس کو جگایا جائے تو ارد گرد کے اشخاص کو مارتا ہو اور ماند کتے کے بھونکتا ہو اور کاٹتا ہو اور نہایت ہی تند ہو۔

خوراک : ابرنیدرہ منٹ کے بعد۔

ہائیوسائی مس : یہ دوائی بیلادونا اور سٹرامونیم کے بین بین ہے۔ نہ تو بیلادونا کی مانند دماغ میں اجتماع خون زوروں پر ہوتا ہے اور نہ سٹرامونیم کی مانند مریض زیادہ تند و تہی ہوتا ہے۔ روشنی سے نفرت ہوتی ہے اور مریض کو زہر خورانی کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر وہ بھگتا اور بڑبڑاتا ہے اور اپنے ارد گرد وحشیانہ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اعصابی اکساہٹ بڑبڑانا چلانا، عضلات کا جھٹکنا بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ فرضی دشمن سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور بستر کے کپڑوں اور ہوا میں کسی چیز کو ہاتھوں کے ساتھ متواتر چننا رہتا ہے۔ یہ علامت ہائیوسائی مس کی خاص ہے۔

خوداک : ابرنیدرہ یا بین منٹ کے بعد۔

سٹرامونیم : ہذیان نہایت تند ہو۔ جنون بہت زوروں پر ہو اور نظام عصبی بہت گڑا ہوا ہو۔ مریض روشنی چاہتا ہو اور اکیلا رہنا نہ چاہتا ہو۔ بلکہ اس کی خواہش

ہو کہ تیمار دار اس کے پاس بیٹھے رہیں۔ بکواس بہت کرتا ہو۔ قہقہہ لگانا ہو۔ قسمیں کھاتا ہو التجا کرتا ہو۔ لعنت ملامت کرتا ہو اور گیت گاتا ہو۔ اُس کو بھوت دکھائی دیتے ہوں، روحوں سے گفتگو کرتا ہو اور ان کی آوازوں کو سنتا ہو، اکثر سر کو سر ہانے پر سے اٹھائے رکھتا ہو چہرہ چمکیلا اور سرخ ہو اور اس کی شکل ڈراؤنی ہو اور اس کو ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ہر ایک کونہ سے کئی اقسام کی اشیاء اُٹھ رہی ہیں اور اس کو ڈرا رہی ہیں۔

خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

وراٹرم ایلیم : بے چینی کاٹنے اور کپڑے پھاڑنے کی خواہش مثل بیلہ ڈونا کے ہو لیکن وراٹرم ایلیم میں جلد تبسم ٹھنڈی اور سپنیہ بھی ٹھنڈا آتا ہے۔ مریض بڑا باتونی اور آواز بلند بولتا ہے اور فرضی اشیاء سے خوف کھاتا ہے نیز پاگل پن یا اکساہٹ کی حالت ہو اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو بہت گایاں نکالتا ہے۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

فاسفورس : خفیف محرقی ہذیان میں جب کہ جریان خون بھی ساتھ ہو اور مریض بیزار، کابل و سست پڑا رہے۔ گفتگو کرنی نہ چاہے اور سوالات کا جواب بڑا آہستہ دے نیز جب کہ بے ہوشی کی حالت ہو اور مریض کو ایسا محسوس ہو کہ کئی ایک چہرے اس کی طرف گھس رہے ہیں۔ نیز کئی قسم کے خیال اُس کے دل میں ہوں۔ مثلاً وہ خیال کرتا ہو کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔

خوراک : ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

اگاری کس : ڈاکٹر ہائز ہذیان محرقی میں اس دوائی کے بڑے مداح ہیں۔ جبکہ مریض بستر پر اٹھنے کی لگاتار کوشش کرتا ہو اور اس کا تمام جسم کانپتا ہو۔

خوراک : ۱۰x ہر بیس یا بیس منٹ کے بعد۔

لاسبس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض بہت بولتا ہے، نیز اس کو زہر نوری کا ڈر رہتا ہو لیکن ہذیان خفیف قسم کا ہو اور نیچے کا جبر اگر جاتا ہو۔ خاص علامت اس کی یہ ہے کہ مریض خیال کیا کرتا ہے کہ وہ انسانی طاقت سے کسی بالا طاقت کے زیر اثر ہے۔

خوراک : ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سعی سی فیکوگا : مریض کو اس بہت کتنی ہے کبھی کسی مضمون پر کبھی کسی مضمون پر ۔  
یعنی مضمون بدلتی رہتی ہو ۔ چوہوں اور چوہیوں وغیرہ کی تصویریں دیکھتی ہو ۔ جب کہ یہ  
ہڈیان فتور حوض کی وجہ سے ہوتو شافی ہوتی ہے ۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیپ ٹیشیا : مریض کو ایسا خیال ہو کہ اس کے جسم کے کئی ٹکڑے ہیں جو کہ ادھر  
ادھر ہاتھ پاؤں مارتا رہتا ہو ۔

خوراک : ۱۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

تھو جا : مریض کو ایسا تصور ہو کہ اس کا جسم شیشہ کا بنا ہوا ہے وہ بڑی احتیاط سے  
جسم کو حرکت دیتا ہو ۔ مبادا کہ یہ ٹوٹ جائے ۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

ایب سن تھی ام : ہڈیان میں مریض کو لگاتار حرکت کرنے کی خواہش لگی رہتی ہو ۔

خوراک : ۱۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : شدید ہڈیان میں سر پر برف کا رکھنا ضروری ہوتا ہے ۔ یا  
گل روغن میں ٹھنڈا پانی ملا کر اور اس میں کپڑا تر کر کے سر پر رکھنا چاہیے ۔

## فالج۔ شل ہو جانا۔ ادھرنگ

HEMIPLEGIA PARALYSIS PARAPLEGIA)

اس مرض میں جسم کے بعض حصص یا کوئی خاص حصہ کی جس یا حرکت یا ہر دو ناقص  
یا زائل ہو جاتی ہیں ۔ جب یہ مرض سارے جسم میں ہو تو اسے ڈاکٹری میں "پیرل پیرے لے  
سس" یعنی فالج عامہ کہتے ہیں اور جب یہ مرض نصف جسم طولانی میں ہو تو اسے "ہمی  
پلیجیا" کہتے ہیں لیکن جب یہ مرض کمر سے نیچے دھڑ میں ہو تو اسے "انگریزی میں" "پراپلیجیا"  
کہتے ہیں اور جب صرف چہرہ مغلوب ہو تو اسے "نی سی ایل پیرے لے سس" یعنی

لقوہ کہتے ہیں۔

علاماتِ مرض: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض سویا ہوا صبح کو جب بیدار ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا تھوڑا سر درد رہتا ہے بعد اے ایک دو مرتبہ قے آکر فالج یا ادھرنگ ہو جاتا ہے۔ چہرہ کے عضلات ماؤف ہو کر منہ کسی قدر ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ ماؤف جانب کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں۔ ماؤف ہاتھ خود بخود گہر پڑتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور قبض رہتی ہے۔ ہوش و حواس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور مریض کے لیے بڑے سہارے کے اٹھنا بیٹھنا یا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے۔ کبھی دفعتاً مرض سکتہ کے ساتھ ہی فالج ہو جاتا ہے۔

اسبابِ مرض: دماغ میں پھوڑا یا رمولی سرگی۔ رعشہ۔ باؤ گولہ آتشک وغیرہ اس مرض کے اسباب ہیں اکثر یہ مرض سکتہ کی بیماری کے باعث ہوا کرتا ہے۔ کبھی نخاع کی خرابی سے مرض ہو جاتا ہے۔

## علاج

لقوہ: برائٹا کارب۔ کاسٹیکم۔ بیلادونا۔ ایکونائٹ وغیرہ۔  
فالج عامہ: فاسفورس۔ برائٹا کارب۔ مرکبوریس کار۔ کاکبوس۔ کونیم۔ پلمیم۔ کاسٹیکم وغیرہ۔

آٹمکھ کے چھتیر کا فالج: جلسیم۔ سیائی جلیا۔ بیلادونا۔ سٹرامونیم وغیرہ۔  
ادھرنگ (فالج نصف جسم طولانی) نکسوامیکا۔ آرنیکا۔ فاسفورس۔ کاسٹیکم۔  
خناق فالج: جلسیم۔ کونیم۔

رنگ سازوں کا فالج: اوپیم۔ آیوڈیم۔ کوپریم۔ سٹیکم۔ ایونٹینیم وغیرہ۔  
رستاکس: جب کہ فالج۔ وجع المفاصل کے باعث ہو یا جھکنے یا نمی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہو نیز عصبی بخاروں اور ٹائیفس کے باعث فالج میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔  
اعضاء بہت سخت ہو گئے ہوں۔ یہ دوائی مزمن حالتوں میں خاص طور پر مفید



ہوتی ہے۔ اگرچہ فالج بچکان کی شدید حالتوں میں بھی یہ ویسی ہی مفید ہوتی ہے۔ (شدید فالج بچکان میں سفر کو نہیں بھوننا چاہیے)

عضلاتِ چشم اور چہرہ کے فالج میں جب کہ اس کا باعث مرطوب آب و ہوا اور ٹھنڈک ہو اور خاص کر وجع المفاصل مریضوں میں کاسٹیکم ویسے ہی مفید دوائی ہے جیسی کہ رٹاکس۔ اس حالت میں دونوں ہی مفید ادویات ہیں۔

ڈنکا مارا بہت حالتوں میں رٹاکس کے مشابہ ہے۔ نچلے دھڑکے فالج یا جب کہ مرطوب موسم میں یا نمدار زمین پر بیٹنے سے فالج شروع ہوا ہو تو ڈنکا مارا اور رٹاکس دونوں ہی مفید ادویات ہیں۔ لیکن مزمن مرض میں ڈنکا مارا مفید نہیں ہوتی۔ ٹھنڈک کے باعث فالج میں نیٹرم میور بھی ایک قیمتی دوائی ہے۔

خوراک: ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کاسٹیکم: ٹھنڈک کے باعث جب فالج ہو تو یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ خشک سرد موسم کی وجہ سے جب لقوہ کا عارضہ ہو تو کاسٹیکم دوائی بہت موثر ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کاپروڈیٹ نے لقوہ کے بے شمار مریضوں کو کاسٹیکم ۳۰ سے شفا دی اور لقوہ کے علاج میں یہ دوائی مسلمہ طور پر مفید ہوتی ہے۔ کسی خاص حصہ مثلاً زبان جنجرہ کے فالج میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ سکتہ کے بعد جب کہ فالج کا عارضہ ہو مہلے تو اس میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ آنکھ کے پھپھر کے فالج میں بھی یہ دوائی نافع ہے۔

خوراک: ۳x یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

برائٹا کارب: یہ لقوہ کی بہت اعلیٰ دوائی ہے اور نیز بوڑھوں کے فالج کی ڈاکٹر بیزاس کے بڑے ملاح ہیں اور ہارٹ مین تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ زبان کا فالج برائٹا کے بغیر درست ہو ہی نہیں سکتا۔ لقوہ کے بعد جب کہ فالج ہو۔ اور مریض اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکتا ہو۔ نوجوان کے لقوہ میں جب کہ زبان بھی قبلے مرض ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹے کے بعد۔

جلسی میسم : حرکتی فالج مکمل ہو۔ فالج خناتی اور فالج بچکان کی یہ ایک اعلیٰ ادویات میں سے ایک ہے۔ فالج عضلاتِ چشم ۲ نکھ کے چھتر کا فالج اور گفتگو بھی موٹی ہو گویا کہ زبان مفلوج ہے۔ جذبات کے باعث فالج ہو۔ حلق کا فالج ہو۔ تمام کا تمام جسم کا پتتا ہو۔

خوراک : ۵ یا ۱x ہر دو گھنٹے کے بعد۔

کونیم : فالج پیری۔ شدید اوپر کی جانب پڑھنے والا فالج یعنی فالج نیچے سے اوپر کی جانب پڑھتا ہے۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹے کے بعد۔

آر جینٹم نائٹریکم : فالج خناتی نیز فالج جسم طولانی کے لیے یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹے کے بعد۔

نکس و امیکا : نچلے دھڑ کا فالج۔ ٹانگیں وزنی اور ان میں کچاوت، پیری میں شانہ کا فالج۔ باضمہ کی خرابی اور مزاجِ مریض پڑ پڑا

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹے کے بعد۔

ایکونائٹ : قریباً ہر ایک قسم کے فالج کے لیے یہ ایک سرتاج دوائی ہے۔ جھنجھٹا ہٹ اور سن ہونا یہ اس کی مشہور علامات ہیں۔ سرد ہوا لگنے کے باعث جب کہ لقوہ کا عارضہ ہو جائے اور ساتھ ہی ٹھنڈک محسوس ہو۔ خاص کو شدید حالات میں تو وہ دوائی اکیر کا حکم رکھتی ہے۔ فالج جسم طولانی میں جب کہ جھنجھٹا ہٹ ساتھ ہو تو دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر نیم یا ایک گھنٹے کے بعد۔

نوٹ : ۱۔ فالج بوجہ ٹھنڈک میں رٹا کس۔ سلفر اور کاسٹیکم، ادویات بھی کام آتی ہیں۔

(۲) گھنجنا ہٹ، کینالس انڈیکا اور سٹافیریا کی بھی علامت ہے۔  
 پلم بلم: مفلوج عضویں جس و حرکت نہ رہے۔ کم بوری از حد زیلہ ہو قبض  
 کی شکایت ہو۔ پیٹ اندر کی طرف گھس گیا ہو۔ فالج سے پہلے مرزہ اور دماغ تشنج ہو۔  
 خوراک: ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
 فاسفورس: فالج نخاع میں یہ دوائی کام آتی ہے۔  
 نحو ساک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ ایوبینا۔ ہائیوسائی مس۔ کالی آیوڈائیڈ ۶x وغیرہ  
 بھی کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات: مریض کو آرام سے بستر پر لیٹے رکھیں اور اسے اٹھنے بیٹھنے  
 کی اجازت نہ دیں۔ قبض ہرگز نہ ہونے دیں۔ غذا لطیف اور زود ہضم دیں۔ دودھ سب  
 سے بہتر غذا ہے۔ مالش کرنا اور بجلی کا لگانا بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اینما کرنا یا سمندر میں  
 نہانا بھی مفید ہوتا ہے۔

## بچوں کا فالج

(INFANTILE PARALYSIS)

یہ مرض چند ماہ سے لے کر چند سال کے بچوں کو حرام مغز (ریڑھ کا ستون) کے  
 کسی حصہ کے سخت ہو جانے کے باعث ہو جایا کرتا ہے۔  
 علاماتِ مرض: اس مرض کا حملہ بخار یا تشنج سے شروع ہوتا ہے اور جب  
 شدید علامات دور ہو جاتی ہیں تو بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بچہ کا فلاں عضو شل ہو گیا ہے  
 کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے کو بچہ بھلا چکا ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے پر اس کے  
 ایک یا دونوں ہاتھ اور پاؤں مفلوج پائے جاتے ہیں جن کی قوتِ حرکت تو بالکل زائل  
 ہو جاتی ہے۔ مگر قوتِ جس میں چنداں نقص واقع ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ عضلات مفلوج

کے نشوونما میں فتور پیدا ہونے سے وہ لاغر اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں اور پشت میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔

اسباب مرض: سردی کا لگنا مثلاً ٹھنڈے پتھر یا مندار جگہ پر بیٹھنا یا لیٹنا۔ دانت نکالنا۔ پشت یا کمر پر چوٹ لگنا۔ معدہ یا انٹریوں کی خرابی، پیٹ کے کیڑے۔ مرض چھپک اور خسرہ وغیرہ اس کے اسباب خیال کیے جاتے ہیں۔ رسولی یا غدود کا بڑھ جانا بھی اس مرض کا سبب ہو سکتا ہے۔

## علاج

ابتداء میں ایکو نائٹ کی خوراکیں دینی چاہئیں۔ ایک یا دو روز کے بعد بیلادونا یا جلسی میم کا استعمال مفید ہو سکتا ہے۔ جب مرض کو بہت روز گزر چکے ہو تو نکس و امیکا یا فاسفورس کا استعمال فائدہ بخش ہو سکتا ہے۔ ہر حالت میں ماؤف عضو کو بڑی احتیاط کے ساتھ گرم رکھنا چاہیے یعنی گرم پانی میں غسل کرا کر اوپر اس کے روٹی باندھ دینی چاہیے۔

ایکو نائٹ: مرض کی ابتدائی حالت میں جب کہ بوجہ سردی لگنے کے مرض پیدا ہوا ہو۔

خوراک: ۳x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم: جسم کے نچلے دھڑ میں فالج، اعضاء کانپتے ہوں۔ کمزوری زیادہ ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا: ہاضمہ بہت خراب ہو۔ مریض پڑ پڑے مزاج کا ہو شراب اور گوشت کا عادی ہو، جب شراب پینے یا زیادہ کھانے کے بعد مرض ظاہر ہوا ہو یہ دوائی مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

برائٹا کارب: خصوصاً سن رسیدہ آدمیوں کے مرض میں یہ دوائی مفید ہوتی

ہے۔ دماغی کمزوری بہت ہو۔ زبان کا فالج ہو۔ جس کی وجہ سے آواز نہ نکل سکے۔ مریض ہر وقت اپنے آپ کو تھکی ٹوٹی حالت میں پاتا ہو اور کوئی کام کرنے کو اس کا جی نہ چاہتا ہو۔  
خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم : پٹھوں کا فالج۔ سر میں درد خاص کر پچھلی ہڈی میں بونا شکل ہو۔  
زبان کانپتی ہو اور تمام جسم کانپتا ہو۔ عضو میں جھنجھاہٹ اور کوئچن ہو۔  
خوراک : ۵ یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

لائس : خصوصاً بائیں طرف کا فالج یا فالج بائیں طرف ظاہر ہو کر دائیں طرف جارہا ہو۔ شرابیوں کا فالج۔

خوراک : ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : جب کہ اسہال وغیرہ کے آنے سے کمزوری بہت ہو گئی ہو اور فالج کا عارضہ ہو جائے تو یہ دوائی مفید ہو کر کرتی ہے۔

خوراک : ۶x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

پلم۔ کم : عضوماروف میں تس و حرکت نہ رہے۔ کمزوری از حد قبض کی شکایت پیٹ اندر کی طرف چلا گیا ہو۔ فالج سے پہلے لرزہ اور دماغی تشنج ہو۔  
خوراک : ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

کاسٹی کم : نقوہ و چہرہ کے فالج کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ ٹھنڈی ہو اسے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو، ڈاکٹر کا پرویٹ نے کاسٹی کم ۳ کے ساتھ نقوہ کے بشمار مریضوں کو شفا دی۔ کسی ایک عضو کے فالج کے لیے بھی یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔  
مثلاً زبان کا فالج یا خجرو کا فالج وغیرہ۔

خوراک : ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : تازہ ہوا۔ کھلی جگہ میں ورزش اور نمکین پانی میں غسل کر کے جسم کی حالت عامہ کو مضبوط بنائے رکھنا چاہیے۔ جب کمزوری بہت ہو تو کوڈ لیور آئیل کا استعمال بہت فائدہ بخش ہوتا ہے۔ مالش بھی بہت نفع دیتی ہے۔ زیادہ

خراب کیس میں بجلی کا لگانا بھی سودمند ہوتا ہے۔

## درِ عصبی - پھول کا درد

### نیوریلجیا

(NEURALGIA)

اس درد میں اعصابی سوزش و درم وغیرہ نہیں ہوا کرتی اور بغیر کسی ظاہری سبب کے درد معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کا درد دفعتاً بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ مفقود ہو جاتا ہے۔

علاماتِ مرض : ابرو کا درد عموماً ادھیڑ عمر کے اشخاص کو زیادہ ہوا کرتا ہے یہ درد کبھی رخسارے میں کبھی ٹھوڑی یا نیچے کے جڑے میں۔ کبھی پیشانی، ابرو، پوٹے اور آنکھ کے ڈھیلے میں ہوتا ہے۔ کبھی درد ایسا تیز ہوتا ہے۔ مانو کہ کوئی چھری سے کاٹ رہا ہے یا شتر لگا رہا ہے مارے درد کے مریض کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور درد کے مقام کو مریض مارتا اور دباتا ہے کبھی درد کے ساتھ ماؤف عضلات اٹھ بھی جاتے ہیں۔ جب مرض کا زور ہو تو دورہ درد بہت جلد ہوا کرتا ہے۔ مزمن مرض میں درد کا دورہ ہفتوں یا مہینوں کے بعد ہوا کرتا ہے۔

اسبابِ مرض : اس مرض کے کئی ایک اسباب ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً بکثرت رنج و غم و تفکرات، کثرتِ مباشرت، زہر پیریا، کمی خون، کمزوری، زیادہ محنت کرنا۔ عصبی خرابی و عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنا۔ سرد و گرم ہو جانا۔ بعض خاص امراض مثلاً گنٹیا، آتشک۔ وجع المفاصل وغیرہ بعض دھاتی زہریں مثلاً پارہ، تانبا یا سیسہ کا زہر اور مستورات میں امراض خصوصاً مہسٹریا۔ دائمی قبض اور بد ہضمی وغیرہ۔

اقسامِ مرض : اس مرض کی بلحاظ مقام درد کے چند قسمیں ہیں۔ مثلاً انٹرلیجیا۔

یعنی آنتوں کی درد، کیس ٹریلیجیا یعنی دردِ معدہ، کارڈی ایلیجیا یعنی دردِ دل، سیلیجیا

یعنی دردِ عکبر، ٹک ڈولر یعنی ابرو کی درد، انٹر کاسٹل، نیوریلجیا یعنی پسلیوں کا عصبی درد، لمبے گو یعنی دردِ کمر شیائٹ کا یعنی سنگری کی کا درد۔

پسلیوں کا درد: یہ درد عموماً بائیں جانب کی پانچویں یا چھٹی پسلی سے لے کر نویں پسلی تک ہوا کرتا ہے۔ کھانسنے یا چھینکنے یا سانس لینے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے۔ مگر ماؤف مقام کو دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہے۔

دردِ کمر: حرکت کرنے سے درد میں زیادتی ہوتی ہے اور نیز بوقتِ شب درد زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اس کا مفصل بیان آئندہ دردِ کمر کے بیان میں ملاحظہ فرمائیں

## علاج

ایکونائٹ: چہرہ کے دردِ عصبی میں یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ خشک سرد ہوا کے باعث یا سردی لگنے کے سبب نوجوان اشخاص کو جب یہ مارنہ شروع ہو جائے تو ابتداء میں ایکونائٹ جادو نما اثر دکھاتی ہے۔ نہ صرف عصب میں ہی لگاتار درد ہوتا رہتا ہے بلکہ ارد گرد کے حصص میں بھی درد ہوتا ہے، چہرہ سرخ اور سوجا ہوا، جھنڈا، تیجن اور درزیں ناقابلِ برداشت ہوں۔ مریض یہی کہے کہ دروین مجھے ہلاک کر رہی ہیں۔ جب چہرہ سوجا ہوا اور اس میں بائی کی دروین ہوتی ہیں۔ تو بھی یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

خوراک: ۳ یا ۴ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

ڈاکٹر باہر اور دیگر کئی ڈاکٹروں کا قول ہے کہ دردِ عصبی میں یہ دوائی اونچی طاقت میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

پلانٹی گو میجر: جب دردِ عصبی کبھی دانتوں میں اور پھر کانوں میں چلا جاتا ہو، تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔ کان کے دردِ عصبی میں یہ دوائی از بس مفید ہے۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد، اس دوائی کو خارجی طور پر بھی درو کی

جگہ پر ملتے ہیں اور کانوں میں بھی ڈالتے ہیں۔

کیمو میلا : جب دردِ عصبی کے ہمراہ اُکساہٹ و پٹر پٹر اپنی بہت ہو۔ درویں رات کو اور گرمی سے زیادہ ہوں اور ساتھ ہی چہرہ میں حرارت پیاس، سرخی گرم پسینہ اور بے صبری بہت ہو تو یہ دوائی بہت مفید ہوا کرتی ہے۔ بچلی طاقتوں میں یہ دوائی زیادہ موثر نہیں ہوا کرتی۔

خوراک : ۳۰ ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

کالوسنتھ : ابتدائی حالت میں یہ دوائی بھی موثر ہوتی ہے جب کہ یہ عارضہ نزلہ یا سردی لگنے یا جذبات کے بھڑکاؤ کے باعث پیدا ہوا ہو۔ ان دردوں کی خاص علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ حرکت کرنے اور چھونے سے درویں زیادہ ہوتی ہو اور آرام کرنے یا بیرونی گرمی سے افاقہ ہوتا ہو۔ درویں دورہ کے ساتھ ہوتی ہوں اور اکثر بائیں پہلو میں لیکن دائیں طرف، کے رینگنی کی درویں ہی یہ دوائی نافع ہوا کرتی ہے شکمی دردِ عصبی میں یہ دوائی سرج، تاثیر ہوتی ہے۔ خصیتہ الرحم کے دردِ عصبی میں یہ دوائی بہت نافع ہوا کرتی ہے۔ کالوسنتھ کے دریدوں کو آرام کرنے اور دباؤ سے آرام معلوم ہوتا ہے لیکن جو نہی دباؤ کو مٹایا جاوے تو درویں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔

خوراک : ۶x یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سپائی جیلیا : چہرہ کے دردِ عصبی میں ڈاکٹر باہر صاحب اس دوائی کا درجہ سب سے اول شمار کرتے ہیں جب کہ درویں بائی کی ہوں جھٹکے کے ساتھ ہوتی ہوں اور کاٹنے والی ہوں۔ نمی چھونے اور حرکت سے دردوں میں زیادتی ہوتی ہو۔ چھونے سے جسم میں تھرتھراہٹ سی ہوتی ہو، درویں خاص وقتِ معینہ کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہوں اور ساتھ ان کے دلی تشویش اور بے چینی ہوتی ہو یا درد کا حملہ ہونے سے پہلے دل کی دھڑکن شروع ہو جاتی ہو۔ درد کا مقام پیشانی کے اعصاب۔ خانہ چشم اور اوپر والے جبرے کے دانتوں میں درد ہو، اکثر اوقات ایسا محسوس ہوتا ہو کہ آنکھیں بہت بڑی ہو گئی ہیں، درد آفتاب نکلنے کے وقت شروع ہو کر دوپہر تک بڑھتا رہے اور بعد اس کے گھٹے۔



خوراک : ۶x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد -

سہمی سہمی فیوگاک : خانہ چشم کے اوپر والے مقام کے درودِ عصبی میں بیہوشی نہایت مفید ہوتی ہے لیکن عموماً یہ درودِ رحم کی خرابیوں کے باعث ہوا کرتا ہے۔ عصبی مزاج والی مستورات کے چہرہ میں دروے بعد دوپہر شروع ہوتی ہوں اور رات کو دروے کا آرام ہوتا ہو۔ بائیں طرف کے پستان کے دروے میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے -

خوراک : ۵ یا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

بیلٹوڈونا : ڈاکٹر ہارٹ مین خانہ چشم کے اندرونی درودِ عصبی میں بیلٹوڈونا کے استعمال پر خاص زور دیتے ہیں، جب کہ دروے کے ہمراہ آنکھوں میں پانی کی بہتات شام کے وقت دروے نہایت شدید کاٹنے والی ہوتی ہوں اور نیم شب کے قریب بہت ہی شدید ہوتی ہوں - دروے کا دورہ بہت دیر تک رہتا ہو - دروے کن ٹیوں، کان اور پشت گردن کی طرف لہر زن ہوتی ہوں اور شور، حرکت، جھٹکا، چبلنے اور سرد ہوا سے زیادہ ہوتی ہوں اور بالکل چپ چاپ پڑا رہنے اور گرمی سے دروے کا افاقہ ہوتا ہو - چہرہ کے درودِ عصبی میں - چہرہ سوجا ہوا اور چکیلا سرخ ہو اور دروے خصوصاً نہایت شدید ہوں - دروے یکایک شروع ہوتی ہوں اور فوراً ہی غائب ہو جاتی ہوں -

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد -

چائنا : درودِ معمولی سی حرکت سے ظاہر ہو جائے اور ناقابلِ برداشت حالت تک پہنچے، دروے کے ساتھ ہونے والے درود چھوٹے سے دروے میں زیادتی ہو لیکن نور کے ساتھ دبانے سے آرام معلوم ہو مریض میں کمزوری کی حالت پائی جاتی ہو - جب طیریا کا زہر اس عارضہ کا موجب ہو تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوا کرتی ہے -

خوراک : ۶x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد -

آر سی سی کم : خالص اعصابی درود جو پہلے جلنے کی مانند ہوتا ہے - مریض سخت بے چینی کی حالت میں ادھر ادھر کر دیکھتا ہو - دروے دروے میں ظاہر ہو - ٹھنڈے پانی سے پہلے تو کمی ہو - لیکن بعد ازاں زیادتی ہونی شروع ہو جائے - مقام ماؤف پر ایسا محسوس ہو

گویا کہ گرم گرم جلتی ہوئی سویاں چبوتی جا رہی ہیں، درو رات، کو ناقابل برداشت ہو۔ آدھی رات کے بعد تکلیف زیادہ ہو۔

خوراک : ۳۰ یا ۶۰۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

سلفرا اور چٹنی نم سلفیوریکم : ادویات بھی لیریل درد عصبی میں مفید ہوا کرتی ہیں۔

شافی سیگریا : جب دانتوں کے خلا میں درد ہو یہ دوائی خاص کہ بوڑھوں کے بے جن کے دانت بہت سارے نکل چکے ہوں اور ان میں غضب کا درد شروع ہو گیا ہو مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

گلنیشیا فاس : درد میں ایک خاص دوائی ہے۔ چہرہ کے درد عصبی میں یہ دوائی خاص طور پر شفا بخش ہوتی ہے۔ جب کہ دروین وقفہ کے بعد اور بھالا مارنے کی سہی ہوتی ہوں اور گرمی سے آرام معلوم ہوتا ہوں۔ گرمی سے درد کو آرام ہونا اس دوائی کی ایک خاص علامت ہے۔

خوراک : ۶x یا ۱۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : دورہ میں ظاہر ہونے والا درد جو دوپہر یا آدھی رات کے وقت ظاہر ہو۔ مزمن امراض میں جب منظر دوائی اپنا پورا اثر نہ کر سکے یا پھنسیوں یا خارش والے مادہ کے اندر دب جانے کے بعد درد شروع ہو گئے ہوں تو یہ دوائی راہبر ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

نیٹرم میور : جب کہ ساحل سمندر پر عصبی دردیں زیادہ ہوں، درد چشم دوپہر کو زیادہ ہوتے ہوں کوئین کے زیادہ استعمال کرنے سے عصبی امراض پیدا ہو گئے ہوں۔

خوراک : ۱۲x یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

سیڈرن : عین الوقتی اس کی خاص علامت ہے۔ جب کہ دورہ مرض شام کو

عین وقت پر ہوتا ہو۔ پوٹوں کے اوپر خاص کہ بائیں جانب دروین زیادہ ہوتی ہوں۔

اور ساتھ ہی آنکھوں میں جلن ہوتی ہو۔ جب میربائی بخار کی وجہ سے چہرہ، زبان اور دانتوں میں عصبی دریں ہوتی ہوں تو یہ دوائی خاص طور پر زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔  
 خوراک: ۵ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پلاٹینا: یہ ایک مفید دوائی ہے، جب کہ دردوں کے ساتھ کھچاؤٹ ہو اور ماؤف مقام سن ہو آنکھوں سے پانی بہت بہتا ہو۔ بوقتِ شب اور آرام کرنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ دردوں کے ساتھ کمر پڑتے ہوں اور ماؤف مقام میں سنسناہٹ اور جھنجھٹ ہو۔ ناک کی جڑ یا جسم کے کسی دیگر حصہ میں ایسی دریں ہوں مانو کہ شکنجہ میں کسے ہوئے ہیں۔ دریں بتدریج بڑھتی اور گھٹتی ہوں۔ (سٹینم)  
 خوراک: ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس: جب دانتوں میں مرکباتِ پارہ بھردانے کے باعث عصبی دریں ہوتی ہوں اور بوقتِ شب دردوں میں زیادتی ہوئی ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔  
 خوراک: ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

میزیریم: جب دریں پھیلتی ہوں اور گڑھی سے زیادہ ہوتی ہوں اور ساتھ ہی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ دریں نیم شب کو زیادہ ہوتی ہوں۔ آتشکی مریضوں اور نیز پارہ کے مریضوں کے لیے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ دورہ کے خاتمہ پر ماؤف مقام سن ہوتا ہو۔ پسلیوں کے دردِ عصبی میں جب کہ آنکھ میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو میزیریم ایک مفید دوائی ہے۔ نیز بوسیدہ دانتوں کی وجہ سے جب اعصاب میں دریں ہوتی ہوں تو یہ دوائی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔

خوراک: ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

رے ن کیورس بلورس: دردِ پسلی کی یہ بھی ایک مفید دوائی ہے۔ جب کہ تیز جھنجھ کی دریں ہوتی ہوں، موسم کی ہر تبدیلی پر سینہ میں جھنجھ پڑتی ہوں، سینہ میں کسی کسی مقام پر درد ہوتا ہو۔

دیگر ادویات جو سینہ کے درد میں کام آجیں وہ یہ ہیں۔

گال تھیریا۔ آرنیکا۔ سنی گا۔ سمی سی فیوگا وغیرہ  
 خوراک ۱ یا ۲ یا ۳۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
 دیگر ادویات مثلاً ورٹیکیم۔ کلیا۔ پٹسلا۔ ایلم سیپا۔ ہائی پرکیم۔ پردنس اور کلکیریا  
 کارب وغیرہ بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## خارجی علاج

جب درد نہایت شدید ہو اور اندرونی دوائی اس کو مطیع نہ کر سکے تو ایکونائٹ کے  
 لوشن کو لگانے سے اکثر فوری آرام ہو جاتا ہے۔ بارہ قطرے ایکونائٹ مدرٹکچر کے ایک  
 اونس پانی میں ڈال کر لوشن تیار کیا جاتا ہے اور گرم یا سرد پانی میں جیسا بھی مریض کو موافق  
 ہو۔ کپڑے کو بھگو کر ماؤف مقام پر رکھتے ہیں یا بیلا ڈونا کو اسی طرح استعمال کرنا چاہیے  
 پلانٹی گو میجر مدرٹکچر کو مذکورہ بالا طریقہ سے استعمال کرنے سے اکثر اوقات فوری آرام  
 آجایا کرتا ہے۔ کلوروفارم اپنی منٹ بھی خارجی استعمال کے لیے مفید ہے۔

ضروری ہدایات: مرض کے اصل سبب کو دریافت کر کے اس کو رفع کریں  
 چنانچہ اگر کوئی دانت خراب ہو تو اس کو نکلوا دیں۔

خوراک کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خوراک مقوی اور خاصی ہونی چاہیے۔ کوڈ  
 لیور آئل۔ مکھن، بالائی اتنی مقدار میں استعمال ہونے چاہئیں، جتنی کہ معدہ برداشت  
 کر سکے۔

ڈاکٹر ریڈ کلف اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ دردِ عصبی کے مریض کو مرغین غذا زیادہ  
 استعمال کرنی چاہیے۔ کیونکہ روغن اس مرض میں بہت نفع کرتا ہے اور اکثر دیکھنے میں  
 آیا ہے کہ دردِ عصبی کے مریضوں کو مرغین اغذیہ سے نفرت ہوتی ہے۔ لیکن اگر پٹسلا  
 دوائی کی چند خوراکیں دی جائیں تو یہ نفرت دور ہو جاتی ہے اور مریض بخوشی مرغین  
 اغذیہ کھا لیتا ہے۔

دوسری ضروری احتیاط سردی سے محفوظ رہنا ہے۔ سرد اور مرطوب آب و ہوا

میں رہنا جب کہ پارچاٹ نا کافی ہوں۔ درو عصبی کے پیدا کرنے کا موجب ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ گرم پارچاٹ مثلاً فلا لین وغیرہ زیادہ مفید ہوا کرتے ہیں نیکین پانی میں غسل کرنا اور غسل کے بعد جسم کو تویسے سے خوب ملنا اور باہر تازہ ہوا میں حسب ضرورت ورزش کرنا مفید ہوتے ہیں۔ تبدیلی آب و ہوا بھی مفید ہے۔ جو مریض بکثرت مشقت کرتے ہوں ان کے لیے آرام شفا یابی میں بڑا مددگار ہوتا ہے۔

## تشنج اطفال، ام الصبّیان، جموگا (INFANTILE CONVULSIONS)

اس مرض میں تشنجی حرکات، بچوں میں ہوا کرتی ہیں، اور مریض کے جسم کے کل یا بعض غیر اختیاری عضلات، باری باری سے اور جلد جلد نمٹتے ہیں اور مریض کو قدرے بے ہوشی بھی ہوا کرتی ہے۔

**علامات مرض :** خفیف حالت میں بچے کے چہرے کے عضلات جھٹکتے ہیں اور سانس قدرے تکلیف سے آتا ہے اور آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کو گھوم جاتے ہیں۔ شدید کیسوں میں مریض یکایک بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے سر، گردن، ٹانگوں اور بازوؤں کے عضلات نمٹتے ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کھینچے جاتے ہیں۔ انگلیاں اور خاص کر انگوٹھے مرجھاتے ہیں اور آنکھوں کے ڈھیلے اوپر کی جانب کھینچ جاتے ہیں۔ چہرہ اول سرخ لیکن بعد میں نیلا ہو جاتا ہے۔ ہونٹ نیلے پیلے ہو جاتے ہیں اور منہ سے جھاگ آتی ہے۔ نبض تیز اور باریک چلتی ہے۔ پیشاب اور پاخانہ بے اختیار نکل جاتے ہیں۔ یہ علامات ایک یا دو منٹ تک رہتی ہیں، بعدہ یا تو آرام آ جاتا ہے یا پھر نوبت مرض کی شروع ہوتی ہے اور اس طرح یہ علامات ایک یا دو منٹ کے لیے ملتوی ہو کر بار بار عود کرتی ہیں۔ تاوقتیکہ مرض کی نوبت ختم نہ ہو جائے۔ جب نوبت مرض رفع ہونے کو ہوتی ہے۔ تو بچہ ایک لمبی سانس لیتا ہے اور تشنجی حرکات دور ہو جاتی ہیں۔

اسباب مرض : ۱۔ نقصانِ باضمہ، ۲۔ دانت نکلا، ۳۔ پیٹ کے کیڑے، ۴۔ کان کی جھبھ، ۵۔ خفق غلفہ۔ اس بیماری میں سپاری کا بالائی چہرہ یعنی گھونگھٹ لمبا اور تنگ ہو جاتا ہے۔ بدیں وجہ وہ سپاری پر سے نیچے کو ہٹ نہیں سکتا، ۶۔ رکش، ۷۔ سر میں اجتماعِ خون، ۸۔ پیدائشی آتشک بعض شدید امراض مثلاً چیچک، خسرہ، نمونیہ، شدید کھانسی اور تیز بخار میں بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ پھانٹ کے دب جانے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## علاج

بیلٹوونا: خون کا دورہ بجانب سر ہو یا ورم دماغ کا عارضہ ہو، چہرہ گرم اور نم ہوتا ہو۔ بچہ یکایک، نیند سے بیدار ہو کر چونک اٹھے اور ادھر ادھر وحشیانہ طور پر دیکھے۔ خوراک : x کے دو قطرے ایک گچھ بھر پانی میں ڈال کر فوراً دے دیں۔ اور اسی طرح سے ہر پندرہ منٹ کے بعد اس کی خوراک دھرتے جائیں۔ کیمومیل: چہرے کے عضلات اور آنکھوں کے پھیروں کے عضلات میں تشنجی حرکات ہوں اور ایک رخسارہ سرخ ہو اور دوسرا زرد، پڑ پڑے مزاج کے بچوں کے لیے یہ دوائی نہایت موزوں ہوتی ہے۔ جب کہ ان کو نقصِ باضمہ ہو پانے سبز پانی پانی آتے ہوں۔ بچہ دانت نکال رہا ہو۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

نکس و امیکا : جب ثقیل غذا یا ثقیل پیل کھانے کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو،

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

کو پرم میلیکم : جب کالی کھانسی کے عارضہ میں یہ مرض پیدا ہو جائے تو یہ دوائی

شانی ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

سائنا : جب پیٹ میں کرموں کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

حلسی میم : جب دماغی امراض کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

سفلایٹیم : جب پیدائشی سفلس ہو۔ تو اس کی چند خوراکیں دینی چاہئیں اس کے

بعد جس دوائی کے علامات ہوں وہ دینی چاہیے۔

خوراک : ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : گلے و سینہ اور شکم کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دیں اور ٹخنوں کو

کھولا دیں۔ سر کو اونچا رکھیں اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر ماریں اور تازہ ہوا کافی

مقدار میں پہنچائیں۔ مریض کو گرم پاؤں میں بٹھا کر سر پر برف رکھیں یا سرد پانی میں تولیہ

بجھو کر رکھیں۔

## دردِ کمر

(LUMBAR BACK ACHE)

اس درد کی کئی ایک وجوہات ہیں سخت مشقت، ٹھنڈ لگنا، جلق، کثرتِ محبت

یا کمزوری عامہ، تکان لیکن زیادہ تر یہ مرض وجع المفاصل کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور

کبھی فقرس کے باعث۔

## علاج

رٹاکس : کمزور و سخت ہونا کہ کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ یہ علامت رٹاکس کی خاص

ہے۔ کمر کے اندرونی عضلات کے عوارض میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ درد بہت ہو۔

اور اٹھنے پر درد میں زیادتی ہو۔ مزمن کمزور کے لیے یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے

اور عا در ایکویٹ کے لیے ایکو نائیٹ جس کے دینے سے بہت جلدی آرام آجایا

کرتا ہے۔

ڈاکٹر باہر صاحب رٹاکس اور آرنیکا کے مقابلہ میں انیٹم ٹارٹ کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ رٹاکس کی یہ بھی علامت ہے کہ کمردرد کو دباؤ سے آرام ہو لیکن بستر میں حالت بدتر ہو۔ رٹاکس کا مریض سخت بستر پر لیٹنا پسند کرتا ہے۔ چیخے کی جانب جھکنے سے دردوں کا آرام ہوتا ہے۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نیم گرم میوڑ کی بھی یہ علامت ہے کہ مریض کو سخت بستر پر لیٹنے سے درد کا آرام ہوتا ہے۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سٹافی سیگنریا: دردیں مریض کو علی الصباح ہی بستر پر سے اٹھ کر چلنے پھرنے کے لیے مجبور کرتی ہوں، کثرتِ مجامعت کے بعد درد۔

خوراک: ۵ کا ایک قطرہ نصف اونس پانی میں ڈال کر دین میں چار مرتبہ۔  
نئے فالی ام: مزمن کمردرد کی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ لگاتار حرکت کرنے سے درجہ کی زیادتی ہو۔ چپ چاپ رہنے سے آرام ہو۔ جتنا مرض زیادہ دیرینہ ہوتا ہے یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیر یا فلوریڈا: کمردرد کی یہ ایک مجرب دوائی ہے۔ کمر کے زیریں حصہ میں جلن دار درد۔ حرکت کے آغاز میں درد زیادہ ہو، لگاتار حرکت کرنے سے درد کا آرام ہو۔ جب کھچاؤٹ کے باعث درد ہو اور رٹاکس کے استعمال سے فائدہ نہ ہوا ہو تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی فاس: جب آرام کرنے کے بعد چلنا پھرنا شروع کیا جائے تو درد کم زیادہ ہو۔ بیٹھ کر اٹھتے وقت ایسا معلوم ہو کہ کمر شل ہو گئی ہے۔



خوراک : ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : نخاع کے امراض کے باعث جب دردِ کمر شروع ہو جائے تو اس کے لیے یہ اعلیٰ دوائی ہے۔ رات کو بستر پہ لیٹتے وقت درد زیادہ ہو۔ بھالا مارنے کا سا درد ہو یا دھکن سی ہو اور کمر میں ٹمپیں بھی پڑتی ہوں۔ نکس و امیکا کی یہ خاص علامت ہے کہ پہلو بدلنے کے لیے مریض کو بیٹھ کر بدلتا پڑتا ہے۔ صبح کے کمر درد کے لیے یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔ جتنی مدت مریض صبح کو بستر میں لیٹا رہتا ہے اتنا ہی درد زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جب کثرتِ مجامعت کے باعث کمر درد شروع ہو گیا ہو تو نکس و امیکا اور سٹانی سیگر یا دونوں کا رآمد ہوتی ہیں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

اوکسالک ایسڈ : کمر میں سخت درد ہو۔ پہلو بدلنے سے قدرے آرام ہو یا معلوم ہو کہ کمر ایسی کمزور ہو گئی ہے کہ جسم کو سہارا نہیں سکتی۔ دردوں کا خیال کرنے سے دردی زیادہ ہوں۔ نقاہت محسوس ہو اور ماؤف اعضا سس ہوں۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سپینا : جب رحم کے نقائص کے باعث کمر میں درد ہو تو یہ دوائی منظر ہو ا کرتی ہے۔ چلتے پھرتے وقت کمزوری محسوس ہو۔ بیٹھنے پر زیادہ ہو۔ کمر میں یکایک درد کا ہو جانا۔ مانو کہ ہتھوڑا کسی نے کمر پر مار دیا ہے۔ کسی سخت چیز کے خلاف کمر کو دبانے سے آرام ہو۔

خوراک : ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ایسی کیولس : جب چلنے پھرنے سے کمر درد زیادہ ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے کمر کے مقام پر سخت لگاتار دھیا دھیا درد ہوتا رہتا ہو۔ اور چلتے چلتے کمر رہ جاتی ہو۔ دورانِ حمل میں کمر درد کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سکی سی فیوگا : مستورات کے کمر درد کی یہ ایک نادر دوائی ہے، جب کہ رحم

کے امراض کے باعث کمزور ہو۔ ڈاکٹر ارنلڈ صاحب کا قول ہے کہ کمزور و اور کمزور  
کوک پڑنے کے لیے سہمی سی فیوگا ایک بہترین دوائی ہے۔

خوداک : ۵ کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد

آرنیکا : جب سخت مشقت کرنے یا چوٹ آنے کے باعث کمزور ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : مریض آرام سے بستر پر لیٹا رہے اور سردی سے اپنے آپ  
کو محفوظ رکھے، مقام درد پر رشاکس اور برائی اونیا۔ مدر ٹنگر بلا کردن میں دو مرتبہ مالش  
کریں اور مقام درد پر سینک کریں، بعض اوقات اسی کی گرم گرم پلٹس باندھنا یا رائی کا  
پلستر یا گلاس لگانا۔ تارپین کے تیل یا لینی منٹ آف ٹرپن ٹائی یا پٹرول کی مالش کرنا بھی  
مفید ہوا کرتا ہے۔ قبض کو دور کریں۔ اگر مرض کا دورہ بار بار ہوتا ہو اور مرض پرانا ہو گیا  
ہو تو مریض کو چاہیے کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھے۔

## نگرہی کا درد - رینگنی

### عرق النساء

(SCIATICA)

یہ درد پیڑو کے بڑے عصب (نزد) میں ہوتا ہے جس کو انگریزی میں ٹیاٹک  
نزد کہتے ہیں، یہ درد ٹری کے نیچے سے لے کر بیرونی ٹخنے تک محسوس ہوا کرتا ہے۔  
علامات مرض : یہ درد آہستہ آہستہ شروع ہو کر شدید ہو جاتا ہے اور گاہے  
یکایک شروع ہو جاتا ہے۔ کوٹھے کے نیچے جانگ کی پھلی طرف سے یہ درد شروع ہو کر  
ٹانگ میں ہوتا ہوا گھٹنے کی پھلی طرف سے ٹخنے تک جاتا ہے۔

تشخیصی علامات : ۱۔ مریض ماؤٹ ٹانگ کو پھیلانے، پھر اس کو پیٹ کی  
طرف لائے ایسا کرنے سے سخت درد محسوس ہو، ۲۔ جب مریض کرسی پر ٹانگیں نیچے

لٹکائے بیٹھا ہو۔ اگر گھٹنے کی پچھلی طرف کچھی (گردھا) میں دبایا جائے تو مریض کو سخت درد محسوس ہو گا۔ مریض کھڑا ہونے کی حالت میں اپنا بوجھ تندرست ٹانگ پر ڈالتا ہے۔ اور ماؤف ٹانگ کو ڈھیلا رکھتا ہے، صرف پاؤں کے اگلے حصہ پر بوجھ ڈالتا ہے اور ایڑی کو اونچا رکھتا ہے۔ تاکہ ماؤف عصب (NERVE) کو کھچاؤٹ نہ ہو، م۔ ماؤف ٹانگ میں کٹرل پڑتے ہیں۔

نوٹ: شیاٹیکا کی درد کا دورہ شدید۔ جب ایک ٹانگ میں موجپکا ہو تو اسی ٹانگ میں اس مرض سے پیدا کرنے کے موجب ہوا کرتے ہیں، سخت قبض، نمدار جگہ پر بیٹھنا یا سونا وغیرہ وغیرہ اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

کالوسنتھ: شیاٹیکا کی یہ ایک مشہور دوائی ہے اور نہایت خراب کیسوں میں بھی یہ مؤثر ہوتی ہے۔ در دیں بڑے عصب (شیاٹک نرو) میں ہوتی ہوں اور گھٹنے یا ایڑی تک جاتی ہوں۔ حرکت کرنے سے اور خصوصاً سردی لگنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ درد وقفہ کے بعد ہوتا ہو اور بعدہ ماؤف مقام سن اور کسی قدر مغلوج ہو جاتا ہو۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ان کو لوہے کے بندھنوں سے جکڑا ہوا ہے یا شکنجہ میں کسا ہوا ہے۔ عضلات نہایت سخت تنے ہوئے اور اکڑے ہوئے ہوں۔ وایاں طرف خصوصاً قبلائے مرض ہو اور چلنے پھرنے میں چھین کی در دیں ہوتی ہوں۔ ابتدائی کیسوں میں یہ دوائی خصوصاً مفید ہوتی ہے، کوٹھے کے ارد گرد کھچاؤ کا احساس ہو، در دیں یکایک شروع ہو جاتی ہوں اور یکایک ہی رفع ہو جاتی ہوں ان میں جلن بھی ہوتی ہو۔ ٹھنڈک یا نمی سے اور بوقت شب در دیں زیادہ ہوتی ہوں اور مریض کسی حالت میں بھی ماؤف عضو کو آرام میں نہ رکھ سکتا ہو۔

خوراک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فی فالی ام (GNAPHALIUM) یہ دوائی کالوسنتھ کے بالکل مشابہ ہے۔

ڈاکٹر اکثر اس مرض میں اس کو اکیر مانتے ہیں۔ درد نہایت سخت ہوتی ہو اور ماؤن مقام سن ہو۔ لیٹنے سے حرکت کرنے سے قدم قدم چلنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ لیکن مریض جب کرسی پر بیٹھے تو اس کو درد کا آرام ہوتا ہو اور درویں پاؤں کے انگوٹھوں تک پھیلتی ہوں۔

خوراک : ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرٹھرائٹس : درد وقفہ کے بعد ہوتی ہو اور ہر شب کو عین وقت پر تیز ہوتی ہو اور ناقابل برداشت ہو۔ زیادہ چلنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو لیکن آہستہ حرکت کرنے سے آرام ہوتا ہو۔ سردی سے تکلیف زیادہ ہوتی ہو اور گرم مالش سے کسی قدر آرام ہوتا ہو۔ درویں خالص عصبی ہوں۔ درم وغیرہ نہ ہو۔ لنگڑی کے درویں آرٹھرائٹس ایک خاص معتبر دوائی ہے۔ شیاٹیکا کے خالص درد عصبی میں کیو میلا بھی ایک مفید دوائی ہے۔ جب کہ درویں ناقابل برداشت ہوں اور جوں جوں درد بڑھتی ہو مریض گرم ہوتا جاتا ہو دنجیف اور سن رسیدہ بوڑھے مریضوں کے لیے آرٹھرائٹس ایک مفید دوائی ہے۔

خوراک : ۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رٹاگس : ابتدائی کیسوں میں یہ دوائی شاذ و نادر ہی کام آتی ہے۔ لیکن جب یہ مرض دیرینہ ہو جائے تو یہ موثر ہوتی ہے۔ درویں پھاٹنے والی اور جلن طہ ہوں، آرام کرتے وقت تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ لنگڑاؤ ہو اور عضلات جھکتے ہوں قبض ہو جب درد کم اور لنگڑی کا درد دونوں مل گئے ہوں۔ تب یہ بہتر دوائی ہے مرض کا باعث بھگنا یا بوجھ کو اوپر اٹھانا چکھوڑا اور کثرت مشقت ہو۔ گرمی سے بہت آرام ہو۔

خوراک : ۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بوائی اونیا : بھالا مارنے کی سی درویں ہوتی ہوں۔ مالش سے اور سخت دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ جب شیاٹیکا کا عارضہ بوجھ و جمع المفاصل ہو تو یہ دوائی

خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لیسٹم : جب شائیکا کی درویں اور وجع المفاصل کی درویں ملی جلی ہوں تو یہ دوائی کام آتی ہے۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد

روٹا : جب سنگری کا درد ابتدائی حرکت میں یا بیٹھے ہوئے اٹھنے پر گولی مارنے

کا سا ہوتا ہو اور مریض دوران درد میں متواتر چلنے پھرنے پر مجبور ہوتا ہو۔ اور درویں مطلوب یا ٹھنڈے موسم میں اور شکور کرنے سے زیادہ ہوتی ہوں۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد

گالی آپتوڈائیڈ : درویں یا ت کو اور ماؤت مقام کے بل لیٹنے سے زیادہ

ہوتی ہوں اور حرکت کرنے سے آرام ہو۔ جب پارہ کے زہر یا آتشکی زہر کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو یہ دوائی معاون ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فانی ٹولا کا : درویں تیر مارنے کی سی اور پھاڑنے کی سی ہوں۔ حرکت سے زیادہ

ہوں۔ آتشکی زہر کی وجہ سے درویں ہوں۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالچیکیم : درویں دائیں جانب ہوں اور تیز گولی مارنے کی سی ہوں اور گھٹنوں

تک جاتی ہوں۔ حرکت کرنے سے زیادہ ہوں۔ مریض کو چپ چاپ رہنا پڑتا ہو۔

درویں فوری لگاتار اور ناقابل برداشت ہوں۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے بہترین گھنٹہ کے بعد۔

امونیم میور : بیٹھے رہنے پر سنگری کا درد زیادہ ہو۔ چلنے پھرنے سے تھوڑا

آرام ہو اور لیٹنے پر بالکل آرام ہو۔ بائیں کوٹھے میں درد ہو گیا کہ بندھن (TENDONS)

بہت چھوٹے ہو گئے ہوں ٹانگیں کچھی ہوئی معلوم ہوتی ہوں جھکے دوناک ہوں اور

پاؤں سوئے ہوئے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا: جب وریدوں میں خون کا دورہ رک گیا ہو تھکاوٹ اور بھاری پن محسوس ہوتا ہو۔ کبھی درد ایک مقام پر اور پھر فوراً ہی دوسرے مقام پر جانو دار ہوتا ہو۔ جنگا سہ اور کوٹھے میں دکھن ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ نقص رحم کی وجہ سے شیاٹیکا کی درویں ہوتی ہوں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائٹ : درمی شیاٹیکا میں جب کہ ٹھنڈا نمی اور پسینہ کے دب جانے کی وجہ سے عارضہ پیدا ہوا ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ ماؤف مقام سُن ہوں اور ان میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو۔ خاص کر پاؤں کے انگوٹھوں میں درویں نہایت شدید ہوں اور خاص کمرات کو مریض بے چین ہو اور ماؤف عصب میں جھنجھناہٹ ہوتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : درم بہت زیادہ ہو اور درویں یکایک ظاہر ہوتی ہوں۔ سوزش عصب ہو اور شیاٹک نرور (عصب) نہایت ذکی الجھن ہو، رات کو درویں شدید ہوتی ہوں ماؤف مقام چھوانہ سکتا ہو۔ ذرا سا چھونے یا ہوا کے جھونکے سے تکلیف بہت زیادہ ہو جاتی ہو۔ شدید بھالا مارنے کی سی درویں بعد دوپہر یا شام کو ہوتی ہوں۔ مریض کو بار بار اپنی جگہ بدلنی پڑتی ہو۔ حرکت کرنے، شور، ٹکرانے یا چھونے سے تکلیف بہت بڑھ جاتی ہو۔ کپڑے کا چھونا بھی ناقابل برداشت ہو۔ عضو کو نیچے لٹکانے سے گرمی سے اور سیدھا بیٹھنے سے آرام ہوتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : چونکہ اس دوائی کا اثر (SPINAL CORD) پر ہوتا ہے۔ اس لیے سنگری کے درو میں اکثر استعمال کی جاتی ہے۔ درویں بجلی کی مانند ہوتی ہوں۔ نہایت شدید ہوں۔ مریض کو جگہ بدلنی پڑتی ہو۔ پاؤں میں درویں جاتی ہوں۔ ماؤف

عضو سخت کڑا، لچھا ہوا ہو۔ ماؤف مقام مفلوج اور ٹھنڈا ہو۔ ماؤف جانب کے بل لیٹنے سے اور گرم پانی کی ٹکور سے آرام ہو۔ قبض ہو اور مریض آرام پسند ہو۔

خوراک : ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ ازیں گلوٹائمن، پیم بلم، کافیا، سلفر، فاسفورس، نیٹرم مہوز، میگنیشیا فاس۔ اور کالی فاس ادویات بھی اس مرض میں کام آتی ہیں۔ جب کہ ان کی علامات موجود ہوں۔

### ضروری ہدایات

جو دوائی اندرونی دی جائے وہی دوائی خارجی طور پر روغن زیتون ملا کر ماؤف مقام پر لٹنی چاہیے۔ مالش گرم کمرے میں کرنی چاہیے تاکہ ہوا کے جھونکوں سے بچاؤ ہے آرام اور گرم مالش دونوں ہی ضروری ہیں۔ ماؤف مقام پر فلائین کا ٹکڑا رکھ کر اور اس پر دھو بی یا درزی کی گرم گرم لوسے کی استری رکھنا بہت مفید ہوا کرتا ہے۔ جنگاسہ کے اوپر فلائین کا ٹکڑا یا روئی رکھنا آرام دہ ہوتا ہے، مریض کو شراب و کباب سے پرہیز کرنا چاہیے اور اس قدر محنت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے تکان ہو جائے۔

### باب ہشتم

امراض چشم یعنی آنکھ کی بیماریاں  
آنکھ میں کچھ پڑ جانا

(FOREIGN BODY IN THE EYE)

جب کوئلہ، چونا، ریت، کنسکریا شیشہ کا ذرہ وغیرہ آنکھ میں پڑ جاتا ہے۔

تو آنکھ میں سخت خراش ہوتی ہے اور اس سے پانی جاری رہتا ہے۔ مریض آنکھ کھول کر نہیں دیکھ سکتا۔

## علاج

۱۔ چھتر کو اٹا کر باریک سلائی وغیرہ کے ذریعہ غیر جنس فوراً نکال دینا چاہیے اور پھر آئی باتھ گلاس لے کر اس میں پانی بھر کر اس میں دو قطرے اکیونائیٹ مدرٹسکچر (۵) کے یا آرنیکا (۵) کے ڈال کر بہ احتیاط تمام گلاس کو آنکھ پر جما دینا چاہیے اور آنکھ کو پانی میں کھول کر رکھنا چاہیے تاکہ اس روشن سے آنکھ بالکل دھوئی جاسکے۔ اس طرح کرنے سے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ذرے آنکھ سے نکل کر گلاس میں آ جاتے ہیں۔

۲۔ جب ان بجھا چونا آنکھ میں پڑ جائے تو کھانڈ پانی میں ملا کر اس کا گاڑھا سوپوشن بنالیں اور آنکھ میں ڈال دیں اور پھر صاف ستھرے پانی سے اس کو دھو ڈالیں یا سرکہ کے روشن سے (ایک حصہ سرکہ اور آٹھ حصہ پانی) آنکھ کو خوب دھو لیں اور آنکھ دھونے کے بعد گلیسرین کے تین چار قطرے یا کسٹرائیل کی دو تین بوندیں آنکھ میں ڈال دیں یا سرد پانی کی گدی آنکھ پر رکھیں۔

۳۔ اگر بارود آنکھ میں پڑ جائے تو با احتیاط اس کے ذرات آنکھ سے نکال دینے چاہیے اور پھر آنکھ کو خوب دھو کر میٹاتیل یا کسٹرائیل کے دو چار قطرے ڈال دینے چاہئیں۔

۴۔ لوہے کا ذرہ اگر آنکھ میں پڑ گیا ہو اور دھونے سے نہ نکلتا ہو تو مقناطیس کو آنکھ کے قریب لے جائیں۔ ذرہ مذکور خود بخود کشمکش مقناطیس سے نکل آئے گا۔ اس کے بعد آنکھ کو اکیونائیٹ یا آرنیکا کے روشن سے آئی باتھ گلاس

نوٹ ۱۔ اس قسم کے گلاس انگریزی دوائی فروشوں کے ہاں سے مل سکتے ہیں۔



کی مدد سے دھو دینا چاہیے۔

۵۔ اگر ایسڈ یا کاسک آنکھ میں پڑ جائے تو میٹھا تیل کے چند قطرے ڈال دینے

سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے

۶۔ اگر کسی دھات کا براہ یا زنگ یا کوئی دوسری سخت چیز آنکھ میں پڑ جائے تو

انڈے کی سفیدی ڈال دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔

۷۔ اگر کوئی نوک دار چیز مثلاً شیشے کا ٹکڑا وغیرہ آنکھ میں گر جائے تو چھوٹے موچے

سے پکڑ کر اس کو نکال دینا چاہیے اور اس کے بعد کیلنڈر لالوشن میں کپڑا تر

کر کے آنکھ پر پٹی رکھنی چاہیے۔ کیلنڈر لال مدیٹنکچر کے دس قطرے اور پانی

ایک اونس لے

## آنکھ دکھنا، آشوب چشم

(CONJUNCTIVITIS OPHTHALMIA)

اس مرض میں پوٹوں کی اندرونی اور آنکھ کے ڈھیلے کی اوپر کی لعاب دار جھلی متورم ہو جاتی ہے۔ یہ مرض ہر موسم اور ہر عمر کے اشخاص میں پایا جاتا ہے لیکن باہر موسم بہار اور موسم خزاں میں عام ہوتا ہے۔ غریب بچے جن کی پرورش اچھی طرح سے نہیں ہوتی وہ اکثر اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ غذا اور صفائی نہایت ضروری ہیں۔

آشوب چشم کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ شدید یعنی حاد ۲۔ مزمن یعنی دیرینہ

شدید آشوب چشم مزمن مرض میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔

۱۔ اکیونائٹ x ۶ کھانے سے بھی ذرہ باہر نکل جاتا ہے۔

علامات مرض: درم کی تمام صفات جس طرح سے اس مرض میں ملتی ہیں دوری کسی جگہ ایسی آشکارہ نہیں ہوتیں، مثلاً گرمی، درد، سرخی سوچ وغیرہ شدید کیسوں میں درد ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے۔ مریض شکایت کرتا ہے کہ آنکھ میں ریت کے دانے پڑے ہوئے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوٹوں کے نیچے شیشے کے ٹکڑے ادھر ادھر حرکت کر رہے ہیں۔

جھٹی جھکیلی سرخ ہوتی ہے اور آنکھ روشنی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہے اور صبح کے وقت پوٹے پیپ (چیپرٹ) کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔

اسباب مرض: زکام و نزلا کا ہونا۔ تیز دھوپ یا شدت کی گرمی، سرد ہوا کا لگنا۔ آنکھ میں کچھ پڑ جانا۔ دھوئیں یا گرد و غبار کا آنکھوں میں پڑنا۔ شیرخوار بچوں میں دانت نکلنا اس مرض کے اسباب ہیں، لیکن بعض امراض کے ساتھ بھی آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں۔ مثلاً خسرہ۔ چیچک۔ خناق و بانی وغیرہ

## علاج

گرم بورک لوشن سے دن میں کئی مرتبہ آنکھوں کو دھونا چاہیے۔ اگر چیپرٹ بہت ہو تو کیلنڈولا، مدرٹسکچر کے پانچ قطرے آدھ پوٹ پانی میں ڈال کر لوشن تیار کر کے اس کے ساتھ آنکھوں کو دھونا چاہیے۔ دھو چکنے کے بعد بورک کی مرہم یا کیلنڈولا کی مرہم نچلے پوٹے میں لگانی چاہیے۔ اگر پوٹے صبح کے وقت چپکے ہوئے ہوں تو ان کو زبردستی نہیں کھولنا چاہیے۔ بلکہ لوشن سے ترک کر کے کھولنا چاہیے۔ اگر رات کو سوتے وقت مذکورہ بالا مرہم تھوڑی سی نچلے پوٹے پر لگائی جائے تو پھر پوٹے آپس میں نہیں بڑتے۔ سرد اور مرطوب ہوا سے بچنا چاہیے اور اگر موسم تند ہو تو مریض کو ایک ہوا دار لیکن کسی قدر تاریک کمرے میں رکھنا چاہیے اور آنکھوں کے اوپر سبز یا سیاہ کپڑے کا سایہ رکھنا چاہیے یا آئی ٹیڈ لگائیں یا سیاہ چشمہ پہنیں اور آنکھوں کو بہت کم

استعمال کریں اور گندی آب دھوئیں نہ جائیں، خوراک بالکل سادہ، زود ہضم اور مقوی کھائیں۔

ادویات جو اس مرض میں کام آتی ہیں یہ ہیں :-  
ایکونائٹ، یوفریڈیا، سلفر، اینٹیم ٹارٹ، مرکبوس کار، رٹاکس وغیرہ۔  
مذکورہ بالا ادویات کی مفصل تشریح اگلے مضمون "پیپ دار آنکھ دکھنا" کے تحت میں درج کی گئی ہے۔ وہاں مطالعہ فرمائیے۔

## پیپ دار آنکھ دکھنا

(PURULENT CONJUNCTIVITIS)

## پیدائشی آنکھ دکھنا

(OPHTHALMIA NEONATORUM)

## سوزاکی آنکھ دکھنا

(GONORRHOEAL CONJUNCTIVITIS)

نوٹ: (۱) پیپ دار آنکھ دکھنا۔

(۲) پیدائشی آنکھ دکھنا (رمد مولودی)

(۳) سوزاکی آنکھ دکھنا (رمد سوزاکی)

یہ تینوں امراض درحقیقت ایک ہی بیماری ہے۔ جس کے یہ تینوں مختلف نام

ہیں۔

یہ ایک متعدی مرض ہے۔ آنکھ میں شدید سوزش ہو کر ایک دو روز میں پیپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا علاج فوراً نہ کرایا جائے تو آنکھ کے ضائع ہو جاتے

کا ڈر ہوتا ہے۔

علاماتِ مرض : آنکھ میں سُرخی اور درم ہوتا ہے، پانی بہت نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ پوٹے متورم ہو جاتے ہیں۔ مریض آنکھ کو کھول نہیں سکتا کیونکہ روشنی اس کے لیے ناقابلِ برداشت ہوتی ہے۔ روشنی سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ پہلے دوچار روز تک آنکھ سے پانی نکلتا رہتا ہے لیکن پھر اس میں پیپ پر جاتی ہے اور سُرخی زیادہ ہو جاتی ہے۔ درد شدت کا آنکھ میں ہوتا ہے اور یہ تکلیف ایک یا دو تھ ماہ تک رہتی ہے۔ پھر تکلیف میں کچھ کمی واقع ہونے لگتی ہے اور مرض پُرانا ہو جاتا ہے۔ اگر مناسب علاج نہ کرایا جائے تو اکثر قرنیہ گل کر آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔

اسبابِ مرض : نوزائیدہ بچوں کی آنکھوں میں بوقتِ ولادت کے اندام نہانی کا زہر لگ جاتا ہے جس سے پیدائش کے تیسرے دن میں ماؤف آنکھ مبتلائے مرض ہو جاتی ہے جس حاملہ عورت کو سوزاک کا عارضہ ہو اس کے بچے کو یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات دایکے غلیظ ہاتھوں سے سوزاک کا مواد نوزائیدہ بچہ کی آنکھوں میں لگ جاتا ہے۔ یہ مرض بچوں اور جوانوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ رمد سوزاک یعنی سوزاک آنکھ دکھنا جو جوانوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوزاک زہر ہاتھوں یا رومال وغیرہ کے ذریعہ آنکھوں میں پہنچ جاتا ہے۔

## مرض کے روک تھام کی تدابیر

۱۔ دورانِ حمل میں حاملہ کا علاج کرائیں۔ تاکہ مرض یکوریا (سیلان الرحم) کا اس کو آرام آجائے۔

۲۔ ایک فی صدی والا سلورنائٹریٹ نوزائیدہ بچہ کی آنکھ میں ڈالیں تاکہ مادہ سوزاک زائل ہو جائے۔

## علاج

بیلادونا، درد، سُرخی اور سورج کن پٹیوں میں دھڑکن کا درد بخارے تممتاے

ہوئے آنکھیں جھکی اور روشنی کے ناقابل برداشت۔ یہ اس کی خاص علامات ہیں۔  
 خوراک: بارہ قطرے مدٹنگر (۵) کے ایک چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر ایک  
 ایک چمچ دوائی کا ہر ایک گھنٹہ کے بعد دیتے جائیں اور جب مرض کا زور کم ہو جائے تو  
 ہر تین یا چار گھنٹہ کے وقفہ پر دیں۔

نوٹ: اکثر ایکونائٹ اور بیلاڈونا باری باری سے دی جاتی ہیں۔ جب کہ بخار بھی  
 ساتھ ہو یا ایکونائٹ کی دو خوراکیں پہلے دے کر اس کے بعد بیلاڈونا دوائی  
 حسب ہدایت مذکورہ بالا استعمال کرائیں۔

ایکونائٹ: آشوب چشم ہو نبض تیز، جلد جسم خشک، پیاس ہو۔ جب سرد ہو  
 اس مرض کا باعث ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے، مرض کے ابتدائی میں دینے سے اور  
 ساتھ کیلنڈولہ اور بورک لوشن کا بیرونی استعمال کرنے سے مریض کو جلد از جلد آفاقہ ہو  
 جاتا ہے۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس سالو: آشوب چشم ہو اور آغاز میں پانی آنکھوں سے بکثرت نکلتا ہو  
 جو کہ بعد میں پیپ اور کچڑ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پلکیں چمپڑ سے باہم چپک جاتی ہوں  
 اور آنکھوں میں جلن دار گرمی اور بوجھ محسوس ہوتا ہو اور حرکت کرنے سے یا  
 آنکھ کو چھونے سے درد میں زیادتی ہوتی ہو۔ بخار زیادہ نہ ہو مگر خارش اور جلن  
 بہت ہو۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

یوفرینز یا: نزلی آشوب چشم ہو اور ساتھ ہی آنکھوں سے بکثرت آنسو بہتے  
 ہوں۔ روشنی برداشت نہ ہو سکتی ہو اور نزلہ کے باعث ناک کی جھلیاں بھی متورم ہو  
 گئی ہوں، نزلہ ورم میں جب کہ آنکھوں سے پانی بکثرت بہتا ہو یہ علامت اس  
 دوائی کی خاص ہے، تو یہ دوائی اکثر اوقات بدوں امداد و گیر دوائی کی سی ہی شفا بخش  
 ثابت ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس کار : جب نہایت شدید آشوب چشم ہو اور روشنی سے ڈر لگتا ہو یا آنکھ میں خونی نقطہ ہو تو اس دوائی کے دینے سے بہت جلد آرام آجاتا ہے۔

خوراک : ۱x، ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر جینٹم نائٹریکیم : یہ دوائی بچوں کے پیدائشی آشوب چشم میں بہت مفید ہوتی ہے۔ مزمن کیوں میں بھی یہ دوائی کام آتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فانی ٹولا کا : آنکھوں میں خارش ہو اور گیس کی روشنی سے خارش زیادہ

ہوتی ہو۔ مزمن آشوب چشم میں جب کہ ساتھ ہی وجع المفاصل کے درد ہوتے ہوں۔

یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ پوٹوں پر سرخی، مل نیلگوں سوزش ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم : بھینکا پن ہو۔ مریض کو روشنی مرغوب ہو۔ خانہ جسم میں عصبی درویں

ہوتی ہوں۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا : پکیں جڑی ہوتی ہوں، آنسو بکثرت خارج ہوتے ہوں اور ڈھیلوں

میں عصبی درویں ہوتی ہوں۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم : کمزور عصبی مریضوں میں شدید آشوب چشم ہو۔ خاص کو جب کہ

رطوبت کڑوی خارج ہوتی ہو۔ جلن دار کاٹتی ہوئی اور چھن کی درویں آنکھوں میں ہوں۔

روشنی سے تکلیف ہوتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : یہ دوائی مزمن اور صدمی کیوں میں جب کہ اور ادویات ناکام

ثابت ہوئی ہوں کام آتی ہے۔ روشنی اور گرمی ناقابل برداشت ہوں اور آنکھوں میں

خارش ہوتی ہو۔ یکایک آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہو۔ سیاہ دھبے اُڑتے ہوئے معلوم ہوتے ہوں اور لیس وار چمپر نکلتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نائیٹرک ایسڈ : پیپ دار آشوب چشم ہو۔ پوٹے سُرخ اور متورم ہوں۔ لیسلر پیپ یا چمپر خارج ہوتی ہو۔ آنکھوں میں جلن ہو، روشنی سے ڈر لگتا ہو رات کو آنکھیں چپک جاتی ہوں۔ آنکھوں کے پاس کے حصص اور استخوان میں دردیں ہوتی ہوں۔ جب زہر آشوب کے باعث مرکبات پارہ کے استعمال سے آشوب پیدا ہوتی ہو تو یہ دوا بہت کار آمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ہیمیرسلف : مذکورہ بالا علامات میں جیسا کہ نائیٹرک ایسڈ میں مذکور ہوئی ہیں یہ دوائی بھی کام آتی ہے اور نائیٹرک ایسڈ کے بعد دینے سے فائدہ کرتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرنیکا : جب چوٹ آنے کے باعث آنکھوں میں دم ہو گیا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ خارجی طور پر آرنیکا مدر ٹنگر کے پانچ قطرے آدھی چٹانک پانی میں ڈال کر اس سے آنکھ کو دھونا اور بعد اس روشن میں کپڑے کا ایک ٹکڑا بھگو کر آنکھ کے اوپر رکھنا چاہیے اور پٹی باندھ دینی چاہیے۔

## ضروری ہدایات

آشوب چشم میں مرض کے سبب کو جان کر اس کو دفع کرنا چاہیے جو مریض زبلہ گنجان اور گندی جگہ میں اور شہروں میں رہتے ہیں ان کو باہر گاؤں میں کچھ عرصہ کے لیے چلا جانا چاہیے جہاں ان کو تازہ اور صحت بخش ہوا مل سکے۔ آنکھوں کو بار بار شیر گرم پانی سے دھونا چاہیے۔ اور مریض کو ایک کھلے ہوا دار کمرے میں رکھنا چاہیے۔ فلا سادہ اور مقوی دینی چاہیے۔

# قریب نظری

(MYOPIA)

اس مرض میں مریض کو دُور سے بخوبی دکھائی نہیں دیتا لیکن نزدیک سے بخوبی دکھائی دیتا ہے۔

اسباب مرض: یہ مرض ناقص روشنی میں باریک بینی کا کام کرنے سے یا گائے عصبی کمزوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور کبھی یہ مرض پیدائشی ہوتا ہے اور کبھی نووٹی۔

## علاج

بہت سے کیسوں میں مناسب عینک ہی اس کا علاج ہے۔ آنکھوں کا امتحان کسی تجربہ کار ڈاکٹر سے کرنا اس کی ہدایت کے بموجب عینک خرید کرنی چاہیے اور نا کافی روشنی میں یا رات کے وقت کسی قسم کا باریک کام نہیں کرنا چاہیے۔ ادویات جو اس مرض میں زیادہ کام آتی ہیں وہ یہ ہیں:-

اگاری کس - بیلا ڈونا - یوفریزیا - جلسی میم - فائی سو شگما - فاسفورس پلوکالس

## موتیا بند - نزول الماء

(CATARACT)

اس مرض میں لینز یعنی آنکھ کا موتی یا اس کا غلاف یا دونوں ہی مکرر یعنی دھندلے ہو جاتے ہیں۔

علامات مرض: آنکھ کو بغور دیکھنے سے پتلی کے پیچھے خاکستری مائل یا نیلگوں سفیدی مائل یا مہرین رنگ کی شے دکھائی دیتی ہے۔ آنکھ میں اٹروپین ڈالنے سے پتلی پھیل جاتی ہے۔ اُس وقت یہ شے بخوبی نظر آتی ہے۔ یہ شے کیا ہے؟



یہ درحقیقت آنکھ کا موتی ہے جو کہ دھندلایا ہوا ہے۔ مریض کی بینائی رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ ہر ایک چیز قد میں ڈبل دکھائی دیتی ہے۔ آنکھوں کے آگے جالا سا معلوم ہوتا ہے اور نئے چاند کو دیکھنے سے بجائے ایک کے زیادہ چاند دکھائی دیتے ہیں اور چراغ کی شعاع کے گرد حلقہ پڑا ہوا نظر آتا ہے۔

**اسباب مرض:** ذیابیطس، امراض گردہ، بڑھاپا، آتشک، مرگی، تشنج آنکھ پر چوٹ لگنا نیز بجلی کے صدمہ سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ بعض حالتوں میں یہ مرض موروثی بھی ہوتا ہے۔

## علاج

بہت سے کیس ہو پوچھتیک ادویات اندر کھلانے سے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ ابتداء میں کلیریا فلوریکا ۱۲x دن میں دو مرتبہ پندرہ دن تک استعمال کرائیں اگر اس سے بہتری ہوتی نظر نہ آئے تو اس کو چھوڑ کر کینالیں انڈیکا ۳x استعمال کرائیں۔ فلورک ایسڈ ۶x بھی مفید ہوتا ہے اور اس طرح سے کاسٹی کم۔ کونیم۔ کاپچی کم۔ فاسفورس۔ سیکیل اور سلیشیا بھی مفید ادویات ہیں۔

سیلنی ریویریا میری ٹیما ۱۰ دو قطرے آنکھ میں تین مرتبہ روزانہ ڈالا کریں۔ چند دنوں میں ہی فائدہ نظر آ جاتا ہے اور تین ماہ تک استعمال کرنے سے مکمل صحت ہو جاتی ہے یہ نہایت مجرب دوائی ہے۔

اگر موتیابند کا کیس اتنا ترقی یافتہ ہو چکا ہے کہ مذکورہ بالا ادویات اس کے دور کرنے میں ناکام ثابت ہوتی ہوں تو پھر آپریشن کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

## سبز موتیابند

(GLAUCOMA)

اس مرض میں آنکھ کا ڈھیلا بوجہ اجتماعِ رطوبت یا اجتماعِ خون تن کو سخت ہو

جاتا ہے اور رفتہ رفتہ نظر ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں موتیا بند کی رنگت سبز ہوتی ہے۔

علامات مرض: چراغ کے گرد حلقہ نظر آتا ہے۔ اور کبھی کبھی آنکھ کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے اور بیٹائی روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔

شدید گلاکوما میں شدت کا درد ہوتا ہے۔ آنکھ میں سُرخی ہوتی ہے اور بعض کیسوں میں کن جنکٹو اتورم ہو جاتا ہے اور قرنیہ کے گرد سُرخ حلقہ دکھائی دیتا ہے اور قیئیں آتی ہیں، مزمن گلاکوما میں درد کی شکایت خفیف ہوتی ہے یا کبھی درد ہوتا ہی نہیں۔

اسباب مرض: جب آنکھ کے ڈھیلا میں بعض وجوہات سے رطوبت کی پیدائش اور جذب میں طبعی مناسبت نہیں رہتی اور نقص واقع ہو جاتا ہے تب یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ناسور وغیرہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔

## علاج

بلا ڈونا: روشنی ناقابل برداشت ہو۔ آنکھیں اور چہرہ سُرخ ہوں۔ جب گلاکوما یعنی سبز موتیا بند کے پیدا ہو جانے کا ڈر ہو۔ سر درد ہو۔ آنکھوں کے سامنے چمکیلی چنگاریاں اڑتی دکھائی دیتی ہوں اور وزن اور دباؤ محسوس ہو۔ یہ دوائی مضبوط دُموی مزاج کے مریضوں کے لیے خصوصاً مفید ہوتی ہے۔

خوداک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
چائنا: بینائی دُھندلی، بینائی یکایک کم ہو جائے۔ کمزوری عامہ بہت ہو جب اخراجِ خون یا پیپ کا دیر تک مریض شکار رہ چکا ہو یا مریضہ دیر تک بچہ کو دودھ پلاتی رہی ہو۔ چائنا اور بلا ڈونا باری باری سے دی جاسکتی ہیں۔

خوداک: ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : جب پتلیوں اور آنکھوں کی رنگت قدرتی ہو اور دُور کی اشیاء دُھندلی دکھائی دیتی ہوں۔ آنکھوں کے سامنے سیاہ دھبے دکھائی پڑتے ہوں اور بینائی کم ہو۔ یہ دوائی بوڑھے اور کمزور اشخاص کی کمزوری نظر میں نافع ہوتی ہے۔ جب غلط کاریوں کے باعث یہ عارضہ وقوع پذیر ہوا ہو تو فاسفورس دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۲x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
فاسفورک ایسڈ : یہ دوائی بھی انہی حالتوں میں کام آتی ہے جو کہ فاسفورس کے بیان میں مذکور ہیں۔

خوراک : ۱x یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
نکس و امیکا : بینائی میں وقفہ کے بعد نقص واقع ہوتا ہو۔ سر درد ہو۔ جب مکان کے اندر بیٹھا رہنے، دماغی محنت زیادہ کرنے، بد ہضمی یا نشوں کے استعمال کا مریض عادی رہا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
مرکیورس کار : پتلی سکرنگٹی ہو۔ بینائی دُھندلی ہو، روشنی سے ڈر لگتا ہو اور آگ کی چمک آنکھوں کو نہ بھاتی ہو۔ یہ دوائی اور بھی مظہر ہوتی ہے۔ جب کہ مریض میں سلی یا آتشکی مادہ موجود ہو۔

خوراک : ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
جلسی میم : روشنی بہت بھاتی ہو، بیلا ڈونا کے برعکس، ایک ایک کے دو دو نظر آتے ہوں۔ بصارت صاف نہ ہو اور خانہ چشم میں درد ہوتا ہو جب کثرت محنت یا بکثرت کوہن نوشی کے باعث بینائی میں نقص واقع ہوا ہو تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
یوفرینیا : آنکھوں سے پانی بکثرت خارج ہوتا ہو۔ نیز جب کہ گلاکوما کا

عارضہ نزلہ کے باعث شروع ہوا ہو۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرٹیکا : آنکھ کے ڈھیلے پڑتے وقت دیکھتے ہوں۔ کمزوری نظر بوجہ بیرونی  
صدمہ کے ہو یا بوجہ نقص ہائیمہ ہوا اور آنکھ کی پتلی سکڑی ہوئی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

## دھند-غبار (AMBLYOPIA)

اس مرض میں نظر روز بروز کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اگر یہ مرض ترقی کرتا جائے  
تو آخر میں نظر جاتی رہتی ہے۔

علاماتِ مرض : نظر روزانہ کم ہونے لگتی ہے اور رفتہ رفتہ اتنی گھٹ جاتی  
ہے کہ مریض اپنے روزمرہ کے کام کرنے سے بھی رہ جاتا ہے۔ سرخ اور مہر رنگ میں  
پہچان نہیں کر سکتا اور اسی طرح سے زرد اور نیلے رنگ کی شناخت بھی جاتی رہتی  
ہے۔ روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے۔ نیند کم آتی ہے اور سر میں قدرے درد  
رہتا ہے۔

اسبابِ مرض : کثرتِ شراب نوری کثرتِ چائے نوشی کثرتِ جماعت  
تباکو یا سیگار و سگریٹ زیادہ پینا۔ سر پر چوٹ لگنا۔ خون کا اخراج۔ جسم سے زیادہ  
ہو کہ کمزوری کا باعث ہونا۔ مرض ہسٹریا وغیرہ اور گلہ سے کونین کا زیادہ استعمال کرنے  
سے یہ عارضہ ہو جاتا ہے اور کبھی یہ مرض پیدائشی بھی ہوتا ہے۔

## علاج

اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو دور کریں۔ نشیات اور تباکو و سگریٹ

وغیرہ سے قطعی پرہیز کریں۔

چائنا : جب مرض بوجہ اخراج خون یا بوجہ اخراج رطوبات زندگی مثلاً منی وغیرہ پیدا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد :

ایسڈ فاس : کثرتِ مجامعت کے باعث جب یہ عارضہ ہو جائے۔

خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا اور فاسفورس : جب شراب نوشی یا تنباکو نوشی کے باعث

یہ عارضہ پیدا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

روٹا : جب آنکھوں سے زیادہ کام لینے کے باعث یہ عارضہ ہوا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سینٹو نائیم : جب باریک بینی کا کام کیا گیا ہو اور آنکھوں کے آگے رنگ دکھائی دیتے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

## اندھاپن، نظر کا یکایک جاتے رہنا

(AMAUROSES)

اس مرض میں بینائی آہستہ آہستہ یا دفعۃً زائل ہو جاتی ہے۔

علامات مرض : جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے۔ کبھی بینائی دفعۃً زائل ہو جاتی

ہے اور کبھی رفتہ رفتہ کمزور ہو کر جاتی رہتی ہے۔ کبھی نظر دھندلی ہو جاتی ہے

اور گاہے ایک چیز کی دو چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور کبھی مریض کھانسی کا نصف

حصہ دکھائی دیتا ہے۔ اندھیرے میں مریض کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس لیے وہ

اندھوں کی مانند چلتا ہے۔

اسباب مرض: سر پر چوٹ آنا، دماغ یا نخاع میں پھوٹا یا رسولی یا آتشکی زہر کا موجود ہونا خناق و بانی سوزش گودہ سرچسکو، سر میں درد، گرم امعاء عصابی کمزوری بکثرت شراب و تنباکو نوشی۔ بعض سمیات کے زہر کا جسم میں موجود ہونا۔ کبھی گرم و سرد ہو جانا۔ مستورات میں حبس حیض وغیرہ۔

## علاج

ایکونائٹ: موسم گرما میں سرد غسل کرنے سے یکایک اندھاپن ہو جانا۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم: یکایک نظر کا زائل ہو جانا۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا: چکیلی اشیاء کی چمک کے باعث نظر جاتے رہنا۔ اندھرتا

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا: بکثرت شراب یا تنباکو نوشی کے باعث نظر کا کم ہو جانا۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس: نکس و امیکا کے بعد فاسفورس کا استعمال مفید ہوا کرتا ہے

مریض کو مختلف رنگ دکھائی دیتے ہوں۔ پڑھتے وقت حرف سرخ نظر آتے ہوں۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف: موم بتی کی روشنی میں مریض اچھی طرح نہ دیکھ سکے۔ پڑھتے وقت

نظر دھندلی پڑ جائے۔ روشنی سے ڈر لگے۔

خوراک: ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

فیرم میتیلیکم اور پیم بلم ایسٹی کم وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علامات

کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

# رتوندا۔ اندھرتا۔ شبکوری

(HEMERALOPIA)

اس مرض میں مریض کو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ مرض بھی موروثی ہوتا ہے۔ کبھی کمزوری یا تیز دھوپ کی شعاع یا تکان دغیرہ کے سبب سے ہو جایا کرتا ہے۔

## علاج

مریض کو تیز دھوپ میں نہیں جانا چاہیے اور غذا مقوی کھانی چاہیے۔  
کونیم اور نکس و امیکا، ادویات کا استعمال اس میں مفید ہوا کرتا ہے۔

## بھینگا پن

(STRABISMUS SQUINT)

اس مرض میں ایک آنکھ کی دھری دوسری آنکھ کی دھری کے متوازی نہیں ہوتی۔  
اسباب مرض: امراض معدہ و امعاء خصوصاً کرم امعاء و انت نکالنا خوف  
وغصہ۔ سر میں پانی جمع ہو جانا۔ بخار۔ گواہنجی۔ ضعف بصارت۔ کمزوری، بعض  
اوقات بھینگے پن کی نقل اتارنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## علاج

بیلادونا ۳x ہائیوسائنس ۳x، سائی کلیمین ۳x، ساٹنا ۳x، سپائی جیلیا ۳x،  
ایلیومن ۶x، ایلیومینا ۶x، جلیسی میم ۳x، سٹرا مونیم ۳x۔ یہ ادویات اس مرض میں  
کام آتی ہیں۔

# آنکھ کے ترمے

(MUSCEVOLITANTES OF THE EYE)

اس مرض میں سیاہ رنگ کے ذرات یا مکھٹی کے پر کی مانند ترمے آنکھوں کے آگے اڑتے دکھائی دیا کرتے ہیں۔

اسباب مرض : کثرت باریک بینی۔ قریب نظری۔ دُھندلی روشنی میں کام کرنا۔ خراب آب و ہوا میں رہنا۔ ناکافی نیند۔ حیاتِ مشاّت پر محرقہ یا ٹائیفیس، نقص ہاضمہ، وہم و سواس تفکرات خانگی اور رنج و غم وغیرہ۔

## علاج

مرض کے اصل سبب کو دور کریں اگر آنکھوں سے کام لیا گیا ہو تو اُن کو آرام دیں۔ روزمرہ کے کاروبار کو کم کر دیں۔ کھلی ہوا میں حسبِ دلخواہ ورزش کریں یا سمندری سیر کریں۔ غذا مقوی اور باقاعدہ کھایا کریں۔ ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو کئی مرتبہ دھویا کریں اور اگر ترمے بہت تنگ کرتے ہوں تو عینک پہن لیں۔ اس سے کسی قدر آرام ہے گا۔

ادویات : ہائیوسائٹس، بیلادونا، کائیوس، کونیم، مرکبوریس کارا اور زینک وغیرہ اس مرض میں کام آتی ہیں۔

## بامہنی۔ سلاق

(BLEPHARITIS INFLAMMATON OF THE EYE LIDS)

یہ مرض بچوں میں عام پایا جاتا ہے۔ اس میں پوٹوں کے کناروں میں درم ہو کر پلکوں کے بال اُڑ جاتے ہیں۔ صاف ستھرے بچوں کی نسبت گندے بچے اس مرض



میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

**علاماتِ مرض :** پوٹے دکھتے ہیں اور پوٹوں کے کنارے متورم ہو کر سُرخ ہوجاتے ہیں اور ان میں درد و جلن ہوتی ہے۔ نیز لیسدار رطوبت نکلتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی پھسلا پھسلا کی جڑ میں ہوجاتی ہیں اور پھر وہاں زخم بن کر کھرنڈ بندھ جاتے ہیں۔ پلکیں باہم چپک جاتی ہیں۔ خصوصاً صبح کو زیادہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔ پوٹوں کے کنارے سُرخ موٹے اور گول ہو کر پٹ جاتے ہیں اور آنکھوں سے پانی آتا رہتا ہے۔ جب یہ مرض پورا ہوجائے تو پھر شفا یابی مشکل ہوجاتی ہے۔

**اسبابِ مرض :** آنکھوں کا غلیظ رہنا پلکوں میں جھڑیں پڑ جانا۔ گند و غبار اور دھوئیں وغیرہ کی خراش۔ مختلف امراض مثلاً خسرہ اور سُرخ بخار وغیرہ اس مرض کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔

## علاج

ایکونائٹ : جب کہ یہ مرض سردی لگنے کے باعث پیدا ہوا ہو اور بخار بھی

ہو۔

خوداک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : پوٹوں کے کنارے جھکیلے سُرخ ہوں۔ روشنی سے خوف لگتا ہو۔

خوداک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایپیس : سوج بہت ہو اور اس میں ڈنک مارنے کی سی درویں ہوتی ہوں۔

خوداک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس : پوٹوں کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے دانے ہوں۔

خوداک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف : جب دانوں میں پیپ پیدا ہوجائے۔

خوداک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

یوفر نریا : پیپ آنکھوں سے بکثرت خارج ہوتی ہو۔ پوٹوں کے کنارے بہت متورم ہوں۔

خوراک : ۶۷ ہر دو گھنٹہ کے بعد

نوٹ : یوفر نریا درنگچر کے دس قطرے ایک اونس پانی میں ڈال کر لوشن بنالیں اور اُس سے ہر تین گھنٹہ کے بعد پوٹوں کو دھوئیں۔

ضروری ہدایات : پوٹوں کے کناروں پر سے تمام کھرنڈ با احتیاط اتار کر صاف کر لیں اور پھر ان پر مرہم کیسلنڈولا یا مرہم بورک ایٹھ یا مرہم میو اکسائیڈ آف مرکری لگائیں۔

## انجمن ہاری گھیری۔ گوبا نجنی

(HORDIOLUM STYE ON THE EYE LID)

اس مرض میں پوٹے کے کنارے پر چھوٹی پھنسی نکل آتی ہے۔ جس میں درد ہوتا ہے۔ یہ پھنسیاں بار بار نکلا کرتی ہیں۔

علاماتِ مرض : پوٹوں کے کنارے پہلے متورم اور سخت موجدلتے ہیں اور ان پر ایک یا زیادہ پھنسیاں نکل آتی ہیں۔ پھنسی میں پیپ پڑ جاتی ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ پھنسیاں یکے بعد دیگرے نکلتی رہتی ہیں۔

اسبابِ مرض : خون کی خرابی، بد ہضمی، گندی آب و ہوا اور خراب غذا۔ یہ مرض خنذیری مزاج کے اشخاص میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ کبھی آنکھوں سے زیادہ کام لینے سے بھی گوبا نجنی نکل آتی ہے۔

## علاج

پسٹلا اور سٹافی سیگریا : اس مرض میں یہ دونوں ادویات شہودِ عالم ہیں۔ اندر

بھی دی جاتی ہیں اور گوبانجی کے اوپر بھی لگائی جاتی ہیں۔ پشلا مستورات کو شانی سیکریا مردوں کے لیے موزوں ہوتی ہے لیکن زیادہ موزوں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دوا دیتے باری باری سے مریض کو دی جائیں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائیٹ : جب ورم اور درد کے ساتھ بے چینی بھی موجود ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ : ابتداء میں ایکونائیٹ اور پشلا باری باری سے دینے سے گوبانجی بڑھ نہیں سکتی بلکہ غائب ہو جاتی ہے۔

ہیمیرسلف : مزمن مرض میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : جب مرض کا حملہ بار بار ہوتا ہو۔ یعنی گوبانجیاں بار بار نکلتی ہوں تو سلفر کی ایک خوراک صبح اور ایک رات کو چند دنوں تک استعمال کرنے سے گوبانجیوں کا نکلنا بند ہو جاتا ہے۔

خوراک : ۳x صبح اور شام

کلکیریا اور سلفر : یہ دونوں ادویات پھنسیوں کے بار بار نکلنے کی حالت میں بہت مفید ہوتی ہیں اور خاص کر کمزور مریضوں میں ان کے استعمال کرنے کا طریقہ حسب ذیل ہے۔

کلکیریا ۳x صبح اور شام سات دن استعمال کریں۔ اس کے بعد دو تین روز کوئی دوائی استعمال نہ کریں بعدہ سلفر کی ایک خوراک صبح اور ایک شام کو سات دن تک استعمال کریں اور علیٰ ہذا القیاس۔

۱۰ کلکیریا کا رب کے بعد سلفر استعمال کرنا مناسب نہیں۔ البتہ سلفر کے بعد کلکیریا کا رب استعمال ہو سکتا ہے۔

ضروری ہدایات : بورک ایڈ یا کینڈولا لوشن کو گرم کر کے اس کی ٹکور کریں۔ اگر پھنسی پک گئی ہو تو کسی صاف سوئی کی نوک سے سوراخ کر کے پیپ نکال دیں اور پھر بورک لوشن سے خوب دھو ڈالیں۔

## لکڑے، روہے

(GRANULAR LIDS)

اس مرض میں پوٹے کے اندر چھوٹے چھوٹے سُرخ دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شدید یعنی ماد، دوسرا مزمن یعنی پُرانا۔ علامات مرض : بالائی پوٹے اور کبھی دونوں پوٹوں کی اندرونی سطح پر چھوٹے چھوٹے سُرخ رنگ کے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آنکھ میں خارش ہوتی ہے اور اس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا ہے۔ ماؤف پوٹا بھاری ہو جاتا ہے اور روشنی مریض کو بُری لگتی ہے۔ صبح اُٹھتے وقت پلکیں رطوبت سے چپکی ہوئی ہوتی ہیں۔

اسباب مرض : کثیف آب و ہوا، خراب غذا، دھواں، گرد و غبار، خراشندہ ادویات کا استعمال آنکھوں میں ریت وغیرہ پڑ جانا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔

## علاج خارجی

صبح و شام آنکھوں کو بورک لوشن سے دھونا چاہیے۔ بورک ایڈ دس گرین اور ٹیر گرم پانی ایک اونس، دھونے کے بعد پوٹوں کو اُلٹا کر ان پر سلورنائٹریٹ لوشن دپانچ کر دس گرین سلورنائٹریٹ اور ایک اونس آبِ مقطر، بذریعہ برش یا رُوئی کے پھوسے کے لگانا چاہیے اور پھر سالٹ لوشن (دس گرین نمک ایک اونس پانی) سے دھو ڈالیں اور اس طرح کرنے سے شدید رویوں کو آرام آ جاتا ہے۔ یوفرنیزیا

مدرٹشکچر پانچ قطرے اور آب مقطر ایک اونس بلا کر اس سے دو مرتبہ آنکھوں کو دھوئیں اور مندرجہ ذیل ادویات اندرونی طور پر استعمال کریں

## علاج اندرونی

ایکونائٹ ۳x آرسلنکم ۳x بیلادونا ۳x یوفرینہ یا ۵ مرکوریس آیوڈائیڈ ۶x  
فائی ٹورا کا ۳x سینگونیریا ۳x اور سلفر ۶x یہ ادویات اس مرض میں مفید ہوتی  
ہیں ۱

## ناخنہ

(PTERYGIUM)

اس مرض میں پردہ ملتحمہ یعنی آنکھ کی پھلی پر ایک سرخ پردہ پیدا ہو جاتا ہے اور  
کبھی یہ پردہ بڑھ کر تمام قرنیہ پر پھیل جاتا ہے جس سے بصارت میں فرق آ جاتا ہے  
اسباب مرض : آنکھ میں ریت، گرد و غبار پڑنے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔  
آشوب چشم یا زخم قرنیہ کے بعد بھی یہ مرض اکثر ہو جاتا ہے۔

علاج خارجی : سفیٹ آف کاپر (توتیا) ناخنہ پر لگائیں۔

علاج اندرونی : رٹینیا ۱۱x استعمال کرائیں ۱

۱۔ آر جینٹم نائٹریک ۱۰۰ کی ایک خوراک بھی بہت مفید ثابت ہوئی ہے۔

۲۔ اس کے علاوہ کینا بس سٹیوا۔ سلفر۔ زنکم اور ٹیلیوریم بھی مفید ہیں۔

# حالا - پھلی

(OPACITY OF THE CORNEA)

قرنیہ میں زخم ہونے کے بعد آنکھ میں سفید نشان باقی رہ جاتا ہے جس کو پنجابی میں پھولا کہتے ہیں۔  
اسباب مرض: لکروں یا پڑبال سے قرنیہ پر دائمی خراش رہنا یا قرنیہ میں سوزش ہو کر زخم بن جانا۔

## علاج اندرونی

مندرجہ ذیل ادویات میں سے جو دوائی زیادہ موزوں ہو استعمال کرائیں۔

- ۱۔ یوفریریا:  $1 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد
- ۲۔ میگنیشیا کارب:  $20 \times$  ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد
- ۳۔ کلکیریا کارب:  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔
- ۴۔ کینا بلس سٹیوا:  $1 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔
- ۵۔ سلیشیا:  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

## علاج خارجی

یوفریریا یا مدینسکچر کے ۵ قطرے ایک انس پانی میں ڈال کر لوشن بنالیں اور اس کو دن میں دو یا تین مرتبہ آنکھ میں ڈالیں یا یلو آئنٹمنٹ یعنی زرد مرہم (دو سے چار گریں فی انس والی) دن میں دو تین مرتبہ آنکھ میں لگائیں۔

# آنکھ میں خونی نقطہ

(ECCHYMOSIS)

آنکھ پر چوٹ لگنے، کھانسنے یا چلانے یا زور سے قے کرنے سے پردہ کے نیچے کوئی رگ پھٹ کر ذرا سا خون بہ جاتا ہے۔ جو سیاہی مائل رنگ کا ایک سُرُخ نقطہ یا دھبہ معلوم ہوتا ہے۔

## علاج

اول تو یہ نقطہ خود بخود جذب ہو جاتا ہے۔ دگر نہ مندرجہ ذیل ادویات اندرونی اور خارجی طور پر استعمال کرائیں۔

آرنیکا ۳x، ہامیلس ۵، ایڈمیور ۳۰، رشاکس ۳x اور روٹا ۳x

## خارجی استعمال

مذکورہ بالا ادویات کی مدرٹشکم کے پانچ قطرے لے کر ایک اونس پانی میں ملا لیں اور اس میں روئی یا کپڑے کا ٹکڑا تھک کر کے آنکھ پر رکھیں۔

## باب نہم

# کان کی بیماریاں

(AFFECTIONS OF THE EARS)

## کان میں کچھ پڑ جانا

(FOREIGN BODY IN THE EAR)

بعض اوقات کان میں کوڑی، کنسکر، پنس کا ٹکڑا یا کوئی کیرا وغیرہ پڑ جاتا ہے۔

بعض اشخاص کو یہ عادت بد ہوتی ہے کہ ماچس کی تیلی یا کسی تنکے کے ساتھ کان کو کویدتے رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کو بغور ملاحظہ کریں اگر کوئی شے نزدیک ہی دکھائی دیتی ہو تو چھوٹے موچنے یا باریک سلائی سے اس کو باہر نکال لیں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو بذریعہ پچکاری کان کو اچھی طرح سے دھو ڈالیں۔ ایسا کرنے سے پچکاری کے پانی کے ساتھ ہی وہ غیر جنس چیز بھی خارج ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی نہ نپٹے تو گلیسرین کے چند قطرے کان میں ڈال دیں۔ دو ایک روز کے بعد وہ چیز خود بخود خارج ہو جائے گی۔

جب کان میں پانی پڑ جائے تو بلا ٹنگ پیپر کی تہی بنا کر کان میں پھرائیں یا خالی پچکاری سے کھینچ کر نکال لیں۔ یا کاغذ کی تہی وغیرہ سے ناک کو کھجائیں یا نسوار لیں۔ اکثر ایسا کرنے سے غیر شے کان سے نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی کیرا کان میں پڑ گیا ہو تو ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کان میں ڈال دیں۔ کیرا فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد گرم پانی کی پچکاری کریں۔ وہ نکل جائے گا۔ ایسی صورت میں میٹھا تیل ڈالنا بھی کان میں مفید ہوتا ہے۔

# کان درد

(EAR ACHE-OTALGIA)

اکثر یہ درد عصبی ہوا کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی سوزش یا ورم بھی پایا جاتا ہے۔  
درد کی ٹیمیں چہرے اور پیشانی تک جاتی ہیں اور مریض سخت بے چینی کی حالت میں  
ہوا کرتا ہے۔

اسباب مرض : کسی دانت کا بوسیدہ ہو جانا ۔ سر دی لگنا ۔ مرض وجع اللغافل وغیرہ ۔

**نوٹ :** جب یہ درد عصبی ہوتا ہے تو اس میں درم یا بخار کی شکایت نہیں ہوتی،



## علاج خارجی

۱۔ اوپیم مدرٹنکچر اور گلیسرین: ہوزن ملا کر چند قطرے کان میں ڈالیں۔ درد کا آرام ہو جائے گا۔

۲۔ پلانٹیکو: مدرٹنکچر کے چند قطرے گرم پانی میں ملا کر کان میں ڈالیں اور اسی طرح سے آدھا آدھ گھنٹہ کے وقفہ پر ڈالتے جائیں۔ حتیٰ کہ درد بند ہو جائے۔

۳۔ مولین آئیل: کے تین یا چار قطرے کان میں ڈالیں اور اسی طرح سے ہر ایک گھنٹہ کے بعد ڈالتے جائیں۔ حتیٰ کہ درد بند ہو جائے۔

۴۔ اگر کان میں درد بوجہ سردی لگنے کے ہو تو ایکونائٹ x کے تین چار قطرے ہر پندرہ منٹ کے بعد ڈالتے جائیں۔ جلدی آرام آجائے گا۔

۵۔ اگر کان میں ورم ہو۔ سرخ اور گرم ہو تو بیلا ڈونا مدرٹنکچر کے چند قطرے گلیسرین میں ملا کر کان میں ڈالیں اور اسی طرح سے ہر نصف گھنٹہ کے بعد ڈالتے جائیں جلدی درد کا آرام آجائے گا۔

۶۔ پستلا x ۲ کے چار یا پانچ قطرے کان میں ڈالیں۔ کان درد کی یہ بھی بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔

ضروری ہدایات: دانت کا بغور ملاحظہ کریں۔ اگر کوئی دانت خراب ہو تو اس کو نکال دیں۔



۷۔ اندرونی طور پر کھانے کے لیے یہ ادویات حسب علامات دی جاسکتی ہیں۔ ایکونائٹ بیلا ڈونا۔ کیپسکیم۔ کیمو میلہ۔ فیرم فاس۔ ہیرپسلفر۔ مرکبیرس۔ پلانٹیکو۔ سلفر۔ پستلا اور وریکیم۔

# کان بہنا

(OTORRHOEA)

جب کان کی بیرونی نالی کی بھلی میں ورم ہو جاتا ہے۔ تو کان سے پیپ بہنے لگتی ہے۔

علامات مرض: ابتدا میں کان کی نالی متوہم ہو کر سرخ ہو جاتی ہے۔ کان میں درد ہوتا ہے اور گاہے خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ وجہ تکلیف کے مین نہیں آتی اور تین روز کے بعد گاڑھی رطوبت بزرگ زرد خارج ہونے لگتی ہے جو آخر کار پیپ میں بدل جاتی ہے۔

اسباب مرض: بچوں میں دانت نکلنا۔ مرض خنازیر۔ غیر جنس چیز کا کان میں پڑ جانا۔ سردی، بد ہضمی اور بعض جلدی امراض کے باعث یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## علاج خارجی

۱۔ ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے چند قطرے ماؤف کان میں ڈال دیں۔ ابل کر پیپ باہر آجائے گی۔ پھر کان کو اچھی طرح سے صاف کر لیں اور اس میں مولین آئل دن میں چار پانچ مرتبہ ڈالیں۔ اسی طرح سے روزانہ کیا کریں۔ کچھ عرصہ کے بعد کان بہنا بند ہو جائے گا۔

۲۔ ہائیڈروجن پراکسائیڈ: ماؤف کان میں ڈال کر صاف کر لیں اور ایک انس رکٹی فائیڈ سپرٹ میں پانچ گرین یعنی اڑھائی رتی بورک ایسڈ ڈال کر دوائی تیار کر لیں اور یہ دوائی صاف کردہ کان میں دو مرتبہ روزانہ ڈالیں۔

۳۔ اگر کان سے بہت بدبودار پیپ بہتی ہو۔ تو پہلے اس کو ہائیڈروجن پراکسائیڈ ڈال کر صاف کر لیں اور پھر اس میں ایک نیشیا ۵ مدرٹیکمرد حصہ اور تھو جادرٹیکم ۵ ایک حصہ ملا کر چار پانچ قطرے ڈالیں۔ دن میں دو تین مرتبہ۔

## علاج اندرونی

پلسٹلا اور سلفر دو مشہور ادویات ہیں، ڈاکٹر جو سٹھ صاحب ایم ڈی مندرجہ ذیل طریق پر ان کو استعمال کیا کرتے تھے۔

اول پلسٹلا  $3 \times$  روزانہ دو بار چھ دن تک، پھر چار روزانہ، بعدہ سلفر  $3 \times$  کی دو خوراکیں روزانہ چھ روز تک پھر آٹھ روزانہ۔ اسی طرح سے پلسٹلا اور سلفر استعمال کرایا کرتے تھے اور اس طرح استعمال کرنے کے بعد اگر کامیابی نہ ہوتی تھی تو پھر سلیشیا  $4 \times$  اور  $30$  کا استعمال کرایا کرتے تھے۔

نوٹ: مرض خمرہ کے بعد جب کان بہنا شروع ہو جائے تو پلسٹلا  $3 \times$  سے بڑھ کر اور کوئی دوائی نہیں ہے۔

کیپ سی کم: جب کان سے خون اور پیپ ملی ہوئی بہتی ہو۔

خوراک:  $4 \times$  دن میں تین مرتبہ۔

مرکیورس سال: جب گاڑھا خون آلودہ اور بدبودار مواد خارج ہو اور کان کے آس پاس کے غدود سوجے ہوئے اور دکھتے ہوں اور اس جانب کے سر اور چہرہ میں پھاڑنے والی دروپیں ہوتی ہوں، نیز جب مرض چیچک کے بعد کان کے بہنے کا عارضہ ہو جائے تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک:  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ہیمر سلف: پیپ اور خون کان سے بہتا ہو۔ جب کہ مریض نے پارہ بہت کھایا ہے۔

خوراک:  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ایسڈ میو: جب سرخ بخار کے بعد کان بہنے کا عارضہ ہو، تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک:  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

آر سیلنیکم الیم: نجیف مریضوں کے لیے جبکہ جلانے والی رطوبت خارج ہوتی ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ  
کاسٹینیکم: کان بہتا ہو اور اس کے پیچھے پھنسیاں ہوں  
خوراک: ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

دیگر ادویات کلیریا۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایوڈیم۔ آرم مینیکیم۔ مرکوریس ایوڈائیڈ  
کالی ہائیڈرائڈیم بھی کام آتی ہیں۔

## کان کا درم

(OTITIS MEDIA)

اس مرض میں کان کا پردہ وغیرہ متورم ہو جایا کرتا ہے۔

علامات مرض: کان میں درد، بہاؤ اور کسی قدر بخار ہوتا ہے، کان کی اندرونی نالی اور پردہ سرخ اور متورم ہو جاتے ہیں۔ پچکاری کرنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر مرض بڑھ جاوے تو درد نہایت ہی شدید ہوتا ہے اور کبھی یہ درم دماغ کی جانب بڑھ کر مریض کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

اسباب مرض: سردی لگنا۔ کان میں زور سے پچکاری کرنا۔ عصبی خراش نزلہ و جمع المفاصل، نقرس، خنازیر اور سرخ بخار وغیرہ بھی اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

ابتدا میں ایکونائٹ ۳ اور بیلاڈونا ۳ نہایت مفید ادویات ہیں۔ باری باری سے پندرہ منٹ کے وقفہ پر دیتے جانا چاہیے۔

پسٹلا: مرض خسرہ کے بعد درم کا عارضہ ہو گیا ہو۔ کان میں تہ مارنے کی

سی اور پھاڑنے کی سی دردی ہوتی ہوں  
 خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 مرکبورس سال : دردی دانتوں تک پھیلتی ہوں اور گرم کمرہ میں زیادہ ہوتی  
 ہوں یا جب کہ مرض سچپک کے بعد ورم کان کا عارضہ ہو گیا۔  
 خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

## علاج خارجی

- ۱۔ پلانٹیکو : مدرٹنکچرہ اور گرم پانی مساوی وزن ملا کر ہر دس منٹ کے بعد کان میں ڈالتے جائیں اس سے ورم بھی کم ہوگا اور درد کو بھی آرام ہوگا۔
- ۲۔ پانچ گرین (۲ ۱/۲ تلی) کوہین اور پانچ گرین کاربالک ایڈ، ایک ڈرام گلیسرین میں ڈال کر دوائی تیار کر لیں اور اس کو کان میں بار بار ڈالیں۔ درد کو آرام ہو جائے گا۔

## کان کا میل (WAX IN THE EAR)

علامات مرض : مریض کو ادبچا سنائی دینے لگتا ہے اور مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کان کو بخوبی دیکھنے سے اس میں میل بخوبی دکھائی دیتی ہے۔

## علاج

کان میں پچکاری شیر گرم پانی کی کرائیں ساگر پچکاری سے درد شروع ہو جائے تو پھر پچکاری بند کر دیں، بادام روغن یا گلیسرین کے چند قطرے گرم گرم کان میں ڈالیں یا دس گرین سوڈا بائی کارب ایک ونس پانی یا گلیسرین میں ملا کر اور گرم کر کے کان میں

بوقتِ شام ڈالیں۔ اس سے میل نرم ہو جائے گی اور باسانی نکلا جائے گی۔

## کان کی جلندار پھنسیاں

(ECZEMA OF THE EARS)

اس مرض میں کان کے اندر اور باہر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جلن، درد اور غارش کی شکایت ہوتی ہے۔

### علاج اندرونی

بیلادونا - پوسٹلا : جب کہ مرض بہت شدید نہ ہو۔  
 زسٹاکس اور ورائٹرم ورائیڈ : آبلہ دار پھنسیوں کے لیے۔  
 گریفائیٹس : کان کے پیچھے پھنسیوں کے لیے۔  
 آرسینکیم یا سلفر : مزمن مرض میں کام آتی ہیں۔

### علاج خارجی

با احتیاط کان کو پچکاری سے دھو کر صاف کر لیں اور پھر خشک کر لیں۔ پھنسیوں پر باریک میدہ چھڑک دیں۔ تاکہ خراش نہ ہو اور نمی بھی چوس لے۔

## کان بجنا

(TINNITUS)

بعض امراض مثلاً بد ہضمی، قلت خون، کمزوری، رنج و غم اور کونین وغیرہ کے کثرتِ استعمال سے کان میں کئی قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو برقوبِ سماعت

میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔

## علاج

مرض کے اصل سبب کو دور کریں۔ اگر خشکی کی وجہ سے کان بجتے ہوں تو بادام روغن یا روغن کدو یا روغن گل یا عورت کا دودھ کان میں ڈالیں اور سر پر بھی ان روغنوں کی مالش کریں اور مندرجہ ذیل ادویات میں سے حسب حال استعمال کریں۔

چائنا۔ فاسفورس۔ سلفر۔ اکیونائیٹ۔ مرکیورس۔ ٹکس و امیکا۔ فاسفورک ایسڈ۔ فرم فاس۔ سلیشیا اور بیلادونا۔

## بہرا پن

(DEAFNESS)

کان میں میل بھر جانے۔ سخت سردی لگنے۔ ضعف دماغ، نقرس، وجع المفاصل آتشک، چیچک، سرخ بخار وغیرہ امراض کے باعث یا توپ وغیرہ کی آواز یا بجلی کی کڑک سے یا دیگر کسی بلند آواز سے کان پر صدمہ پہنچ کر قوت سماعت ناقص اور کبھی بالکل زائل ہو جاتی ہے اور کبھی کانوں میں مختلف اقسام کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

## علاج

اگر بہرا پن کان میں میل بھر جانے کی وجہ سے ہو تو میل خارج کریں اور گلیسرین کے چند قطرے ماؤف کان میں ڈالتے رہے اور پھر شیر گرم پانی سے پچکاری کریں۔ میل باہر نکل جائے گی اور بہرا پن کا آرام آجائے گا۔

۱۔ اگر کان اور حلق کی درمیانی نالی جس کو انگریزی میں یوٹے کین ٹیوب کہتے

ہیں۔ میں نقص واقع ہونے کی وجہ سے بہراپن کا عارضہ ہو، تو سی پانہایت ہی اعلیٰ دوائی ہے اور اس کے استعمال سے اکثر شفا ہو جاتی ہے۔

نھوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ۔ نیز ایسی حالت میں آیوڈیم اور میپر سلف اور مرکبوس ادویات بھی کام آتی ہیں۔

۲۔ اگر بہراپن کا عارضہ کمزوری عامہ کی وجہ سے ہو تو ناسفورس۔ چینیم سلف آیوڈیم۔ ایڈفاس۔ کاکس۔ (جب دل کی دھڑکن بھی ساتھ ہو) پٹرولیم۔ سپنجیا اور آر سینکم ادویات کام آتی ہیں۔

۳۔ اگر بہراپن کا عارضہ ٹھنڈ کے لگنے کی وجہ سے ہو تو اکیونائیٹ۔ کالی میور۔ وسم۔ الیم۔ منگنم ایڈ۔ پٹسلا۔ مرکبوس۔ کالی ہائیڈراڈیکم، ڈسکامارا اور بلٹی ادویات کام آتی ہیں۔

۴۔ اگر بہراپن کا عارضہ طوبت کے اخراج کے رُک جٹ کے باعث یا جسم پر چھانٹ نمودار ہو کر کم ہو جانے کی وجہ سے ہو تو سلف۔ میپر سلف اور آرم ادویات کام آتی ہیں۔

۵۔ اگر بہراپن کا عارضہ غدودِ گلہ کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو، تو مرکبوس آیوڈائیڈ۔ کالی ہائیڈراڈیکم۔ مرکبوس کار اور آیوڈیم ادویات کام آتی ہیں۔

۶۔ اگر بہراپن کا عارضہ چوٹ کی وجہ سے ہو تو آرنیکا دوائی مفید ہوتی ہے۔

۷۔ اگر بہراپن کا عارضہ عصبی کمزوری کی وجہ سے ہو تو لاکس، ناجا۔ بیلا۔ ڈونا۔ امبرا گریسیا۔ اگنیشیا۔ گریفاسیٹس۔ لیڈم۔ میور الک ایڈ۔ چینیم سلف اور چائنا وغیرہ ادویات کام آتی ہیں۔

۸۔ اگر خنزیر کی وجہ سے ہو تو سلف اور ایتھیا پس مرکب کام آتی ہیں۔



## باب دس

## ناک کی بیماریاں

AFFECTIONS OF THE NOSE

## ناک میں کچھ پھنس جانا

(FOREIGN BODY IN THE NOSE)

بعض اوقات ناک میں مٹریا چنے کا دانہ یا بٹن وغیرہ پھنس جاتا ہے۔ یا کبھی کوئی جونک یا کیڑا وغیرہ ناک میں چلا جاتا ہے۔

## علاج

ناک کا ملاحظہ بغور کریں۔ اگر کوئی شے نظر آتی ہو تو با احتیاط تمام باریک مہچنے سے پکڑ کر نکال دیں یا گرم پانی میں تھوڑا نمک ملا کر مخالف جانب کے نتھنے میں پھکاری کریں لیکن مریض کو چاہیے کہ اپنے منہ کا بھی طرح سے بند کرے۔ یا مخالف نتھنے کو دبا کر زور سے ناک سنکے، دو تین بار ایسا کرنے سے اکثر غیر جنس یا شے باہر نکل جاتی ہے۔ اگر کوئی کیڑا یا جونک ناک میں چلی گئی ہو تو پہلے ذرا سا کلوروفارم سونگھا کر وہیں ہلاک کر دیں وہ یا تو خود بخود خارج ہو جائے گا یا مذکورہ بالا تدابیر سے اُس کو خارج کر دیں۔

# زکام اور نزلہ

CORYZA COLD IN THE HEAD (CATARRH  
RHINITIS)

اس مرض میں ناک کی اندرونی لعاب دار جھلی متورم ہو جاتی ہے اور ناک بہتی ہے۔ یہ چھوٹا دار متعدی امراض ہے۔

علامات مرض : ابتداء میں طبیعت سست رہتی ہے اور پیشانی پر جکڑن و بوجھ ہوتا ہے۔ سر میں کبھی تھوڑا درد ہوتا ہے۔ پھینکیں آتی ہیں اور ناک سے پتلا جلتا ہوا پانی بہنے لگتا ہے۔ پانی کی خراش سے ناک کے کنارے درو کرتے ہیں اور سرخ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ آنسوؤں کی نالی میں بھی سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے باعث آنکھوں میں کسی قدر سُرخی بھی ہو جاتی ہے۔ حلق میں کسی قدر درد ہوتا ہے۔ حلق اندر سے سُرخ اور متورم ہو جاتا ہے اور نکلنے وقت کسی قدر درد ہوتا ہے۔ جب مرض کا حملہ شدید ہو تو ہوا کی نالیوں میں خراش ہو کر کھانسی ہونے لگتی ہے اور خفیف سا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ نبض تیز چلتی ہے۔ زبان میلی ہوتی ہے۔ پیاس بہت لگتی ہے اور بھوک ماری جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے اور پیشاب قلیل مقدار میں بزدل ہو جاتا ہے۔ ایک یا دو دن کے بعد رطوبت ناک سے گاڑھی آنے لگتی ہے اور خارش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح چار پانچ روز تکلیف بنی رہتی ہے۔

اسباب مرض : یہ ایک متعدی مرض ہے۔ جس کا باعث ایک

خورد بینی کیڑا مانا گیا ہے جس کو زکام کا کیڑا کہتے ہیں، سرد ہوا میں چلنا پھرنا، نمدار زمین پر بیٹھنا۔ ٹھنڈ لگنا، پانی میں بھیگ جانا۔ رات کو دیر تک سردی میں رہنا۔ گرم سرد ہو جانا۔ گرم گرم کھانا کھا کر اوپر سے سرد پانی پینا یا کسی غیر جنس کا ناک میں خراش کرنا اس مرض کے اسباب مؤیدہ ہیں

نوٹ: جب مرض کا حملہ بار بار ہو تو مرض مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض خاندانوں میں زکام کا عارفہ موروثی چلا آتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ: جب ٹھنڈی ہوا کے باعث یکایک زکام ہو جائے اور نزلہ کے ساتھ بخار ہو جائے تو ایکونائٹ ایک مفید دوائی ہے۔ جب زکام کے ساتھ کھانسی بھی ہو تو یہ دوائی منظر ہوا کرتی ہے۔ بونہی کہ مریض کو زکام کاشک ہو جائے اسی وقت یہ دوائی فوراً استعمال کرنی چاہیے۔ ناک سے ابھی تک نزلہ تو گزرا شروع نہ ہوا ہو لیکن اجتماع خون کے باعث ناک سوج کر گرم خشک اور بند ہو گیا ہو۔ ناک میں کھجلا ہٹ اور جلن ہوتی ہو اور دھڑکن کا پیشانی میں سر درد ہوتا ہو۔ نیز چھینکیں بھی آتی ہوں۔ کھلی ہوا میں ان تمام علامات کو آرام معلوم ہوتا ہو۔

خوراک: ۳x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

فیرم فاس: ایکونائٹ کی مانند یہ دوائی بھی ابتداء میں کام آتی ہے۔ جب کہ آنا فانا علامات بہت شدید نہ ہو گئی ہوں نیز بے چینی اور تشویش بھی موجود نہ ہو۔

خوراک: ۳x یا ۶x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم: موسم سرما کے زکام میں یہ دوائی خصوصاً مفید ہوتی ہے۔ جب کہ پتلا پانی نلکھنوں سے گرتا ہو اور اوپر والے ہونٹ کو جلا دیتا ہو اور باوجود اس پانی کے گرنے کے بھی ناک بند محسوس ہوتی ہو پیشانی میں دھیمادھیمادھڑکن کا درد ہوتا ہو اور چھینکیں آتی ہوں۔ روشنی سے نفرت ہو اور کھلی ہوا میں جانے سے نہ چھینکوں کا آرام ہوتا ہو اور نہ خراش جلن کا۔

خوراک: ۳x یا ۳۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم آیوڈائیڈ: جب ناک اور حلق میں جلن بہت زیادہ ہو۔ تو بجائے آر سینکیم ایلم کے آر سینکیم آیوڈائیڈ مفید تر ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x یا ۱۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایلم سپیا: زکام کی بہترین ادویات میں سے یہ ایک ہے۔ علامات اس کی حسب ذیل ہیں:-

رطوبت بکثرت، پتلی اور تیز خراش دار نکلتی ہو اور ساتھ ہی ناک اور آنکھوں میں جلن سی ہوتی ہو۔ آنکھیں سُرخ ہوں اور روشنی برداشت نہ کر سکتی ہوں اور چھپڑوں کے کنارے جلتے ہوں۔ نٹھنوں سے پتلا پانی متواتر بہتا رہتا ہو۔ جو کہ اوپر کے ہونٹ کو جلا دیتا ہو اور ساتھ ہی لگاتار چھینکیں آتی رہتی ہوں۔ ایلم سپیا کی یہ خاص علامت ہے کہ جب مریض کھلی ہوا میں جاتا ہے۔ تو نزلہ بند ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ گرم کمرہ میں واپس آتا ہے۔ تو پھر نزلہ بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دوائی ابتدا میں دینی زیادہ مفید ہوتی ہے اور اگر نزلہ کے ساتھ گلا پھاڑ کھانسی بھی ہو تو یہ دوائی اور بھی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔

خوداک: ۲x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

یوفرزیا: جب ناک سے پانی بہتا ہو، چھینکیں آتی ہوں اور آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے کے ساتھ چلتا ہو۔ آنکھ سے بہنے والا پانی تیز اور خراش پیدا کرنے والا ہو۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آرم ٹرمی فایلم: نزلہ بہت تیز ہو جو کہ نٹھنوں اور ہونٹوں کو زخمی کر دیتا ہو۔ ناک اور آنکھوں سے زیادہ تیز رطوبت نکلتی ہو، پیاس تو لگتی ہو لیکن پیسے سے حلق میں درد ہوتا ہو نٹھنے زخمی ہو گئے ہوں اور مریض یہی چاہتا ہو کہ ناک کو انگلی سے کوڑتا رہے۔ غنودگی ہو اور چھینکیوں کی طرف رجحان ہو۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

جلسی میم: یہ بھی نزلہ کی ایک خاص دوائی ہے۔ جبکہ سر پھو ہو۔ جلد جسم گرم اور ساتھ ہی ٹھنڈ بھی لگتی ہو۔ مریض سست اور کمزور ہو۔ سردی کمر کے اوپر نیچے دوڑتی ہو اور ناک سے پتلا پانی نکلتا ہو اور چھینکیں بھی آتی ہوں۔ جلیسی میم کی یہ خاص علامت ہے کہ مریض آگ سینکنے کی بڑی زبردست خواہش کرتا ہے۔ موسم گرمی کے زکام میں یہ دوائی خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا: ناک بند اور ناک کی جڑ کے قریب بوجھ سا معلوم ہو۔ نزلہ یا تو بالکل نہ گرتا ہو۔ اگر گرتا بھی ہو تو بہت کم اور چھاتی بھی بہت گھٹی ہوئی ہو۔ گرم کمرے میں تکلیف اور کھلی ہوا میں آرام معلوم ہوتا ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس: چھینکیں متواتر آتی رہتی ہوں۔ ناک دھکتی ہو۔ ناک سے گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہو۔ گرمی اور جاڑا باری باری سے لگتے ہوں۔ پسینہ بہت آتا ہو لیکن تکلیف کو بڑھا دیتا ہو۔ رات کے وقت تمام علامات میں زیادتی ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا: سونگھنے کی طاقت زائل۔ ناک کا نزلہ گاڑھا اور بدبودار۔ سر بھاری شام کو یا گرم کمرے میں تکلیف زیادہ ہوتی ہو۔ جب نزلہ پک گیا ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ ابتدا میں یہ دوائی نہیں دی جاتی۔ پسٹلا کے مریض کو نہ تو چھینکیں آتی ہیں اور نہ ہی تیز رطوبت خارج ہوتی ہے۔ بلکہ موٹی گاڑھی زرد پیپ کے مانند رطوبت نکلتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کیمفر: جب زکام شروع ہونے سے پہلے جاڑہ لگ رہا ہو اور ناک بند اور خشک ہو۔ جب مریض سانس اندر کھینچے تو ہوا بہت ٹھنڈی محسوس ہو۔ اس دوائی کے تین چار قطرے مصری یا پتاشے پر تین چار مرتبہ دینے سے یا دوائی سونگھانے سے

بیماری ابتداء میں ہی رُک جاتی ہے۔

خوراک : مدرنکچر کے تین یا چار قطرے مصری یا پتاشہ پر ڈال کر ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد تین یا چار مرتبہ۔

کالی آئیوڈائیڈ : خنازیری مزاج والے یا جن مریضوں نے پارہ کا استعمال بہت زیادہ کیا ہو۔ اُن کو جب بکثرت پتلا پانی ناک سے گرتا ہوا آنکھیں جلتی ہوں اور ان سے پانی بہتا ہو تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نیٹرم میورائیکم : بارہ ٹینور میڈیزین میں سے نیٹرم میور نزلہ کی ایک خالص دوائی ہے۔

خوراک : ۳ یا ۶ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : رات کو سوتے وقت گرم پانی میں پاؤں ڈبو رکھو پھر اُن کو پونچھ کر خشک کر لو اور اوپر سے پیٹ دو اور گرم گھم چائے یا گرم پانی یا کوئی اور گرم چیز پی کر سو جاؤ۔ زکام رُک جائے گا۔ لیکن اگر زکام ابتداء میں نہ رُکے تو پھر مریض کے لیے ضروری ہے کہ مرض کے شدید ہونے کی صورت میں دو یا تین روز گھر سے باہر نہ نکلے، کیونکہ آب و ہوا کی یکایک تبدیلی مفید نہیں ہوتی۔ غذائیں نرم اور زود ہضم ہوتی چاہیے۔

## نکیر پھوٹنا

(EPISTAXIS)

اگرچہ یہ عام طور پر ایک معمولی بیماری سمجھی جاتی ہے لیکن جب یہ مرض ترقی پذیر ہو جائے تو پھر اس کے روکنے کی تدابیر کرنی پڑتی ہیں، البتہ جب تھوڑی سی نکیر بھونٹے تو بدول علاج کے ہی آرام آجایا کرتا ہے۔

علامات مرض: نکسیر آنے سے پہلے پیشانی میں بوجھ اور دباؤ ہوا کرتا ہے۔ عموماً ایک ہی نتھنے سے خون آیا کرتا ہے اور بعض اوقات دونوں نتھنوں سے قطرہ قطرہ یا دھار بندھ کر خون بہتا ہے۔ بعض اوقات خون ناک کے اندرونی راستہ سے حلق یا معدہ میں گر جاتا ہے اور پھر بذریعہ منہ خارج ہوتا ہے۔ بعض اشخاص غلطی سے اس خون کو پھیپھڑوں سے آنا منسوب کرتے ہیں۔ کمزور اشخاص کو اگر دیر تک خون بہتا رہے تو مریض کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہے۔

اسباب مرض: ناک یا سر پر چوٹ یا ضرب کا آنا۔ زیادہ مشقت اور کھانسنے وغیرہ سے سر میں اجتماع خون ہو کر بذریعہ نکسیر کے خارج ہو جانا۔ آتشکی۔ بے سکتہ اور بڑھاپا بھی اس کے اسباب ہیں۔ دموی مزاج کے اشخاص بوجہ کثرت خون اکثر اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں۔ نیز شدید انیمیا یعنی خرابی خون میں نکسیر پھوٹ آیا کرتی ہے جن مستورات کا حیض رک جاتا ہے یا تھوڑا بے قاعدہ آتا ہے۔ ان کو بھی نکسیر بہتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کو حیض کا بدل کہتے ہیں جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں اور وہ متواتر نوچتے رہتے ہیں۔ ان کو اکثر نکسیر آیا کرتی ہے۔

## علاج

علی قولیم: اس مرض کی ایک مشہور دوائی ہے۔

خوراک: مد نیکمرہ کے تین سے ۵ قطرے نصف اونس پانی میں ڈال کر ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

آرنیکا: جب ناک یا سر پر چوٹ یا صدمہ آنے کی وجہ سے نکسیر آئے۔

خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

بیلادونا: جب سر میں اجتماع خون ہو۔ سر درد تپکن کا ہو اور چہرہ سرخ ہو۔

خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

برائی اونیا: جب صبح اٹھنے پر چمکیلا سرخ خون آئے۔

خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد لیکن جب مرض کا آرام ہو تو وقفہ کے

دوران میں تین مرتبہ روزانہ یہ دوائی استعمال کرنی چاہیے۔  
 نکس و امیکا: جب بوقت صبح جما ہوا خون ناک سے خارج ہو۔  
 خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد وقفہ کے دوران میں دن میں تین مرتبہ  
 بطور حفظہ ماقدم۔

کروکس: جب سیاہ خون ڈورے دار خارج ہو۔  
 خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔  
 فاسفورس: جب خون بکثرت اور بمقدار کثیر خارج ہوتا رہتا ہو۔  
 خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 ہیما میلز: جب سیاہ رنگ کا خون بکثرت پانی کی طرح خارج ہوتا ہو۔  
 خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ یا آدھ گھنٹہ کے بعد۔  
 فیرم فاس: جب بوجہ انیمیا بار بار نکیر پھوٹ آتی ہو اور ظاہراً اس کا کوئی  
 سبب معلوم نہ ہوتا ہو۔

خوراک: ۳x ۵ گرین دن میں تین مرتبہ۔  
 کاربوئیکی: جب پیری میں نکیر بار بار آئے۔  
 خوراک: ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔ ۱۰  
 ضروری ہدایات: پیشانی گردن یا پشت پر سرد پانی یا برف لگائیں اور  
 بازوؤں کو سر کے اوپر اٹھا رکھیں۔ ایسا کرنے سے عموماً نکیر رُک جاتی ہے۔ اگر  
 باوجود ان تمام تدابیر کے خون جاری رہے تو کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا ہیما میلز مدرٹنکچر  
 میں ترکیب کے ماؤف نٹھنے میں رکھیں یا میں قطرے ہیما میلز مدرٹنکچر کے ایک اونس  
 پانی میں ڈال کر روشن بنالیں اور ماؤف نٹھنے میں اس روشن کی نسوار چڑھائیں۔ اگر  
 نتھنوں میں خون کے چھیمچڑے ہوں تو ال کو پہلے نکال لیں۔ مریض کو آرام سے لیٹائے  
 رکھیں اور کمرہ بھی زیادہ گرم نہ ہو۔ سب سے پہلے معالج ناک کے نتھنوں کو بغور دیکھیے  
 اور ایک چھیمچ نمک ڈیڑھ پاؤنک ڈیڑھ پاؤ پانی میں ڈال کر بذریعہ پچکاری اس

۱۰ اس کے علاوہ تھلپی بُرسا۔ ٹرلیم اور ارٹیکا یونس بھی عمدہ دوائیں ہیں



لوشن سے نتھنوں کو دھوئے اور تمام چھیمچڑوں کو باہر نکال دے۔ بہت سے کیسوں میں تو اتنا کرنے سے ہی خون رُک جاتا ہے۔ اگر خون زیادہ نہ آتا ہو تو ناک مضبوط انگوٹھے اور انگلی کے ساتھ پکڑے رکھیں نکسیر بند ہو جائے گی۔

دموی مزاج کے اشخاص کو اکثر بحالتِ شدید بخار یا سخت سر درد نکسیر پھوٹ نکلتی ہے۔ اس کو فوراً بند نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس صورت میں اجتماعِ خون دماغ یا سوزشِ دماغ کا قدرتی علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر خون بکثرت آوے تو پھر علاج ضروری ہونا کرتا ہے۔ اگر بدون کسی مرض کے دموی مزاج والے اشخاص کو نکسیر آتی رہتی ہو تو ان کو لازم ہے کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کریں۔ منشیات سے پرہیز کریں ٹھنڈے پانی سے بار بار منہ دھوئیں اور غسل کریں اور کھلی ہوا میں روزانہ تھوڑی ورزش کیا کریں، زیادہ ورزش اور سرنگوں رہنا نقصان دہ ہوتے ہیں مگر کمزور اشخاص کو بار بار نکسیر پھوٹے تو یہ بہت ہی نقصان دہ ہوتی ہے ایسے مریضوں کو مقوی غذا دینی چاہیے اور فریم فاس اور چائنا ادویات دینی چاہئیں۔ تبدیلی آب و ہوا بھی مفید ہوا کرتی ہے۔

## ناک سے بدبو آنا۔ سینس

OZAENA

OZAENA

اس مرض میں ناک کے نتھنوں میں پیریاں جم جاتی ہیں اور ناک سے بڑی بدبو آتی ہے۔

اسباب مرض: عموماً یہ مرض پرانے زکام کے باعث ہوتا ہے۔ کبھی آتشک یا چھیک یا خسرہ کے سبب سے یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، ناک پر چوٹ لگنا یا ناک میں حیرتے کا پھنس جانا یا زخم ہو جانا، یہ بھی اس مرض کے اسباب ہیں خنازیری مزاج کے اشخاص عموماً اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

## علاج

**آرم میٹلیکم** : ناک کے اوپر درد نتنوں میں گرمی اور دکھن، زردی ناکل سبز بدبو دار رطوبت خارج ہو۔ آتشکی مریضوں کے لیے یہ دوائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

**اکوڈولم** : بدبو بہت ہو اور ناک کے پردہ میں زخم ہو خنازیری مزاج کے مریضوں کے لیے یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

**مرکوریس بن ایوڈائیڈ** : بدبو دار رطوبت خارج ہوتی ہو، ناک کی دیوار اور ناک کی استخوان کھائی جاتی ہوں۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

**ٹائمرک ایسڈ** : آتشکی پنیں ہو اور نیز جب کہ مریض نے پارہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال کیا ہو۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

**آر سینیکم** : بدبو دار مواد ہو، مرض سخت صورت اختیار کیے ہوئے ہوں خاص کر جب کہ مریض بہت کمزور ہو چکا ہو۔

علاوہ ازیں سینگو نیریا۔ ہیامیس۔ زینکم میٹلیکم۔ سائی کلمن۔ جلی میم

فائی ٹولا کا اور سٹیکٹا ادویات بھی کام آتی ہیں۔

**نوٹ** : نتنوں کو ہانڈی فلوئیڈ کے سلوشن سے دھونے سے ناک کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔

**جب ناک میں سے بو آئے مانند**

۱۔ خون کے تو نکس و امیکا۔ سلیشیا۔ سورنیم۔

۲۔ گندھک کے تو آر سینیکم کلیریا کارب، گریفائیٹس۔ نکس و امیکا۔

- ۳- جلے ہوئے سینگ کے پستلا - سلفر۔
- ۴- چوڑے کے، کلکیر یا کارب
- ۵- خراب انڈے کے، کلکیر یا کارب
- ۶- بارود کے - کلکیر یا کارب
- ۷- کستوری کے - اگینس کاسٹس
- ۸- دیرینہ زکام کے - گریفائیٹس - پستلا - سلفر
- ۹- دھوئیں کے سلفر
- ۱۰- پیشاب کے، گریفائیٹس
- ۱۱- کھٹی بدبو کے، ایومین - بیلاڈونا۔
- ۱۲- میٹھی بو کے - آرم - نائٹرک ایسڈ - سلیشیا۔

**ضروری ہدایات :** نحتوں کو خوب اچھی طرح سے صاف رکھنا چاہیے اور ایک چمچ بھر نمک کو ڈیڑھ پاؤ پانی میں ڈال کر روشن تیار کر کے اس سے ناک کے نحتوں کو بذریعہ پچکاری یا نسوار دن میں کئی مرتبہ دھونا چاہیے۔ مریض کو لطیف اور مقوی غذا دینی چاہیے اور اس کو صاف و ستھری آب دہوا میں رکھنا چاہیے۔

## ناک کے کیڑے

(VERMESNASI)

اس مرض میں مریض کی ناک سے پہلے سخت بدبو دار اور خون آمیز مواد خارج ہوتا ہے۔ پھر کیڑے بھی خارج ہوتے ہیں۔

**اسباب مرض :** جو مریض پینس کے پرانے عارضہ میں مبتلا ہوتے ہیں یہ سبب - گندے رہنے کے ان کی ناک میں مکھیاں گھس کر انڈے دے جاتی ہیں جن سے یہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ موسم گرم و برسات میں گندے اشخاص میں یہ مرض پایا جاتا ہے۔

## علاج

نیم میر گرم پانی لے کر اس میں روغن تار میں نصف چھٹانک ملا لیں اور اس سے صبح و شام ناک میں پچکاری کریں اور پھر باریک موچنے کے ساتھ با احتیاط ناک سے کیڑے نکال دیں۔ بعدہ ایک رتی پھٹکڑی ایک چھٹانک پانی میں ملا کر ناک میں پچکاری کریں۔

## ناک کی بواسیر

(POLYPUS NASI)

اس بیماری میں ناک کے نتھنوں میں متے پیدا ہو جاتے ہیں۔ علامات مرض: مریض کی آواز میں غنغنائے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے اور مریض اپنے منہ کو سانس لینے کے لیے کھلا رہتا ہے۔ سیال اشیاء کو نگلنا مشکل ہوتا ہے۔ ناک باہر کی جانب سے بڑھ جاتی ہے اور نتھنوں کو بغور دیکھنے سے بواسیری متے نظر آتے ہیں۔ یہ متے سفید زردی مائل نرم ہلکے یا ریشہ دار سخت سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ مریض کو اکثر زکام کی شکایت رہتی ہے۔ کبھی ناک سے خون بھی بہتا ہے۔ جس نتھنے میں متہ ہو۔ اس نتھنے سے سانس نہیں لیا جاسکتا۔ اگر متہ بہت بڑھ جائے تو نتھنا ابھر کر چہرے کو بد شکل بنا دیتا ہے۔

## علاج

تھوجا۔ سینگو نیریا۔ فاسفورس۔ کالی بانی کر دیسکم۔ مرکبوریس آیوڈاڈ کلکیریا کارب اور ادھیم وغیرہ اس مرض میں کام آتی ہیں۔ انمد بھی دی جاتی ہیں اور اوپر بھی دہی لگائی جاتی ہیں۔

# قوت شامہ کا زائل ہو جانا

(SENSE OF SMELL LOST)

یہ مرض کبھی دوسرے مرض خاص کہ مزمن زکام کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

## علاج

ابتداء میں ایکونائٹ ۱x یا ۲x دینی چاہیے۔ بعدہ پٹلا مرکبوریس۔ سلفر۔  
کالی بائی کرومیکم۔ کالی آیوڈائیڈ۔ مجلسی میم۔ سی پیا۔ کلکیریا کارب میں سے  
جس دوائی کی علامات موجود ہوں وہ دینی چاہیے۔

## باب یازدہم

# امراض آلات تنفس

AFFECTIONS OF THE RESPIRATORY ORGANS.

## خنجرہ یعنی نرخرہ کی سوجن اور ہوا کی نالی کی سوجن

(LARYNGITIS AND TRACHITIS)

اس مرض میں نرخرہ اور ہوا کی نالی کی لعاب دار جھلتی متورم ہو جاتی ہے اور اس

لے حلق میں سانس کا راستہ، یہ درحقیقت آواز کا آلہ ہے جو ہوا کی نالی کے اوپر زبان  
کی جڑ کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کا اوپر کا حصہ مثلث اور چوڑا لیکن نیچے کا  
حصہ گول اور تنگ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کے کنارے کے درمیان  
ایک ابھار ہوتا ہے جسے کنٹھ کہتے ہیں۔

میں گاڑھی رطوبت پیدا ہو جاتی ہے۔

**علاماتِ مرض :** یہ مرض عموماً نزلہ سے پیدا ہوتا ہے اس کی ابتدائی علامات بخار اور آواز کا بھداپن ہیں اور ایک خاص قسم کی کتے کھانسی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے لیے تکلیف دہ تو ضرور ہوتا ہے۔ لیکن مہلک نہیں ہوتا لیکن جب اس مرض کا باعث جراثیمِ سل یا آتشکی زہر ہو تو یہ مہلک بھی ثابت ہوتا ہے مگر بچوں میں یہ مرض ایک یا دو روز کے بعد اور بعض اوقات یکا یک خوفناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ عموماً رات کے وقت یہ مرض ترقی پذیر ہو جاتا ہے اور گھردری کھانسی کے دورے ہوتے ہیں جو کہ نیند میں مغل ہوا کرتے ہیں۔ اندر بانس لیتے وقت اور کھانتے وقت گھنگرو بولنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ کوئی چوڑہ بول رہا ہے یا کتے کا بچہ بھونک رہا ہے اور ساتھ ہی حنجروں میں کسی قدر شتج پڑتے ہیں اور اگر حنجرہ بچہ سانس بڑی کوشش سے لیتا ہے۔ تاہم اس کے چہرے اور شکل کو دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہوا کی ناکافی مقدار اس کے پھیپھڑوں میں داخل ہو رہی ہے۔ چند منٹ تک مرض کا دورہ رہنے کے بعد پھر چند گھنٹوں کے لیے آرام آ جاتا ہے۔ نبض تیز اور باریک چلتی ہے۔ بھوک اور پیاس ماری جاتی ہیں اور تکلیف بہت ہوتی ہے۔

**اسبابِ مرض :** گرم سرد ہو جانا۔ سردی لگنا۔ بارش میں بھیگنا۔ زیادہ گرم غذا کھانا یا گرم پانی پینا۔ گردوغبار کا حلق میں پہنچ کر خراش پیدا کرنا۔ پاؤں بھیگنا۔ بڑی یا ناکافی غذا کھانا۔ خاص کر ماں کا دودھ چھوڑنے کے بعد بچہ کو مناسب غذا کا نہ ملنا یا کافی پارچات کا میٹر نہ ہونا۔ ترش اشیاء کا کھانا۔ زیادہ نعرے بولنا یا چلاتنا۔ حنجروں پر چوٹ لگنا۔ زکام اور شدید کھانسی کا ہونا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں اور بعض بچوں کو خسرہ۔ چیچک۔ زکام و بائی و سرخ باد وغیرہ امراض کے بعد بھی یہ بیماری ہو جایا کرتی ہے اور گاہے گرم گلو پھیل کر حنجروں تک چلا جاتا ہے اور اس مرض کو پیدا کرتا ہے۔

## علاج

۱۔ ابتداء میں اکیونائٹ۔ بیلادونا۔ سپنجیا۔ اینٹیم ٹارٹ

۲۔ حتمی مرض میں برومیم۔ آیوڈیم۔ پنچیا۔ کالی بانی کر و حکم۔ بہر سلف۔

## تشریح العلما

ایکونائٹ : بخار ہو۔ حنجرہ میں تشنج ہو اور سانس بدقت آوے۔ بچوں کے ورم حنجرہ میں ایکونائٹ سے بڑھ کر آغاز مرض میں اور کوئی دوائی نہیں ہے جبکہ بخار ٹھنڈک اور جلد جسم خشک ہو اور آواز بھرا گئی ہو اور مریض مارے کھانسی کے جاگ اٹھتا ہو۔ گھبراتا ہو اور اندوگہن و سخت تشویش میں ہو۔ بیلا ڈونا میں خشکی۔ کھچاؤ اور حنجرہ میں دھکن موجود ہوتی ہیں اور حلق کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ بخار تیز ہوتا ہے اور بولتے وقت درد ہوتا ہے اور آواز بھدی پڑ جاتی ہے۔ ڈاکٹر وینس کا دعویٰ ہے کہ اگر فیرم فاس دوائی ابتدا میں دی جائے تو یقیناً ورم کو کم کر دیتی ہے اور مرض کی ترقی کو روک دیتی ہے۔ ڈاکٹرے دو فرنی سونڈس حنجرہ گلوں میں ایسی کیوس کو بہت مفید بتلاتے ہیں۔ ڈاکٹر موگن کا قول ہے کہ فیرم فاس آواز کو بحال کرنے میں سبب دویات میں سے بڑھ کر موثر ہوتی ہے۔ گولیوں کا گلاب جیب بیٹھ جاتا ہے تو فیرم فاس آواز کو ٹھیک کر دیتی ہے۔

خوراک : ۱x یا ۳x ہر دس پندرہ منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد۔

اگر کوئی دوسری دوائی بھی منظر ہو تو ایکونائٹ اور وہ دوائی باری باری سے دی جاتی ہے۔

پنچیا : جب کھانسی خشک سخت کھروری اور بھونکنے کی مانند ہو، کھانسی میں سے سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو اور سانس بڑی دقت سے آتا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ کھانسی میں غوطہ آنا بھی اس دوائی کی علامت ہے۔

خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

آیوڈیم : ایکونائٹ کے بعد یہ دوائی بہت ہوتی ہے جبکہ بخار جلد جسم خشک، کھانسی خشک اور سانس لینے میں بہت تکلیف ہو کھانسی میں بہت تکلیف ہو۔ کھانسی کی علامات پنچیا اور آیوڈیم سے ملتی جلتی ہیں۔ لیکن مریض جب بہت کمزور ہو تو آیوڈیم کو پنچیا پر ترجیح دینی چاہیے۔ دوائی

بیمار کو سونگھائی بھی جاتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

برومیم : نومذہ میں سوندش ہو، ہوا کی نالیوں میں سوجن اور غائت درجہ کا اجتماع خون ہو۔ ہوا کی نالیوں کے اوپر کے حصے ماؤف ہوں۔ بچہ اپنے گلے کو پکڑتا ہو اور بڑا اندوہ گین دکھائی دیتا ہو۔ خشک کھانسی، مانند بھیڑ کی کھانسی کے ہو گرمی سے مرض میں زیادتی ہو۔ جب بخار ہو اور جلدہ جسم سرم و خشک ہو تو یہ دوائی اور ایونائٹ : برقی یا بی بی سے دینی چاہیے۔ حتیٰ کہ مریض رو بصحت ہو جائے۔ جب بخار آتے جانے لگیں تھیں ہوا کی نالیوں میں موجود ہوں تو برومیم کسیر کا حکم رکھتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف : ترکھانسی ہو اور متواتر غرغر کی آواز پیدا ہوتی ہو۔ مریض بغم باہر نکالنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہو مگر بے سود، جب خشک سر و ہوا کے باعث بچوں میں دم خجرہ کی شکایت پیدا ہو جائے۔ کھانسی ہو اور آواز بھدی ہو۔ صبح کے وقت تکلیف زیادہ ہو۔ خفیف ہوا کا جھونکا بھی مریض کو بہت برا لگتا ہو۔ حلق دکھتا ہو اور خشک ہو تو ہیپر سلف نافع ہوتی ہے سٹاکٹر چل کا کہنا ہے کہ ہیپر سلف مزمن دم خجرہ میں تمام ادویات سے زیادہ مؤثر دوائی ہے۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : شام کو آواز کا بھرا جانا اور حلق میں خشکی اور دکھن کا زیادہ ہونا۔ یہ فاسفورس کی خاص علامات ہیں۔ بولنے سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تھک جاتا ہے۔ آواز کھردری اور بھدی ہوتی ہے۔ تھوک بہت کم آتی ہے۔ بولنے سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ فاسفورس کی دکھن حلق میں ہوتی ہے لیکن کاسٹی کم کی دکھن سینہ کی ہڈی کے زیر ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ : جب مریض کو کمزوری بہت ہو اور آریٹم کی علامات بھی پائی جائیں



تو فاسفوریس ۶x اور کاشی کم ۶x ادویات ماری باری سے دی جاتی ہیں۔  
**اپنی کاک** : جب ٹھنڈ کی وجہ سے گلہ بیٹھ گیا ہو تو یہ دوائی سودمند  
 ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x یا ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 کالی بانی کریم : مونی گاڑھی لیس دار اور ڈورے دار زردی مائل ملغم  
 بشکل خارج ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 ضروری ہدایات : مریض کو گرم کمرے میں آرام سے ٹائے رکھیں اور  
 اس کمرے میں کھولتے ہوئے پانی کی ایک تیلی نکلیٹی پر رکھیں تاکہ پانی کی بھاپ  
 سے کمرے کی ہوا گرم اور مرطوب رہے اور اگر کھولتے ہوئے پانی میں چند قطرے یوڈین  
 یا کالی بانی کریم کے ڈال دیے جائیں تو اور بھی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ جب مرض کا  
 حملہ شدید ہو تو مریض کو گفتگو کرنے اور حقہ نوشی سے باز رکھیں۔ شدید کسیوں میں  
 بعض ڈاکٹر حلق میں دس گرین والا کاشک ٹچ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔  
 سلور ٹائٹریٹ دس گرین اور پانی مقطر (ایک انس) کا لوشن ٹچ کیا جاتا ہے۔

## تشخ حنجرہ زغرہ کی اینٹھن جھوٹا خناق

(LARYNGISMUS STRIDULUS)

اس مرض میں حنجرہ میں تشنج ہو کر مریض کا دم بند ہونے لگتا ہے۔ یہ مرض پہلی رات  
 کو ہوتا ہے اور اس کا دورہ چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ مرض زیادہ تر بچوں کو  
 ہوتا ہے اور خاص کر دانت نکلنے کے زمانہ میں، نیز عصبی اور ہسٹریکل مزاج کے  
 نوجوانوں کو بھی ہوتا ہے۔

علامات مرض : یہ مرض زیادہ تر رات کو یکایک ہو جاتا ہے۔ بچہ اندر  
 سانس نہیں کھینچ سکتا۔ بڑی جدوجہد کرتا ہے۔ ہانپتا ہے اور سانس اندر  
 کھینچتے وقت بانگ مرغ کی سی آواز پیدا ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بچہ

بہلا چنکا ہو جاتا ہے لیکن پھر کسی وقت مرض کا دورہ ہو جاتا ہے۔ یا کسی وقت دم بند ہو جاتا ہے۔ حنجرہ کے بند ہو جانے سے کوئی آواز نہیں پیدا ہو جاتی بچہ پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور اس کا رنگ زرد اور کسی قدر نیلیوں ہو جاتا ہے۔ اور بچہ بانپتا ہے اور سانس لینے کے لیے بہت جدوجہد کرتا ہے۔ یہ حالات چند سیکنڈز کے تشنج کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ حنجرہ کھل جاتا ہے اور بوا سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا کرتی ہوئی یا بانگ مرغ کے چیخنے کی سی آواز کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے اور تب مریض کا رنگ جو کہ پہلے زرد اور نیلیوں ہو گیا تھا اب بحال ہو جاتا ہے اس مرض کے ہمراہ ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھوں میں بھی کھچاؤٹ ہو جاتی ہے اور وہ اندر کی طرف مڑ جاتے ہیں جب مرض کا حملہ شدید ہو تو ایک ہی رات میں کئی دورے ہوتے ہیں، دورہ جتنی دیر تک رہے اسی قدر شدید ہوتا ہے اور دم گھٹ کر مریض کے مرجانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس مرض میں نہ تو بخار ہوتا ہے اور نہ ہی نکلنے اور بولنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور نہ ہی دورے سے پہلے یا پیچھے کھانسی ہوتی ہے۔

**اسباب مرض:** بعض خاندانوں میں یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ خصوصاً رکٹی بچے یا ایسے بچے کہ جن کی ہڈیاں کمزور ہوں، اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کمزور اور نازک بچے جو خراب آب و ہوا میں رہتے ہوں اور جن کو اچھی غذا میسر نہ آتی ہو یا ایسے بچے جن کو بد مضمی ہو اور جن کے پیٹ میں کبرے ہوں یا ایسے بچے جو کہ دانت نکال رہے ہوں اور ان دنوں میں وہ خوف کھا جائیں یا کوئی شے اتنے قیہ ان کے حلق میں ٹک جاوے تو ان کو اس مرض کا دورہ ہو جاتا ہے۔ جن مستورات کو میسٹریا یا مرگی کی شکایت ہوتی ہے۔ وہ عموماً اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں۔ یہ مرض تین سال کی عمر تک کے بچوں کو نسبتاً زیادہ ہوا کرتا ہے۔

**اسباب موندہ:** خفیف امور اس مرض کے پیدا کرنے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ مثلاً سرد ہوا کا ایک جھونکا۔ ٹھنڈک۔ اُگتے ہوئے دانت کی خراش، بد مضمی، قبض، اسہال وغیرہ وغیرہ۔

**تشخیص مرض :** اس مرض میں اور درم خجرہ یا خناق میں امتیازی علامات یہ ہیں اس مرض میں سانس اندر کھینچتے وقت بانگ مرغ کی سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ نیز نہ ہی کھانسی اور نہ ہی بخار وجود ہوتے ہیں۔ مرض یہ ایک حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اور ایک منٹ میں انتہائی درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

## علاج

دوران مرض میں اکیونائٹ - سمبوس - مجلسی میم - بیلادونا - اپنی کاک - پنچیا کالی بانی کریمکم - کو پریم میسکم کام آتی ہیں۔  
دوران وقفہ میں فاسفورس - پنچیا - کاربوئیچی - ہیرسلف اور سلفر وغیرہ

## تشریح علامات

اکیونائٹ : خجرہ میں تشنج، سانس میں تکلیف اور بخار کی علامات شدید حالت میں پندرہ یا بیس منٹ کے وقفہ پر اس کی خوراک دینی چاہیے۔ خناق کا وہ میں اکیونائٹ نہایت ہی موثر دوائی ہے اور اکثر کیسوں میں یہ اکیلی ہی شافی ہوا کرتی ہے۔ اکیونائٹ پنچیا کو باری باری سے بھی دیتے ہیں۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

جلسی میم : مرض کا حملہ گاہے گاہے شدید ہو جاتا ہے اور اکیونائٹ دینے سے مکمل صحت نہ ہوتی ہو تو یہ دوائی دی جاتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : جب کہ مرض کے بعد کھانسی ہوتی ہو اور چھاتی دکھتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سمبوس : چہرہ سرخ گرم ہو اور سوتے وقت جلد جسم گرم ہوتی ہو۔ ہاتھ اور

پاؤں ٹھنڈے ہوں۔ جاگنے پر چہرے اور جسم پر بکثرت پسینہ آتا ہو اور بیداری میں لگاتار پسینہ آتا رہتا ہو۔ لیکن دوران میں جلد جسم پھر خشک ہو جاتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

بیل ڈونا: چہرہ سُرخ - آنکھوں کی پتلیاں پھلی ہوئی اور سر درد -

خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد -

اپنی کاک: بطن سینے میں کھڑکتا ہوا اور تپیں آتی ہوں - ہوائی نالیوں میں جلن و خراش ہو -

خوراک: ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد -

سینہ بچھاؤ آواز بھدی ہو اور سانس میں آہ چلنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو -

خوراک: ۳x ہر دس منٹ کے بعد

علاوہ ازیں کوہم ٹیلیکم ۶x کلورل ۱x کلکیریا ۶x اگاریکس ۳x اور اگنیشیا ۳x

ادویات بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں

ضروری ہدایات: بچوں ہی مرض کا دورہ شروع ہو - مریض کو ٹھاکر گرم

پانی میں بٹھلا دیں اور حلق پر گرم پانی میں کپڑا بھگو کر اور پچوڑ کر ٹکڑ کر دیں - کمرہ ہوا دار ہو -

بعض اوقات سرد پانی کا چھینٹا چہرہ یا سینہ پر یا ریڑھ کے ستون پر دینے سے سانس جاری ہو

جاتا ہے - بچوں ہی مرض کا دورہ دور ہو - مریض کو لیٹ کر بستر پر لٹا دیں تازہ اور

صاف ہوا از بس ضروری ہے - کاڈیور آیل کا استعمال بھی مفید ہوتا ہے - اگر مرض کا دورہ

دیر تک رہے تو با احتیاط کلوروفارم یا ایل ٹاٹریٹ سو نکھائیں - اگر کوئی دانت سوڑھے

میں پھنسا ہوا ہو تو سوڑھے کو نشتر کریں -



## خون تھوکتا نفث لدم

(HAEMOPTYSIS)

اکثر تو اس مرض کا باعث مادہ سل ہوتا ہے - یعنی جن مریضوں کو پھیپھڑوں کی سل ہوا کرتی ہے - وہ اکثر خون تھوکتا کرتے ہیں - لیکن دیگر امراض مثلاً پھیپھڑوں کی معذش یعنی نمونیا یا پھیپھڑوں کا مردار پڑ جانا یا امراض دل یا حلق یا حجرہ یا ہوا کی نالیوں میں سے خون آیا کرتا ہے - زیادہ مددش کرنے زور سے چلانے یا کھانسنے یا کسی پہاڑ

پر پڑنے یا شدت کی گرمی کے باعث بھی مریض خون تھوکا کرتا ہے۔ کبھی مستورات میں خون حیض بند ہو کر اس مرض کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ یعنی وہ خون تھوکے لگتی ہیں۔ یہ مرض اکثر دموی اور خن زیری مزاج کے اشخاص کو ہوا کرتا ہے۔

**علامات مرض :** حلق میں خراش سینہ تنہا ہوا اور بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ دم لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور کھانسی کے ہمراہ تھوک میں خون خارج ہوتا ہے لیکن اگر پھیپھڑے میں کوئی باریک شریان پھٹ جاوے تو مریض یکبارگی بہت سا خون تھوکتا ہے۔ جس کے باعث بعض اوقات اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

**تذکرہ :** معدہ سے جو خون بذریعہ قے خارج ہوتا ہے، وہ سیاہی مائل ہوتا ہے اور اس میں گرمی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جو خون پھیپھڑوں سے آئلبے وہ سُرخ مائل ہوتا ہے اور اس میں غذا کی آمیزش نہیں ہوتی۔

## علاج

**آرنیکا :** جب بوجہ چوٹ آنے یا معدہ کے یہ مرض پیدا ہو۔ خون برنگ سیاہ منجمد اور بمقدار کثیر خارج ہو۔

**خوداک :** مدرٹیکر کے بیس قطرے ایک پاؤ پانی میں ڈال کر ایک چمچہ بھر کر ہر پانچ منٹ کے بعد دیتے جائیں۔ حتیٰ کہ خون آئلبے تک چلے۔

**ایکونائیٹ :** تشویش بے چینی، خون سُرخ اور جھاگ دار بمقدار کثیر معہ مسلسل کھانسی کے سینہ کی ہڈی کے زیریں گرمی محسوس ہو اور ایسا معلوم ہو جیسا کہ چھاتی میں ابلتا ہوا پانی بھرا پڑا ہے۔ چہرہ سُرخ، آنکھیں چمکیل، نبض بھرپور اور سخت ہو۔ اگر بخار کی حرارت بھی ساتھ ہو تو یہ ایکونائیٹ کی قیمتی علامت سمجھی جائیے۔

**خوداک :** مدرٹیکر (۵) کے بیس قطرے ایک پاؤ پانی میں ڈال کر اس میں سے چمچہ بھر کر ہر پانچ منٹ کے بعد دیتے جائیں حتیٰ کہ خون آئلبے ہو جائے۔

**اپی کاک اور میلی فوہیم :** اس مرض میں یہ دونوں ادویات نہایت ہی قابل اعتبار مانی گئی ہیں۔ یہ دونوں ادویات باری باری سے دی جاتی ہیں۔ جب

سینے میں اُبلنے کا احساس ہو اور خون بکثرت خارج ہو تو اس کو اپنی کاک کی علامت سمجھنی چاہیے۔

خوراک : اپنی کاک ۳x اور ملی فولیم ۳x طاقت میں بھی موثر ہوتی ہیں لیکن بعض معالج ملی فولیم کو مدد شکر میں استعمال کرتے ہیں۔

لیڈم : یہ دوائی مذکورہ بالا ادویات کے مقابلہ میں بہت کم مستعمل ہے۔ لیکن جب اس کی علامت مخصوصہ موجود ہو تو یہ کارآمد ہوتی ہے۔ شدید دورے کی کھانسی ہو اور ساتھ ہی حلق میں خراش ہو۔ بمقدار کثیر چمکیلا، سرخ اور جھاگ دار خون خارج ہو۔

خوراک : ۵ کے دس یا بیس قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر پلائیں اور اسی طرح سے ہر پانچ منٹ کے بعد دیتے جائیں۔ بعض ڈاکٹر صاحبان اس معالی کو ۶x میں زیادہ مفید بتلاتے ہیں۔

فیرم ایسٹی کم : جب کھانسی سبقت اور سینہ کی ہڈی کے زیریں سخت خراش ہو خون بوقت صبح آئے اور مریض کا چہرہ گرم اور سرخ ہو جائے، سرد واد اور سخت نقابت بھی اس دوائی کی علامات ہیں۔

خوراک : ۱x ہر دس منٹ کے بعد۔  
اکلفا انڈیکا : سلی مریضوں کے خون تھوکنے میں یہ دوائی نہایت کارآمد ہے پہلے خشک تکلیف وہ کھانسی آئے اور بعد میں مریض خون تھوکے۔

خوراک : بیس قطرے ۵ کے ایک پاؤ پانی میں ڈال کر دوائی بنالیں، اور چیمہ معالی ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد پلاتے جائیں۔

ہما میلس : جب خون سیاہ رنگ کا آئے۔ وریدی خون کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ ہما میلس سلی مریضوں کے نفث الدم میں کام نہیں آتی، امراض دل کی وجہ سے جب مرض ہو یا سخت بخاروں میں نفث الدم کی شکایت ہو تو یہ دوائی کام آتی۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے نصف ادس پانی میں ڈال کر ہر دس یا پندرہ منٹ کے بعد۔

نکس و امیکا: نفث الدم کی یہ بھی ایک دوائی ہے، جب مریض سل میں مبتلا ہو۔  
خون جلکنے پر یا بوقت صبح خارج ہوتا ہو، سیاہ چمکیلا ہو اور اگر بواسیر کے دب جانے  
کی وجہ سے باہر نکلے تو یہ دوائی اور بھی زیادہ موثر ہوتی ہے۔

خوداک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد

چائنا: خون کے خارج ہونے سے جو کمزوری واقع ہوئی ہو اس کے دور کرنے  
کے لیے یہ دوائی بہت موثر ہوتی ہے، کانوں میں بھننا ہٹ اور ضعف اس کے  
خاص علامات ہیں، جب نفث الدم کا عارضہ ہر تیسرے روز ہوا کرتا ہو تو یہ دوائی  
اور بھی زیادہ موثر ہوتی ہے۔

خوداک: ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سینٹی شیلو: حیض بند ہو جانے کی وجہ سے پھیپھڑوں سے خون خارج ہو مرض  
سل کی ابتداء میں تکلیف دہ کھانسی کے ہمراہ خون آتا ہو۔ ابتداء میں خشک کھانسی ہو لیکن  
بعدہ زرد بلغم بکثرت خارج ہو۔ سینہ میں زخم نمودار ہو۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ پشلا۔ رشاکس۔ سنامیونم۔ کاربودیچی۔ کاکش۔ برہم

فاسفورس ادویات بھی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات: اس مرض میں مریض کے لیے جسمانی و دماغی آرام ضروری

ہوا کرتا ہے۔ اگر مریض کے تھوک یا بلغم میں صرف خون کی نس موجود ہو اور زیادہ خون نہ ہو  
تو اسے چاہیے کہ وہ کوئی زور کا کام نہ کرے لیکن اگر مریض خون زیادہ تھوکتا ہو تو اسے  
بالکل آرام سے بستر میں ٹٹائے رکھیں اور اس کے سر کے نیچے سر بانہ رکھیں تاکہ سر کبھی قدر  
اوپنچا رہے اور اسے بولنے یا حرکت کرنے نہ دیں اور اگر ہوسکے تو اسے برف کے ٹکڑے  
چوسائیں، جب مریض رو بھرت ہو تو اسے آہستہ آہستہ چلنے پھرنے اور کام کاج کرنے  
کی اجازت دیں۔ مریض کو قبض نہ ہونے دیں۔

غذا: صرف تھوڑا سا دودھ یا دودھ چاول، ساگودانہ یا دودھ اور آتش جو

یا ڈبل روٹی دودھ و پتلی کھجڑی وغیرہ دزرم اور ہلکی غذا دیں۔

پرمہیز: گرم اشیاء۔ لال مرچ و گرم مصالحہ۔ گوشت و شراب وغیرہ

سے قطعی ہمساز لازم ہے۔

# دومہ - ضیق النفس

(ASTHMA)

یہ ایک تشنجی مرض ہے۔ جس میں پھیپھڑے کی باریک ہوائی نالیوں اور ڈایا فرام کے عضلہ میں تشنج ہو کر تنگی تنفس کے دورے شروع ہو جاتے ہیں اور سانس میں سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہے اور سینہ کے گرد بڑی خوفناک کھچاؤٹ محسوس ہوتی ہے، دومہ کے ہر ایک دورہ کے خاتمہ پر کم و بیش بلغم مریض باہر نکالتا ہے۔

**علامات مرض :** دومہ کا دورہ عموماً رات کو ہوتا ہے اور خصوصاً نیم شب کے بعد صبح تک نیند سے مریض یکایک چونک اٹھتا ہے۔ گویا کہ اس کا دم کھٹنے لگا ہے اور وہ جھٹ بتر سے اٹھ بیٹھا ہے اور کئی مختلف حالتیں اختیار کرتا ہے۔ گھلی کھڑکی پاس جا کر اپنے بازوؤں کے سہارے آگے کی جانب جھک جاتا ہے اور گردن، کمر اور سینہ کے تمام عضلات پر زور دیتا ہے۔ تاکہ سانس آسانی سے آسکے اور سانس بلند آواز کے ساتھ آتا ہے اور مریض سانس لینے کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ مریض کے چہرے پر نظر ڈالنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھاری مصیبت میں مبتلا ہے، آنکھیں ابھرا آتی ہیں۔ جلد جسم ٹھنڈی اور چکنی نبض چھوٹی اور کمزور پسینہ کے بڑے بڑے قطرے پیشانی اور چہرے پر دوڑتے ہوئے دکھلائی دیتے ہیں۔ مریض اپنے معالج کی طرف نہایت بے صبری کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کی شکل سے آشکارا ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ بڑی بھاری مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے سخت بیتاب ہے۔ آخر کار کچھ وقت تک یعنی ایک گھنٹہ سے لے کر تین گھنٹہ تک بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ عرصہ مرض کا دورہ رہ کر تخفیف شروع ہوتی ہے، کھانسی کے ہمراہ بلغم خارج ہوتی ہے۔ اور دورہ ختم ہو جاتا ہے، اور مریض گہری نیند میں سو جاتا ہے۔ دورہ کے ہمراہ بخار نہیں ہوا کرتا۔ لیکن قبل از دورہ باضمہ میں نقص عموماً ہوا کرتا ہے۔



**اسباب مرض :** نقص ہاضمہ، موسم کی یکایک تبدیلی زہریلے اور خراش پیدا کرنے والے ذرات کا براستہ سانس اندر چلا جانا یا گندھک، تیزاب گندھک یا کلورائیڈ کے انجرات کا آلات تنفس کے ساتھ ٹکرانا اس مرض کے پیدا کرنے کے اسباب ہوتے ہیں کبھی نقرس اور آتشک کے سبب سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جب ایک مرتبہ اس مرض کا حملہ ہو جائے پھر ہاضمہ میں نقص ہونے سے مرض کا دودھ بآسانی ہو جایا کرتا ہے۔ اکثر تو یہ مرض موروٹی ہوا کرتا ہے۔ کالی کھانسی یا خسرہ کے بعد یہ مرض بچوں کو بھی ہو جایا کرتا ہے رحم و نصیحتہ الحسم کے بعض امراض، مرض باؤ گولہ، حمل وغیرہ نیز دل و پیپھروں کے بعض امراض اور دماغی عوارض مثلاً غم و غصہ، مایوسی، ڈر اور خوف وغیرہ بھی اس کے اسباب ہیں۔ ناک کے امراض مثلاً ناک کی بواسیر وغیرہ اور حلق و تنجرہ کے امراض بھی دمہ کے مرض کو پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔

## علاج

- ۱۔ دمہ کے دوران میں : بلانا اور فٹالس، ایکونائٹ، اپنی کاک، کوپرم لویلیا۔ ہائیڈروسیانک ایڈ، نیڑم سلف دیں۔ ایل نائٹریٹ کو سونگھاتے بھی ہیں۔
- ۲۔ بچوں کا دمہ : سمبوکس۔ اپنی کاک، جلسی میم وغیرہ۔
- ۳۔ جب دمہ کا عارضہ بوجہ چھانٹ و ب جانے کے ہو : گریفائیٹس۔ سلفر۔ زینک وغیرہ۔
- ۴۔ مزمن دمہ : آر سینکم۔ نکس دامیکا۔ سلفر۔ آر جنٹم نائٹریٹ کاکس پلم بلم۔ کالی ہائیڈراٹیم وغیرہ۔

## تشریح علامات و دوائی

اپنی کاک : دمہ کی یہ مشہور دوائی ہے خصوصاً تشنجی دمہ کی جب کہ سینہ پر بہت بوجھ اور تشویش ہو، یکایک کوتاہ دمی ہو جائے، دم کھٹنے لگے، حرکت کرنے سے تکلیف زیادہ ہو اور کھانسی کے ہمراہ قے آئے، کھانسی لگاتار ہو۔ سینہ بلغم

سے کچھ معلوم ہو۔ لیکن بلغم خارج نہ ہوتا ہو۔ بازو اور ٹانگیں، سر و پسینہ سے تر ہوں۔

**خوراک:** ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد، دورہ مرض کے دوران میں۔

**لوبیلیا:** چھاتی پر بہت دباؤ ہو اور سینہ میں بہت کمزوری معلوم ہو اور یہ کمزوری معدہ سے اٹھتی ہوئی محسوس ہو۔ معدہ میں گولہ کا احساس ہو۔ آبکائیاں آئیں منہ میں رالیں بہت پیدا ہوں، اور قبل از دورہ مرض تمام جسم میں چھن پڑتی ہو۔ برنگیل دمہ میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ سانس نہایت تکلیف کے ساتھ آتا ہو اور ادھر ادھر حرکت کرنے سے تھوڑا آرام ہوتا ہو۔ پیشانی کے آر پار ایک کنپٹی سے دوسری کنپٹی تک درد کا ہونا نیز ریڑھ کے ستون میں درد کا ہونا۔ یہ بھی اس دوائی کی مفید علامات ہیں۔

**خوراک:** ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

**آر سینکم:** جب مرض کا دورہ نیم شب کے بعد ہوتا ہو۔ مریض نہایت متفکر اور بے چین ہوتا ہو اور دم گھٹنے کے ڈر کے مارے وہ لیٹ نہ سکتا ہو، اگر مریض کو کبھی اذیت بھی آجاتی ہو تو سینہ میں دھکن دھکن وار دردوں کے باعث جاگ اٹھتا ہو جب مرض پرانا ہو چکا ہو۔ کوتاہ دمی ہمیشہ رہتی ہو اور مریض عمر رسیدہ ہو تو یہ دوائی خاص طور پر نافع ہوتی ہے۔ اپنی کاک کے بعد آر سینکم کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ خاص کہ جب کہ مریض بہت کمزور ہو اور اس کے سینہ میں جلن رہتی ہو۔ ڈاکٹر پھر اور جو کچھ دمہ کے مرض میں آر سینکم کا درجہ سب ادویات سے افضل مانتے ہیں۔

**خوراک:** ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد دوران دورہ میں اور ہر چھ گھنٹہ

کے بعد دوران وقفہ مرض میں۔

**نکس و امیکا:** نقص ہاضمہ کی وجہ سے دمہ کا دورہ ہوتا ہو۔ ڈکار آنے سے

تھوڑا آرام ہو۔ مریض کو اپنے پوشیدنی پارچات ڈھیلے کرنے پڑتے ہوں، یہ دوائی اس وقت بھی کارآمد ہوتی ہے، جب کہ مریض کافی یا شراب بہت استعمال کرتا رہا ہو، پڑ پڑی اور صفراوی مزاج والے مریضوں کو یہ دوائی نفع کرتی ہے۔ سینہ

کے زیریں حصہ میں کچا وٹ کا احساس ہونا۔ نکس و امیکا کی ایک قیمتی علامت ہے۔  
جب نقص ہاضمہ کی وجہ سے دمہ کا دورہ ہو اور دورہ صبح کے  
وقت ہوتا ہو۔ مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہو۔ لیکن تشویش موجودہ ہو تو زنجی بر موثر  
ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

گرنڈیلیا : تجربہ شاد ہے کہ ترومہ اور شدید نوزلی و مہ میں یہ دوائی بہت فائدہ  
مند ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بلرٹ فرماتے ہیں کہ اگر اس دوائی کی مدرٹن کچر کے پانچ یا دس قطرے  
ہر ایک گھنٹہ کے وقفہ پر مریض کو پلائے جائیں تو بڑا افاقہ ہوتا ہے۔

کالی بانی کورومیکم : جب مرض کا حملہ صبح تین یا چار بجے کے درمیان ہوتا ہو  
مریض کو سانس لینے کے لیے اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہو اور آگے کی جانب جھکنے سے تھوڑا  
آرام ہوتا ہو اور ڈورے وار بلغم لیس وار ہوتی ہے لیکن آر سینکم میں لیس وار نہیں  
ہوتی۔ کالی کاربونیکم اور کالی فاس ادویات بھی دمہ کے مرض میں مذکورہ بالا علامت  
کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

خوراک : ۶x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

نیرم سلف : دمہ کی یہ بھی ایک تجربہ دوائی ہے۔ مرطوب موسم میں تکلیف  
کا زیادہ ہونا اس دوائی کی مشہور علامت ہے۔ دمہ تر ہو اور سینہ میں بلغم کھڑکھڑاتی  
ہو۔ دمہ کے ہر دورہ کے بعد اجابت کا ہونا اس دوائی کی آزمودہ علامت ہے۔ مرض  
کا دورہ صبح چار یا پانچ بجے کے قریب ہوتا ہو اور ساتھ ہی کھانسی اور چمکیلی تھوک نکلتی  
ہو بلغم سبزی مائل اور بمقدار کثیر آتی ہو۔ دوسری علامت مخصوصہ نیرم سلف کی یہ  
ہے کہ دورانِ دمہ میں مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے  
سینہ کو تھام لیتا ہے۔

خوراک : ۳x یا ۶x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

ایٹم ٹارٹ : یہ دوائی دمہ کے عارضہ میں ایوینٹیک ڈاکٹر کسی نہ کسی شکل  
میں اکثر استعمال کرتے ہیں۔ اس دوائی کی خاص علامت سینہ میں بلغم کا کھڑکھڑانا  
ہے۔ لیکن اپنی کاک کی نسبت بلغم کی آواز ذرا نرم اور دھیمی ہوتی ہے سچائی بلغم

سے پر معلوم ہوتی ہے جس کو مریض باہر نکلنے کے ناقابل ہوتا ہے۔ کوتاہ دمی بہت ہوتی ہے اور مریض کو اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے اور بوقت صبح تین بجے کے قریب مرض کا دورہ دم گھٹنے والا ہوتا ہے۔ اینٹیم ٹارٹ پچول اور بڑھوں کے لیے خصوصاً مفید ہوتی ہے اس دوائی کی ایک علامت مخصوصہ یہ ہے کہ مریض کو محسوس ہوتا ہے کہ سانس لینے کے لیے کافی ہوا اس کو میسر نہیں ہوتی۔

خوراک : ۶x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

ماسکس : نہایت ہی تشویش اور بڑا سخت قدر اور دم گھٹنے کا احساس، یہ اس دوائی کی علامات ہیں۔ نہایت ذکی انھیں مریضوں کے لیے جو کہ عصبی مزاج کے ہوں اور جن کو تشویش اور آکسائیڈ انتہائی درجہ کی رہتی ہو، یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

بلاٹا اور نیٹالس : دمہ کی یہ ایک مشہور عالم دوائی ہے، خواہ مرض شدید ہو اور خواہ مزمن، ہر دو حالتوں میں یہ دوائی اکثر کیوں میں جادو نما اثر دکھلاتی ہے۔ خاص کر مضبوط مریضوں کے لیے یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے، مرض دمہ میں اس دوائی کو کبھی نہیں بھونا چاہیے۔

خوراک : جب مرض کا زور ہو، تو اس دوائی کے مدرٹکچر کے دو یا تین قطرے نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد دیتے ہیں اور مرض کی خفیف حالت میں دن میں تین یا چار مرتبہ یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔

جب مرض کا دورہ ختم ہو چکا ہو اور دوسرے دورے کے آغاز تک اس دوائی کی ۶x یا ۳۰ کی ایک یا دو خوراکیں یومیہ دیتے رہنا چاہیے۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ ہائی پریم۔ ایمبراگیشیا۔ لائیکو پوڈیم۔ کارپوویچی ہائیڈروسیانک ایسڈ، ڈرائرم اور کروٹننگ ادویات بھی اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

نوٹ : مزمن مرض میں بیسی لائیم ۳۰ یا ۲۰۰ کے تین یا چار قطرے ہفتہ میں ایک مرتبہ استعمال کرنے میں نہایت مفید ثابت ہوتے ہیں۔

ضروری ہدایات : جب مرض کا دورہ ہو۔ تو گرم پانی میں مریض کے

ہاتھ اور پاؤں ڈبونا، اکثر بہت جلدی آرام وہ ثابت ہوتا ہے، دورہ کے آغاز میں دھتورہ کے سگریٹ پینا بعض حالتوں میں جادو نما اثر دکھلاتے ہیں لیکن جن کیسوں میں ان کے پیئے سے آرام نہ ہو، ان کو ایکو نائٹ ۵ ملے ٹنکچر کے انجرات اندر لینے سے یقینی فائدہ ہوتا ہے۔ صدف۔ ٹرین ٹائن یا ٹنک کو گرم پانی میں ڈال کر ان کے انجرات لینے بھی مفید ہوتے ہیں، گرم گرم کافیہ (قہوہ) کا پینا جس میں دودھا اور شکر شامل نہ ہوں، بعض کیسوں میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ سانس کو اندر اور باہر روکنا جتنی دیر کہ وہ روکا جاسکے۔ اکثر تشنچ کو کم کرتا ہے۔ سخت کیسوں میں کلوروفارم کا سونگھانا بھی آرام دہ ہوتا ہے بلا ٹنک پیر (سیاہی پوس کاغذ) کے چند ٹکڑوں کو نائٹریٹ آف پوٹاش کے سولیوشن میں بھگو کر اوپر خشک کر کے ایک طشتری میں رکھ کر ان کو جلاتے ہیں اور مریض کو اس کی دھوٹی دیتے ہیں۔ اس سے بھی مرض کا حملہ رک جاتا ہے۔ یا مذکورہ بالا سیاہی پوس کاغذ کے ٹکڑوں کو جلا کر کمرے میں اس کا دھواں پھیلا دیتے ہیں اور اس میں سانس لینے سے مریض کو بہت جلدی آفاقہ ہو جاتا ہے تازہ ہوا کی آمد و رفت کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور کھڑکیاں روشن دان کھلے رہنے چاہئیں۔ اگر مریض کو قبض ہو تو گرم پانی اور صابن کی پچکاری کریں یا گلیسرین سپازی ٹری مقعد میں رکھیں۔ ایل نائٹریٹ کی تین چار بوندیں عدال پر ڈال کر سونگھانا بھی مفید ہوتا ہے۔ مریضان دمہ کو سرشام ہی رات کا کھانا کھالینا چاہیے۔ کیونکہ کھانا کھانے کے بعد جلدی ہو جانا مفید نہیں ہوتا۔ بلکہ تین چار گھنٹوں کے بعد سونا چاہیے۔ سردی سے محفوظ رہنا چاہیے اور گیلی جگہ پر نہ سونا چاہیے۔

ہر قسم کی نفیل اور نفخ پیدا کرنے والی اغذیہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پیٹ بھر کر بھی نہیں کھانا چاہیے جس غذا سے دورہ ہو جانا ہو۔ اس کو ترک کر دینا چاہیے۔

جب مرض گمردہ یا دل دمہ کا سبب ہو تو اس کا مناسب علاج کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اگر رحم یا خستہ الحسم کا کوئی عارضہ اس مرض کا باعث ہو تو اس کو دور کریں اور اسی طرح سے ناک کی بیماری وغیرہ اگر دمہ کا باعث ہو تو اس کا خاص خیال رکھیں، اگر کوئی خاص پیشہ یا کام اس بیماری کا موجب ہو تو اس کو ترک کر دیں۔

# شدید کھانسی - براؤنکائٹس

(ACUTE BRONCHITIS CHRONIC BRONCHITIS)

اس مرض میں پھیپھڑوں کی ہوائی نالیوں میں ورم نزلی ہو جاتا ہے۔ جب اس قسم کا ورم پھیپھڑوں میں ہوا کی نہایت چھوٹی چھوٹی نالیوں کے (جن کو انگریزی میں کلیری کہتے ہیں) اندر ہو جاوے تو اسے کلیری براؤنکائٹس (نہایت شدید کھانسی) کہتے ہیں۔

علاماتِ مرض : ۱۔ شدید کھانسی (ACUTE BRONCHITIS)

کے علامات حسب ذیل ہیں :-

ابتداء میں بخار، سر درد، کاہلی، تشویش، آواز کا بھدا پن، کھانسی، حرارت اور سینہ کی دھکن و دیگر ٹھنڈ کے علامات موجود ہوتے ہیں۔ شروع میں بلغم پیدا نہیں ہوتا لیکن بعد میں بہت پیدا ہونے لگ جاتا ہے۔ سینہ میں اور خاص کر بالائی حصہ میں جکڑن محسوس ہوتی ہے اور سانس تیز اور بو جھل آتا ہے اور اس میں سیٹی بجنے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ کھانسی نہایت شدید ہوتی ہے جو ابتداء میں خشک ہوتی ہے لیکن بعد ازاں اس میں لیس دار اور جھاگ والا بلغم نکلتا ہے۔ بعض اوقات خون آمیز ہوتا ہے۔ پھر بلغم موٹا، زرد اور پیپ نما ہو جاتا ہے لیکن اس کا رنگ زنگاری نہیں ہوتا جیسا کہ نمونہ میں ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے ہمراہ خون کی اس اکثر ملی ہوتی ہے نبض تیز لیکن کمزور ملتی ہے۔ حرارت جسم بڑھ جاتی ہے اور شدید کیوں میں ۱۰۵ درجہ تک ہو جاتی ہے۔ پیشانی اور آنکھیں دھکتی ہیں اور کھانسنے سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ زبان گندی ہوتی ہے اور پیشاب بمقدار خفیف اور گہری رنگت کا آتا ہے۔

رو بصحت ہونے کی حالت میں بیماری چوتھے اور آٹھویں یوم کے درمیان گھٹتی شروع ہو جاتی ہے۔ سانس ذرا آسانی سے آنے لگتا ہے اور بلغم زیادہ گارھا ہو جاتا ہے اور جھاگ آنی بند ہو جاتی ہے اور مریض تدریجاً صحت یاب ہوتا جاتا ہے۔

یا مرض مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب مرض مہلک ہو تو مریض ٹھنڈے پسینہ میں تر ہوتا رہتا ہے، اس کے رخسارے اور ہونٹ زرد اور نیلگوں ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے اور دم گھٹنے لگتا ہے اور بلغم آنا پیدا ہوتا ہے کہ مریض کے دم کو روک دیتا ہے۔ یہاں تک کہ مریض میں کھانسی کہ باہر نکلنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اسنو کار نہایت ضعف اور بے ہوشی کی حالت میں مریض رحلت کر جاتا ہے۔

۲۔ مزمن برانکائٹس یعنی مزمن کھانسی پیری میں زیادہ ہوا کرتی ہے معمولی کیسوں میں تھوڑی تھوڑی کھانسی ہوا کرتی ہے۔ سانس چھوٹا آتا ہے اور بلغم بکثرت نکلتا ہے۔ لیکن بخار بالکل نہیں ہوتا۔ بوڑھوں کو موسم سرما میں جو کھانسی ہوا کرتی ہے۔ وہ اسی مزمن برانکائٹس کا نمونہ ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات مزمن کھانسی شدید کھانسی میں تبدیل ہو جاتا کرتی ہے۔ خاص کر جب کہ مرض کا ٹھیک تدارک نہ کیا گیا ہو۔ بار بار کھانسنے کا نتیجہ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہوا کی نالیاں تن جاتی ہیں اور پھول کر ہوا بھر جاتی ہے اس مرض کو انگریزی میں رامفائیسی ما کہتے ہیں اور ہوا کی نالیوں میں گرہیں پڑ جاتے ہیں، مارے کھانسی کے مریض رات کو سو نہیں سکتا نیز سوتے وقت اور صبح اُٹھتے وقت کھانسی اور بھی زیادہ ہوا کرتی ہے۔

**اسباب مرض :** سردی لگنا، اس مرض کا عام سبب ہوا کرتا ہے۔ سرد ہوا، تیز آندھی، موسم کا یکا یک تبدیل ہو جانا۔ ناکانی پارچیاں، بولنے اور گانے کے بعد حلق اور گردن کا دیر تک سنکا رہنا وغیرہ۔ بعض پیشے بھی اس مرض کے پیدا کرنے کے سبب ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً بھوسہ جمع کرنے والے، سنگتراش، معمار، یاروئی مٹھنے والے وغیرہ بعض امراض مثلاً خسرہ، انفلو انزا، تپ محرقہ، وجع المفاصل، امراض قلب، آتشک، نقرس اور ویرینہ ورم گردہ کے باعث بھی کھانسی ہو جاتی ہے۔ کسی جلدی مرض کے یکا یک گم ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ مستورات میں خون حیض کا آتے آتے بند ہو جانا بھی اس مرض کے پیدا ہو جانے کا موجب ہوتا ہے۔ سگریٹ بھی اس مرضی کا باعث ہوتا ہے۔

## علاج

۱۔ شدید کھانسی (ایکویوٹ برانکائٹس) میں ایکونائٹ، اینٹیم

ٹارٹ۔ کالی بانی ٹرو میکس۔ برائی ادویا، فاسفورس، اپی کاک۔

۲۔ مزمن کھانسی : اینٹیم ٹارٹ (جب کہ بلغم بہت ہو) کالی بانی ٹرو میکس

(سخت لیسڈار بلغم) کاربوئیج یا آرسینکس (سخت تقابہت) امونیم کارب رنگاتار۔  
کھانسی، مرکوریس (ہیپ دار بلغم) سلشیا، فاسفورس، سلفر، کاکٹس، نائٹرک  
ایسڈ وغیرہ۔

۳۔ بچوں میں کھانسی : ایکونائٹ، فاسفورس، برائی ادویا۔ پلسٹا

(ترکھانسی) اپی کاک (تشنجی کھانسی) اینٹیم ٹارٹ (سینہ میں بلغم کا اجتماع)

۴ : مندرجہ ذیل ادویات بھی بعض اوقات کام آتی ہیں۔ بیلڈوونا۔ کونیم

سنی گا۔ سپہیا۔ آیوڈیم، اوپیم وغیرہ۔

## تشریح العلامات

ایکونائٹ : اس مرض کی ابتداء میں یہ دوا کام آتی ہے اور یہاں اس

دوائی کو دیگر اسی قسم کی ادویات سے امتیاز نہ کرنا لازمی ہوتا ہے، پسینہ کا آنے آتے

رُک جانا، ٹھنڈ لگنا۔ خشک سرد ہوا کے چھونکوں یا ٹھنڈ لگ کر زکام کا ہو جانا

چھینکوں کا بکثرت آنا، ٹھنڈک، بے آرام، خواب، بھری ہوئی سخت نبض اور

بے چینی و تشویش، یہ سب اس دوائی کی علاماتِ مخصوصہ ہیں۔

جب مذکورہ بالا اسباب و علامات موجود ہو تو ایکونائٹ مؤثر ہوا کرتی ہے

لیکن عام طور پر معالج کو اسی وقت طلب کیا جاتا ہے جب کہ یہ ابتدائی علامات

گزر چکی ہوں۔ ایکونائٹ محض اسی وقت کارآمد ہوتی ہے جب کہ دم کسی

خاص جگہ پر مقامی نہ ہو گئی ہو گئی ہو۔ ڈاکٹر پوپ صاحب فرماتے ہیں کہ ایکونائٹ

کے دینے سے اکثر اوقات برانکائٹس کا دورہ کمی میں ہو جاتا ہے۔

اگر مریض کو کابل اور جسمانی کمزوری بہت ہو اور نبض بھری ہوئی رواں چلتی ہو



اور اجتماعِ خون بھی کم ہو تو ایکونائٹ کے بعد مجلسی میم کی باری آتی ہے۔ بعض اوقات یہ تجویز کرنا کہ کونسی دوائی ان دونوں میں سے دی جائے مشکل ہوا کرتا ہے۔

فیرم فاس کو بھی خیال میں رکھنا چاہیے۔ خاص کر بچوں کی شدید کھانسی میں یہ مرض جلدی روک دیتی ہے، فیرم فاس کا درجہ ایکونائٹ اور مجلسی میم کے بین بین ہوتا ہے۔ اس میں ایکونائٹ کی نسبت بے چینی اور تنگی ہوئی نبض کم ہوتی ہے اور مجلسی میم کی نسبت غنودگی اور روانِ نبض بھی کم ہوتی ہے۔ یہ دوائی اس وقت زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ جب کہ ہر تھوڑی گھنٹہ بھی تکلیف زیادہ کر دیتی ہو۔ کھانسی چھوٹی چھوٹی اور خشک آتی ہو۔ پھیپھڑوں میں دھکن ہو اور سانس بوجھل آتا ہو۔

دراثرم ورائیڈ شدید کیسوں میں کام آتی ہے۔ جب کہ ابتداء میں حرارت بخار بہت تیز ہو۔ نبض بھری ہوئی سخت اور تیز چلتی ہو اور مریض کے جسم پر ہاتھ لگانے سے بڑی گرمی محسوس ہوتی ہو۔

ایکونائٹ اور دراثرم ورائیڈ میں یہ فرق ہے کہ ایکونائٹ کی مانند بے چینی اور تشویش و رائیڈ میں موجود نہیں ہوتی۔

خوراک: ۲x یا ۳x ہر پندرہ منٹ یا نصف گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا: شدید کھانسی بھی برا نکائیٹس کے ہمراہ شدید بخار۔ چھوٹی خشک لگاتار اور تکلیف دہ کھانسی جو کہ رات کو لیٹنے پر زیادہ ہو، سانس بے قاعدہ اور تیز چلتا ہو۔ بغم نہ آتی ہو اور اگر تھوڑی بہت آتی بھی ہو تو بعض اوقات اس میں خون کی لہر موجود ہوتی ہو۔ سینہ پرہ اور بدون درد کے ہو۔ اگرچہ بچہ کھانسی بہت چلاتا ہی کیوں نہ ہو، جلد جسم گرم اور تیزی پر ہو۔ ایکونائٹ یا دراثرم ورائیڈ کی مانند خشک ہو۔ غنودگی کی طرف طبیعت راغب رہتی ہو۔ مریض سوتا نہ ہو لیکن نیم خوابی میں اٹکھیں لیتا ہو اور اکثر چونک اٹھتا ہو جب کھانسی تشنجی ہو اور بچہ ہر دورہ کے بعد چلاتا ہو تو پہلے بیلادونا کو آزما لو۔ پھر اگر ضرورت ہو تو دوسری دوائی کی طرف توجہ کر دو۔

خوراک: ۱x یا ۳x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا: اگرچہ اس دوائی کا استعمال برا نکائیٹس میں اکثر کیا جاتا ہے

لیکن منظر یہ گاہے گاہے ہوتی ہے، جب کھانسی بہت شدید ہو اور کھانسنے سے سر اور جسم کے دور دور کے حصے دھکتے ہوں، کھانستے وقت مریض اپنے ہاتھوں سے سینہ کو دبائے رکھتا ہو۔ تاکہ درد کا آرام رہے، سینہ کی ہڈی پر بہت دباؤ ہو۔ کوتاہ دمی ہو اور خشک کھانسی ہو اور کھانسی معدہ سے اٹھتی ہوئی معلوم ہوتی ہو۔ کھانسنے کے بعد کھانسی زیادہ ہوتی ہو اور تھوک نہ نکلتا ہو یا بہت کم نکلتا ہو، ہوا کی بڑی نالیوں میں خراش کی وجہ سے کھانسی پیدا ہوتی ہو اور ہوا کی نالی اور سینہ کئی مقامات پر دھکتا ہو۔ جب پہلوؤں میں چھین کی دریں ہوتی ہوں، تو یہ برائی اونیا کی ایک بڑی بھاری علامت ہوا کرتی ہے۔ ٹھنڈی ہوا سے جب مریض گرم کمرے میں جاتا ہو تو کھانسی زیادہ پیدا ہوتی ہو۔

ڈاکٹر ہوگلز فرماتے ہیں کہ جب سینہ کو ٹھنڈ لگ جائے تو ایکونائیٹ کے بعد برائی اونیا ایک نہایت ہی بڑھیا دوائی ہے۔ جب کھانسی تر ہو جائے، بلغم بکثرت موٹا اور پیپ آمیز خارج ہوتا ہو تو پٹلا دوائی مفید ہوتی ہے لیکن اگر آبکائیاں اور قیئیں ساتھ آتی ہوں تو اپنی کاک دینی چاہیے۔ اگر مریض کا جگر ماؤف ہو اور اس کو خسرہ یا کالی کھانسی کے بعد برانکائیٹس کا حملہ ہو جائے تو چیلی ڈونیم دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : یہ دوائی نازل مزاج لیے، پتلے، سلی مزاج کے مریضوں کے لیے خاص کر موزوں ہوتی ہے۔ جب کہ مرض کا زور زیادہ نہ ہو اور کہیں لمبا ہو چکا ہو۔ کھانسی دورہ کے ساتھ ہوتی ہو اور سینہ کی ہڈی کے زیرین درد ہوتا ہو۔ سینہ کے اوپر کے حصہ میں دم گھٹنے کا دباؤ ہو اور ساتھ ہی حلق میں کھچاؤٹا آواز بھڑکی اور بلغم ہوا کی نالیوں میں کھڑکھڑاتا ہو۔ خون آمیز یا پیپ دار تھوک آتی ہو جس کا ذائقہ نکبین یا میٹھا ہو۔ سو کر اٹھنے کے بعد مریض کی حالت اچھی ہو۔ سانس تنگی سے آتا ہو اور نونیا کا ڈر ہو۔

رومیکیس : میں سینہ کی ہڈی کے اوپر گڑھا ہوتا ہے۔ اس میں خراش ہوتی ہے اور سانس میں ذرا سی تبدیلی آنے سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ کھانسی کو

روکنے کے لیے مریض کو گرم ہوا میں سانس لینا پڑتا ہے۔ فاسفورس میں کھانسی کھانے کے بعد زیادہ ہوتی ہے اور اس کی بھاری علامت سینہ میں دکھن کا ہونا ہے کھلی ہوا میں جانے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات برائی دنیا کے برعکس ہے گفتگو کرنے یا آواز نکالنے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف: جب کھانسی تر ہو جائے اور بلغم کھڑکھڑ کرے، تھکاوٹ محسوس ہو اور دم گھٹے تو یہ دوائی کام آتی ہے۔ ہیپر سلف کی یہ قیمتی علامت ہے کہ کھانستے کھانستے مریض کام گھٹتا ہے اور غوطہ آتا ہے۔ مرض کا زور جب کم ہوتا ہے تو یہ دوائی کام آتی ہے۔

خوراک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی کار بوسکم: جب پھیپڑوں کی نہایت چھوٹی نالیوں میں شدید کھانسی ہوتی ہو اور کوتاہ دمی و غوطہ والی کھانسی کے ساتھ سینہ میں تیز چبھن کی دویں ہوتی ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک: ۶x یا ۱۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس: یہ دوائی درمی حالت میں کام آتی ہے، جب کہ ہوا کی نالیوں میں سوزش ہو اور نزلہ سینہ میں گوتا ہو۔ حلق سے لے کر سینہ کے درمیان تک تمام جگہ دکھتی ہو۔ خشک لگاتار کھانسی ہوتی ہو، جو کہ مریض کو بہت کمزور کر دیتی ہو، تھوک پتلی پانی کی مانند یا رالیں یا زرد پیپ دار بلغم نکلتا ہو۔ بخار ہو اور کبھی ٹھنڈ لگتی ہو اور کبھی گرمی۔ ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہتا ہو۔ لیکن سرد اشیا پینے سے کھانسی زیادہ ہوتی ہو۔ لیس دار سپینہ آتا ہو اور سپینہ آنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کالی بائی کرومیکم: سخت لیس دار بلغم نکلتا ہو اور بلغم کو اگر کھینچا جائے تو لمبی رسی بن جاتی ہو۔

ڈاکٹر میوگس کا فرمان ہے کہ جب مرض کا دورہ لمبا ہو جائے تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ نیز جب بلغم کا رنگ نیلا ہو اور بوقت صبح کھانسی زیادہ تکلیف دہ

ہو اور معدہ میں کسادٹ ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اینٹیم ٹارٹ : یہ دوائی برانکائٹس کے ابتدا اور نیز مرض کے آخری درجہ میں کام آتی ہے، چھوٹے بچوں یا بوڑھوں کی شدید کھانسی میں نہایت مفید ہوتی ہے۔ سینہ میں سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا ہوتی ہو اور بلغم کھڑکتا ہو لیکن باہر نہ نکلتا ہو۔ بچہ غنودگی میں پڑا رہتا ہو اور سانس لینے کے لیے بہت کوشش کرتا ہو اور کھایا پیا تھے کر چھوڑتا ہو۔

خوراک : ۳ x یا ۶ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اپی کاک : بلغم سینہ میں کھڑکتا ہو اور کھانسی بہت ہو مریض بلغم تھوڑا خارج کرتا ہو۔ شیرخوار بچوں کی شدید کھانسی میں یہ ایک بہت بڑھا دوائی ہے۔ اپی کاک اور اینٹیم ٹارٹ میں یہ فرق ہے کہ اینٹیم ٹارٹ کا مریض بہت کم درموا کرتا ہے لیکن اپی کاک میں ایسی حالت نہیں ہوتی۔ تشنجی کھانسی ہو۔ بلغم کا اجتماع بہت ہو۔ ابکائیاں اور قبض آتی ہوں اور سانس لینے میں تکلیف ہو۔ اپی کاک دینے سے بلغم تپلا پڑ جاتا ہے اور آسانی سے باہر نکل آتا ہے۔ براؤن کاک کی بھی یہ علامت ہے کہ بلغم سینہ میں بہت کھڑکھڑکتا ہے۔ لیکن مریض اس کو باہر نہیں نکال سکتا۔ مونیم کاسٹی کم میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے کہ کھانسی لگاتار ہوتی ہے اور پھیپھڑوں میں بلغم جمع ہو جاتا ہے۔

ڈاکٹر گوڈون صاحب فرماتے ہیں کہ جب بلغم بہت بزرگ زرد اور پیپنا خارج ہوتا ہو تو انٹی مونیم آیوڈیم مفید ہوتی ہے۔ انٹی مونیم آسینکم بھی ایک نہایت مفید دوائی ہے اور جب کھانسی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہو تو یہ دوائی دی جاتی ہے۔

خوراک : ۳ x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : جب برانکائٹس کا مرض پُرانا ہو گیا ہو اور خطرناک صورت اختیار کر چکا ہو۔ یہ دوائی بعض اوقات شاندار نتائج پیدا کرتی ہے بلغم بکثرت موٹا پیپ نما خارج ہوتا ہو اور دم گھٹنے والی کھانسی ہو۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
بالسم پیرو : ہر روز کائٹل نزلہ میں جب کہ بلغم بکثرت پیپ نا اور بہ آواز بلند  
نکلتا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
بیسی لائینم : جب مریض کو بار بار ٹھنڈ لگتی ہو۔ ابھی ایک حملہ ختم نہ ہونے  
پایا ہو کہ دوسرا آگھیرتا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳۰ یا ۲۰۰ دن میں ایک یا دو مرتبہ۔  
کاربووہی : پیری کی کھانسی میں یہ دوائی نافع ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ بلغم  
بکثرت زرد اور بدبو دار نکلتا ہو، کوتاہ دمی ہو اور سینہ میں بلغم بہت کھڑکتا ہو اور  
جھلنی ہوتی ہو۔ بڑھاپے کی کھانسی تکلیف دہ ہو اور بلغم چمٹ جاتا ہو۔ مریض سانس  
لیتے وقت یا ہلنے چلنے پر سینہ میں درد کی شکایت کرتا ہو۔

خوراک : ۶x یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔  
سلا : مزمن کھانسی میں جب کہ سینہ میں چھین پڑتی ہو۔ بلغم شفاف یا  
سپ نا نکلتا ہو۔ بعض اوقات آسانی اور بعض اوقات تکلیف سے  
بخارج ہوتا ہو۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے آر سینکم، لکس۔ نکس و امیکا۔ رٹاکس  
ڈلکامار۔ وراٹرم ایلیم ادویات بھی اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں  
کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات : شدید کھانسی میں غذا ہلکی اور سیال ہونی چاہیے  
مثلاً آش جو۔ دلیا۔ مونگ کی دھوئی ہوئی دال یا پنچنی وغیرہ مرض کے اصل  
سبب کو رفع کرنا چاہیے اور مریض کو مناسب آب و ہوا میں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی  
مریض اس قسم کا کام کرتا ہو کہ جس سے وہ گرم سرد ہو جاتا ہو۔ یا خراش دار ذرات و  
انجرات اس کی ہوائی نالیوں میں جا کر خراش پیدا کرتے ہوں تو اس کو ایسا کام چھوڑ دینا  
چاہیے اور کوئی دوسرا کام اختیار کرنا چاہیے۔ چونکہ سردی کے موسم میں کھانسی اکثر

ہوا کرتی ہے۔ اس لیے مریض کو حتیٰ الامکان سردی سے بچنا چاہیے۔ سرد پانی اور سرد غذا سے پرہیز اور گرم کپڑے پہننے چاہئیں، ایسے مریض کو خشک گرم آب دہوا میں رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اگر مریض کو معمولی سردی لگنے سے بھی کھانسی ہو جایا کرتی ہو تو اس کو چاہیے کہ بعد از غروب آفتاب اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر سینہ میں جکڑن محسوس ہو یا سانس وقت سے آتا ہو، تو ایسی حالت میں سینہ پر سینک دینا یا گرم گرم پلٹس باندھنا مفید ہوتا ہے۔ اور جب سینہ میں درد ہوتا ہو تو ماؤف مقام پر ٹشکر آیوڈین لگانا یا تارپین کے تیل کی مالش کرنا مفید ہوتا ہے۔ پرانی کھانسی کے مریضوں کو لازم ہے کہ بوقت صبح ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کیا کریں، جن مردوں کو موسم کی یکایک تبدیلی فوراً اثر کر جاتی ہو۔ ان کو لمبی وارڈھی رکھنی مفید ہوتی ہے۔ سگریٹ سے پرہیز لازم ہے۔ یہ سرطان پیدا کرتا ہے۔



## دردِ سینہ۔ فاسدِ لوپوری سوات الجنب غیر خالص

(PLEURODYNIA)

اس مرض میں سینہ کے عضلات میں درد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ مرض فقرس کی قسم میں سے ہے، اکثر سینہ کی ایک طرف درد ہوا کرتا ہے۔ گہرا سانس لینے اور سینہ کو حرکت دینے سے درد زیادہ ہوتا ہے۔

### علاج

اس مرض کی مشہور ادویات برائی اوینا، نکس فامیکا، سمی سی فیوگا۔ رن کیوس، لمبوسن، کالچی کم، آرنیکا اور پلٹلا ہیں۔

### تشریح العلامات

برائی اوینا، جب حرکت کرنے اور باہر سانس نکالتے وقت درد زیادہ

ہو اور سینہ کے اوپر دبانے سے آرام ہو اور خصوصاً ماؤف پہلو کے بل لیٹنے سے افاقہ ہو۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا: جب مریض ماؤف پہلو کے بل لیٹ نہ سکتا ہو۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

سمی سی فینوگا: یہ دوائی مستورات میں خصوصاً نافع ہوتی ہے۔ جب کہ نقابہت مجددہ سے شروع ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

لے ن کیو لیس بلوسمس: جب درد نہایت سخت ہو اور مارے درد کے مریض حرکت نہ کر سکتا ہو۔ دروین حرکت کرنے سے درد دبانے سے زیادہ ہوں۔ جب سینہ کی دائیں جانب میں درد ہو تو یہ دوائی اور بھی زیادہ موثر ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

کالچیک کم: نقرس کی یہ خاص دوائی ہے۔ اس لیے اس مرض میں بھی یہ نافع ہوتی ہے۔ جب کہ مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں۔ بھال مارنے کی سی اور پھاڑنے والی دروین ہوں۔ حرکت کرنے، سانس لینے اور دبانے سے تکلیف زیادہ ہو۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

آرنیکا: دروین چوٹ آنے کی مانند ہوتی ہوں۔ حرکت کرنے اور دبانے سے زیادہ ہوں۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا: حرکت کرنے سے اور ماؤف پہلو کے بل لیٹنے سے دروین کا افاقہ

ہوتا ہو۔

خوراک: ۱۰ یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات: جبے ماؤف پر گرم گرم پٹس باندھیں یا فلاپس

کے ٹکڑے کو گرم پانی میں بھگو کر اور بخور کر ماؤف مقام پر رکھیں اور ٹکڑے کریں۔

غذا: ہلکی اور زود ہضم کھائیں۔

# کھانسی

(COUGH)

کھانسی کی وجہ دراصل ہوا کی نالیوں کی لعاب دار جھلی کی سوزش ہے، لیکن عام طور پر معمولی کھانسی کئی ایک دیگر وجوہات سے بھی ہو جاتی ہے۔ مختلف علامات کے لحاظ سے اس مرض کے چند اقسام ہیں:-

WINTER COUGH

## ۱۔ سردی کی کھانسی

اس قسم کی کھانسی موسم سرما میں عموماً بوڑھے اشخاص کو ہو جایا کرتی ہے اور چند روزہ کر خود بخود معدوم ہو جاتی ہے لیکن کبھی بد پرہیزی کی وجہ سے یہ مدامی ہو جاتی ہے اور جب موسم سرما آتا ہے تو زیادہ ہو جایا کرتی ہے۔

DRY BRONCHITIS

## ۲۔ خشک کھانسی :

اس قسم کی کھانسی میں یا تو بلغم بالکل ہی نہیں نکلتا اور اگر نکلتا ہے تو بہت ہی کم۔

BRONCHORREA

## ۳۔ بہت بلغم والی کھانسی :

اس قسم کی کھانسی میں پیلا لیسڈار اور چمکیلا بلغمی مادہ بکثرت خارج ہوتا ہے۔ اسباب : گرد و غبار و دھواں، بعض امراض قلب، امراض گردہ، جوڑوں کا درد، سہل، آتشک وغیرہ یہ اس مرض کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ سردی کے نزل میں یہ مرض کئی ایک اشخاص کو اور خصوصاً بوڑھوں کو ہو جاتا ہے۔

## علاج

ایکونائیٹ : خشک کھانسی جو ٹھنڈی اور خشک ہوا لگنے کی وجہ سے پیدا ہوئی



ہو۔ رات کو زیادہ پیاس اور ساتھ ہی زیادہ بے چینی بھی ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم : کھانسی خشک ہو اور زیادتی رات کے وقت ہو۔ چھاتی گھٹی ہوئی معلوم ہو۔ کھانسی کی وجہ سے مریض بند سے جھٹ جاگ اٹھتا ہو۔ گھبراہٹ ہو۔ بے چینی پیاس لیکن تھوڑا تھوڑا پانی پیا جائے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیر یا کارب : کھانسی کے ساتھ ہی گلے میں خراش سی معلوم ہو۔ گویا کہ رسی جانور کا پر اٹکا ہوا ہے، یا حلق میں مٹی لگ گئی ہے خوراک کھانے یا پانی پینے کے بعد کھانسی زیادہ ہو۔ ذریعہ پھینکنے پر سانس پھول جائے اور دم لینے کے لیے بیٹھنا پڑے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : آواز بھاری گلے میں خشکی۔ گلے میں کچھ رینگتا ہوا معلوم ہو۔ سینہ میں دھکن۔ سینہ میں بغم کی غرغراہٹ رات کے وقت زیادہ بہت سی بغم خارج ہو۔ بے پتے آدمی جو جھک کر چلیں، اُن کے لیے خاص کو مفید ہے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی کارب : کھانسی کے ساتھ چھاتی گھٹی ہوئی معلوم ہو۔ زیادتی نمواریات کے دو یا تین بجے ہوا کرتی ہے۔ کھانسی کے ساتھ چھاتی میں درد اور چھین۔

خوراک : ۳x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

برائی اوٹیا : خشک کھانسی، صبح جانے کے بعد یا بسترے پر سے اٹھنے کے بعد یا حرکت کرنے سے زیادہ ہو، ابتداء میں تھوڑی بغم نکلے۔ لیکن بعد ازاں کھانسی بالکل خشک ہو۔ گرم کمرے کے اندر داخل ہونے سے کھانسی زیادہ ہو۔

خوراک : ۱۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : خشک کھانسی رات کو زیادہ ہو، سونے سے جگا دے۔ سینہ

میں دھکن پختے کھانتے وقت رونے لگیں، چہرہ گرم اور سرخ ہو، ایسا معلوم ہو کہ حلق میں گرد پھر گئی ہے۔ جس کی وجہ سے گلے میں سرسراہٹ پیدا ہو۔ گہرا سانس لینے

سے زیادتی ہو، سانس میں دقت ہو۔

خوراک: ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سائنہ: خشک کھانسی جو جھٹکوں میں ہو یا نگاتا رباری رہے، ایسے بچوں کو جنہیں پیٹ کے کیڑوں کی شکایت ہو، بچہ ہمیشہ ناک کو انگلی سے کھجواتا رہتا ہو۔  
پیشاب سفید ہو۔

خوراک: ۱x یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لاکس: خشک کھانسی، لیکن ساتھ ہی ایسا معلوم ہو کہ بلغم خارج ہو، یا بلغم تھوڑا اوپر آتا ہو اور پھر واپس چلا جاتا ہو۔ زترے میں خراش سی ہو اور ذرا سا دباؤ پڑنے سے زور کے ساتھ کھانسی اُٹھے اور دم گھٹنے لگے، مریضہ گلے کے بٹن کھول دیتی ہے کیونکہ ذرا سے دباؤ سے کھانسی ہونے لگتی ہے۔ سوکراٹھنے کے بعد زیادتی ہو۔ گلے کے غدودوں کی مزمن سوزش ہو۔

خوراک: ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس: جب کھانسی کے ساتھ منویا بھی ہو یا عموماً ایسی خشک کھانسی جو گلے یا سینہ میں خراش کی وجہ سے پیدا ہو۔ پڑھنے بولنے، ہنسنے یا پانی پینے سے تکلیف زیادہ ہو جائے شام کے وقت سینہ کسا ہوا معلوم ہو۔ جن مریضوں کا رجحان تپدق کی طرف ہو۔ ان کو یہ دوائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کاسٹی کم: جب کھانسی کے ساتھ پیشاب بھی خارج ہو جائے کھانسی عموماً صبح کے وقت زیادہ ہو۔ ٹھنڈا پانی پینے سے آرام ہو۔ سینہ میں کسادٹ اور تناؤ محسوس ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ریو میکس: تشنجی کھانسی جس میں بلغم مشکل کے ساتھ خارج ہوتی ہو۔ سینہ کی ہڈی اور ٹریکیا کے مقام پر دھکن سی محسوس ہو اور زیادتی ٹھنڈی ہوا سے پیدا ہو جاتی ہو۔  
خوراک: ۱x یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پسٹلا: خشک کھانسی کا حملہ رات کے وقت ہو۔ مریض جب بستر پر

اُٹھ کر بیٹھے تو کم ہو جائے لیکن لیٹنے پر پھر زیادہ ہو۔ کھانسی دن میں ترا و رات کو خشک یا تر کھانسی ہیں میں زرد یا سفید رنگ کا بلغم نکلے۔ شام کے بعد تکلیف بڑھتی نہ دیر ہو جاتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : خشک کھانسی جس کے ساتھ سخت درد بھی ہو اور ایسا معلوم ہو کہ سر کی کھوپڑی بوجہ درد پھٹ جائے گی۔ پاخانہ کی ذرفع ہونے والی حاجت بنی رہتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کاربووہی : بوڑھے آدمیوں کی کھانسی جن کے ناخن نیلے پڑ گئے ہوں اور ٹانگیں ٹھنڈی رہتی ہوں۔ مزمن کھانسی بوجہ کمزوری بلغم خارج نہ ہو سکتا ہو۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو رفع کرنا چاہیے۔ اگر مریض کوئی ایسا کام یا پیشہ کرتا ہو کہ جس سے خراشدار انجرات یا ذرات اس کی ہوائی نالیوں میں جا کر خراش پیدا کرتے ہیں۔ تو مریض کو یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام اختیار کر لینا چاہیے۔ سردی سے مریض کو محفوظ رکھیں۔ ہاضمہ کا خیال رکھیں اور قبض نہ ہونے دیں اور مریض کو مناسب آب و ہوا میں رہنا چاہیے جو کہ اس کی طبیعت کے موافق ہو۔ سگریٹ سے پرہیز لازم ہے ورنہ کینسر (سرطان) لاحق ہو سکتا ہے۔

## باب دوازدہم

## امراض قلب یعنی دل کے امراض

(AFFECTIONS OF THE HEART)

## دل کے غلاف کی سوجن ورم حجاب القلب

(PERICARDITIS)

وجع المفاصل اور گٹھیا زیادہ تر اس مرض کے اسباب ہوا کرتے ہیں یعنی گٹھیا  
نے باعث دل کے غلاف میں اکثر سوجن ہو جایا کرتی ہے اور بعض اوقات  
تپ محرقہ یا عفونتی بخار یا سہل یا سرطان یا ورم گودہ وغیرہ اس کے اسباب ہوا  
کرتے ہیں۔

**علامات مرض:** دل کے مقام پر درد اور دل دھڑکن اس کی علامات ہیں  
سینہ جکڑا ہوا اور سانس لینے میں تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ مرض کے  
ابتدا میں گاہے بخار کی شکایت بھی ہو جایا کرتی ہے اور بعض اوقات سردرد  
تشنج یا بے ہوشی وغیرہ میں سے کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے۔

## علاج

ایکونائٹ - برائی اوینا - سپائی جلیا - ڈیجی ٹیس - کالجیکم - وراٹرم  
ورائیڈ - لاکس اور ناجا وغیرہ کام آتی ہیں۔

ادویات کی علامات کی تشریح آگے کی گئی ہے۔ دیکھئے صفحہ ۶۴۸ تا ۶۵۲

# دل کی اندرونی جھٹکی کی سوچن

## (ENDOCARDITIS)

اس مرض میں دل کی اندرونی جھٹکی متورم ہو جاتی ہے۔

**علامات مرض :** اس مرض کی بھی وہی علامات ہیں جو کہ ورم حجاب القلب کے بیان میں درج کی گئی ہیں۔ یعنی دل کا دھڑکنا، سر درد، بے ہوشی اور کھینچ و غیرہ۔ مریض صفت محسوس کرتا ہے۔ مقام قلب پر درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ گھبراہٹ حد درجہ بڑھ جاتی ہے اور بخار بھی ساتھ ہوتا ہے سانس لیتے وقت بہت تکلیف ہوتی ہے اور سر و پسینہ آتا ہے اور کبھی مریض پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض :** اس مرض کے بھی وہی اسباب ہیں جو کہ ورم حجاب القلب کے یعنی وجع المفاصل اور عفونتی بخار وغیرہ بعض اوقات زیادہ زور کا کام کرنے یا بوجھ اٹھانے سے دل پر بہت زور پڑتا ہے۔ ایسی حالت میں اس مرض کے ہو جانے کا امکان ہوتا ہے۔

## علاج

اس میں بھی تقریباً وہی ادویات کا سامدہ ہیں جو کہ دل کے غلاف کی سوچن میں کام آتی ہیں۔ مفصل تشریح آگے کی گئی ہے۔ دیکھئے صفحہ ۶۴۸ تا ۶۵۳

# دل کی سوچن۔ ورم قلب

(MYOCARDITIS)

اس مرض میں مقام دل پر بوجھ اور درد ہوتا ہے اور بے چینی محسوس ہوتی

ہے۔ دل اپنا کام بخوبی سرانجام نہیں دے سکتا کیونکہ بوجہ درم اس کے فعل میں خلل واقع ہوتا ہے۔ بخار، بے ہوشی اور سخت نقاہت ہو جایا کرتے ہیں یہ امراض اکثر ہلک ثابت ہوتا ہے۔

## علاج

دل کے غلات کی سوچ میں جن ادویات کا ذکر کیا گیا ہے وہی ادویات یہاں بھی کام آتی ہیں مفصل تشریح مندرجہ ذیل ہے۔

## تشریح العلامات الادویات

ڈیجی ٹیلیس - امراض دل میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے اور مرض دل کا شاید ہی کوئی مریض ہوگا کہ جس کو ڈیجی ٹیلیس کی ضرورت نہ پڑتی ہو لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس دوائی کا استعمال بعض اوقات اندھا دھند کیا جاتا ہے اس کی علامات خاص ہیں جو کہ مختصر نیچے درج کیے جاتے ہیں۔

نخیف محنت سے نبض تیز چلتی ہو لیکن کمزور چلتی ہو۔ یعنی نبض تیز، بے قاعدہ اور رُک رُک کر چلتی ہو۔ نبض کا بے قاعدہ اور رُک رُک کر چلنا ڈیجی ٹیلیس کی خاص علامت ہے۔ ایسا معلوم ہو کہ دل میں خون ساکن ہو گیا ہے۔ بایاں بازو کمزور اور سن ہو اور جلد جسم کا رنگ نیلگوں ہو گیا ہو، مریض کو یہ خوف رہتا ہو کہ اگر اس نے ذرا حرکت کی تو دل اپنا فعل بند کر دے گا۔ سینہ میں ایک قسم کی بے چینی رہتی ہو۔

جلیسی میم میں اس کے برعکس علامت پائی جاتی ہے۔ مریض سوتے سوتے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل ٹھہر جائے گا۔ اس لیے وہ حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے تاکہ حرکت کرنے سے دل کی حرکت قائم رہے۔ امراض دل میں بایں بازو کا سن ہونا اور بھی کئی ایک ادویات کی علامت ہے۔ مثلاً اکیونائیٹ - کلیمیا - رٹاکس اور پیلٹا کی - ڈیجی ٹیلیس کو استعمال کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیجی ٹیلیس کی اور بھی کئی علامات ہیں۔ مثلاً

بے خوابی، خوف، گہرا سانس لینا، تنفس کی رفتار سست، خشک کھانسی، دم گھٹنے والے دورے، جب امراضِ دل کے باعث استسقاء عامہ ہو۔ نبض کمزور اور پیشاب تھوڑا آتا ہو۔ عضلاتِ دل کے ورم ہیں ڈیجیٹالس بہت کارآمد دوائی ہے یعنی جب کہ یکایک ورمِ قلب یا قلب کی اندرونی جھلی کی سوچن کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو اور نیز مذکورہ بالا علامات ڈیجیٹالس کی موجود ہوں۔ ڈیجیٹالس کے استعمال سے جو ظاہر فائدہ نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دل کا فعل درست ہو جاتا ہے اور پیشاب بھی زیادہ مقدار میں آتا ہے۔

خوراک : ۱ یا ۲ کے تین قطرے ہر چار گھنٹے کے بعد۔

کاکٹس گوینڈی فلورس : امراضِ دل میں ڈیجیٹالس سے اتر کر دوسری دوائی کاکٹس ہے۔ اس کی مشہور مخصوص علامت یہ ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل لوہے کے بند میں جکڑا ہوا ہے۔ جو کہ کبھی ڈھیلا ہوتا ہے اور کبھی کسا جاتا ہے، یہ علامت مریض کے دل کی ہر وقت موجود رہتی ہو۔ دیگر علامات یہ ہیں، سینہ میں دھکن اور کھچاؤٹ، دروین بائیں بائیں گولی مارنے کی سی ہوتی ہوں۔ نبض تیز اور سخت چلتی ہو۔ ورمِ قلب یعنی دل کی سوچن اور ورمِ حجابِ القلب یعنی دل کے غلاف کی سوچن میں یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے دل کی وجع المفاصل دردوں میں یہ دوائی زیادہ تر موثر ہوتی ہے، اس دوائی کے استعمال سے ورم کم ہو جاتا ہے اور دل کا فعل مضبوط ہو جاتا ہے۔

دردِ دل یعنی وجع القلب کے عارضہ میں کاکٹس مفید ہوتی ہے۔ یہ دوائی سخت دل کی دھڑکن میں بھی کام آتی ہے۔

خوراک : ۱ یا ۲ کے چار قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد۔

کلمیا لیٹی فولیا : یہ دوائی دل کے بڑھ جانے کی شکایت میں خصوصاً وجع المفاصل کے بعد کارآمد ہوتی ہے۔ امراضِ دل میں اس کی علامت مخصوصہ بائیں بازو کا سن ہو جانا ہے۔ دل میں درد تشویش، کسی قدر کوتاہ دمی، دل کی دھڑکن اور معدہ کی طرف سے دل کی جانب دباؤ۔ یہ اس کی علامات ہیں، دل کا فعل بے قاعدہ ہو اور برقیسری یا چوتھی بیٹ (BEAT) رک جاتی ہے۔ گولی

مارنے کی سی درویں سینہ میں سے کندھے کی ہڈی تک جاتی ہوں۔ جب مقامِ دل پر خارجی ادویات استعمال کرنے سے دروِ دل دب گیا ہو۔ اور دیگر امراضِ قلب پیدا ہو گئے ہوں تو کلیا نہایت اعلیٰ دوائی ثابت ہوتی ہے۔ کلیا میں بھی نبض کی رفتار تسست ہوتی ہے۔ لیکن اتنی تسست نہیں ہوتی۔ جتنی کہ ڈبچہ نیلیں میں شدید وجعِ القلب کی کلیا ایک خاص دوائی ہے۔

خوراک: ۵ کے پانچ قطرے ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

سپائی جیلیا: دروِ دل کی یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ درمِ قلب اور درمِ حجابِ القلب میں یہ دوائی سب ادویات کی سرتاج دوائی ہے۔ گولی مارنے کی سی درویں۔ دل کی جانب سے کمر میں جاتی ہوں یا دل سے بازو اور سینہ کے اوپر اور ریڑھ کی ہڈی کے نیچے تک جاتی ہوں، بازو کی یا جسم کی تھوڑی سی حرکت سے بھی دھڑکن بڑھ جاتی ہو، مقامِ دل پر ہاتھ رکھنے سے غرض کی آواز محسوس ہوتی ہو۔ نبض رُک رُک کر چلتی ہو اور دل کی بیٹ کے مطابق نہ چلتی ہو۔ بازو یا ہاتھوں کو تھوڑی سی حرکت دینے سے بھی مریض کو بہت تکلیف ہوتی ہو۔ جب دل میں عصبی درویں ہوتی ہوں تو سپائی جیلیا ایک بہتر دوائی ثابت ہوتی ہے۔

دل کی اندونی جھٹکی کی سوجن میں سپائی جیلیا ایک شافی دوائی ہوتی ہے اور دروِ دل میں یہ نہایت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ یا ۱۰ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

سیمی سی فیوگا: امراضِ دل میں یہ دوائی بھی اکثر کام آتی ہے، پیشانی پر سرد روکا ہونا یا ایسا محسوس ہونا کہ سر کی چوٹی اُڑ جائے گی۔ یہ اس کی علامت ہے۔ بائیں پستان کے زیریں اور نیزائیں بازو میں درد ہونا یہ بھی اس کی علامت ہے۔

خوراک: ۵ کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائیٹ: جو امراضِ دل میں خاص اثر رکھتی ہیں ان میں سے ایک دوائی ایکونائیٹ بھی ہے۔ بائیں بازو کا سُن ہونا اور نیزائیں انگلیوں میں گھنجنا ہٹ مقامِ دل میں اجتماعِ خون ہو۔ تشویش، دباؤ اور دل کی دھڑکن ہو، چلنے پھرنے سے تکلیف زیادہ ہو۔ بھالا مارنے کی جھمکن پڑتی ہوں۔ نیز شدید درد کے دورے



ہوتے ہوں، دل کی سوچن اور حجابِ القلب کی سوچن میں جب کہ سوزش کے ہمراہ بخار ہو اور دوائی تشویش از حد ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x کے تین قطرے ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

گلوٹامین : مقامِ دل بھرا ہوا محسوس ہو۔ تیز درویں ہوتی ہوں، دل تھرتھراتا ہو اور سخت بچتا ہو۔ گویا کہ سینہ پھیٹ جیسے گا۔ سانس تکلیف سے آتا ہو، اور درویں تمام اطراف میں پھلتی ہوں۔ یہاں تک کہ بازوؤں میں بھی درد ہوتا ہو۔ مریض سر اُٹھاتا رہتا ہو اور سر درد تکین کا ہو۔

خوراک : ۳x کے چار قطرے ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس : دل کی وجع المفاصلی دردوں میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ زیادہ شقت کرنے سے بایاں بازو اور کندھائیں ہلکے ہوں اور دکتے ہوں۔ برسات میں بھیگنے یا نمی کے باعث ورم حجابِ القلب یا ورمِ قلب کا عارضہ ہو گیا ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : دل کی جھلیوں کے امراض میں برائی اونیا واقعی ایک مشہور دوائی ہے۔ وجع المفاصل کے باعث جب ورم حجابِ القلب ہو نیز جھپکن کی درویں ہوتی ہوں تو یہ دوائی خصوصاً نافع ہوتی ہے۔ بخار نہایت شدید پیشانی یا کن پٹیوں میں درد اور حرکت کرنے سے جھپکن زیادہ ہوتی ہو۔ مقامِ دل میں کرپل کا پڑنا حرکت کرنے یا اٹھنے اور یہاں تک کہ بازو کو اٹھانے پر بھی تکلیف کا زیادہ ہو جانا یہ برائی اونیا کی خاص علامات میں سے ہے۔ دل شدت سے اور بسرعت بچتا ہو۔

خوراک : ۳x کے چار قطرے ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

کنولیریا : امراضِ دل میں یہ دوائی بھی نہایت کارآمد ہے، امراضِ بطونِ دل میں جب کہ پیشابِ تمور یا استفادہ اور کوتاہ دمی بہت ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے زیادہ سگریٹ نوشی یا تنباکو نوشی کے باعث جب دل میں تکلیف ہو جائے یعنی دل کے مقام کے آس پاس بے قراری سی ہو تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

خوراک : ۵ کے پانچ سے دس قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کرائیکس : کسی کینٹھا : یہ دوائی بھی امراضِ دل میں بہت مفید ہے۔

جب فعلِ دل کمزور اور بے قاعدہ ہو۔ نبض کمزور اور رُک رُک کر چلتی ہو اور ایسا احساں ہو گویا کہ دل اپنی حرکت بند کر دے گا۔ جب بوجہ کمّی خون دل کی دھڑکن وغیرہ کے امراض پیدا ہوں تو یہ دوائی کام آتی ہے، شدید امراض کے دوران میں جب دل کے فیل ہو جانے کا ڈر پیدا ہو تو یہ دوائی اکثر اوقات اکسیر ثابت ہوتی ہے۔

خوراک : ۵ پانچ سے پندرہ قطرے ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
لاکس : جب دل کی دھڑکن ہو اور مقامِ دل میں کھچاؤ محسوس ہو تو اس دوائی کو نہیں بھوننا چاہیے۔ چھاتی پر خفیف دباؤ بھی مریض برداشت نہ کر سکتا ہو۔ نبض چھوٹی اور کمزور چلتی ہو۔

خوراک : ۳ کے تین قطرے دن میں دو یا تین مرتبہ۔  
للیم ٹنگر نیم : جب دل میں درد ہو۔ گویا کہ دل شکنجہ میں کسا ہوا ہے جس کے باعث مریض یکایک چونک اُٹھتا ہو۔ دل بہت پھڑپھڑاتا ہو اور غشی ہو۔ دل میں اُکساہٹ عصبی دل کی دھڑکن نیز بائیں پہلو کے بل لیٹنے سے افاقہ ہونا اور حرکت کرنے سے تکلیف کا زیادہ ہونا۔ اس کی علامات ہیں۔ مستورات میں جب امراضِ رحم کی وجہ سے دل کی دھڑکن اور دیگر امراض دل پیدا ہو گئے ہوں تو للیم ٹنگر نیم ایک نہایت مفید دوائی ثابت ہوتی ہے۔

خوراک : ۳۰ یا ۳۰ کے چار قطرے ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔  
آر سینکیم : یہ دوائی بھی امراضِ دل میں اکثر مفید ثابت ہوتی ہے۔ لاکس کی مانند آر سینکیم بھی امراضِ دل کے آخری درجوں میں کام آتی ہے۔ جب کہ مرضِ رعب ترقی ہو۔ فعلِ دل بے قاعدہ ہو۔ یا نبض تیز اور کمزور ہو۔ جب خسرہ یا سرج بخار کے دب جانے کے بعد دل کے غلاف میں یا اندرونی جھتی میں سوجن ہو جائے تو یہ دوائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے، پاؤں سوجے ہوں۔ آنکھیں پھولی ہوئیں اور بے چینی موجود ہو۔ رات کو لیٹتے وقت اور خاص کو نیم شب کے بعد دم گھٹتا ہو اور سخت کوتاہ دمی ہوتی ہو۔

خوراک : ۳۰ یا ۳۰ کے تین قطرے ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
کالین سونیا : امراضِ دل میں کالین سونیا کا اثر بھی قابلِ تعریف ہے۔ خاص

کہ جبکہ مریض کو مرضِ بواسیر کی شکایت بھی ساتھ ہو۔ یا امراضِ دل اور بواسیر کی شکایت باری باری سے ہوتے ہوں۔ بواسیر کے دب جانے کے باعث جب امراضِ دل پیدا ہو جائیں۔ دل میں اکساہٹ بہت ہو۔ سینہ پر اور بو جھل ہو۔ تنفسِ وقت کے ساتھ آتا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۵ کے پانچ سے دس قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

سلفر: جب مریض کو ایسا محسوس ہو کہ بہت سا خون دل میں جمع ہو گیا ہے جس کے باعث دل دھڑکن اور سانس لینے کے لیے بانپنا پڑتا ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ دل بہت بڑا ہو گیا ہے اور سینہ میں سمانہیں سکتا۔

خوراک : ۳ x یا ۳ کے چار قطرے ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ سٹرکینیا۔ کافین۔ کوپر ایسی ٹیکم۔ فائی ٹولا کا فاسفورس۔ اوکسالک ایسڈ۔ گریفامیٹس۔ کالی بامیڈ راڈیکم۔ لائیکوپس۔ ایس کیلپ یاس وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علاماتِ مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

دردِ دل اگر گرمی کے موسم میں ہو تو مقامِ درد پر برف لگائیں۔ ایک تھیلی یا جراب میں گٹی ہوئی برف کو بھر کر مقامِ درد پر رکھیں اور اگر موسمِ سردی کا ہو تو مقامِ درد پر گرم پلش باندھیں۔ یا پوستِ خشخاش کے جوشِ اندہ سے منکور کریں۔ مقامِ درد پر خالی گلاس لگانا بھی بعض حالتوں میں مفید ثابت ہوتا ہے۔

غذا : لطیف اور زود ہضم دیں۔ تقبیلِ غذا سے پرہیز کریں۔ دودھ میں قدرِ سوڈا واٹر یا لائٹ واٹر ملا کر پلاتے رہیں۔



# دردِ دل - وجعِ اقلب

(ANGINA PECTORIS)

اس مرض میں دل میں تشنج ہو کر درد کے یکا یک سخت دورے شروع ہو جاتے ہیں۔ دم گھٹنے لگتا ہے اور جلن محسوس ہوتی ہے اور نہایت سخت تشویش اور موت کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ مرض عمر رسیدہ اشخاص کو زیادہ ہوا کرتا ہے۔

**علاماتِ مرض:** دردِ یکا یک مقامِ دل میں شروع ہو جاتا ہے اور سینہ کے کسی حصہ تک نیز کاندھے اور بازو تک اس کی چانگیں پڑتی ہیں۔ مریض کو غشی ہو جاتی ہے اور اس کو یہی اندیشہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کی موت آئی سو آئی، دل کی دھڑکن اور کوتاہی سخت ہوتی ہیں۔ مریض کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے اور سپینہ سے اس کا جسم تر بتر ہو جاتا ہے۔ چند منٹوں تک اور بعض اوقات کئی گھنٹوں تک مرض کے دورے ہوتے رہتے ہیں اور ایک دورہ دوسرے دورے سے سخت ہوا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ آخری دورہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔

**اسبابِ مرض:** یہ مرض بہ نسبت عورتوں کے مردوں کو زیادہ ہوا کرتا ہے اور عموماً چالیس پینتالیس برس کی عمر کے بعد ہوا کرتا ہے۔ بالعموم نقرسی مزاج کے اشخاص اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ زیادہ ورزش کرنا۔ گرم سرو ہو جانا۔ زیادہ غم و رنج۔ شراب خوری۔ پیٹ میں نفخ اور قبض۔ بد ہضمی اور بعض امراضِ قلب اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

**ایملِ نائٹریٹ:** مرض کے نہایت شدید کیسوں میں یہ دوائی دی جاتی ہے اور عموماً سونگھائی جاتی ہے۔ یہ دوائی بہت جلد آرام دہ ثابت ہوتی ہے۔  
**خوراک:** ۳ x مدرٹیکچر کے تین یا چار قطرے رومال پر ڈال کر سونگھاتے ہیں یا ایملِ نائٹریٹ کے کیپ سول کو رومال میں توڑ کر سونگھاتے ہیں۔

گلوٹامائن : یہ دوائی بھی اس مرض میں بہت آزمودہ ہے اس کی بڑی بھاری علاقت یہ ہے کہ جسم کے ہر ایک حصہ میں شریانیں ترپتی ہیں، مقامِ دل بھرا ہوا معلوم ہو اور تیز دروئی دل کے مقام سے تمام اطراف کو جاتی ہوں۔ سانس بوجھل ہو۔ دل پھٹ پھڑاتا ہوا دسکڑا ہوا محسوس ہوتا ہو۔

خودِ ہراک : ۳x کے چار قطرے ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

کمرائیکس : بائیں طرف سینہ میں یکایک غضبِ ناک دروئی شروع ہو کر مقامِ دل اور بائیں بازو تک پھیلتی ہوں۔ مریض زندگی سے مایوس ہو۔

خودِ ہراک : ۵ مدرٹکچر کے پانچ سے دس قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر پلائیں اور اسی طرح سے دن میں پانچ چھ مرتبہ بلکہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ دیتے جائیں۔

سمی سی فیوگا : دروئی تمام سینہ میں پھیلتی ہوں اور ایسا محسوس ہو کہ بائیں بازو کو کسی نے باندھ دیا ہے۔

خودِ ہراک : ۵ کے پانچ قطرے ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

سیائی جیلیا : وجعِ القلب کی یہ بھی ایک مفید دوائی ہے، دروئی گردن اور بازوؤں تک پھیلتی ہوں۔ نبض بے قاعدہ چلتی ہو۔ غشی کا ڈر ہو۔ دل کی دھڑکن ہواؤ مقامِ دل میں تیز چھین کی دروئی ہوتی ہوں۔ نبض کمزور اور بے قاعدہ چلتی ہو یا برعکس اس کے بھری ہوئی اور مضبوط چلتی ہو، تھوڑی سی حرکت کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہو۔

خودِ ہراک : ۵ کے تین قطرے یا ۳x کے چار قطرے دن میں چار مرتبہ۔

کو پیرم : دردِ دل کی یہ بھی ایک مجرب دوائی ہے۔ نبض کی رفتار سست ہو جب کڑل پڑتے ہوں اور دم کشی ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خودِ ہراک : ۶x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

ایکونائیٹ : جب ٹھنڈ کی وجہ سے دل میں درد شروع ہو۔ تشویش اور

گھبراہٹ بہت زیادہ ہوں۔ ٹھنڈک ہو۔ دروئی سر سے لے کر تمام اطراف میں جاتی ہوں۔ ماؤف مقامِ سن ہوا داس میں جھنجھٹا ہٹ ہو۔

خودِ ہراک : ۳x کے چار قطرے ہر پانچ یا دس یا پندرہ منٹ کے بعد۔

آر سینکم : مزمن کیسوں میں یہ دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خاص کر

مریض کے دورے کو روکنے میں -

خوراک : ۳ یا ۲۰ دن میں دو یا تین مرتبہ -

کلیمیا لیٹی فولیوا : دردیوں کندھے کی بڑی تک جاتی ہوں اور گولی مارنے کی

سی ہوتی ہوں - معدہ سے دل پر دباؤ پڑتا ہو - جب تبا کو نوشی سے دردِ دل کا غرضہ پیدا ہو گیا ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے -

خوراک : ۵ یا ۳ کے چار قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

میکنیشیا ناس : دردِ دل کے دوران میں یہ دوائی گرم پانی میں دینے سے اکثر

جلدی آرام کر دیتی ہے اور دورے کی میعاد کو کم کر دیتی ہے - چھاتی سکڑتی ہوئی محسوس ہو اور دردیوں دل سے تمام اطراف میں جاتی ہوں -

خوراک : ۶ ٹری ٹیورلین کے پانچ گرین گرم پانی میں ہر نچرہ منٹ کے بعد -

کاکٹس : جب ایسا محسوس ہو کہ دل کو لوہے کے بندوں میں جکڑا ہوا ہے

تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے - سینہ کسا ہوا اور سانس تکلیف سے آتا ہو -

خوراک : ۵ یا ۳ کے تین قطرے ہر نچرہ منٹ یا نیم گھنٹہ کے بعد -

نوٹ : تبا کو نوشی کی وجہ سے جب مقامِ دل میں درد ہوتا ہو - تو کلیمیا لیٹی فولیوا اور

سپائی جیلیا کے علاوہ کس داسیکا - شافی سی گیرا اور بیکیم ادویات بھی مفید ہوتی ہیں

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ برائی اونیا - ڈیجی ٹیس - ہائیڈروسیانک ایسڈ -

آرم میٹلیبکم - کافیا کرڈا - بلیم گمری نم - ورائٹرم - مہوس وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی

علاماتِ مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں -

**ضروری ہدایات :** مریض کو فوراً بستر پر ٹا دیں اور اس کے گلے اور چھاتی

کے مٹن کھول دیں اور درتھے کھول دیں - تاکہ تازہ ہوا کافی مقدار میں مکرے میں آتی

جاتی رہے اور امیل نائٹریٹ - مدرٹیکچر کے چار پانچ قطرے رومال پر ڈال کر سونگھائیں

یا انگریزی دوائی فروشوں کے ہاں نائٹریٹ آف ایمیل کے کیپ سول فروخت

ہوتے ہیں - ایک کیپ سول جس میں پانچ قطرے دوائی ہوتی ہے ایک رومال میں توڑ

توڑ کر سونگھائیں ، دل کے مقام پر گرم گرم پلٹس کو باندھیں یا گرم پانی کی ٹکڑہ کریں قبض

ہو تو سختہ کریں ، بیلڈونا پلاسٹر دل کے مقام پر لگائے رکھنے سے اکثر مرض کا دورہ رک

جانتا ہے۔ مرض کے وقفہ کی حالت میں مریض کو چائے، قہوہ، تنباکو، شراب اور تمام تھقل اور نفخ پیدا کرنے والی اغذیہ سے پرہیز کرنا چاہیے اور تمام ایسے اسباب جو کہ مرض کے دورہ کے باعث ہوں، مثلاً جوش و غصہ وغیرہ ان سے مریض کو بچنا چاہیے۔ اگر مرض کے دورہ کے وقت مریض کی ٹانگیں اور بازو ٹھنڈے ہو جائیں تو گرم پانی کی بوتلیں بھر کر ٹانگوں اور بازوؤں میں رکھنی چاہئیں۔



## دل دھڑکن، دھڑکا، ہول دل اختلاج قلب

(PALPITATION)

اس مرض میں دل زور زور سے دھڑکتا ہے اور دل کی دھڑکن سینہ پر بخوبی محسوس ہوتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا دل ڈوبا جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس مرض کا حملہ چند منٹوں سے لے کر چند گھنٹوں تک رہتا ہے۔

اسباب مرض: کثرتِ مجامعت، جلق، بکثرت چائے، تنباکو یا شراب نوشی، نفخ، تشکم، بد ہضمی، رنج و غم، فسر و تروڑ اور کثرتِ محنت وماغی و جسمانی کمزوری، خون کی خرابی وغیرہ اس کے اسباب ہیں اور نیز بعض امراضِ دل اور امراضِ عصبی مثلاً ہسٹیریا، رعشہ، مرگی، مایخولیا اور جنون وغیرہ بھی اس مرض کے اسباب ہیں۔

### علاج

مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کا مناسب علاج کرنا چاہیے۔  
ایکونائٹ: معمولی سے جوش کے بعد بھی دل زور زور سے دھڑکتا ہو اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ دل فیل ہوا چاہتا ہے۔ جاڑہ لگنا شروع ہو جاتا ہو اور ہاتھ پاؤں میں جھنجھٹ سی محسوس ہوتی ہو۔ چہرہ پر اجتماعِ خون ہو جاتا ہو۔  
خوراک: ۳x ہرنیم گھنٹہ کے بعد۔

بلا ڈونا : معمولی سی حرکت کے بعد بھی دھڑکی ہو جاتی ہو۔ سر کی طرف خون زیادتی کے ساتھ دورہ کرنا شروع کر دیتا ہو اور شور و روشنی کو مریض برداشت نہ کر سکتا ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

ڈیجیٹلایس : بغیر کسی خاص سبب کے دل کی حرکت میں بے ترتیبی ہو مریض نہ تو چل پھر سکتا ہو اور نہ ہی لیٹ سکتا ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : جب دھڑکن بوجہ بد معنی کے ہو۔ خوراک کھانے کے بعد پیٹ میں ہوا زیادتی کے ساتھ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہو اور قبض کی بھی شکایت ساتھ ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

پلٹلا : مستورات میں جب بد معنی کی شکایت ہو اور معدہ میں غیر معمولی اکساہٹ پائی جائے۔ اس میں اکثر اسہال کی شکایت ہوا کرتی ہے۔

خوراک :  $3 \times$  یا  $30$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

انیشیا : عصبی مزاج والے مریضوں کو رات کو سوتے وقت دھڑکے میں زیادتی ہو جاتی ہو اور مریض سونہ سکتا ہو۔

خوراک :  $1 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سپائی جیلیا : جب دھڑکے کے ساتھ ہی کاٹنے والی تیز دردیں ہوتی ہوں خصوصاً دل کے مقام پر تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔

خوراک :  $1 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ماسکس : عصبی دل کی دھڑکن میں یہ دوائی نہایت مفید ہوتی ہے۔ خاص کر ہٹیربا کی دل دھڑکن میں، جب مرض کا زور ہو تو اس دوائی کو استعمال کرنے سے دل دھڑکن کا بہت جلد آرام آ جاتا ہے۔

خوراک :  $3 \times$  ہر پندرہ منٹ کے بعد اس دوائی کو سونگھنا بھی مفید ہوتا

ہے۔



کافیا : عصبی مزاج کے اشخاص کی دل دھڑکن کی یہ بھی ایک خاص دعائی ہے۔ دل دھڑکن غضب کی ہو اور مقام دل میں گولی مارنے کی سی درویں ہوتی ہوں، اگر ساتھ ہی پیشاب بھی زیادہ آتا ہو اور مریض کے دل میں تشویش بھی پائی جاتی ہو تو یہ دعائی اور بھی زیادہ منظر ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x جب مرض کا زور ہو تو اس دعائی کی خوراک ہر دس منٹ کے بعد دہنی چاہیے اور وقفہ میں ایک خوراک صبح اور ایک شام کو۔  
نکس ماشکاٹا : ہسٹریکل مریضوں کے لیے یہ بھی ایک اعلیٰ دعائی ہے جب کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ غشی کا بھی ڈر ہو۔

خوراک : ۶x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔  
کاکٹس : جب دن رات دل دھڑکتا رہتا ہو۔ چلنے پھرنے سے زیادہ دھڑکتا ہو اور مقام دل میں کچھاوٹ سی محسوس ہو تو یہ دعائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے نیز جب دوران حیض میں دل کی دھڑکن بہت بڑھ جائے تو کاکٹس کو نہیں بھوننا چاہیے۔  
خوراک : ۵ یا ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سمی سی فیوگکا : دھڑکن کے ساتھ جب معدہ کے ڈوبنے کا احساس ہو اور بڑی سخت بے چینی اور بے خوابی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
نیرم میور : جب دل کی دھڑکن بوقت شب بتر میں بیٹنے پر یا کھانا کھانے کے بعد زیادہ ہو تو۔

خوراک : ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے ٹیکم۔ آیوڈیم اور سلفر بھی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات : جب دل کی دھڑکن شدید ہو تو مریض کو چند منٹ تک چپ چاپ لیٹے رہنا چاہیے۔ اگر نفخ اور بد ہضمی کے باعث یہ عارضہ ہو تو مریض کو کئی گھنٹوں تک بالکل غذا نہ دیں اور اس کے بعد لطیف غذا یعنی دودھ، پنچنی یا مونگ کی دال کی کھچڑی دیں۔ کثرت محنت، کثرت مباشرت

اور زیادہ دماغی محنت کرنے سے قطعی پرہیز کریں۔ نیز تمباکو چائے اور شراب سے بھی قطعی پرہیز لازم ہے۔ مریض کے لیے تازہ ہوا نہایت مفید ہوا کرتی ہے۔

## دل کا غوطہ کھانا

(CARDIAC INTERMISSION)

اس کی خاص ادویات سپائی جیلیا۔ کاکٹس۔ سی پیا۔ کاربوونجی۔ چائنا اور سٹروپھینٹکس ہیں۔

سپائی جیلیا: نبض رُک رُک کر چلتی ہو۔ دل پھڑپھڑاتا ہو اور مقامِ دل میں غضب ناک دردیں ہوتی ہوں۔ جب ساتھ ہی بد ہضمی اور کھٹے ڈکار اور آبکائی بھی آتی ہوں اور معدہ پر بوجھ پڑا ہوا تو اس دوائی کو نہیں کو نہیں بھوننا چاہیے۔

• خوراک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد

کاکٹس: بد ہضمی کی یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ ہاضمہ کمزور، مقامِ معدہ پر بہت بوجھ، دباؤ اور کھانا کھانے کے آٹھ یا دس گھنٹہ کے بعد غذا قے کر دینا۔ شراب میں تیکن نبض رُک رُک کر چلتی ہو۔ یعنی بیچ میں غوطہ مار جاتی ہو تشویش ہو اور مقامِ دل میں درد ہو۔

خوراک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

چائنا: نبض کے رُک رُک کر چلنے یعنی بیچ میں غوطہ کھانے کے عارضہ میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے اور اگر ساتھ ہی مندرجہ ذیل علامات موجود ہوں تو یہ اور بھی زیادہ موثر ہوتی ہے۔ تھوٹا سانا شتہ کرنے کے بعد بھی معدہ پر نفع بہت ہو۔ سی پیا: بد ہضمی۔ معدہ میں جلن، ڈکار، آبکائیاں، معدہ میں تیکن، کھانا کھانے کے بعد دل کا گم ہو جانا، یہ اس کی علامات ہیں۔

خوراک: ۶x یا ۱۲x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کاربوونجی: بد ہضمی کے ہمراہ درد تو لہج۔ نبض کا غوطہ مار جانا۔ خاص

کر کھانا کھانے اور بیٹنے کے بعد۔ یہ اس کی خاص علامات ہیں۔

خوراک : ۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

سٹر و پھینٹھس اور نیٹرم میور بھی بعض اوقات اس مرض میں مفید ثابت ہوتی ہیں ۔

## غشی - غش آنا

(SYNCOPE FAINTING)

اس مرض میں دل کا فعل عارضی طور پر بند ہو جاتا ہے ۔

علامات مرض : چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے ۔ نبض نہایت کمزور

چلتی ہے ۔ سانس بھی بہت آہستہ آہستہ آتا ہے ۔ جسم سرد پسینے (تریلی) سے تر ہوتا

ہو جاتا ہے ۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے ۔ ہاتھ اور پاؤں سرد ہو

جاتے ہیں اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے ، کچھ عرصہ یہ حالت رہ کر مریض ایک

ٹھنڈا سانس بھرتا ہے اور ہوش میں آ جاتا ہے اور اس وقت قے آ جاتی ہے

کبھی یکا یک غشی طاری ہو کر مریض فوراً مر جاتا ہے ۔ جب اس مرض کا حملہ

خفیف ہوتا ہے ۔ تو اس وقت پیشانی پر ذرا سا سرد پسینہ آ جاتا ہے ۔ نبض کمزور

چلتی ہے اور مریض کا جی بچلاتا ہے ۔

اسباب مرض : یکا یک کسی بہت خوشی کی خبر سنانا یا سخت غم و رنج

کی خبر سنانا ۔ چوٹ یا زخم یا اور کسی باعث سے جسم سے خون کا بکثرت خارج ہو

جانا ۔ نقاہت اور رنج و غم اس کے اسباب ہیں ۔

تشخیص مرض : اس غشی میں اور اس غشی میں جو کہ دماغ میں خون

کی زیادتی سے ہوتی ہے جس کو طب میں قوما کہتے

ہیں تشخیص کرنا ضروری ہوتا ہے ۔ دل کی غشی میں مریض کے چہرے کا رنگ زرد

نبض اور سانس نہایت کمزور اور جسم سرد پسینہ (تریلی) سے تر ہوتا ہے ۔

مگر دماغ کی غشی یعنی قوما میں مریض کی آنکھیں یا چہرہ سرخ ۔ نبض بھری ہوئی

اور سانس خراٹے سے آتا ہے۔ غشی میں خون کی کمی مریض کے دماغ میں ہوتی ہے لیکن مریض تو مابین خون کی زیادتی دماغ میں ہوتی ہے۔

### علاج

مریض کو آرام سے بستر پر کمر کے بل لیٹائے رکھیں اور اس کا سر، باقی جسم سے تھوڑا نیچا رکھیں۔ تاکہ خون سر کی جانب بہ آسانی جاسکے۔ اور ٹھنڈے پانی کے پھینٹے مریض کے منہ پر دیویں۔ تھوڑی سی دسکی یا برانڈی یا بہت تھوڑی انیون پانی میں گھول کر مریض کو پلا دیں اور جب غشی کا دورہ دُور ہو جائے تو پھر اصل مرض کا علاج کریں۔

نوٹ: غشی کی حالت میں مریض کے سر کو باقی جسم سے نیچا رکھنا چاہیے اور نیچا ہرگز نہ رکھنا چاہیے ورنہ موت واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

۵ GOLD DROPS گولڈ ڈراپس۔ ڈایاکارڈ۔ ڈولماکارڈ وغیرہ بہت مفید ثابت ہوئے ہیں۔

## باب سیزدہم

## منہ زبان اور حلق کے امراض

AFFECTIONS OF THE MOUTH TONGUE AND  
THROAT

## ہونٹ کے چھالے

(HERPS LABIALIS)

اس مرض میں عموماً نیچے کے لب پر چند چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں۔ ان کی سطح سرخ اور قدرے متورم ہوتی ہے اور ان میں پہلے شفاف رطوبت ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں یہ رطوبت پیپ بن جاتی ہے یا زرد مواد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ انوں میں سے رطوبت نکل نکل کر ختم جاتی ہے اور کھرنڈ بن جاتے ہیں۔ یہ دانے عموماً ہونٹوں پر اور کبھی کبھی چہرے پر بھی ہوتے ہیں۔

اسباب مرض : معدے یا جگر یا دل کی خرابی کی وجہ سے یہ دانے نکل آتے ہیں، سردی لگنا اور مقام لب پر خراش کا ہونا بھی اس کے اسباب ہیں۔ بعض اوقات کئی قسم کے بخاروں کے بعد بھی یہ دانے نکل آیا کرتے ہیں۔

## علاج

رشاکس۔ کرویٹن ٹیکلیم۔ مرکیورس۔ آرسینکیم۔ ہیرسلف اور گریفائٹس

وغیرہ۔

ضروری ہدایات : چھالوں پر بورک ایڈ چھڑکنا مفید ہوتا ہے۔ مریض کو غذا لطیف اور زود ہضم دینی چاہیے۔

# منہ آنا۔ منہ کی سوزش

## STOMATITIS INFLAMMATION OF THE MOUTH

اس مرض میں منہ کی اندرونی جھلی سرخ اور متورم ہو جاتی ہے۔ منہ سے بہت رالیں نکلتی ہیں اور تھوک بہت پیدا ہوتا ہے، یا برعکس اس کے منہ خشک ہوتا ہے کھانے اور چبانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے سانس سے بدبو آتی ہے اور آخر کار منہ میں چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں۔

اسباب مرض : کمزور بچوں کو ٹھنڈا لگ جانا۔ دانت نکالنا۔ بدھمی وغیرہ اور دیگر ایسے بخاروں کا ہونا کہ جن میں جسم پر دھتے پڑ جاتے ہیں اور دانے نکل آتے ہیں۔ زیادہ گرم غذا کھانا یا مصالحہ دار چیزوں کا کھانا۔ سگار یا سگریٹ بکثرت پینا کسی بوسیدہ دانت کا منہ میں خراش کرنا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ نیز پارہ کے مرکبات کیلومل یا دار چکنا کے زیادہ استعمال سے بھی یہ مرض ہو جاتا کرتا ہے۔

## علاج

کالی کلوریکم : سانس بہت بدبودار، تالو اور رخسارے کی اندرونی لعابدار جھلی میں زخم۔ کالی کلوریکم اس مرض کی ایک خاص دوائی ہے۔ جب یہ مرض زیادہ مصالحہ دار اشیاء کے کھانے یا بہت گرم غذا کھانے اور بکثرت تمباکو نوشی سے ہوا ہو تو یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ٹری ٹیورین (سفوف) ہر تین گھنٹہ کے بعد، چار رقی کلورٹ آف پوٹاش کو دو چٹانک پانی میں ڈال کر اس سے زخموں کو صاف کرتے ہیں یا غراسے کرتے ہیں۔

بلاڈونا : منہ کی اندرونی جھلی متورم، سرخ اور جلتی ہوئی گرم ہو۔ منہ بہت خشک ہو۔ گاڑھا تھوک نکلتا ہو۔  
خوراک : ۲x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس : رالیں بہت نکلتی ہوں اور غدود متورم ہو گئے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایسڈ نائٹریکیم : جب پارہ کے کثرت استعمال کے بعد یہ مرض پیدا ہوا ہو۔

یامعہ میں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد

چائنا : کموری کو دور کرنے کے لیے جب کہ مریض کا زور کم ہو گیا ہو تو

یہ دوائی دی جاتی ہے۔

خوراک : ۵ درنیکچر کے ایک دو قطرے دن میں تین یا چار مرتبہ۔

غزارے : ٹینک ایسڈ ایک ڈرام اور پانی ایک پاؤ، دونوں کو ملا کر غزارے

کریں بہت جلدی آرام ہو جائے گا۔

## ضروری ہدایات

مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے دور کریں۔ اگر کسی سبب سے منہ میں

خراش ہوتی ہو تو اس سبب کو دور کرنا چاہیے۔ اگر غذا میں بد پرہیزی کی وجہ

سے یہ عارضہ ہو تو اس کو درست کرنا چاہیے۔ مریض کو غذا صرف دودھ یا دودھ

میں سوڈا واٹر ملا کر کچھ عرصہ تک دینا چاہیے اور جوں جوں مرض کا آرام ہوتا جائے

تو اس کے مطابق غذا دیتے جانا چاہیے۔ گلیسرین میں تھوڑا بورکس یا بورک

ایسڈ ملا کر منہ میں لگانا چاہیے۔

## منہ کے چھالے

(APHTHAE THRUSH)

اس مرض میں بے شمار چھوٹے چھوٹے چھالے منہ میں مسوڑھوں، زبان اور

لبوں پر رخساروں کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ان کا رنگ سفید یا خاکستر ہوتا ہے

اور یہ چھالے بعض اوقات خوراک کی تمام نالی کی لعاب دار جھلی پر پھیل جاتے ہیں۔ جب اُن کی سفیدی اتر جاتی ہے تو نیچے سے خاکستری رنگ کے چھوٹے چھوٹے زخم نمودار ہو جاتے ہیں جن کے کنارے تنگ اور سرخ ہوتے ہیں۔

علامات مرض: جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے چھالے یا سفید نقاط منہ کی اندرونی جھلی کے ہر ایک حصہ میں نمودار ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ اتنے گنجان ہوتے ہیں کہ زبان، سوڑھوں، تالوہاں تک کہ حلق وغیرہ کی تمام سطح پر ہتر کا تھرجم جاتا ہے۔ بخار ہوتا ہے اور نکلنے وقت درد ہوتا ہے۔ متصلہ غدود بھی بعض اوقات متورم ہو کر درد کرتے ہیں۔ شدید کمیوں میں یہ مرض امعا تک پھیل جاتا ہے اور بہت اسہال آتے ہیں۔

اسباب مرض: زیادہ تر شیرخوار بچے جن کی پودرش ماں کے دودھ سے نہ ہوئی ہو یا ماں کا دودھ ہی خراب ہو یا ویسے ہی بہت کمزور ہوں، اس مرض میں مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ کئی ایک امراض مثلاً خسرہ، تپ محرقہ، تپ دق وغیرہ کے دوران میں بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ مرض بڑھاپے میں بھی ہو جاتا ہے۔ اُس وقت یہ موت کا پیش خیمہ ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ قوتِ زسیت کی سخت کمزوری کی علامت ہوا کرتی ہے۔

## علاج

بوریکس: اس مرض کی ایک خاص دوائی ہے اور بسا اوقات شافی ہوتی ہے۔

خود پاک: ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ: ڈورٹی بوریکس نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر ایک لوشن بنالو اور اور اُس میں کاربانک ایسڈ کے تین یا چار قطرے ملا لو اور نرم برسش سے چھالوں پر ہر دو تین گھنٹہ کے وقفہ پر لگاتے جاؤ یا پندرہ رتی کے قریب بوریکس نصف چھٹانک گلیسرین میں ملا لو اور اس کو دو یا تین گھنٹہ کے وقفہ پر لگاتے جاؤ آرام ہو جائے گا۔



مرکیورس : تنفس بدبودار ہو۔ رالیں بہت بہتی ہوں۔ اسہال آتے ہوں۔  
سیاہ رنگ لے بوسیدہ ہو گئے ہوں۔

خوراک : ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
آر سینٹیم : جب چھالے پھیل کر معدہ اور امعاء تک پھیل گئے ہوں۔ سیاہ  
رنگ کے ہوں بدبو آتی ہو اور بڑے اسہال بہت شدید آتے ہوں۔  
خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : جب چھالے دب چکے ہوں تو سلفر کی چند خوراکیں دینے سے  
مرض کے دوبارہ عود کرنے کا ڈر نہیں رہتا۔ نیز سلفر کی خوراک گاہے گاہے دوسری  
منظرہ دوائی کے دوران میں دیتے جانا چاہیے۔

خوراک : ۳x یا ۳۰ دن میں تین یا چار مرتبہ۔  
برائی اونیا یا نکس و امیکا : جب بدبھنی ہو۔ منہ خشک ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔  
ایٹیم ٹارٹ : جب منہ میں چھالے ہوں اور پتہ دودھ قے کر دیتا ہو۔  
خوراک : ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ضروری ہدایات : تازہ ہوا، مناسب غذا اور صفائی کا خاص  
خیال رکھنا چاہیے۔ منہ کو صاف رکھیں اور مندرجہ ذیل طریقے منہ کو صاف  
کرنے کے اختیار کریں۔

- ۱۔ ایک چمچہ بھریانی میں پانچ قطرے کانڈیز فلویڈ کے ڈال کر لوشن بنا لو۔ یا
- ۲۔ راکس ایک رتی اور پانی نصف چھٹانک ملا کر لوشن بنا لو۔ یا
- ۳۔ ایک رتی پوٹاشیم کلورائیڈ ایک اونس پانی میں ملا کر لوشن بنا لو۔

مذکورہ بالا تینوں لوشنوں سے کسی ایک لوشن میں صرف روئی تھوڑی سی  
بھگو کر یا ایک مکڑا پٹے کا بھگو کر پتہ کے منہ کے اندر پھیر کر منہ کو صاف  
کریں اور منہ کو صاف کرنے کے بعد گلیسرین نصف چھٹانک میں دس یا  
بندہ رتی بورکس حل کر کے منہ میں بذریعہ برش یا روئی کی پھیری کے دن  
میں دو یا تین مرتبہ لگائیں، یا پھول کی ہوائی پھٹری پانچ رتی نصف چھٹانک

- پانی میں ملا کر بذریعہ بوش یا روئی کی پھیری کے صبح اور شام منہ میں لگائیں اور اگر اس سے جلد آرام آتا نظر نہ آئے تو پھول کی ہوئی پھٹکڑی کو بہت بار ایک پیس کر روئی کی پھیری کے ساتھ زخموں پر پھڑکیں، جو ان مریضوں کی حالت میں۔
- ۱۔ ڈیڑھ پاؤ پانی میں ایک بہت چھوٹی چمچی کا نڈیرز فلوئیڈ کو ڈال کر، یا
  - ۲۔ میں رتی بوریکس ڈیڑھ پاؤ پانی میں ملا کر، یا
  - ۳۔ تین رتی پوٹاشیم کلورائیڈ ایک پاؤ پانی میں ملا کر اس سے کلیاں اور غرارے کریں۔ یا
  - ۴۔ سلور نائٹریٹ کی بتی سے بڑی ہوشیاری کے ساتھ زخموں کو ٹچ کریں۔ اگر بچہ کی ماں کا دودھ خراب ہو تو بچہ کو گائے یا بکری کا دودھ پلائیں اور ماں کا دودھ چھڑا دیں یا ماں کو ہائیڈرو کوٹائیل ۵ کے دس قطرے صبح، دس قطرے دوپہر اور دس قطرے شام کو نصف چھٹانک تازہ پانی میں ڈال کر پلائیں۔ دودھ صاف ہو جائے گا۔ صفائی عامہ کا اس مرض میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔

## منہ کی سٹرن - اکلہ

### CANCERUM GANGRENOUS STOMATITIS

اس مرض میں شدید سوزش ہو کر منہ کے اندر سٹرن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض عموماً دو سے لے کر چھ برس تک غریب اور محتاج لوگوں کے بچوں کو جن کی پرورش خاطر خواہ نہیں ہوتی، ہو جایا کرتا ہے۔ خاص کو مندار اور گیلی جگہوں پر رہنے والوں کو کبھی یہ مرض خمرہ کے بعد بھی ہو جایا کرتا ہے۔ عموماً موسمی بخاروں کے بعد یہ مرض ہو جاتا ہے۔

علامات مرض: سوزش عموماً مسوڑھوں کے شروع ہوتی ہے مسوڑھے سفید پلے اور دانتوں سے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ زخم پھیل کر تمام مسوڑھوں حتیٰ

کہ جبرڑوں تک پھیل جاتا ہے اور جوں جوں مرض ترقی کرتا جاتا ہے رخسارے اور مونٹ بھی سوجتے جاتے ہیں اور ماؤف جگہ سخت ہو جاتی ہے۔ دانت جھڑنے لگتے ہیں اور سانس بدبو دار ہو جاتا ہے، جبرڑ کے نیچے والے غدود متورم ہو جاتے ہیں اور درد کرتے ہیں۔ شدید کیسوں میں ماؤف مقام بڑی سرعت سے گلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ چند دنوں کے عرصہ میں ہی مونٹ، رخسارے، غدود، تالو، زبان بلکہ نصف چہرہ گل سر ہو جاتا ہے۔ دانت جھڑ جاتے ہیں۔ بڑا غضب ناک بدبو دار تھوک آتا ہے۔ جبرڑے کی ہڈی مردار پڑ جاتی ہے اور نہایت ضعیف ہو کر مریض مر جاتا ہے۔

## علاج

اس مرض میں مرکبوریس - ایڈمیور - ایڈنائٹرک - آرسینکم - کالی کلوریم اور لاکس وغیرہ ادویات کام آتی ہیں۔

مرکبوریس : یہ دوائی ابتداء میں مرض جب کہ منہ کے اندر زخم ہوں جن کی سطح خاکستری اور کنارے سرخ ہوں، رخسارے اور مونٹ سوجے ہوئے اور لعاب دہن خونی اور سخت متعفن آتا ہو، مفید ہوتی ہے۔ مرکبوریس ڈلس مفید تر ہے۔

خوراک : ۱ x ٹری ٹیوریشن ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

(نکتہ) اگر مریض پہلے پارہ کے مرکبات یعنی کینول وغیرہ استعمال کر چکا ہو تو پھر مرکبوریس نہیں دینا چاہیے۔

نوٹ : ایک مریض کو ڈاکٹر ہوگس نے مرکبوریس سال اور میوٹاک ایڈ کی خوراکیں باری باری دینے سے شفا دی تھی۔

ایڈمیور : جب کسی شدید مرض یعنی خسرہ کے بعد یہ مرض پیدا ہوا ہو تو مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایڈنائٹرک : جب پارے کے بے جا استعمال کی وجہ سے یہ مرض پیدا

ہوا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک :  $3 \times 1$  یا  $3 \times 2$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم : مرکبوریس کے استعمال کے بعد جبکہ مرض ترقی یافتہ ہو گیا ہو۔ نہایت متعفن اور خونی لعاب دہن نکلتا ہو۔ پیاس اور نقاہت پیدا ہوں۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔  
خوراک :  $3 \times 3$  ٹری ٹیورلین ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لاکس : جب چہرہ بہت زیادہ متورم ہو اور سوجا ہوا ہو۔ نقاہت اور ضعف بہت ہو مرض بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہو۔ حالت مریض خطرناک ہو تو اس دوائی کو آر سینکیم پر ترجیح دینی چاہیے۔

خوراک :  $3 \times 3$  ٹری ٹیورلین یا  $4 \times 4$  ڈائی یوشن ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

کالی کلوریکم : یہ دوائی بھی اس مرض میں بہت نافع ہوتی ہے۔

خوراک :  $3 \times 3$  ٹری ٹیورلین ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد اور اس دوائی کا سفوف بھی ماؤف مقام پر پھڑکتے ہیں۔

ضروری ہدایات : بڑی احتیاط سے رخسارے کے اندر کا داغ یا زخم ہوتے خالص کاربالک ایڈ سے یا نائٹرک ایڈ سے جلا دینا چاہیے۔ لیکن تیزاب لگا دقت اتنی احتیاط کر لینی لازم ہے کہ آس پاس کا گوشت جل نہ جائے۔ زخم کو جلانے کے بعد ایک ڈرام کارڈیز فلویڈ کو ایک پاؤ پانی میں ملا کر اس سے غرارے کر کر منہ کو صاف کر لیں۔

۲۔ ڈیو رتی پر مینگنیٹ آف پوٹاش کو ایک پاؤ پانی میں ڈال کر اس سے بار بار منہ کو صاف کرتے رہیں۔ یعنی تھوڑی سی روٹی لے کر اور اس روشن میں مچھو کر اس سے بار بار منہ کو صاف کرتے رہیں۔

۳۔ ہائیڈروجن پراکسائیڈ کے چار پانچ قطرے زخم پر پھڑک کر اس کو صاف روٹی کی پھریری سے صاف کریں اور اسی طرح سے دن رات میں چار مرتبہ زخم کو صاف کریں۔ اگر منہ سے بہت بدبو آتی ہو تو مقام ماؤف کانڈیز فلویڈ سے صاف کر کے بعد میں تھوڑا یو کلپس آیل لگا دیں۔ ڈاکٹر جو سٹھ ایم۔ ڈی تحریر فرماتے ہیں کہ بعض ڈاکٹر اس مرض میں ایڈ بھی زخموں پر لگاتے رہے اور گرم لوسہ سے بھی داغے رہے لیکن کبھی کوئی اچھا نتیجہ ہمارے ہاں نہیں

ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آرسنک سولوشن (آرسنک) ایک حقہ اور پانی سو حقہ زخم پر لگائیں اور آرسنک x اٹری ٹیورشن (سفوف) زخم پر چھڑک دیں۔ یہ طریقہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

مریض کو شروع مرض سے ہی مقوی غذا دینی چاہیے یعنی دودھ۔ انڈے۔ شوربہ۔ تینخی وغیرہ۔

## تھوک بہت آنا۔ بکثرت لعاب ہن

(PTYALISM SALIVATION)

اس مرض میں منہ میں بہت تھوک پیدا ہوتا ہے اور مریض کو بار بار تھوکنا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بولنا اور کھانا پینا بھی مریض کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اور مریض لاغر ہوتا جاتا ہے۔

اسباب مرض : زبان یا منہ کا چھل جانا۔ منہ میں زخم، آکھ، گوشت خورہ سوزش زبان۔ منہ میں خراش کا ہونا خرابی معدہ، یہ اس کے موٹے موٹے اسباب ہیں۔ درد نیم سر کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ ایام حمل میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ بعض امراض حلق۔ مرض کن پیرا۔ آتشکی امراض دہن اور سکرہ بوٹی یہ سب اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

مرکیورس سال : سوڑھے اور منہ دکتے ہوں نیز ایام حمل میں جب تھوک بہت آتا ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

آیو ڈیم : پارہ کے بکثرت استعمال کرنے کے بعد جب یہ عارضہ ہو گیا ہو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ نیز ایام حمل میں اس عارضہ میں مرکیورس سال کے استعمال

کے بعد یہ دوائی دی جاتی ہے ۔

خوراک : ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ٹائٹلک ایڈ: پارہ کے بکثرت استعمال کے باعث جب یہ عارضہ ہو گیا ہو۔

نیز ایوڈیم ناکام ثابت ہو تو یہ دوڑائی دی جاتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

آئیرس ورسسی کولر: جب اس مرض کے ہمراہ عصبی سرور بھی ہو تو یہ دوائی

وہی چاہیے۔

خوراک ۳x۱ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایلیم سٹاپو! کھانا کھانے کے بعد منہ میں تھوک بہت پیدا ہوتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

جبرندہی : عصبی کمزوری کی وجہ سے تھوٹک بہت آئے۔

خویراک ۳۷۱ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

جب تھوک بکثرت آئے اور کڑوا ہو تو آر سینم - سلفر - تھوجا

”خونی ہوتو۔ کالی آیوڈائیڈ۔ میگنیشیا کارب، مرکبوس نیٹرم میورس

ٹائٹلک ایڈ - نکس و امیکا - سلفر -

" " میرد ہو تو ایسا فوٹا۔ سسٹ

”جھاگ دار موتو کینتھرس - برائی اونیا - ڈیجی ٹیس

” روئی کی مانند ہو تو لاکس۔ نکس ماشکامٹا۔ پیٹلا

” جھاگ در سبزی مائل ہو تو سکیں ”

” سرخ جھاگ دار ہو تو بیدار ڈونا۔

” تیل نما ہو تو کوپے با۔“

” مونا گاڑھا ہو تو کار بو دیجی۔ کالی بائی

" "ملکین ہو تو سفر

---

” کڑوا کھٹا ہو تو کلکیر یا کارب۔ اگنیشیا

” صابون تماہوتو برائی ادینا۔

جب تھوک میٹھا ہو تو ڈیجی ٹیلر۔ پمٹلا۔ سبائٹا۔  
 ” زرد ہو تو جلیسی میم۔ کالی بانی کرو میکم۔ رستاکس۔  
 ” سوتے ہوئے سر ہانہ رالول سے تر ہتر ہو جائے تو مرکبوس  
 ” رالیں سر ہانہ پر پڑ کر زرد رنگ کا داغ دیں تو نائیریل ایڈ  
 ضروری ہدایات : ۵۔ رتی پھٹکڑی تین چھٹانک پانی میں ملا کر اس سے  
 غرارے کر آئیں۔  
 غذا : چپاتی یا خمیری روٹی چنا کے رس یا شوربہ کے ساتھ کھانا چاہیے۔

## دانت درد۔ دانت کا درد

(TOOTHACHE ODANTALET)

اس مرض میں ماؤف دانت میں سخت درد ہوتا ہے۔ قریبی سوڑھے متورم  
 ہو جاتے ہیں۔ کبھی چہرہ اور رخسارے بھی سوج جاتے ہیں۔  
 اسباب مرض : دانت کا بوسیدہ ہونا اور اس میں موراخ کا ہو جانا۔  
 یکایک موسم میں تبدیلی آ جانا۔ بد معنی صحت عامہ کا خراب ہو جانا۔ دانتوں کا صاف  
 نہ رکھنا۔ دانت کی جڑ میں ورم ہو جانا۔ ترمش، میٹھی یا سرد چیزوں کا کثرت سے  
 استعمال کرنا۔ پارہ کا زیادہ استعمال کرنا۔ گنچیا وغیرہ یہ سب اس کے اسباب ہیں  
 ایام حمل میں مستورات کو اکثر دانت درد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔

## علاج

- ۱۔ دانت درد جب سردی یا ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے ہو۔ ایکونائٹ۔ بیلادونا  
 کیومیلا۔ ڈاکامارا۔ مرکبوس۔ گلوٹائین۔
- ۲۔ دانت درد جب بوسیدہ ہونے کی وجہ سے ہو۔ کوپوزوٹ۔ شافی سیکریا۔  
 بیلادونا۔ مرکبوس، سلیٹیا۔ ایٹم کرڈوم۔ فاسفورس۔ نکس و امیکا  
 ایکونائٹ کیوفر۔

۳۔ دانت درد جب بد معہی کی وجہ سے ہو۔ برائی ادویا۔ نکس و امیکا۔ پمٹلا

۴۔ دانت درد جب غصہ کی وجہ سے ہو۔ بیلادونا۔ کیومیل۔ نکس و امیکا۔ کافیا۔

انگیشیا۔ آر سینکس۔

۵۔ دانت درد جب گٹھنے کی وجہ سے ہو۔ کیومیل۔ مرکورس۔ سی سی فوگلا

برائی ادویا۔

۶۔ بچوں میں دانت درد۔ ایکونائٹ۔ کیومیل۔ بیلادونا۔ سلیشیا۔

۷۔ آیام حمل میں مستورات کو دانت درد۔ بیلادونا۔ نکس و امیکا۔ کافیا۔

کیومیل۔ سی پیا۔ شانی سگریا اور کرپوزوٹ ۶x

دانت درد کی مشہور ادویات: پلانٹی گو۔ مرکورس۔ کرپوزوٹ اور

گلونائین ۶x

## تشریح علامات الادویات

ایکونائٹ: جب دردی کا ایک شروع ہو گیا ہو اور بے چینی خوف اور گھبراہٹ بھی ساتھ ہوں، درد کی زیادتی کی وجہ سے مریض پاگل سا ہو گیا ہو۔

خوراک: ۱x یا ۲x ثانی یوشن کے چار یا پانچ قطرے صاف روئی کے چھوٹے سے پھوٹے رہنجابی تونبر، پر ڈال کر یہ پڑا مقام ماؤف میں رکھنا چاہیے اور دوائی کو باہر نہیں تھوکنا چاہیے یا ۱x یا ۲x تری یوشن لے کر ماؤف مقام پر ملنا چاہیے اور باہر تھوکنا نہیں چاہیے۔ بلکہ دوائی اندر جانی چاہیے۔ اس طرح سے ہر نصف گھنٹہ کے بعد دوائی دہرائی چاہیے۔

بیلادونا: دانتوں میں چرنے والے درد جو کئی ایک دانتوں تک پھلتے ہوں اور کسی خاص دانت کو نہ تبا سکتا ہو۔ درد ادھر ادھر جھٹکوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہو۔ منہ لال ہو اور موٹھے موج گئے ہوں اور گرم ہوں اور شب کو درد کی زیادتی ہوتی ہو۔

خوراک: ۱x یا ۲x بطرز مذکورہ بالا جیسا کہ ایکونائٹ میں بیان ہوا ہے۔

مرکورس: پرانے اور گلے سرے دانتوں میں جب درد ہو اور کئی ایک



دانتوں میں ایک ساتھ درد ہو۔ یعنی دانتوں کی ٹری میں درد ہو۔ تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک :  $3 \times$  بطرز مذکورہ بالا

کافیا : جب منہ میں ٹھنڈا پانی پینے سے درد کا آرام ہو۔

خوراک :  $2 \times$  یا  $3 \times$  بطرز مذکورہ بالا۔

کلکیریا کارب : جب ٹھنڈا پانی پینے یا سرد ہوا لگنے سے درد شروع ہو

جائے۔

خوراک :  $3 \times$  بطرز مذکورہ بالا۔

کریوزوٹم : جب ابتداء میں ہی دانت بوسیدہ ہو گئے ہوں اور سیاہ

پڑ گئے ہوں

خوراک :  $3 \times$  بطرز مذکورہ بالا۔

میکنیشیا فاس : جب دانتوں میں ریشہ کا (یعنی عصبی) درد ہو۔

خوراک :  $4 \times$  یا  $12 \times$  بطرز مذکورہ بالا۔

پلانٹی گو میجر : دانت درد کی یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ اسی فیصدی

حالتوں میں صرف اسی دوائی کے دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔ جب کسی دوائی کے

علامات صاف طور پر آشکارا نہ ہوں تو پلانٹیگو میجر  $2 \times$  یا  $3 \times$  بطرز مذکورہ بالا جیسا

کہ ایکونائٹ کے بیان میں مذکور ہوا۔ استعمال کرنی چاہیے۔ پلانٹیگو میجر کی ۵ مدر

ٹینکچر ماؤف سوڈھول پر یا درد والے مقام میں رخساروں پر ملنے سے درد کا آرام

آجایا کرتا ہے۔ جس طرف کا دانت درد ہو اس طرف کے کان میں اس دوائی کی مدر

ٹینکچر کے چند قطرے ٹپکانے سے دانت درد کا آرام آجایا کرتا ہے۔ دانت درد

اور کان درد ایک ساتھ ہوں۔

شافی سیکریا : حاملہ عورت کے دانت درد کے لیے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے

نیز جب دانت سیاہ ہو گئے ہوں، کھائے جا رہے ہوں۔ چھونے سے بڑا درد ہوتا

ہو یا ٹھنڈی اشیاء کے پینے سے درد میں زیادتیاں ہوتی ہو۔

خوراک :  $5 \times$  یا  $3 \times$  بطرز مذکورہ بالا جیسا کہ ایکونائٹ میں مذکور ہوا۔ ہر ایک

گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیل : جب دانت میں درد کی زیادتی گرم اشیا کے کھانے یا پینے سے ہوتی ہو۔ جب مریض رات کو بستر میں گرم ہو تو درد ناقابل برداشت ہو۔  
خوراک : ۱x یا ۳x بطرز مذکورہ بالا۔

سلیشیا : جب دانتوں کی جڑوں میں پھوڑے ہو گئے ہوں اور ناسور ہو گئے ہوں۔ گرم غذا کھانے سے درد بہت ہو یا ٹھنڈی ہوائ میں لینے سے درد میں زیادتی ہو۔ رات کے وقت درد زیادہ ہو اور دانت ہلتے ہوئے معلوم ہوں۔

خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

میگنیشیا کارب : حاملہ کے دانت درد کے لیے یہ ایک خاص دوائی ہے۔  
خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سی پیا : بقول ڈاکٹر لی وٹ حاملہ عورت کے دانت درد کے لیے یہ دوائی اکیر کا حکم رکھتی ہے۔

خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سپائی جیلیا : بوسیدہ دانتوں میں جب دردیں پھاڑنے والی ہوتی ہوں اور جبرے کی بڑی تک دردیں جاتی ہوں۔ ٹھنڈے پانی سے بوسیدہ دانتوں میں جھٹکے کی دردیں ہوتی ہوں۔ کھانے یا تبا کو نوشی یا بیٹنے سے درد شروع ہو جاتا ہو اور مارے قدرت درد کے مریض کو بستر پر سے اٹھنا پڑتا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔  
خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آرنیکا : دانت نکلوانے کے بعد جب خون جاری رہے اور درد ہوتی ہو یا مصنوعی دانت لگوانے سے ورم ہو گئی ہو یا دانت کو بھر دانے سے درد پیدا ہو گئی ہو، تو ایسے حالات میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ دیکھن کا احساس ہونا۔ اس کی خاص علامت ہے۔

خوراک : ۱x یا ۳x ہر تیس منٹ یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

## REPORTOR

## ریپورٹری

## بلحاظ وقت کے

دانت درد رک رک کرتا ہو: بیلڈونا - کلکیریا - کیومیل - کافیا - برائی اوینا -  
مرکیورس - نکس و امیکا - پٹلا - رشاکس - سلیشیا - شانی سگریا - سلفر -  
دانت درد لگاتار رات دن رہتا ہو: بیلڈونا - کلکیریا - نیٹرم میور -  
سلیشیا - سلفر -

دانت درد ستر میں زیادہ ہو: اینٹم کرڈم - مرکیورس -  
دانت درد شام کو ہو: پٹلا -

دانت درد رات کو ہو: اینٹم کرڈم - بیلڈونا - برائی اوینا - کلکیریا -  
کاسٹیکم - ہیرسلف - ہائیوسائی مس - اگنیشیا - مرکیورس - نکس ماشکاٹا - نکس و امیکا -  
فاسفورس - پٹلا - رشاکس - شانی سگریا - سلفر -

دانت درد ہر تیسرے روز ہوتا ہو: کیومیل - نیٹرم میور -

ساتویں: آرسینک - فاسفورس - سلفر -

ہر موسم بہار میں ہوتا ہو: اکیونائیٹ - بیلڈونا - برائی اوینا -  
کلکیریا - کاربودیکی - ڈکامارا - لاکس - نیٹرم میور - نکس و امیکا - پٹلا - رشاکس -  
سلیشیا - سلفر -

## دانت درد میں زیادتی ہوتی ہو

بوقت شرب: کلکیریا - کارب - گریفائیٹس - مرکیورس -

قبل از طوفان: روڈوڈنڈرن -

ٹھنڈی ہوا میں: کلکیریا - کارب - ہائیوسائی مس - نکس و امیکا -

گھلی ہوا میں: کونیم - نکس و امیکا -

کھاتے وقت : کالی کارب - نیٹرم کارب - زنکم -  
کھا چکنے کے بعد : کیو میلا - کالی کارب

## دانت درد میں کمی واقع ہوتی ہو

ٹھنڈا پانی پینے سے : برائی ادینا -  
گرم " : لائیکو پوڈیم - نکس و امیکا - سلفر  
دانتوں کو ایک دوسرے کے اوپر دبانے سے : آر سینکم - چائنا - کافیا -

## دانت درد شروع ہو جایا کرتا ہو

ٹھنڈی خوراک کھانے یا ٹھنڈا پانی پینے سے : کلکیر یا کارب - کار بودیجی  
کیو میلا -  
گرم غذا کھانے سے : کیو میلا - کافیا - نکس و امیکا - پلسلا -

## ضروری ہدایات

دانتوں کی حفاظت : دانتوں کا فعل جسم میں ایک نہایت ضروری فعل ہے۔ اس لیے ان کو درست حالت میں رکھنا بڑا ضروری ہے۔ روزانہ دانتوں کو دانت یا بریش سے صاف کرنا چاہیے اور کھانا کھانے سے بعد کلی کر کے دانتوں کو صاف کر دینا چاہیے اور رات کو سوتے وقت بھی اچھی طرح سے کلی کر کے سونا چاہیے۔ بہت گرم کھانا اور پینا درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس عادت سے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ نیز دانتوں کو بہت زیادہ سردی پہنچانا بھی درست نہیں، یعنی برف وغیرہ کا چبانا دانتوں کو خراب کرتا ہے۔ پان اور تمباکو کی زیادہ عادت سے اور نیز شراب نوشی سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان عادات کو ترک کر دینا چاہیے۔ سگریٹ بھی دانتوں کے لیے مضر ہے۔

جب بوسیدہ دانت کا سودا خ بڑا ہو تو کسی ہوشیار دندان ساز سے اس کو بھروا دینا چاہیے۔ لیکن بھرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ سودا خ مذکورہ میں سونڈش یا

پیپ نہ ہو۔ اگر سوزش یا پیپ ہوگی تو بھروانے سے اور بھی زیادہ تکلیف بڑھ جائیگی۔  
**دانت نکلوانا:** عام مقولہ ہے کہ جب دانت درد ہو تو دانت کو نکلوا دینا  
 چاہیے لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ بذریعہ علاج جب تک ماؤٹ دانت کے  
 اچھا ہو جانے کی امید ہو۔ تب تک اسے ہرگز نکلوانا نہیں چاہیے بلکہ مناسب علاج  
 کرنا چاہیے تاکہ درد وغیرہ موقوف ہو جائے۔

**نوٹ:** اب تو بڑے بڑے ایوینٹیک ڈاکٹر بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب تک  
 دانت علاج وغیرہ سے درست ہو سکتا ہے۔ تب تک اس کو نکلوانا نہیں  
 چاہیے۔ لیکن ہو میو پیٹھک ڈاکٹر تو شروع سے ہی باواز بند پکار کر کہہ رہے  
 ہیں کہ تبسم پر کبھی بھی چاقو نہ چلاؤ۔ یعنی آپریشن وغیرہ نہ کراؤ۔ جب تک کہ  
 ادویات سے درست ہونے کی توقع ہو، چونکہ ہو میو پیٹھک، میٹریا میڈیکا میں  
 ہر ایک مرض کے لیے بے شمار ادویات درج ہیں اس لیے ہو میو پیٹھک ڈاکٹر  
 کو علاج میں مایوسی نہیں ہوا کرتی۔ بشرطیکہ ماؤٹ مقام کی قوتِ زیست  
 (VITALITY) موجود ہو۔

بعض مریض شدتِ درد سے پتلا ہو کر مضبوط دانت نکلوانے پر بضد ہوتے ہیں  
 لیکن یہ ان کی بھول ہے مضبوط دانت کو نکالتے وقت بعض اوقات وہ ٹوٹ جاتا  
 ہے اور نہایت تکلیف کا موجب بنتا ہے منہ سوج جاتا ہے اور درد بڑھ جاتا  
 ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مضبوط دانت کو کھینچتے وقت جبرٹے کی ہڈی ٹوٹ  
 جاتی ہے جو کہ نہایت ہی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ مضبوط دائرہ نکالتے وقت  
 آنکھ کو بھی صدمہ پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ تا وقتیکہ ہر قسم کا علاج  
 بے سود ثابت ہو جائے تب تک دانت کو نہ نکلایا جائے جن اشخاص کو سکروئی کی  
 بیماری ہو۔ انہیں حتی الوسع دانت نہیں نکلوانا چاہیے کیونکہ ایسے اشخاص میں اور  
 بعض اوقات دموی مزاج کے اشخاص میں دانت نکالنے کے بعد بہت زیادہ خون  
 خارج ہوتا ہے اور بعض اوقات مریض کی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں ایسے اشخاص  
 کے دانت نکالنے کی اگر شد ضرورت پڑ جائے تو دانت نکالنے والے کو بہت احتیاط  
 سے کام لینا چاہیے اگر دانت نکالنے کے بعد خون بند نہ ہوتا ہو تو تھوڑی سی صاف

روٹی لے کر اور آرنیکا یا کیلنڈولا کے چار یا پانچ قطرے اس پر ڈال کر ماؤف مقام میں رکھیں اور آرنیکا  $1 \times$  یا  $2 \times$  کی چند خوراکیں بھی مریض کو اندر دیویں یا روٹی کی پھریری پر تھوڑی سی سفوف چٹکڑی چھڑک کر ماؤف مقام پر ٹھونس دیں۔  
غذا: مریض کو ہلکی یعنی دودھ، فرنی یا ساگو دانہ وغیرہ دیں۔ گرم اغذیہ اور مصالحہ سے پرہیز لازم ہے۔

## مسوڑھوں کا پھوڑا

(GUM BOILS)

اس مرض میں خاٹہ دانت میں ایک چھوٹا سا پھوڑا ہوتا ہے جس کا منہ مسوڑا میں جاتا ہے اور بعض اوقات رخسار میں جاتا ہے۔

**علامات مرض:** ماؤف دانت میں درد جو کہ جڑے تک پھیلتی ہے۔ گرمی، ورم۔ یہ اس کے علامات ہیں۔ تکلیف بعض اوقات بہت ہوا کرتی ہے۔ اور بمقابلہ دن کے رات کو زیادہ ہوتی ہے اور عموماً کم و بیش بخار بھی ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض:** بوسیدہ دانت میں خراش کا ہونا، عموماً اس مرض کا سبب ہوا کرتا ہے بعض اوقات سردی لگنے سے بھی پھوڑا بن جاتا ہے۔

## علاج

**مرکیورس:** مسوڑا متورم اور لگاتار دکھتا ہوا دلتعاب دہن بکثرت نکلتا ہو جن اشخاص کو یہ مرض بار بار ہو جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ دوائی بطور حفظہ ماتقدم دن میں روزانہ دو مرتبہ ایک یا دو ہفتہ کے لیے استعمال کر پھوڑیں۔  
خود پاک:  $1 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

**ایکونائٹ:** ابتداء کے مرض میں اگر اس دوائی کا استعمال کرایا جائے تو وہ مرض کو روک دیتی ہے اور بیماری بڑھنے نہیں پاتی۔ مرکیورس اور ایکونائٹ اس مرض میں باری باری سے دیتے ہیں جب تک کہ بخار بھی ساتھ ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بلا ڈونا : ٹیکن کا سر درو چہرہ تمٹایا ہوا اور شور و روشنی برداشت نہ ہو سکتے ہوں۔ اس دوائی کو اور مرکبوں کو باری باری سے بھی دیتے ہیں۔

خوراک : ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : نچلے جبرے کے دانت جب بوسیدہ ہو گئے ہوں اور ان کے مسوڑھوں پر پھوڑے ہو گئے ہوں تو یہ ایک نہایت اعلیٰ دوائی ثابت ہوتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف : جب مسوڑے کے پھوڑے میں پیپ بھر جانے کا خطرہ پیدا ہو

کیا ہو تو یہ دوائی کار آمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x یا ۳x کی خوراکیں دینے سے پیپ جلد بھر کر پھوڑا یک جا

گا۔ لیکن اگر یہ مطلوب ہو کہ پیپ پیدا ہی نہ ہو تو پھر اس دوائی کی اونچی طاقت کی خوراکیں ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد دینی چاہئیں۔ یعنی ۳۰ یا ۲۰۰ کی طاقت۔

سلیشیا : جب پھوڑا پھٹ چکا ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے، چونکہ یہ

دوائی مرکبوں کے متضاد ہوتی ہے اس لیے اس دوائی کو فوراً ہی مرکبوں کے بعد نہیں دینا چاہیے۔

خوراک : ۳x ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : جب مرض مزمن ہو چکا ہو۔ تب یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ نیز اس

دوائی کی خوراکیں دیگر مناسب علاج کے دوران میں گاہے گاہے دی جاتی ہیں۔ تاکہ منظرہ دوائی اپنا پورا اثر کر سکے۔

خوراک : ۶x یا ۳۰ ہر تین یا چار گھنٹہ کے بعد۔

علاوہ مذکورہ بالا ادویات کے کلکیر یا فلوریکا ۲x یا ۳x بھی مفید دوائی ہے

جب کہ پھوڑا سخت ہو۔

## ضروری ہدایات

گرم گرم نمور کرنا اور پلش باندھنا مفید ہوتا ہے بعض اوقات دانت نکلوانا

اور پھوڑے پر نشتر لگوانا بھی درد سے فوراً نجات دیتا ہے۔

## زبان کی سوجن، ورم اللسان

(GLOSSITIS)

شروع مرض میں زبان میں درد ہوتا ہے اور گرم ہوتی ہے پھر یکایک متورم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ اتنی سوج جاتی ہے کہ منہ سے باہر نکلنے لگتی ہے۔ منہ سے پانی بہت جاتا ہے اور مریض کے لیے کھانا، نگلنا یا بولنا دشوار ہوتا ہے اور سانس رک جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کبھی گردن کی رگیں بھی پھول جاتی ہیں۔ بے چینی اور بخار ہوتا ہے اور کبھی بسبب سوزش زبان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔

**اسباب مرض:** زبان پر زخم آنا۔ معدے یا آنتوں کی خرابی و انتوں کی خرابی، بعض شدید امراض مثلاً شدید بخار، چیچک، خنانہیر وغیرہ فساد آتشک مرکبات پارہ کا استعمال گرم گرم کھانا کھانا یا تیز مصالحہ دار چیزیں کھانا۔ زیادہ کر دوا تمباکو پینا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔

## علاج

ایکونائیٹ اور مرکیورس: یہ دونوں ادویات اس مرض میں شافی ہوتی ہیں۔ بشرطیکہ اس مرض کا باعث مرکبات سیماپ (پارہ) کا استعمال نہ ہو۔ یہ دونوں ادویات ایک دوسرے کے بعد باری باری سے دی جاتی ہیں۔

خوداک: ایکونائیٹ ۳x، مرکیورس ۶x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا اور ہیرسلف: جب یہ مرض پارہ کے بکثرت استعمال کی وجہ سے ہو تو یہ دونوں ادویات چمچے بعد دیگر باری باری سے دینی جائیں۔

خوداک: ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

ایڈنائٹسک اور کاربودیچی بھی مفید ادویات ہیں، جب کہ مرض کا باعث مرکبات سیماپ کا استعمال ہو۔



خوراک : ۳x یا ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

ایمپس : اگر سوجن بہت زیادہ ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

کینتھرس : اگر زبان جھکس گئی ہو یا جل جانے کی وجہ سے سوج گئی ہو، تو یہ

دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد

اکسالک ایسڈ : جب زبان سوج گئی ہو۔ پھل گئی ہو یا اوپر کی جھتی اتر گئی ہو

تو یہ دوائی دینی چاہیے۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ : جوں جوں مرض میں افادہ نظر آئے توں توں دوائی دینے کے وقفہ کو لمبا کرتے جانا

چاہیے۔ یعنی دوائی کی خوراک نسبتاً دیر سے دینی چاہیے۔

ضروری ہدایات : ہر قسم کی غرض کو رفع کریں اور قبض کو دور کرنے کے لیے

ایما کریں۔ نیز مرض کے اصل سبب کو دریافت کر کے مناسب علاج کریں۔

غذا : مریض کو سرد اور تپلی دینی چاہیے۔ مثلاً مودھ، آش جو وغیرہ، گرم اور

مصالحہ دار اشیاء سے پرہیز کرائیں۔

## زبان کا پھٹنا۔ شقاق اللسان

(CRACK FISSURE OF THE TONGUE)

اس مرض میں زبان کئی جگہوں پر پھٹ جاتی ہے۔ کھانے اور بولنے میں تکلیف

ہوتی ہے۔

اسباب مرض : معدہ کی خرابی۔ پانی میں زیادہ چونا کھانا، تیز مصالحہ دار

غذائیں کھانا۔ ترش اشیاء۔ مثلاً چٹنی، اچار وغیرہ کا بکثرت استعمال کرنا اور بد معنی وغیرہ

## علاج

بیلادونا: زبان پھٹی ہوئی خشک اور سُرخ ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آرم ٹری فاسیلیم: زبان پھٹی ہوئی اور درد کرتی ہو اور اس میں سے خون نکلتا ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

رس وی فی ٹاٹا: زبان میانہ میں پھٹی ہوئی ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ اسے نینتھس، ایپس، آرسینکیم، کن ڈیورانگو، فلورک ایسڈ، لائیگو پوڈیم، رشاکس، سپائی جیلیا، مرکیورس، سلفر، وراٹرم، نائٹرک ایسڈ بھی اپنی اپنی علاماتِ مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

ضروری ہدایات: زیادہ مصالحہ دار ترش اور نمکین چیزوں سے نیز چونا کھانے سے پرہیز کریں۔ زبان پر بورو گلیسرین لگاویں جب تک ایسڈ م رقی اور گلیسرین ایک ادس یعنی آدھی چھٹانک ملا کر

غذا: سردیوں - دودھ - ساگودانہ - فرنی وغیرہ۔

## زبان کا فالج

(PARALYSIS OF THE TONGUE)

کاسٹیکم: اس مرض کی خاص دوا ہے۔

خوراک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ڈلکا مارا: زبان مفلوج ہو۔ سوچی ہوئی اور سخت ہو۔ مریض زبان باہر نہ نکال سکتا ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

جاسٹی میم : زبان بہت موٹی محسوس ہوا اور مریض بتسل بول سکتا ہو۔  
خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

## زبان کے دیگر امراض و علامات

جباتے وقت یا بولتے وقت زبان دانتوں کے نیچے آکر کٹ جاتی ہو  
کاسٹیکم۔ اگنیٹیا۔ پٹرو لیم۔ فاسفورک ایڈ۔ لاکس  
زبان پر چھالے ہوں : امونیم میور۔ ایپس۔ آر سینکم۔ گریفائٹس۔ نیٹرم  
میور۔ نائٹرک ایڈ۔ حقوجا۔ زنگم۔ لاکس  
زبان جلتی ہو : آر سینکم۔ کاسٹی کم۔ لاکس۔ مرکیورس کار۔ فاسفورک  
ایڈ۔ سلفر۔

زبان ٹھنڈی ہو۔ بیلاڈونا۔ کاربودیجی۔ کیفیر۔ وراٹرم ایلم  
زبان کی نوک ٹھنڈی ہو : کالچی کم۔ کوپرم میٹیلیکم۔  
زبان خشک ہو : ایکونائٹ۔ آر سینکم۔ آر جنٹم نائٹرکیم۔ اے لینتس  
ڈلکامار۔ لائیکو پوڈیم۔ میورٹک ایڈ۔ نکس ماشکاٹا۔ پائی لوکارپس۔ رشاکس۔  
سلفر۔ وراٹرم ایلم وغیرہ۔

زبان خشک ہو بوقت صبح : نکس ماشکاٹا۔ پٹلا۔ رشاکس۔ سلفر۔  
معلوم ہو لیکن حقیقتاً خشک نہ ہو : نیٹرم میور۔  
زبان وزنی ہو : بیلاڈونا۔ لاکس۔ میورٹک ایڈ۔ کاربودیجی۔  
زبان پر دانتوں کے نشانات ہوں : آر سینکم۔ مرکیورس۔ پوڈوفالیم  
زبان خارش کرتی ہو : ایوٹا۔ سلفر۔  
زبان پھیلی۔ لمبی اور چوڑی ہو : ہائیڈراسٹس۔ کریوزوٹ۔ مرکورس  
پوڈوفالیم

زبان حرکت کرتی رہتی ہو : اندر اور باہر ہو : کوپرم ایسی ٹیٹ۔ لائیکو  
پوڈیم۔ سلفر  
زبان باہر نکالنے پر اندر باہر حرکت کرتی ہو : لاکس

زبان نیچے لٹکی ہوئی ہوئی ہو: لائیکو پوڈیم - سٹرا مونیم -  
 زبان سن ہو: ایکونائٹ - اگاری کس - امبراگوشیا - کالجی کم - جلی میم -  
 نیٹرم میور - نکس ماشکاتا -

نکلتے وقت زبان کی جڑ میں درد ہوتا ہو: فانی ٹولا کا -  
 زبان کے نیچے گھٹی ہو جس کو انگریزی میں رے نولا کہتے ہیں: امبراگوشیا  
 گلکیریا کرب - مرکورس - میزیریم - نائٹرک ایسڈ  
 گھٹی نیلگوں ہو: تھوجا

زبان لوزتی ہو: اگاری کس، ایپس، بیلادونا - جلی میم - ہیلی بورس  
 لاکس - لائیکو پوڈیم - مرکورس -

زبان لوزتی ہو اور نوکیلی ہو: مہی سی فوگا -

## زبان کی رنگت

سیاہ: آر سینکم - کاربودیجی - چائنا - کینتھرس - لاکس - مرکورس -  
 فاسفورس - ورائٹم ورائٹڈ

نیلگوں: آر سینکم - ڈیجی ٹیلیس -

جھوسلی: آر سینکم - بیپ ٹیشا - بیلادونا - برائی اوینا - کورڈیلیس - کالی  
 فاس - لاکس - رشاکس - سلیشا -

جھونسلی میانہ میں: بیپ ٹیشا - کالی بائی کورڈیکم، پانی رجبی نیم -

سبز: میکنیشا کرب - نیٹرم سلف - نائٹرک ایسڈ - رشاکس -

سرخ: ایپس - آر سینکم - بیلادونا - ہایوسائی مس - کالی بائی کورڈیکم - لاکس  
 مرکورس - پوڈوناٹیم - رشاکس - انٹیم مارٹ - آرم رڈی فائلم -

ارغوانی سرخ ہو: کورڈیلیس

چمکیلی سرخ ہو: ٹاکس - نکس دامیکا - ٹیری بن تھینا -

سرخ لکیریں ہوں: انٹیم مارٹ

میانہ سرخ ہو: آر جنٹم نائٹریک - آر سینکم - انٹیم مارٹ - ورائٹم ورائٹڈ -

کنارے سُرخ ہوں : آر سینکیم - بیل ڈونا - ساٹنا - رٹاکس - وراٹرم ایلم -  
 نوک سُرخ ہو : آر جنٹم ناٹریکیم - ایپس - آر سینکیم - فانی ٹولا کا - وراٹرم

ایلم -  
 نوک پر تکیونی شکل کی سُرخ ہو : رٹاکس  
 سُرخ دھتے ہوں : مرکیدس  
 سفید ہو : اینٹم کرڈم - برائی ادینا - بسمتھ ، کاربالک ایڈ - چائنا - ڈبچی  
 ٹیلس - کالی میوڈ - مرکیدس - نکس و امیکا - پٹرولیم - پٹلا -  
 زبان سفید ہو اور نقشہ کی مانند اس پر لکیریں ہوں : نیٹرم میوڈ -  
 زرد ہو : چائنا - چیلی ڈونیم - کالوسنتھ - برائی ادینا ، کالی بائی کرومیکم  
 پینڈا - مرکورس - نکس و امیکا ، وراٹرم ایلم -  
 ہلکی زرد ہو : ہائی ڈراسٹس - کالی سلف - پٹلا -  
 جوط میں زرد ہو : کالی بائی کرومیکم - مرکیدس - نکس و امیکا -  
 میانہ میں زرد ہو : بیپ ٹیشیا - وراٹرم ورائیڈ

## زبان کا ذائقہ

ذائقہ ندارد ہو : ایو مینیا - آئرس درسی کوہر ، لائیکو پوڈیم ، نیٹرم میوڈ  
 پٹلا - سلیٹیا -  
 ذائقہ کڑوا ہو : کارڈوس مریانس ، کیمومیل - چیلی ڈونیم ، نیٹرم سلف -  
 نکس و امیکا - پٹلا - سلف -  
 ذائقہ کڑوا بوقت صبح : کلیریا کارب - نکس و امیکا  
 ہر چیز کا ذائقہ تلخ ہو : ایکونائیٹ - برائی ادینا - کالوسنتھ  
 مالو متواتر کڑوا ہو : پٹلا - برائی ادینا - کالی سلف - سلف  
 خونی ہو : اپی کاک - نکس و امیکا - لیم مگرئی نم -  
 خونی بوقت صبح ہو : سلیٹیا -  
 چاک نما ہو : نکس ماسکاتا -

ساتبا نما ہو: بستمہ - کوپرم میٹلیکم - کالی بانی کوسیکم، نیرم میورنیکس دایکا -  
فانی ٹولا کا - رٹاکس - سلفر - زنکم -

ڈالٹہ گندہ ہو: فلورک ایٹر - کالی فاس -

چکنا ہو: ایٹا فوٹا - کاسٹیکم - پستلا - دلیرانا - ایسی کیولس - کیوپے با  
پیاز نما ہو: ایتھوزا

نمکین ہو: کاربودیجی - چاننا - سائی کلیمن - آیوڈیم - مرکوریس - فاسفورس  
پستلا - سی پیا - زنکم -

صابون نما ہو - آیوڈیم -

میٹھا ہو: ایلومینیا - ڈیجی ٹیلس - مرکوریس - ایڈٹائیٹرک، فاسفورس -  
پستلا - سلفر - شینم -

## کو اگڑنا - کو ا پھولنا

### ELONGATION OF THE UVULA - UVULA SWOLLEN

اس مرض میں کو ا ڈھیلا اور لمبا ہو کر نیچے کو ٹنگ جاتا ہے - جس کے باعث  
گلے میں خراش پیدا ہوتی ہے - اور بار بار خشک کھانسی ہوتی ہے - یہ کھانسی اور بھی  
زیادہ ہو جاتی ہے - جب کہ مریض کمر کے بل لیٹتا ہے -

اسباب مرض: حلق کی سوزش یا حلق کی خراش اس کا سبب ہے نیز گاڈ  
رنقرس، یا وجع المفاصل (جوڑوں کا درد) کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے -

### علاج

مرکوریس کار: جب کو ا سوجا ہوا ہو - متورم یا پھولا ہوا ہو -

خوزاک: ۶x ہر ۱۰ گھنٹہ کے بعد نیز مرکوریس کار ۳x ٹری ٹیوڈین (سفن)  
کو برش پر لگا کر کونے پر لگاتے ہیں -

ہائیوسائی مس: کو ا پھولا ہوا ہو - جس سے خراش دار کھانسی آتی ہو - لیٹنے پر

زیادہ تکلیف ہوتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

الیمین : کوآگر گیا ہو۔ ڈھیلا ہو اور حلق میں خراش ہوتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کوتے کے گرنے میں بروڈیم - کلکیریا کارب - آیوڈیم - لاکس - وائیکو

پوڈیم، سلیشیا اور سلفر ادویات بھی کام آتی ہیں۔

کوتے کے پھوٹنے (مانند تھیلی) میں بیپ ٹیشیا، کالی بانٹی کرومیکم اور

رستاکس ادویات کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

پانی میں دس گرین پھسکری فی اونس کے حساب سے ڈال کر اس سے

غذا سے کہتے ہیں، نیز کوتے پر ٹنگچر آیوڈین لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔ جب

کسی علاج سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کوتے کو تھوڑا سا کٹوا دیتے ہیں۔ اگر مریض کمزور

ہو۔ تو اس کو غذا مقوی دینی چاہیے۔

## حلق کی سوچن - رد گلو - سیکچاروں کا رد گلو

(PHARYNGITIS SORE THROAT)

شدید سوچن میں خفیف لرزہ لگ کر بخار ہو جاتا ہے اور گلو درد کرتا ہے

پاس لگتی ہے۔ اگر کوتا بھی بتلائے مرض ہو، تو بار بار حلق میں خراش ہو کر

کٹانسی اٹھتی ہے۔ مریض بار بار نگلنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ اس کو ایسا معلوم

ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے گلے میں ٹکی ہوئی ہے۔ آواز بیٹھ جاتی ہے۔ حلق

کے اندر دیکھنے پر جھلی تورم اور سُرخ پانی جاتی ہے۔ بلغم بکثرت خارج ہوتی

ہے۔ منہ کا ذائقہ خراب اور سانس سے بدبو آتی ہے۔ اگر ورم کان کی

اندرونی نالی کی طرف بڑھ جائے۔ تو مریض بہرا ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض - سوزش حلق، خناق، کسی خراشدارشے سے یا گردوغبار کا گلے میں چلا جانا - بہ آواز بلند چلا چلا کر بولتے رہنا - سردی کا لگ جانا - بعض اوقات بکثرت شراب نوشی یا سگریٹ نوشی سے یہ مرض ہو جاتا ہے - نیز بد مضمی آشک، نقرس اور رسل کی وجہ سے بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے -

## علاج

مرض کے ابتداء میں یا شدید مرض میں ایکونائٹ - بیلادونا - مرکوریس ناجا - ایپس - آیوڈیم، کالی بانی کرومیکم، فانی ٹولا کا اور مرکوریس سیانائٹس کام آتی ہیں -

مزمن سوزش گلو میں - ہائیڈراسٹس - کلیریا فاس - مرکوریس - الیومینا کالی بانی کرومیکم - آرسینکم - برومیم - براسٹا کارب - کیپ سی کم - اگنیشیا - لاکس - آرنیکا - ایسی کیولس - فانی ٹولا کا - ارجنٹم نائٹریکم - کاربوجی کام آتی ہیں -

لیکچراروں کے درد گلو میں - فانی ٹولا کا - مرکوریس - آیوڈائیڈ آرم - آرنیکا اور بیلادونا وغیرہ ادویات کام آتی ہیں - ایکونائٹ - جب کہ ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے یہ مرض ہو گیا ہو اور بخار بھی ساتھ ہو - بے چینی اور گھبراہٹ بہت ہو -

خوراک - ۳ x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد -

بیلادونا - حلق خشک اور جلتا ہو - چکیلا دسرخ ہو حلق میں کوئی چیز اٹکی ہوئی محسوس ہوتی ہو - نگنا دشوار ہو، چہرہ تھمتا ہوا اور گرم ہو - بیلادونا کی یہ بھی مخصوص علامت ہے کہ مریض کو پانی پینے سے نفرت ہوتی ہے -

خوراک - ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

نوٹ : ڈاکٹر جو سٹھ ایم ڈی لکھتے ہیں کہ مزمن مرض میں اگر بیلادونا اور سلفر باری باری سے چار یوم تک استعمال کرائے جائیں اور پھر چار دن تک کوئی دوائی نہ دی جائے - بعد چار یوم کے لیے پھر دونوں ادویات



مذکورہ بالا استعمال کرائی جائیں اور اسی طرح سے یہ علاج کچھ عرصہ تک جاری رکھا جائے تو بہت مفید ثابت ہوتا ہے اور بیلا ڈونا ۱۲x اور سلفر ۳۰۔ استعمال کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

مرکیورس - یہ بھی ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ حلق خشک اور بہت دکھتا ہو۔ مریض بار بار نگلنے کی کوشش کرتا ہو۔ غدد و گلو متورم ہوں اور درد کرتے ہوں۔ حلق دکھتا ہو۔ جتنا ہو سُرُخ اور متورم ہو۔ یہ دوائی مرض کی شدید اور مزمن ہر دو حالتوں میں کام آتی ہے۔ بدبودار تنفس اس کی خاص علامت ہے۔

مرکیورس کار - کوٹا سو جا بوا ہو۔ جلن بہت ہوتی ہو۔ گلا گھٹا جاتا ہو۔ خشک اور سخت ہو۔ بیرونی گلا اور غدد بہت متورم ہو۔

مرکیورس پراٹو آیوڈائیڈ - غدد بہت سوجے ہوئے ہوں اور حلق میں موٹا گاڑھا بلغم بہت جمع رہتا ہو۔ زبان کی جڑ پر زرد فرجی ہوا اور سر اور کنارے زبان کے سُرُخ ہوں، مزمن مرض میں یہ دوائی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جب کہ درم تو کم ہو لیکن بلغم بہت کم نکلتا ہے۔

مرکیورس بن آیوڈائیڈ - اس مرض میں یہ دوائی بھی پراٹو آیوڈائیڈ کے مشابہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ دوائی شدید کیسوں میں اور مرکیورس پراٹو آیوڈائیڈ مزمن کیسوں میں کام آتی ہے۔ مزمن درم غدد میں بھی یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔

خوراک : مذکورہ بالا ادویات ۳x یا ۶x میں عموماً استعمال کی جاتی ہیں شدید حالتوں میں ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد خوراک دہرائی جاتی ہے اور مزمن حالتوں میں ہر چار گھنٹہ کے بعد خوراک دی جاتی ہے۔

فانی ٹو لاکا - حلق کا رنگ سیاہ ہوا اور غدد سیاہی مائل سُرُخ ہوں دکھتے ہوں اور نگلنے پر زبان کی جڑ میں درد ہوتا ہوا اور ساتھ ہی کرا اور اعضاء بھی دکھتے ہوں۔ مزمن کیسوں میں یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے۔ جب کہ حلق کو بلغم سے صاف کرنے کی خواہش لگاتا رہے ہو۔ یا ایسا محسوس ہو کہ حلق میں ایک گرم گولا پڑا ہے۔ گرم اشیا پینے سے تکلیف زیادہ ہو جاتی ہو، اکثر حلق کی

دائیں جانب مبتلائے مرض ہوتی ہے۔

خوراک : ۳ x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

گریفائیٹس - مزمن دردِ گلو میں جب کہ حلق میں ڈھیلے کا احساس ہو۔ یہ

دوائی دی جاتی ہے۔

خوراک - ۶ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

بیپ ٹیشیا - یہ دوائی دردِ گلو میں مفید ہوتی ہے۔ جب کہ حلق میں

زخم ہوں اور بڑی سخت بدبو آتی ہو۔ تعفن کی موجودگی اس دوائی کی خاص علامت

ہے۔

خوراک : ۱ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی میور - حلق کی سوجن میں یہ دوائی اعلیٰ ادویات میں سے ایک ہے

خدو دسوجے ہوئے اور متورم اور ان پر بھونسلے یا سفید رنگ کے وجہ موجود ہوں۔

نقص ہاضمہ کی وجہ سے جب حلق دکھتا ہو اور اس میں زخم ہو گئے ہوں تو یہ دوائی

اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

خوراک - ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالی بانی کروسیکم - دردِ گلو - خدو دمتورم اور حلق میں زخم ہوں جن

سے پیپ نما مواد خارج ہوتا ہو۔ زبان کی جڑ کی زنگت زرد ہو اور حلق میں لیسار

تھوک بھی رہتی ہو اور نیز کان کی اندرونی نالی میں درد ہوتا ہو۔ خشکی، جلن اور دکھن

اور کھڑچنے کا احساس گویا کہ حلق میں کوئی چیز چپٹی ہوئی ہے۔ یہ بھی کالی بانی کروسیکم

کی علامات ہیں۔

خوراک - ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا فاس - بقول ٹاکٹر کوپر حلق کی چھوٹی چھوٹی رسولیوں کے لیے جن کو

انگریزی میں TONSUS کہتے ہیں۔ یہ ایک اکسیر دوائی ہے۔

خوراک ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

گوائیکم - حلق کی سادہ سوجن میں جب کہ دائیں جانب تکلیف زیادہ ہو

خدو دسوجے ہوئے اور حلق اتنا خشک ہو کہ مریض کو نگلنے کے لیے منہ کو تر کرنا

جدا نہ ہو۔ یہ دوائی قریباً ایک سیر کا حکم رکھتی ہے۔ بیلادونا میں حلق زیادہ خشک اور سرخ ہوتا ہے۔ ڈنگ مارنے کی سی دردیں حلق میں ہوتی ہوں۔ حلق اور گردن دکھتے ہوں اور بولتے وقت مریض اپنی گردن کو سہارا دیتا ہو۔

خوراک: ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

اس دوائی کے غرارے بھی کراتے ہیں۔ یعنی چند قطرے مدرٹیکر کے پانی میں ملا کر اس سے غرارے کرتے ہیں۔

لائس - حلق میں ڈھیلے کا احساس ہو۔ جو کہ نگلتے وقت نیچے جاتا ہوا محسوس ہو۔ لیکن پھر اوپر آ جاتا ہو۔ حلق میں کھچاؤٹ ہو اور سانس لینا مشکل ہو۔ سو کر اٹھنے پر تکلیف زیادہ ہو جایا کرتی ہو۔ خالی نگلتے وقت درد ہوتا ہو اور سیال اشیا نگلتے وقت ناک کے راستہ نکل جاتی ہوں اور باہر کی جانب سے حلق کا چھوٹنا ناقابل برداشت ہو۔

خوراک: ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کینتھرس - حلق میں تودم ہو اور اس میں شدید کھچاؤٹ محسوس ہوتی ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ حلق میں آگ رکھی ہوئی ہے۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایسپس - حلق میں ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ پھولا ہوا ہو۔ اور رنگت اس کی چمکیلی ہو۔

خوراک: ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کیپ سی کم - بے خواری اور بجزرت تمباکو نوشی کی وجہ سے جب گلا دکھتا ہو۔ جلن ہوتی ہو اور گوا بھی گر گیا ہو اور رنگت سیاہی مائل سرخ ہو اور مری تکلیف میں زیادتی پیدا کر دیتی ہو۔ تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک: ۲x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف - جب حلق میں ایسی دردیوں ہوں، گویا کہ کوئی لکڑی کا ٹکڑا

یا پھلی کا کاٹھا چبھور رہا ہے۔ یا ایسا محسوس ہوتا ہو۔ گویا کہ حلق میں ڈھیللا پڑا ہے۔ متورم غدودوں اور حلق کے پھوڑے میں جب پیپ پڑنے کا اندیشہ ہو تو یہ

دوائی کارآمد ہوتی ہے۔

خوراک ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نیٹرم میور۔ حلق میں بال کا احساس ہو۔ کوتا ڈھیلا ہو گیا ہو اور ایسا محسوس ہو کہ حلق میں کچھ ٹھونسٹا گیا ہے۔ تمباکو پینے والوں کے دردِ گلو میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔

خوراک ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا۔ تمباکو پینے والوں، شراب پینے والوں، واعطوں اور لیکچرروں کے دردِ گلو میں یہ دوائی بھی اکثر منظر ہوتی ہے۔ چھوٹی خشک کھانسی ہوتی ہو۔ آواز بھرا گئی ہو اور گلابا لکل بیٹھ گیا ہو۔

خوراک ۶x یا ۱۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فرم فاس۔ گلا خشک، سرخ متورم اور درد کرتا ہو۔ گوتیوں اور لیکچرروں کے دردِ گلو کی یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایوڈیم۔ دردِ گلو کی جب کہ گلا متورم ہو۔ یہ بھی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ جلسی میم۔ سینی گا۔ سینگو نیریا۔ ایومینا۔ نائٹک ایڈ۔ ارجنٹم نائٹریکیم۔ اگنیشیا۔ ولیریانہ۔ کالی کارب۔ پٹلا۔ امونیم میور۔ نیٹرم آرس۔ آرسینکیم۔ آرم۔ ایٹم ٹارٹ۔ سی پیا وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علامات مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

اگر سردی لگنے سے یہ شکایت پیدا ہو گئی ہو تو گرم پانی یا جوشاندہ پوست میں فلائین کا ٹکڑا بھگو کر اس کے ساتھ گلے پر سینک کریں اور اگر کسی اور مرض کے دوران میں یہ بیماری ہو گئی ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ میگا روشی یا حقہ یا مے خواری کی عادت کو ترک کر دیں۔ ترش ثقیل۔ قابض۔ نفاخ اور گرم مصالحہ دارا شیا

سے پرہیز لازم ہے۔

غذا۔ مریض کو دودھ، ساگووانہ، اراروٹ، مونگ کی فال کا پانی، پتلی کھجڑی، آتش جواہر دہنی وغیرہ دینی چاہئیں۔

گوتوں اور لیکچراروں کو جب درد گلو کا عارضہ ہو جائے اور حلق میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو کر تکلیف کا موجب ہوں تو ان کو اپنا کام کاج چھوڑ کر آرام کی زندگی بسر کرنی چاہیے اور تھکے نوشی کی عادت کو ترک کر دینا چاہیے۔

ہر روز غسل اور تازہ ہوا میں ہوا بخوری کرنی چاہیے اور مذکورہ بالا ادویات میں سے مناسب حال دوائی استعمال کرنی چاہیے اور غذا زود مضام اور مقوی کھانی چاہیے۔

## گلے پڑنے۔ حلق کی گلیوں کا متورم ہو جانا

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے :-

۱۔ شدید ۲۔ مزمن

۱۔ شدید مرض کی علامات حسب ذیل ہیں، جاڑا لگ کر بخار چڑھ جاتا ہے اور ٹمپیرچر ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ تک پہنچ جاتا ہے۔ حلق متورم ہو کر درد کرتا ہے اور درد کی ٹیسس کانوں تک جاتی ہیں۔ غدد گلو سرخ، متورم اور بڑھ جاتے ہیں باہر کی جانب نیچے جڑے کے زیریں۔ ہاتھ لگانے سے غدد بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، سر درد کرتا ہے۔ کمر اور اعضا دکھتے ہیں۔ زبان گندی اور سانس بدبودار آتا ہے۔ بعض اوقات کوا بھی ساتھ ہی متورم ہو جاتا ہے اور بڑھ کر زبان کی جڑ میں خراش پیدا کرتا ہے۔ نگلنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ چارہ پانچ یوم تک شدید علامات بنی رہتی ہیں۔ بعدہ درم تحلیل ہونے لگتا ہے اور ہفتہ عشرہ میں آرام ہو جاتا ہے۔ یا برعکس اس کے پیپ پڑ کر پھوڑا بن جاتا ہے جو بہت تکلیف کا سبب ہوتا ہے۔

۲۔ مزمن مرض۔ شدید مرض کا حملہ بار بار ہونے کے بعد اکثر یہ مرض مزمن صورت اختیار کر لیتا ہے۔ غدد بڑھے رہتے ہیں۔ آواز بھدی، سانس بدقت اور باواز بلند خصوصاً سوتے وقت نکلتا ہے۔ تھوڑی سی بد پرہیزی یا موسم کی یکایک تبدیلی سے مزمن مرض شدید صورت اختیار کر لیتا ہے۔

اسباب مرض - بارش میں بھگینا، سردی لگنا اور متغصن و بدبودار جگہوں میں رہنے اور سانس لینے سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ سلی مزاج پارہ کا زیادہ استعمال بھی اس کے اسباب ہیں۔ یہ مرض بچپن اور جوانی میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔

بعض اوقات بعض متعدی امراض کے جراثیم ان غدودوں کے ذریعہ جسم میں داخل ہوتے ہیں جس کے باعث یہ غدود متورم اور ماؤف ہو جاتے ہیں و جمع المفاصل اور نقرس کے سبب سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔

برائٹا کارب - بقول ڈاکٹر ہوگس - یہ دوائی اس مرض میں نہایت ہی مجرب ہے۔ خواہ مرض نرم ہو۔ خواہ سخت، یہ ہر حالت میں مفید پڑتی ہے۔

خوراک: ۶x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیر یا فاس - یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ خاص کو خنزاری مزاج ولے بچوں کے لیے۔ کلکیر یا آ یو ڈاٹا بھی ایسی حالت میں مفید ہوتا ہے۔

خوراک: ۳x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائٹ و فیرم فاس - یہ دونوں ادویات ابتدائی حالت میں مفید ہوا کرتی ہیں۔ ایکونائٹ جبکہ تیز بخار ہو۔ بے چینی اور گھبراہٹ ہو اور پیاس کی زیادتی ہو اور فیرم فاس جبکہ گھبراہٹ خوف اور بے چینی زیادہ نہ ہوں اور نزلہ کی شکایت بھی ہو۔

خوراک: ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا - جب ایکونائٹ یا فیرم فاس کا وقت گزر چکا ہو تو بیلادونا دوائی نہایت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ مرنخی اور سوج اس کی علامات ہیں، نگلنے میں سخت دقت ہوتی ہے۔

خوراک: ۲x یا ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

فائی ٹولا کا - جب حلق سیاہی مائل نیلگوں ہو۔ غدود گلو بڑھے ہوئے اور نیلگوں ہوں۔ حلق میں غضب کی خشکی اور جلن ہوتی ہو۔ زبان کی جڑ میں درد ہوتا ہو اور نگلنے وقت درد کانوں تک پھیلتا ہو۔

خوراک: ۵ یا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

اس دوائی کے مدرٹنکچر کے چند قطرے گلیسرین میں ملا کر روئی کے ساتھ حلق

میں بھی لگتے ہیں۔

گو آئیکم - مرض کے ابتداء میں یہ ایک خاص دوائی ہے۔ خاص کر جب کہ نذلی علامات بھی ساتھ ہوں۔ اس کی علامات مخصوصہ یہ ہیں۔ شدید جلن، سردی، حلق گرم کر اور اعضا میں سردی اور دکھن۔

خوراک ۱x بار بار اس دوائی کی خوراکیں نہرانے سے بیماری کو جلدی آرام آجاتا ہے۔

ہیپر سلف - جب حلق میں تیر مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں یا کانٹا چھبھنے کی سی اور تیکن بہت پڑتی ہو۔ گویا کہ پھوڑا بن رہا ہے۔ چھو نہ جاسکے۔ دردیں کانوں تک گولی مارنے کی سی ہوتی ہوں۔ خوراک ۲x یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلیشیا - جب پھوڑا پھٹ جائے اور درست ہونے میں نہ آتا ہو خاص کر رکٹی پتوں میں تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے۔ نادر میں یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس - ابتداء میں یہ دوائی تھاد و نادر ہی کام آتی ہے لیکن جب یہ مرض بہت بڑھ گیا ہو۔ پیپ پڑ گئی ہو۔ سوج بہت ہو۔ تمام حلق گہرا سرخ ہو۔ لیکن غدود بہ نسبت حلق کے سیاہی پر ہوں، لعاب دھن لبیدار نکلتا ہو تنفس بدبودار، درد بمقابلہ بیلادونا کے کم ہو لیکن صحت عامہ زیادہ خراب ہو۔ حلق میں سے سانس بدقت نکلتا ہو اور ڈنگ مارنے کی سی دردیں ہوں۔ فاسد تھلی غدود اور حلق پر جم جاتی ہو۔ خوراک : ۳x یا ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

لائکس - جب سوزش بائیں طرف سے شروع ہو اور دائیں طرف کو جائے۔ ماؤف مقام سیاہ ہوں۔ سوزش بہت ہو اور مریض چھو نہ کر سکے، نکلنے وقت درویں، حلق سے کانوں تک جاتی ہوں۔ گرم اشیا کے استعمال سے تکالیف بڑھتی ہوں۔

خوراک - ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد

کالی میوڑ - یہ دوائی اس مرض میں مجرب ہے اور اس عارضہ میں کوئی دوا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حاد اور مزمن دونوں حالتوں میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جب کہ سوج بہت ہو۔

خوراک: ۶ x ۴ ٹری ٹیوریشن رسفون ہیر دو گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

شروع مرض میں برف کا چوسنا اور برف کگلے پر لگانا یا سرد پانی کی گدی رکھنا بعض اوقات فائدہ مند ہوتا ہے اور حرارت و درد کو تسکین بخشتا ہے لیکن اگر موسم سرد ہو تو مریض کو سردی سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کو زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے اور گرم پانی میں فلائین کا ٹکڑا بھگو کر اور نچوڑ کر کگلے کے گرد باندھ دینا چاہیے اور اس ترکیب سے بار بار کگلے کو سینکنا چاہیے۔ یا گرم گرم پلٹس کو کگلے پر باندھنا چاہیے۔ گرم پانی کے ابخرات کا مریض کے حلق میں پہنچانا بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر اس گرم پانی میں چار پانچ قطرے اکیونائٹ یا بیلا ڈونا کے ڈال کر ابخرات کگلے کے اندر پہنچائے جائیں تو اور بھی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ بعض کیسوں میں گرم کچی لسی (آدھ پاؤ گرم دودھ اور ایک پاؤ گرم پانی) کے بار بار غارے کرنے مفید ہوتے ہیں اور اگر اس گرم کچی لسی میں چار پانچ رتی پھسکڑی ملا کر غارے کیے جائیں تو اور بھی مفید ہوتا ہے۔

۲۔ نیز گرم کچی لسی میں گوائسکم کے پانچ سات قطرے ڈال کر دن میں تین چار مرتبہ غارے کرنے بھی فائدہ بخش ہوتے ہیں۔

۳۔ گوائسکم ریزن لازنج (قرص ٹکیہ) منہ میں ہر دو پائین گھنٹہ کے بعد ڈال کر چوستے رہیں۔ شدید کیسوں میں مریض کو باہر نہیں نکلنا چاہیے اور اگر کمرے کی ہوا خشک سرد ہو تو کمرے میں کولوں کے اوپر پانی کی کیتلی بھر کر رکھ دیں۔ اس سے پانی کے ابخرات کمرے میں پھیل جائیں گے۔ مزمن مرض میں اگر بہر اپن کا شبہ پیدا ہو جائے یا ناک میں رکاوٹ پیدا ہونے کا ڈر ہو جائے تو پہلے مناسب علاج کرائیں۔ ہو میو پیتھک ادویات کا باقاعدہ اور مناسب علاج اس مرض کو دور کر



ریتا ہے۔ لیکن اگر کسی کیس میں باوجود مناسب علاج کے بھی آرام ہوتا نظر نہ آئے تو پھر نندو دوں کو کھٹانے یا آپریشن کرانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔

غذا۔ مریض کو شدید مرض میں ساگودانہ، دودھ، آتش جو، مونگ کی دال کا پانی اور کھجڑی وغیرہ دینی چاہیے۔ اگر مریض کمزور ہو تو کاڈیور آئیل مریض کو پلائیں۔ اس مرض کے مریض کو ساحل سمندر کی آب و ہوا بہت مفید ہوتی ہے۔

### باب چہارم

## معدہ اور انتڑیوں کی بیماریاں اور مرض معدہ

### معدہ کی سوچن اور مرض معدہ

(GASTRITIS)

اس مرض میں معدہ کی اندرونی لعاب دار جھلی میں ورم ہو جاتا ہے اور اس سے سفید رطوبت بکثرت پیدا ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس پر چھوٹے چھوٹے زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ جن سے خون نکلتا ہے۔

یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے۔

۱۔ شدید ورم معدہ ۲۔ مزمن ورم معدہ۔

۱۔ شدید ورم معدہ۔ شدید ورم معدہ کا عارضہ کم و بیش ہی دیکھنے میں

آتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں۔ جلن دار دردی ہوں اور دبانے سے زیادہ ہوتی ہوں۔ ٹھنڈے پانی کی لگاتار پیاس ہو لیکن نہ ہی غذا اور نہ ہی پانی معدہ میں ٹھیرتا ہو۔ لگاتار جی متلاتا رہتا ہو۔ زبان میلی ہو اور ذائقہ خراب ہو۔ بد ہضمی۔ غشی نقاہت اور تشویش وغیرہ موجود ہوں اور اکثر خفیف بخار بھی ساتھ ہوتا کرتا ہے۔ لیکن جب مرض بہت شدید ہو تو بخار بھی تیز ہو جاتا ہے۔ ۱۰۴ کا

بخار ہو جاتا ہے۔ تے میں پہلے تو نا اضم شدہ غذا خارج ہوتی ہے اور پھر بھگم خاج ہوتا ہے جس میں گاہے خون بھی ملا ہوا ہوتا ہے۔ فم معدہ پر دبانے سے درد محسوس ہوتا ہے۔ پیشاب بمقدار خفیف اور سرخ رنگ کا آتا ہے اور اس میں تلچھٹ بکثرت نشین ہوتی ہے مریض کا دل ڈوبا جاتا ہے اور عموماً مروڑ کے ساتھ تیلے تیلے دست آتے ہیں۔

اسباب مرض : تیز قسم کی شراب پینا۔ خراب سخت گوشت کھانا۔ یا خراب قسم کی مچھلی کھانا۔ کچا یا گلا سٹرا میوہ کھانا۔ یا کچی سبزی مثلاً گاجر یا مولی کھانا۔ یا خراب ثقیل یا باسی اور متعفن غذا کھانا۔ یہ اس کے اسباب ہیں۔ نیز کسی جلانے والے زہر مثلاً شکبیا یا تیزاب یا دار چکنا اور نیز کا شک سوڈا وغیرہ کھا جانے سے معدہ میں شدید ورم ہو جاتا ہے۔ بعض بخاروں مثلاً تپ محرقہ پر سوت کے بخار اور دیگر عفونی بخاروں میں بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

۶۔ معدہ کی مزمن سوچن کے علامات یہ ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ہی معدہ میں دھیمادھیماد درد اور بوجھ اور بعض اوقات ترش پانی یا بھگم کا بذریعہ تھے خارج ہونا۔ زبان میلی یا اوپر سے میلی اور کنارے سرخ۔ مریض اکثر معدہ میں جلن کی شکایت کیا کرتا ہے۔ نفخ۔ پیاس۔ ہاتھ اور پاؤں کا جلنا۔ قبض اور نہایت رنگین پیشاب کا آنا اور پیشاب میں بکثرت تلچھٹ تہ نشین ہونا یہ سب اس کی علامات ہیں۔ اس مرض میں عموماً جگر، دل اور گردے بھی مبتلائے مرض ہو جاتے ہیں اور یہ مرض اکثر شرابیوں میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اس کے اسباب بھی خراب غذا کا کھانا، زیادہ چائے نوشی یا ٹھنڈی اشیا کا پینا۔ جب کہ معدہ گرم ہو۔ صدمہ یا چوٹ کا آنا، دائمی قبض کی شکایت کا ہونا و زرش جسمانی نہ کرنا اور ایک ہی مقام پر بیٹھے رہنا۔ رنج و غم اور فکر و تردد کا ہونا۔ دانتوں کا خراب ہونا۔ جسم میں آتشک یا نقرس یا وجع المفاصل کا زہر موجود ہونا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ شدید ورم معدہ کے بعد اکثر مزمن ورم معدہ کا عارضہ ہو جایا کرتا ہے۔

## علاج

**شدید ورم معدہ :** ایکونائیٹ - آرسینکم، فاسفورس، کینتھرس، کیمفر کالی نائٹریکم وغیرہ۔

**مزمن ورم معدہ :** نکس وایکا - آرسینکم، فاسفورس - مرکبوریس کا انیم کرڈم - آرجنٹم - نائٹریکم - برائی اونیا اور تھوجا وغیرہ۔

**ایکونائیٹ -** ابتدائے مرض میں یہ دوائی کام آتی ہے جب کہ علامت نہایت شدید ہوں - بخار ہو - معدہ میں دردناک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو یا معدہ میں اور خوراک کی نالی میں حلق تک جلن ہوتی ہو - چھلکی آتی ہو - ترش پانی منہ میں آتا ہو - پانی پینے کے بعد فوراً ہی قے آجاتی ہو، قے میں خون ملا ہوا آتا ہو اور تشویش بے ہوشی اور بے قراری بہت ہو۔

**خوراک :** ۳ x یا ۶ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

**آرسینکم -** یہ دوائی مرض شدید اور مزمن ہر دو حالتوں میں کام آتی ہے اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں - تیز جلن دار درد دل پر ایسا دباؤ گویا کہ کچلا جا رہا ہے - غشی موت کا خوف، تشنجی، بھکی - آبکائیاں اور تشویش وغیرہ غذا کا قے ہو جانا اور قے میں بغم یا خون کا آنا - قیوں کے ساتھ اسہال کا آنا جب معدہ میں زخم بھی پڑ گئے ہوں، تو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔

**خوراک :** ۳ x یا ۱۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

**فاسفورس -** یہ دوائی بھی ہر دو شدید ورم مزمن حالتوں میں کام آتی ہے معدہ میں درد ڈکار، منہ میں پانی آبکائیاں، غشی، قے میں خوراک خوردہ اور صفرا کا خارج ہونا - قے آنا - یہ سب اس کی علامات ہیں - معدہ کا بڑھ جانا بھی اس کی علامت ہے۔

**خوراک :** ۳ x یا ۱۲ x یا ۳۰ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

**کینتھرس -** معدہ میں جلن دار درد، بعض اوقات گولی مارنے کی سی دریں - ڈکار - جی تلتانا - ترشی - قے - جلن - خونی قے یا قے میں فاسد بھتی کے پھیپھڑے خارج ہونا۔

خوراک : ۶x یا ۱۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
 کیمر - معدہ میں درد اور دباؤ - گرمی اور جلن کا احساس - جی متلانا صفراوی  
 تے آنا اور تے کے ہمراہ چہرہ پر سرد پینہ یعنی تریلی کا آنا -  
 خوراک : ۱۵x یا ۱x ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
 نکسن و امیکا - مزمن درم معدہ کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے خاص کر جب  
 کہ مرض کا باعث شراب، خوری ہو - بن مریضوں کو دائمی قبض رہتی ہو - ان کے لیے  
 بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے -  
 خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
 کالی نائٹریکیم - معدہ میں درد، ٹھنڈک - ابکائیاں تے اور خون آلود تے کا آنا -  
 خوراک : ۶x یا ۱۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
 ایٹم کروڈم - معدہ میں درد، ٹھنڈک، ابکائیاں تے اور خون آلودہ  
 تے کا آنا -

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
 تھو جا - جب بھرت چائے نوشی کے باعث یہ عارضہ پیدا ہوا ہو تو تھو جا  
 کی چند خوراکیں دینے سے آرام ہو جاتا ہے -  
 خوراک : ۵ کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد -  
 نیز برائی ادویا - ار جیٹم نائٹریکیم اور مرکب ورس وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علائق  
 کی موجودگی میں کام آتی ہیں -  
 نوٹ : جب اس مرض کا باعث زہروں کا کھانا یا کاشک سوڈا وغیرہ کا نگلنا ہو تو اس  
 کا مناسب علاج کرنا چاہیے - دیکھو سمیات (زہروں کے بیان میں)

### ضروری ہدایات

اس مرض میں اس امر کا خیال رکھنا چاہیے کہ معدہ کو کلی آرام ملے اور غذا کا  
 بوجھ معدہ پر نہ پڑے، لہذا شدید مرض میں کسی قسم کی غذا ایک دو روز تک مریض کو  
 نہیں دینی چاہیے - البتہ پینے کے لیے برن سے سرد کیا ہوا پانی یا سوڈا اور گھونٹ

گھونٹ دینا چاہیے یا برف کے ٹکڑے چوسنے کے لیے دیں۔ جب مرض کا زود کم ہو جائے تو دودھ اور سوڈا واٹر بلا کر بھی دے سکتے ہیں۔ رفع درد کے لیے گرم پانی کی بوتل سے مقامِ معدہ پر سینک دیں یا گرم گرم پلٹس باندھیں۔ رفع قبض کے لیے گرم پانی اور صابن کا انیما کریں۔ مریض کو جب آرام ہو تو پھر رفتہ رفتہ اس کو لطیف اور زود مضمم غذا دینے لگیں۔ ثقیل ترش اور تیز مصالحہ دار اشیاء کا کھانا پینا چند یوم کے لیے ترک کر دیں۔

## زخم معدہ

ULCER OF THE STOMACH GASTRIC ULCER

اس مرض میں معدہ کی دیوار پر ایک یا دو یا زیادہ زخم ہوتے ہیں۔  
**علامات مرض:** اس مرض میں بد مضمی کم و بیش موجود ہوتی ہے اور عموماً کھانا کھانے کے بعد شدت کا درد ہوتا ہے۔ جس سے مریض بعض اوقات بیتا ہو جاتا ہے۔ اس درد کی شدت ایک آدھ گھنٹہ تک رہتی ہے حتیٰ کہ مریض کھائی ہوئی غذا کو قے کر دیتا ہے اور اکثر کھانا کھانے کے ایک یا دو گھنٹہ کے بعد قے ہو جایا کرتی ہے اور اس میں نا مضمم شدہ غذا کے ٹکڑے اور خون ملا ہوا ہوتا ہے اور کبھی کسی بڑی شریان کے معدہ میں پھٹ جانے سے خالص خونی قے آتی ہے کبھی زخم معدہ پھٹ کر معدہ میں سوراخ ہو جاتا ہے اور غذا پردہ صفاق میں چلی جاتی ہے اور مریض کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔

**اسباب مرض:** یہ مرض مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ خاص کر ایسی مستورات کو کہ جن کو ماہواری خونی جاری نہ ہوتا ہو اور بجائے اس کے خونی قے آتی ہو۔ اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتی ہیں۔ پرانا درم معدہ پھٹ کر زخم بن جاتا ہے یا پرانی بد مضمی کے باعث معدہ میں زخم ہو جاتا ہے۔ نیز ایسے پیشے والے کو بھی جس سے عضلات شکم پر زور پڑے۔ یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ مثلاً جوتے سینے والے وغیرہ

### علاج

اس مرض کی موٹی موٹی ادویات آر جینٹم نائٹریٹیم، کریو زوٹ، کالی بائی کریم

آر سینکم، فاسفورس - پلم بلم - یورے نیم - نائٹریکیم، ہما میلس - اپنی کاک اور ہائیڈرکس میں۔  
آر جینٹم نائٹریکیم - مقامِ معدہ میں درد بہت ہو اور بوقتِ شب درد کو  
تے آنے سے آرام ہو۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $4 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کریوزوٹ: یہ اس مرض کی مشہور دوائی ہے اور تے کو آرام دینے میں یہ  
دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $4 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کالی بانی کروئیکم - معدہ میں شدید درد خصوصاً بوقتِ شب یا تھوڑی  
سی غذا کھانے کے بعد تے ہو جاتی ہو اور تے میں خون ملا ہوا آتا ہو۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم - مقامِ معدہ میں جلن والی دردی ہوتی ہوں - مریض ہر شے خوردہ  
تے کر چھوڑتا ہے تے میں خون آتا ہو - زبان خشک اور سرخ ہو اور پیاس کی  
زیادتی ہو - نقاہت بہت ہو۔

خوراک:  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس - مقامِ معدہ میں پھارنے والی دردی ہوتی ہوں تے خونی  
تے نیز ہچکی کے ہمراہ خوردہ غذا کا پھر منہ میں واپس آنا - اس کی علامات ہیں -

ڈاکٹر جوٹھ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اس مرض (زخمِ معدہ) میں یہ دوائی  
اتنی مفید نہیں پائی گئی جتنی کہ آر سینکم اور کالی بانی کروئیکم مفید پائی گئی ہیں۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $4 \times$  یا  $12 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پلم بلم - شدید قبض، تے، ہچکی، یہ اس کی علامات ہیں۔

خوراک:  $4 \times$  یا  $30 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

یورے نیم نائٹریکیم - ڈاکٹر ہیوگس اور ڈاکٹر ڈریس ڈریل اس دوائی کو اس  
مرض میں بہت مفید بتلاتے ہیں۔

خوراک:  $3 \times$  یا  $4 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

ہما میلس اور اپنی کاک - خونی قیٹوں کو روکنے کے لیے یہ دونوں ادویات

باری باری سے ہر پندرہ یا بیس منٹ کے وقفہ پر دی جاتی ہیں۔

**خوراک:** ہمایس ۵ اور اپی کاک x ۱ ٹری ٹیورلین ہر پندرہ منٹ کے بعد۔  
نوٹ: ابتدائے مرض میں کالی بانی کرومیکم یا آر جینٹم نائٹریکم سے علاج شروع کریں۔  
اگر مرض بہت ترقی یافتہ ہو چکا ہو اور جلن وار دریں اور پیاس موجود ہوں  
تو آر سینکم استعمال کریں۔

کالی بانی کرومیکم مرض کی شدید حالت میں اور آر سینکم مزمن حالت میں نہایت  
اعلیٰ ادویات ہیں۔ کریازوٹ رفع قے کے لیے دی جاتی ہے۔

## ضروری ہدایات

اس مرض میں یہ نہایت ضروری ہے کہ مریض کو چند یوم کے لیے کسی قسم کی  
غذا کھانے کو نہ دیں۔ صرف ٹھنڈا پانی گھونٹ گھونٹ دیتے رہیں یا دودھ میں لائٹ  
وانڈ بلا کر اور اسے خوب سرد کر کے تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیتے رہیں۔ جب  
مرض میں تخفیف ہو جائے تو پھر پیلا ارا روٹ یا ساگو دانہ دودھ میں پکا کر یا دودھ  
اور آتش جو بلا کر یا سادہ شور بادیں۔ جریان خون و درد کو روکنے کے لیے معدہ پر  
برف رکھیں۔ برف مریض کو بار بار چوسنے کے لیے دیں۔

## سرطانِ معدہ

CANCER OF THE STOMACH      GASTRIC ULCER

اس مرض میں مقامِ معدہ پر برہمی جھنے کا سادہ ہوتا ہے۔ دبائے سے یا  
کھانا کھانے سے یہ درد اور بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر قیئیں آتی ہیں۔ جن میں کینسر  
کے ٹکڑے اور خون خارج ہوتا ہے۔ مریض روز بروز کمزور اور لاغر ہوتا جاتا ہے۔  
یہ مرض مستورات کو زیادہ ہوتا ہے یہ مرض موروثی بھی ہے۔ نیز معدہ کی  
پُرانی سوزش بھی اس کا سبب ہوتی ہے۔

## علاج

مندرجہ ذیل ادویات آرام دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نکس دامیکا۔ گریفائٹس۔

آر سینکرم - کار بوویجی - میزیریم اور انونیم میور -

غذا، مریض کو دودھ، آتش جو، یخنی اور شوربا وغیرہ دیں اور شراب سے قطعی پرہیز لازم ہے۔

## خونی تے - قے الدم

HAEMATEMESIS

اس مرض میں ابتدا میں جی متلاتا ہے۔ معدہ میں جلن یا درد محسوس ہوتا ہے اور کبھی خون شدت کی قے کے ساتھ آتا ہے اور کبھی ویسے ہی آجاتا ہے۔ کبھی اس میں بغم ملا ہوا ہوتا ہے اور کبھی غذا کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے اور کبھی خاص خون ہی آتا ہے۔ یہ خون کبھی تپلا آتا ہے اور کبھی گاڑھا۔ مقدار بھی اس کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی مقدار میں بہت تھوڑا آتا ہے اور کبھی بہت زیادہ خون آنے سے مریض کی جان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔

اسباب مرض : درم معدہ، زخم معدہ، سرطان معدہ، لڑکیوں میں بھس اور صفرا لکبد (جگر کا چھوٹا ہو جانا) خراش پیدا کرنے والی سمیات کا نگل جانا حلق - ناک - منہ اور پھیپھڑوں سے آدہ خون کا نگل جانا اور پھر اس کا قے ہو جانا۔ خون حیض کا بند ہو جانا۔ مرض سکروڈی وغیرہ۔

تشخیص : معدہ سے خون آنے (قے الدم) اور پھیپھڑوں سے خون آنے (نفث الدم - خون تھوکنا) میں تشخیص کیا کرتے ہیں۔ امتیازی علامات حسب ذیل ہیں :-

| معدہ سے خون آنے کی علامات             | پھیپھڑوں سے خون آنے کی علامات               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۱۔ خون کا رنگ عموماً سیاہ ہوتا ہے۔    | ۱۔ خون اکثر چمکیلے سرخ رنگ کا خارج ہوتا ہے۔ |
| ۲۔ خون قے کے ہمراہ آتا ہے۔            | ۲۔ خون عموماً کھالسی کے ہمراہ آتا ہے۔       |
| ۳۔ خون کے ہمراہ اکثر غذا ملی ہوئی آتی | ۳۔ خون عموماً بھاگ دار ہوتا ہے۔             |



| معدہ سے خون آنے کی علامات                                             | پھیپھڑوں سے خون آنے کی علامات                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۔ جی ملتا تا ہے۔ اُبکائیاں آتی ہیں اور معدہ میں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ | ۱۔ اور اس میں تھوک ملا ہوا ہوتا ہے اور کوتاہ دمی ہوتی ہے۔     |
| ۲۔ پاخانہ میں بھی خون ملا ہوا آتا ہے۔                                 | ۲۔ خون آنے کے قبل سینہ میں درد ہوتا ہے اور کوتاہ دمی ہوتی ہے۔ |
| ۳۔ اور یہ سیاہ کول تار کی مانند ہوتا ہے۔                              | ۳۔ خون پاخانہ میں خارج نہیں ہوتا۔                             |
|                                                                       | ۴۔ سوائے اس حالت کے کہ خون مریض کے منہ میں آکر نکل گیا ہو۔    |
|                                                                       | ۵۔ اور خوراک کی نالی میں چلا گیا ہو۔                          |

### علاج

اس کا علاج بھی تقریباً وہی ہے جو کہ زخم معدہ کے بیان میں درج کیا گیا ہے وہاں سے دیکھ لیں۔ مثلاً ایکونائٹ۔ ہامیلٹس۔ چائنا۔ آرسینک۔ فرم۔ آرنیکا اور اپی کاک ادویات بہت مستعمل ہوتی ہیں۔ ہامیلٹس کا درجہ اس مرض میں سب سے اول و اعلیٰ ہے۔ نیز چائنا اور فرم ناس کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ادویات ہیں۔ جب کسی صدمہ کے باعث یا سخت محنت و مشقت کرنے کی وجہ سے خون کی قے آئے تو آرنیکا دوائی مفید ثابت ہوتی ہے۔

### ضروری ہدایات

مریض کو آرام سے بستر پر چت بٹا دیں اور اس کو بالکل حرکت نہ کرنے دیں۔ سر اور کندھے تھوڑے اونچے رہنے چاہئیں۔ اگر کوئی کپڑا یا گریبان کسا ہوا ہو تو اس کو ڈھیلا کر دینا چاہیے۔ مریض کے پاس زیادہ گفتگو۔ ہجوم۔ شور یا گھبراہٹ نہیں ہونے چاہئیں۔ مریض کا کمرہ ٹھنڈا اور ہوادار ہونا چاہیے۔ برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلنے کے لیے مریض کو دینے چاہئیں اور برف کو کوٹ کر اور کسی رومال، پتیلی یا جراب میں ڈال کر اسے مقام معدہ پر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ

خون کے بند کرنے میں یہ بہت مددگار ہوا کرتی ہے۔ اگر مریض کو غشی آجائے، تو زیادہ خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس سے بھی اکثر خون طبعی طور پر بند ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو قبض ہو تو گرم پانی اور صابن کی پچکاری کر کے قبض کو رفع کریں یا گلیسرین پیاز سے ٹری مقعد میں رکھیں۔

**غذا :** بہتر تو یہ ہے کہ مریض کو کسی قسم کی غذا براستہ منہ نہ دیں، بلکہ بذریعہ حقنہ غذائی اس کی پرورش کریں اور جب چوبیس گھنٹے تک تے نہ آتے تو اس کو گھونٹ گھونٹ سرد پانی اور دو دو دیں اور پھر رفتہ رفتہ زود ہضم اور لطیف غذا کھانے کی اجازت دیں۔

## متلی اورتے

### RETCHING VOMITING

جی کا تھلانا یا تے آنا۔ یہ کسی نہ کسی مرض کی ایک علامت ہے لیکن یہ بذات خود کوئی مرض نہیں۔ بعض قسم کے بخاروں میں قیئیں آیا کرتی ہیں اور اکثر معدہ یا انٹریوں یا جگر یا گردوں یا دماغ یا نخاع یا رحم کی بعض بیماریوں میں متلی اور قیئیں ہوا کرتی ہیں۔

**اسباب مرض :** نامناسب یا بہت زیادہ یا نامرغوب غذا کھانا یا معدہ میں خراش یا سوزش یا تشنچ کا ہونا یا معدہ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا معدہ کا دب جانا اس مرض کے عام اسباب ہیں۔ کبھی زور کی کھانسی سے بھی تے آجایا کرتی ہے۔ بعض نازک مزاج اشخاص کا کسی بد مزہ یا کڑوی چیز کے چکھنے سے یا کسی بدبودار چیز کے سونگھنے سے جی تھلانے لگتا ہے اور تے آجاتی ہے۔ بعض امراض دماغی مثلاً دماغ پر چوٹ آنا۔ دماغ کے پردوں کی سوزش۔ دماغ کا اہل جانا اور دماغ کے چکرانے کی وجہ سے بھی تے آجاتی ہے۔ جہاز یا ریل کی تیز رفتاری بھی بعض اوقات جی تھلانے اور تے لانے کا سبب ہوا کرتی ہے۔ بعض شدید قسم کے دردوں مثلاً شدید درد گردہ اور درد جگر وغیرہ میں بھی جی تھلانے لگتا ہے اور قیئیں آتی ہیں۔ ہرنیا (فتق) کے مرض میں انٹری کے پھنس جانے کی وجہ سے شدید قیئیں آتی ہیں۔ شراب

افیون - تبہا کو وغیرہ کے زہر جب خون میں مل کر مرکز دماغی کو محرک کر دیتے ہیں۔ تب بھی قیئیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے کلوروفارم کا زہر بھی خون میں مل کر مرکز دماغی پر جب اثر کرتا ہے تو جی متلانے اور قیئیں لانے کا موجب ہوا کرتا ہے۔ بعض سیمیاٹ مثلاً سکھیا وغیرہ معدہ میں خراش و سوزش پیدا کر کے قے لانے کا باعث ہوا کرتے ہیں! یام حمل میں بھی متورات کا دل متلایا کرتا ہے اور قیئیں آیا کرتی ہیں۔

**انجام مرض:** بعض شدید امراض دماغی مثلاً مرگی وغیرہ میں جب جی متلائے اور قیئیں آئیں تو یہ اچھی علامت نہیں سمجھی جاتی لیکن برخلاف اس کے حمل یا اسٹیریا کے دوران میں قیئوں کا آنا کوئی خطرے کی علامت نہیں ہوتی۔ اگر قے کے آنے سے آرام محسوس ہو۔ جی کا متلانا اور چھاتی و معدہ کا بوجھ اور سردرد کم ہو جائیں تو اس کو ابھی علامت سمجھنا چاہیے۔ لیکن برعکس اس کے اگر قے آنے سے قبل کی تکالیف میں کمی واقع نہ ہو بلکہ الٹی تکالیف زیادہ ہو جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ مرض خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے۔

## علاج

مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کا علاج کریں۔ اگر زیادہ کھانے پینے یا ثقیل اور نامرطوب غذا کے کھانے کی وجہ سے جی متلاتا ہو اور قیئیں آتی ہوں اور قدرت کا منشاء ہو کہ معدہ ایسی نامرغوب و ثقیل اغذیہ سے خالی ہو جائے تو ایسی صورت میں قدرت کو مدد دینا لازم ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ گرم گرم پانی پی کر اور حلق میں پتہ یا انگلی ڈال کر خراش کرنی چاہیے تاکہ اچھی طرح سے قے آجائے اور معدہ خالی ہو جائے۔ ایسی حالت میں مریض کو پھر کھانے یا پینے کے لیے کچھ دیر تک نہیں دینا چاہیے۔

مندرجہ ذیل ادویات اس مرض میں کام آتی ہیں، مرض کا اصل سبب معلوم کر کے اور علامات مرض کو دھیان میں رکھ کر اس کے مطابق دوائی کا انتخاب کر کے مناسب دوائی دیں۔

**اپنی کاک** - متلی اور قے اس کی خاص علامات ہیں۔ قے آنے سے پہلے

جی بہت تھلے اور ابکائیاں آئیں۔ زبان صاف ہو، اکثر اوقات کھانا کھانے کے بعد تسلی اور تے ہو۔ تے کا رنگ سبز یا سیاہ ہو۔ ساتھ ہی اسہال بھی آتے ہوں۔  
 خوراک:  $2 \times$  یا  $3 \times$  ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایٹیم کر ڈوم۔ زبان پر سفید فر کا جما ہونا۔ اس دوائی کی خاص علامت ہے کھانے یا پینے کے بعد فوراً مریض تے کر دے۔ جب معدہ لدا ہوا ہو اور ناقابلِ مضمم یا مرغن غذا کھائی گئی ہو یا موسم گرما کی گرمی کے باعث تے آنی شروع ہو گئی ہو تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔

خوراک:  $2 \times$  یا  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایتھیوزا۔ بچوں کی تے میں یہ ایک بڑی عجیب دوائی ہے۔ جبکہ بچہ بڑے بڑے پھیکڑوں میں دودھ تے کو چھوڑتا ہو اور تے کرنے کے بعد نڈھال ہو جاتا ہو۔ بچہ کو بھوک لگتی ہو اور کھانے یا دودھ پینے کے بعد بڑے زور سے تے آ جاتی ہو اور بچہ نڈھال ہو جاتا ہے۔

خوراک:  $2 \times$  یا  $3 \times$  ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس۔ تے کے مزمن عارضہ میں جبکہ اس کا باعث بد مضمی ہو تو یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بہت پیاس ہو۔ لیکن جو نہی یہ پانی معدہ میں گرم ہو جاتا ہو تو فوراً تے ہو کر باہر نکل جاتا ہو اور پیاس کی شدت ہو۔ سرٹان معدہ کے باعث جب خون تے آتی ہوں تو فاسفورس دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک:  $6 \times$  یا  $30$  ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

آئرس ورسی کولر۔ منہ اور معدہ میں جلن، کھٹے ذائقہ کی تے اور ایسی کھٹی تے جو دانتوں کو کھٹا کر دے اور ساتھ ہی سخت سرد ہو۔

خوراک:  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا۔ یہ دوائی اس وقت خصوصاً موزوں ہوتی ہے جبکہ دماغ زیر اثر ہو اور بدن دھرتے آتی ہو۔

گلونائین بھی ایسے حالات میں مفید ہوا کرتی ہے۔  
 خوراک:  $3 \times$  ہر نصف گھنٹہ کے بعد۔

بسمتھ۔ خوراک کھانے کے بعد فوراً ہی تے ہو جائے اور ساتھ ہی جلن دار

درد ہو۔

خوراک:  $2 \times 3$  یا  $3 \times 3$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کریو زوٹ۔ ثقیل غذا کے کھانے اور معدہ میں عرصہ تک ویسے ہی پڑے رہنے کی حالت میں تے کا آنا اس دوائی کی علامت ہے۔ جب ماسوائے معدہ کے دیگر کسی اعضاء میں خراش ہونے کی وجہ سے قیئیں آتی ہوں۔ تب بھی یہ دوائی سونمند ہوتی ہے۔

سل۔ سرطان یا امراض گودہ نیز مرض بستیہ یا کی وجہ سے جب قیئیں آتی ہوں تو بھی یہ دوائی نافع ہوتی بنے تے کی مزمن مرض میں یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔

خوراک:  $3 \times 3$  ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

کلکیر یا کارب۔ مریض دودھ پینے کے بعد فوراً ہی تے کر چھوڑے اور دودھ پٹھا ہوا اور پھیڑوں میں باہر نکلے۔

خوراک:  $3 \times 3$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

اپومارفین۔ دماغی مرکز میں حرکت پیدا ہونے کی وجہ سے جب تے آئے۔ اور تے مقدار میں بہت زیادہ اور یکایک بدوں جی متلانے کے آجائے تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک:  $3 \times 3$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کاربالک ایسڈ۔ نفاخ بد ہضمی میں مریض تے کر چھوڑتا ہو۔ واپس آنکھ کے اوپر درد عصبی ہوتا ہو۔

خوراک:  $3 \times 3$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کائیولس انڈی کس۔ جہاز میں سفر کرنے سے جب تے آئے تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

۱۔ بحری جہاز، کار یا بس پر سفر کرتے ہوئے جی متلائے اور تے ہونے لگے تو یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

فیرم ٹیلیکیم ۔ جب کمزوری بہت ہو اور بوجہ کمی خون معدہ اپنا فعل پورے طور پر سرانجام دینے سے قاصر رہتا ہو اور اس لیے مریض کھایا پیتے کر چھوڑتا ہو تو یہ دوائی کارآمد ہوتی ہے ۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد ۔

ایو ڈیم ۔ مریض سوکھتا جاتا ہو اور غذا مضغ نہ کر سکتا ہو ۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

مرکیورس سال ۔ شیر خوار بچہ جب دودھ یکا یک قے کر چھوڑتا ہو ۔

خوراک : ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

آر سیلنیکم ۔ سوزش معدہ ہو اور معدہ پانی برداشت نہ کر سکتا ہو ۔ معدہ

میں خراش بہت ہو ۔ زبان سرخ ہو ۔ اسہال آتے ہوں اور نقاہت بہت ہو ، معدہ اور حلق میں جلن ہوتی ہو ، ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے ہوں ۔ جب سرطان معدہ یا معدہ کے دیگر شدید مرض کے باعث قیئیں آتی ہوں ، تو یہ دوائی بہت جلدی آرام دہ ثابت ہوتی ہے ۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد ۔

زنگم ۔ مریض غذا کو یکا یک بدوں جی متلانے کے قے کر چھوڑتا ہو اور

کمزور ہوتا جاتا ہو ۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد ۔

سیکیل ۔ مزمن مرض میں جبکہ گندے ڈکار بھی ساتھ آتے ہوں اور مریض

گندہ مادہ قے کرتا ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے ۔

خوراک : ۳x ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد ۔



۱۰ کار یا بس میں سفر سے متلی اور قے کی شکایت ہونے پر پٹرولیم یا ٹوبیکم استعمال کریں ۔

## رہبر ٹری

تے کارنگ سیاہ ہو۔ آر جنٹم نائٹریٹیم۔ آر سینکم۔ کروٹیل۔ ہائیوسائی مس  
اپی کاک، فاسفورس نکس و امیکا۔ سیکل۔ وراٹرم۔ کیدیم سلف  
تے خونی ہو۔ ایکونائٹ، آرنیکا۔ آرنک کینتھرس۔ کوکین ۲x۔ فیرم فاس۔  
ہما میل۔ ہائیوسائی مس۔ اپی کاک۔ فاسفورس سینیم۔ وراٹرم الیم۔ سیکل۔

نیلگوں ہو۔ آر سینکم۔ کوپرم  
خاکسری ہو۔ آر سینکم۔ کبمتھ۔ کونیم۔  
پاخانہ منہ کے راستہ تے ہو۔ اوپیم۔ آر سینکم۔ بیلاڈونا۔ برائی ادیا  
سلفر۔ پلم بم۔ پائروجنیم۔ ریفسنس۔

تے جھاگدار ہو۔ ایکونائٹ۔ پوڈوفالیم۔ وراٹرم الیم۔ کریازوٹ  
تے کارنگ سبز ہو۔ ایکونائٹ۔ آر سینکم۔ چیلڈونیم۔ اپی کاک مرکریس  
نیرم سلف۔ وراٹرم الیم۔

تے گرم ہو۔ پوڈوفالیم  
تے سفید ہو۔ ایتھیوزا۔ آر سینکم۔ کالچی کم۔ مرکورس کار۔ وراٹرم  
تے کارنگ زرد ہو۔ آر سینکم۔ کالوسنتھ۔ کالی بائی کرومیکم۔ ٹیری بن تھینا۔  
چمکیلی زرد اور کڑوی کالی بائی کرومیکم

## ضروری ہدایات

برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چوسنے سے اکثر اس مرض کا آرام آجایا کرتا ہے  
بعض کیسوں میں دودھ اور سوڈا واٹر مساوی مقدار میں ملا کر تھوڑا تھوڑا مرتبض کو  
دینے سے آرام ہو جاتا ہے۔

## حاملہ کی متلی اور تے

VOMITING OF THE PREGNANCY

حمل کے ابتدائی ایام میں بعض مستورات کا صبح کے وقت جی متلا تارہتا ہے

اُبکائیاں اور قیئیں آتی رہتی ہیں اور یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ خاص کر نازک مزاج عورتوں کے پہلے حمل میں یہ صحت پر بہت بُرا اثر ڈالتی ہیں۔

**علاماتِ مرض**۔ صبح بستر پر سے اُٹھنے وقت مریضہ کو اُبکائیاں اور قیئیں شروع ہو جاتی ہیں اور بعض کو بستر پر سے اُٹھنے کے تھوڑی دیر بعد۔ حمل قرار پانے کے فوراً ہی بعد یہ علامات ظہور پذیر ہوتی ہیں اور ان کو حمل کی ابتدائی علامات میں سے سمجھا جاتا ہے لیکن عموماً حمل قرار پانے کے دو یا تین ہفتہ کے بعد یہ علامت شروع ہوا کرتی ہے اور تین یا چار ہفتہ تک لگاتار یا کم و بیش رہتی ہے اور بعض عورتوں میں بچہ جنمنے تک یہ علامت بنی رہتی ہے۔

**اسبابِ مرض** : مرکزِ دماغی پر فعلِ انہضام کا زیادہ اثر پڑنے کی وجہ سے قوائے ہاضمہ میں موازنہ نہیں رہتا اور اس لیے معدہ میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے یہ مرض ظہور پذیر ہوتا ہے۔ امیر گھرانے کی اور جسمانی محنت کم کرنے والی مستورات میں یہ بہت پایا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت متلی اور قے حاملہ کے لیے کسی حد تک مفید بھی ہوا کرتی ہے۔ رحم کا کم و بیش اپنی جگہ سے ہل جانا یا رحم کا خروج جو کہ اکثر ایامِ حمل میں وقوع میں آتا ہے اس علامت کے پیدا کرنے کا موجب کسی حد تک ہوتا ہے۔ جب متلی اور قے دن کے آخری حصہ شام کو آئیں جبکہ مریضہ لیٹی ہوئی نہ ہو تو اس کا موجب رحم کا اپنی جگہ سے ہل جانا یا خروجِ رحم ہی سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ جب مریضہ کو چت لٹا کر رحم کو اپنی اصلی جگہ پر لایا جائے تو پھر متلی اور قے کا آرام ہو جاتا ہے۔ جب متلی اور قے تکلیف دہ ثابت ہو اور بہت عرصہ تک جاری رہے، تو اس وقت اس کا علاج کسی تجربہ کار معالج سے کرانا چاہیے۔ رات کے وقت متلی یا قے کا آنا زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک سمجھنا چاہیے۔

## علاج

اینٹیم کروڈم۔ آر سینکم۔ کاکیلوس۔ کونیم۔ کوپرم سلف، اپی کاک، کالی بائی کروڈیم۔ کریازوٹ۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس وامیکا۔ پٹرولیم۔ پیسٹلا۔ بیکیم۔ وراٹرم۔ اویپیم وغیرہ ادویات زیادہ مستعمل ہوتی ہیں۔



## تشریح علامات

انی کاک : معدہ میں بہت بے چینی ہو۔ تے میں ناہضم شدہ غذا۔ یا پت یا بٹغم جاری ہوتی ہو اور قبض نہ ہو۔ یعنی پاخانے آتے ہوں تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔  
آر سینکم۔ کھانے یا پینے کے بعد تے ہو جاتی ہو۔ لگاتار ہوتی ہو اور مرینہ کمزور ولاغر بہت ہو۔

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کریوزوٹ - اس مرض میں یہ دوائی خاص طور پر موثر ثابت ہوتی ہے۔ اور شاذ و نادر ہی ناکام ہوتی ہے۔

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا۔ تے کے ہمراہ سرچکر بھی ہوں اور مزاج چڑچڑا ہو۔ منہ میں پانی بہت آتا ہو۔ ہچکی آتی ہو اور مقام معدہ پر بوجھ پڑا ہوا محسوس ہوتا ہو۔ قبض ہو جن مستورات کا رنگ کالا ہوتا ہے ان کے لیے یہ دوائی خاص طور پر مفید ہوتی ہے۔

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پٹرولیم۔ لگاتار آبکائیاں آئیں اور ڈکار آئیں۔

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹا۔ زبان سفید اور تر ہو اور پاخانے بھی آتے ہوں۔ مرینہ کا رنگ

خوب صحت ہو۔

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ٹبیکیم۔ سارا دن ہی دل خراب ہوتا ہے لیکن تے نہ آئے۔

خوراک - ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیر یا فلوریکا۔ نفخ بہت ہو اور متلی یا تے آئے۔

خوراک : ۳ سفوف کے ۵ گرین ہر چھ یا آٹھ گھنٹہ کے بعد

## ضروری ہدایات

تازہ ہوا - غذا کی باقاعدگی - دل شاد - یہ نہایت ضروری ہیں - غذا لطیف اور زود ہضم دینی چاہیے - اگر مریضہ گرم غذا تے کر چھوڑتی ہو - تو اس کو ٹھنڈی غذا دینی چاہیے - تھوڑا دودھ اور سوڈا ملا کر دینا چاہیے اور اگر مریضہ اس کو بھی ہضم نہ کر سکتی ہو - تو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چوسنے کے لیے دینے چاہئیں -

## پیٹ کا درد - دردِ معدہ - پیٹ کا مروڑ پیٹ کا شدید درد - کلیجہ جلنا

HEARTBURN    GASTRIC CRAMP    GASTRODYINA.  
CARDIAGIA    GASTRALGIA

اس مرض میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور یہ درد اکثر عصبی ہوتا ہے - اور درحقیقت یہ بد ہضمی کی ایک علامت ہے کبھی پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں اور درد دورہ کے ساتھ ہوتا ہے -

علاماتِ مرض - اس درد کا دورہ عموماً رات کو ہوتا ہے - فمِ معدہ میں ٹھنڈی ہوا کو درد ہوتا ہے - کھانا کھانے کے بعد عموماً یہ درد ہو جاتا ہے - پیٹ میں نفخ و مروڑ اور جلن کی شکایات ہوتی ہیں - جی متلاتا ہے - ڈکاریں آتی ہیں اور اکثر تے ہو جاتی ہے - کبھی یہ درد خالی معدہ ہوا کرتا ہے اور کھانا کھانے سے درد میں افاقہ ہو جاتا ہے -

جب یہ مرض شدید ہو تو مقامِ معدہ پر سخت درد ہوتا ہے اور مریض مارے

ہے سفاری کارپس رسی موسا (SYMPHORICARPIUS RACEMOSA)

۲۰۰ یا ۳۰۰ یا ۲۰۰ حاملہ کی تے کے لیے بہترین دوا ہے

درد کے لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور مقامِ معدہ کو دباتا ہے۔ اس قسم کا درد خالی معدہ میں صبح کے وقت عموماً ہوا کرتا ہے۔

**اسباب مرض**۔ اس قسم کا درد زیادہ تر بھس اور باؤ گولہ کے امراض میں ہوا کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مستورات اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں ایامِ حمل میں بھی اس کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ بد ہضمی اور قبض وغیرہ بھی اس کے اسباب ہیں۔ نیز بکثرت چائے کا استعمال اور تبا کو نوشی کے باعث بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ زیادہ فکر و غم، کثرتِ محنت و ماغی، سستی و کاہلی بھی اس کے اسباب ہیں۔ نفرس اور سمیت طیریا کی وجہ سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

ثقیل غذا کا کھانا۔ معدہ میں ترشی کا زیادہ پیدا ہو جانا۔ خالی پیٹ، سرد پانی پینا یہ بھی اس کے اسباب ہیں سے ہیں۔

### علاج

**نکس و امیکا**۔ درد نہایت شدید ہو۔ ایسا محسوس ہو کہ مقامِ معدہ کسی پنچہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے۔ درد بوقتِ صبح یا شام یا کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہو۔ معدہ کو چھونے سے درد زیادہ ہو۔ معدہ میں جلن ہوتی ہو۔

**خوراک** : ۵ یا ۱ x یا ۲ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

**اگنیشیا**۔ اس کی بھی وہی علامات ہیں جو کہ نکس و امیکا کی ہیں۔ ہسٹیریکل مزاج کی مستورات کو یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے۔

**خوراک** : ۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

**کیمومیل** اور **بیلادونا**۔ جب درد ٹھہر ٹھہر کر ہوتا ہو تو یہ دونوں ادویات نہایت موزوں ہوتی ہیں۔ معدہ میں سخت مروڑ پڑتے ہوں اور برچھی مارنے کی سی دردیں ہوتی ہوں۔ دروین ناقابلِ برداشت ہوں اور مارے دردوں کے مریض کی چنچیں نکل جاتی ہوں۔

**خوراک** : ۱ x یہ دونوں ادویات اکٹھی باری باری سے دی جاتی ہیں مثلاً بیلادونا ۱ x کی خوراک پہلے اور پھر دس منٹ کے بعد کیمومیل ۱ x کی خوراک اور علیٰ ہذا تیس اور چوں چوں آرام ہوتا جاتا ہے توں توں خوراکیں بھی زیادہ وقفہ کے بعد دی جاتی ہیں۔

آر سینکیم - معدہ میں سخت جلن - دبانے والی دردیں ہوتی ہوں، پیاس، تشویش اور غشی کی حالت ہوتی ہو - درد کارات کو ہونا اور ساتھ ہی اسہال بھی آنے اس دوائی کی اعلیٰ علامت ہے - سمیت پیریا اگر اس درد کا موجب ہو تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے -  
 خوراک : ۳ x یا ۶ x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

آر جنٹم نائٹرکیم - اس مرض میں یہ دوائی بھی نہایت موثر ہوتی ہے - کھانا کھانے کے دوران میں دردیں ہوتی ہوں یا رات کو ہوتی ہوں اور ساتھ ہی دست بھی آتے ہوں -

خوراک : ۳ x ٹری ٹیورلین ہر دو گھنٹہ کے بعد -

پلم بلم اور اوپیم - دردیں سخت ہوتی ہوں اور دبانے سے آرام ہوتا ہو - قے آنے کے بعد عموماً درد کا آرام آ جاتا ہے - قبض نہایت سخت ہو -

خوراک : ۱۲ x یا ۳۰ - ان دونوں ادویات کی خوراکیں بھی باری باری سے ہر دو گھنٹہ کے بعد دی جاتی ہیں - ڈاکٹر جو سٹھ صاحب کا تجربہ ہے کہ اگر پلم بلم ۳۰ کی تین خوراکیں دن میں دی جائیں اور اوپیم ۱۲ x کی ایک خوراک شام کو دی جائے تو نہایت ہی تسلی بخش نتائج پیدا کرتی ہیں -

یلائینا - ہسٹیریکل مزاج کی مستورات کے دردِ معدہ میں یہ دوائی بعض اوقات موثر ہوتی ہے -

خوراک : ۳۰ x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

ڈرائٹرم ایلم - درد نہایت شدید ہو اور سرد پسینہ (تریلی) سے مریض تدریجاً بہتر ہوتا جاتا ہو -

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

کالوسنتھ - درد معدہ کی یہ بھی ایک قیمتی دوائی ہے - اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مارے درودوں کے مریض دوہرا ہوتا جاتا ہو یا ٹانگوں کو اکٹھا کر کے پیٹ میں سکیرتا ہو -

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر نیم گھنٹہ کے بعد -

اوکسالک ایسڈ - درد معدہ ہو - کھانا کھانے کے بعد افاقہ ہوتا ہو نیز

اشیاء کا فیا اور شراب کے استعمال سے درد زیادہ ہوتا ہو معده کو ذرا چھونے سے غضب ناک درد ہونے لگتا ہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بسمتھ - دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو اور پیشانی بھی دکھتی ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فیرم فاس - کمی خون یا بھس کی وجہ سے معدے میں درد ہوتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالچی کم - نقرس کی وجہ سے اگر درد ہوتا ہو تو یہ دوائی مددگار ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

جب درد شدید ہو تو گرم پانی میں فلائین کے ٹکڑے کو بھگو کر اور نیچوڑ کر مقام معدہ پر ٹکور کرنی چاہیے اور اگر درد خفیف ہو تو روٹی کو گرم کر کے معدہ پر ٹکور کرنی چاہیے۔ اگر ثقیل غذا یا کھانا کھانے کے بعد درد ظاہر ہوتا ہو تو آدھ سیر گرم پانی میں نیم چٹانک نمک ملا کر مریض کو پلائیں اور حلق میں انگلی یا پیر سے خراش کریں تاکہ قے ہو جائے۔ کثرت شراب خوری، چائے نوشی اور تمباکو نوشی اور زیادہ شیریں و ترش اشیاء کھانے سے پرہیز کرائیں۔

## بھوک کا مرجانا۔ بھوک کا کم ہو جانا

ANEREXIA-APPETITE LOST-APPETITE DEPRAVED

اس مرض میں یا تو غذا کی خواہش بالکل ہی نہیں ہوتی یا بہت ہی کم ہوتی ہے مریض کا دل غذا کھانے کو نہیں چاہتا اور بعض اوقات اس کو غذا سے نفرت ہو جاتی ہے۔

اسباب مرض : بد مضمی، زیادہ کھا جانا۔ خصوصاً گھی اور تیل والی مرغین اغذیہ کا زیادہ کھا جانا۔ کثرت شراب نوشی۔ عصبی کمزوری۔ یہ سب اس کے اسباب

ہیں۔ نیز سرطانِ معدہ یا زخمِ معدہ میں مزمن یا شدید درد بھی اس کے اسباب ہیں۔

### علاج

چائنا۔ فیرم۔ ایسڈ فاس۔ نیکس و امیکا x۱۔ آرسینکم۔ مرکوریس۔ اگنیشیا۔ پٹلا۔ یورے نیم۔ نائٹریکیم وغیرہ ادویات اس مرض میں کام آتی ہیں۔  
مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کے مطابق علاج کرنا چاہیے۔

## بھوک بہت لگنا۔ بھوک کا ہوکا

BULMIA-BULINS APPETITE EXCESSIVE

اس مرض میں بھوک بہت لگتی ہے، ادھر مریض نے کھایا ادھر بھوک پھر لگ گئی۔ اگر مریض کچھ نہ کھائے تو اس کا دل ڈوبا جاتا ہے۔ مریض سست اور پژمردہ رہتا ہے۔

اسباب مرض: بچوں میں پیٹ کے کپڑے۔ مریض ذیابیطس۔ معدہ میں خراش وغیرہ کا ہونا۔ شدید امراض کے بعد بھی اکثر بھوک بہت زیادہ لگا کرتی ہے۔

### علاج

سانا (پیٹ میں کرموں کی وجہ سے بھوک لگتی ہو) چائنا۔ ایسڈ فاس او۔ آیوڈیم۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد مرکوریس۔ سلیشیا۔ کلکیریا کارب۔ جلیسی میم۔ وغیرہ ادویات اس مرض میں کام آتی ہیں۔

اگنیشیا۔ جب معدہ میں خلل محسوس ہوا اور کمزور ہو۔

خوراک: ۲x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

سمی کسی فیوگا۔ معدہ ڈوبا جاتا ہو۔

خوراک: ۲x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

رٹاکس۔ اصل بھوک نہ لگتی ہو۔ لیکن جھوٹی بھوک بہت لگتی ہو۔

خوراک: ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

نوٹ: اس مرض کے مریض کو لازم ہے کہ بہت پیٹ بھر کر نہ کھایا کرے بلکہ غذا تھوڑی تھوڑی اٹھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد کھایا کرے۔

## بد مضمی

### DYSPEPSIA

اس مرض میں ہانمہ میں نقص ہو جاتا ہے۔ معدہ کا فعل انضام درست نہیں رہتا لیکن اس کی راحت میں کوئی فتور واقع نہیں ہوتا۔

**علاماتِ مرض:** مقامِ معدہ میں کم دبش درد کا ہونا۔ یا بوجھ ہونا ڈکاروں کا آنا۔ غذا کا منہ میں واپس آنا اور بعض اوقات تے ہو جانا۔ قبض یا اسہال۔ کبھی کبھی خفیف بخار بھی ہو جاتا ہے۔ پشیا ب میں البیومن خارج ہونے لگتی ہے اور مریض روز بروز لاغر ہوتا جاتا ہے۔ بعض اوقات پیٹ میں نفخ ہو جاتا ہے اور شکم بہت تن جاتا ہے۔ مریض کو بہت بے چینی ہوتی ہے۔ ڈکار بے ذائقہ اور باواز بند آتے ہیں اور دیر تک آتے رہتے ہیں۔ مریض کو اپنے پارچات ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

**اسبابِ مرض:** بے وقت کھانا اور زیادہ کھا جانا خصوصاً ثقیل مرغین یا کچی غذا کھانا۔ کھانے کے ساتھ پانی بہت پی جانا۔ جلد جلد غذا کھانا اور اچھی طرح سے نہ چبانا۔ ایک ہی قسم کی غذا بہت مدت تک کھاتے رہنا۔ رطوباتِ ہانمہ کا کم دبش پیدا ہونا یا ناقص ہونا۔ جگر و پیکریاس کی رطوبات میں نقص واقع ہونا اور اسی طرح سے آنتوں کی رطوبات متناقض یا کم دبش پیدا ہونا۔ کثرتِ مٹالو و رزٹس و سیر نہ کرنا۔ تازہ ہوا کا نہ کھانا۔ زیادہ شراب نوشی۔ تبا کو نوشی یا چائے نوشی کرنا۔ رنج و غم زیادہ کرنا۔ خون کی خرابی۔ نیز امراضِ فقر میں اور وجعِ انفاس میں بھی بد مضمی کی شایعیت ہو جاتی ہے جس میں خون کی کمی کا ہونا یا غسبی کمزوری یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ پیوریہ۔ مسوڑھوں کا پھوڑا اور دانتوں کا گل ٹر جانا بھی اس کے اسباب میں سے ہیں۔

## علاج

نکس و امیکا - ضعف معدہ کے لیے مجرب، دوا ہے جب لانے پینے کی بد پر میزی، شراب، خورق، دماغی محنت زیادہ کرنے اور بانی ریاضت نہ کرنے کی وجہ سے ضعف معدہ ہو جائے۔ نفخ اور قبض کی شکایت ہو، بد ذائقہ کے ڈکار آتے ہوں۔ سر درد صبح جاگتے ہی شروع ہو جاتا ہو۔ یہ دوائی خصوصاً ان اشخاص کے لیے زیادہ مفید ہوتی ہے جو گھ کی چار دیواری میں زیادہ بیٹھے رہتے ہوں یا جو زیادہ دماغی کام کرنے کے عادی ہوں جن کو بواسیر کی بھی شکایت ہو۔

خوراک: ۱ x یا ۳ x ہر دو گھنٹہ۔

گریفائیٹس - ڈاکٹر جوسٹ صاحب نکس و امیکا اور گریفائیٹس، باری باری سے دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ نکس و امیکا کی ایک خوراک بوقت صبح گریفائیٹس کی بارہ بجے دن کے پچھ نکس و امیکا کی چار بجے شام اور گریفائیٹس رات کو سوتے وقت ان کے تجربہ میں یہ علاج نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔

خوراک: ۱۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹا: جب مرغن اور نقیل چیزیں بکثرت کھانے سے بد مضمی پیدا ہو گئی ہو۔ اس کے لیے یہ خاص دوائی ہے۔ جب معدہ کے اندر بلغم بکثرت پیدا ہو۔ منہ کا ذائقہ صابن سا رہتا ہو۔ غذا بہت دیر میں ہضم ہو اکثر غذا معدہ میں پڑ جاتی ہو اور معدہ میں بہت ترشی پیدا ہو۔ سینہ جلتا ہو۔ کھٹی ڈکاریں آتی ہوں منہ میں پانی بھرتا ہو۔ اکثر دست آتے ہوں تو ایسی حالت میں یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔

خوراک: ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی ادنیا - منہ میں خشکی، ذائقہ تلخ۔ غذا کھانے کے بعد معدہ میں پتھر کی مانند بوجھ معلوم ہوتا ہو۔ معدہ کے اوپر ہاتھ سے دبانے سے درد ہو۔ قبض ہو، سستے پڑ گئے ہوں اور گرمی کے موسم میں یہ عارضہ لاحق ہو جاتا ہو، گہرا سانس لینے سے فم معدہ میں درد ہو۔ سر درد جس میں حرکت کرنے سے زیادتی ہوتی ہو۔ طبیعت چڑچڑی ہو۔

خوراک: ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔



چائنا۔ جب بدبضی کے باعث دست آتے ہوں اور غذا ویسی کی ویسی پاخانہ میں نکل جاتی ہو۔ کثرت اخراج منی یا جسم کی کوئی رطوبت زیادہ نکل جانے کے سبب سے ضعف معدہ ہو گیا ہو۔ پیٹ بھرا ہوا ہو۔ ڈکاریں بہت آتی ہوں لیکن ڈکا آنے سے ذرا بھی آرام نہ ہوتا ہو۔ پیٹ میں از حد اچھارہ پیدا ہو۔ دست بغیر درد کے اور تپے زور۔ مہووک بھی اچھی ہو۔ کمزوری روز بروز افزوں ہو۔  
 خوراک : ۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکم ایلم۔ جو لوگ برف زیادہ پیا کرتے ہیں اور ان کو ضعف معدہ کا نقص ہو جاتا ہے۔ اس کے دفعیہ کے لیے آر سینکم مجرب دوا ہے۔ ضعیف القوائے آدمیوں کے مزاج میں ضعف معدہ میں تب کہ معدہ میں جلن رہتی ہو اور ترش مادہ متے ہوتا ہو۔ سرد چیزیں کھانے سے دست آجاتے ہوں اور گرم چیزیں مزاج کے موافق اور معدہ کے اوپر ہاتھ سے دبانے سے درد ہوتا ہو۔

خوراک : ۲ یا ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
 لائیکوپوڈیم۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ معلوم ہو۔ ایک لقمہ کھاتے ہی پیٹ بھر جائے پیٹ میں گڑبڑ ہو اور اچھا اچھے حصہ میں ہو۔ قبض۔ پاخانہ کم سخت اور بدقت خارج ہو۔ پیشاب میں مرنج رنگ خارج ہو۔  
 خوراک : ۲۰ دان میں تین مرتبہ۔

ایٹمی منی کروڈم۔ خوراک سے نفرت اور جھوک میں کمی ہو۔ زبان پر سفید فرجی ہو۔ مانو کہ سفیدی کی ہوئی ہے۔ ڈکاریں خوراک خوردہ ذائقہ کی آتی ہوں۔ قبض اور اہمال باری باری سے ہوتے ہوں۔

خوراک : ۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کاربوویکی : جب مرض دیرینہ ہو۔ معدہ اور انتڑیوں کے اوپر کے حصہ میں اچھارہ بہت ہو۔ مریض کمزور ہو۔ ڈکاریں آنے سے قدرے آرام معلوم ہو۔ ہلکی غذا بھی ناموافق بیٹھتی ہو۔ جلن اور کھٹی ڈکاریں آتی ہوں۔ بوڑھے آدمیوں کے لیے یہ دوائی خاص طور پر مفید ہوا کرتی ہے۔  
 خوراک : ۲ یا ۶ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب - بچوں اور مستورات کے ضعفِ معدہ میں بہت نافع ہے اور بلغمی اور خنازیری مزاج کے آدیوں کے ضعفِ معدہ کے لیے یہ خاص دوائی ہے۔ جب معدہ میں بہت ترشی پیدا ہو۔ مریض کو سرد چیزیں بہت مرغوب ہوں اور گرم چیزوں سے بہت نفرت ہو اور مرغن غذا مضیم نہ ہو سکتی ہو۔ دودھ ناموافق پڑتا ہو۔ مفید رنگ کے اور کھٹے دست آتے ہیں۔

خوراک: ۳ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر - معدہ میں ترشی بہت پیدا ہو۔ قریب گیارہ بجے صبح کے معدہ میں خلاء کا احساس ہو اور کھانے کی زبردست خواہش ہو۔ صبح اٹھتے ہی دست آجائے جگر میں حرارت ہو یا قبض اور بواسیر ہو۔ اس دوائی کو صبح بغیر کسی چیز کے کھانے کے دینا چاہیے اور بعد ازاں شام کو نکس دایکا۔

خوراک: ۳ یا ۳۰ صبح کے وقت۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ براٹا کارب - لاکسٹیکیم - سی پیا - نیٹرم میور - بائیڈروسیانک ایڈ - اپی کاک - سپائی جلیا - کاکٹس - اگنیشیا - آر جینٹم نائٹریکیم - ایس نگر - کاربالک ایڈ - ایڈم سلفیوریکم وغیرہ ادویات بھی اپنی اپنی علاماتِ مخصوصہ کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

شراب - سرکہ - بکھن - گھی - تیل و دیگر مرغن اغذیہ وغیرہ - مٹھائی وغیرہ سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ غذا مریض کو زود مضیم اور لطیف کھانی چاہیے اور خوب چبا چبا کر کھانی چاہیے۔ دودھ اور تھوڑی سبز ترکاری ابلے ہوئے آلو۔ یا ابلے ہوئے انڈے تھوڑی مقدار میں کھانے چاہئیں۔ چائے - حقہ اور پان تنباکو کا بھی کم استعمال کرنا چاہیے اگر مریض کا کلیجہ جلتا ہو تو کھانے میں نمک اور گرم مصالحہ بہت کم استعمال کرنا چاہیے لیکن اگر کلیجہ نہ جلتا ہو اور بدبو وارڈ کاریں آتی ہوں تو کھانے میں گرم مصالحہ اور نمک ذراتیز ڈال کر کھانا چاہیے اور پانی کم پینا چاہیے اور ورزش کرنا۔ صبح و شام سیر کرنا۔ ہر روز سرد یا شیر گرم پانی سے غسل کرنا۔ دانتوں کو داتن سے صاف کرنا۔

اور منہ کو پانی سے صاف کرنا یہ نہایت ضروری ہیں، نیز کثرت مطالعہ و کثرت شغل نیز فکر و تردد وغیرہ سے آزاد رہنا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک گھنٹہ تک آرام کرنا اور مجامعت سے پرہیز کرنا۔ یہ سب مفید تدابیر ہیں۔

کلیجہ کا جلنا اور کھٹی ڈکادوں کا آنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ معدہ میں ترشی بہت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں کھٹی اور شیریں اشیاء سے پرہیز لازم ہے اور نمک اور گرم مصالحہ بھی کم کھانا چاہیے۔ اگر برخلاف اس کے بدبودار اور کھسی ڈکاریں آتی ہوں۔ پیٹ بوجھل ہو۔ طبیعت میں کابلی و سستی بہت ہو لیکن کلیجہ نہ جلتا ہو تو ایسی صحت میں نمک ذراتیز کھانا چاہیے۔

## انٹریوں کی سوچیں

(ENTERITIS)

اس مرض میں آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے اور مٹھی یا صفراوی رنگ کے آبی اسہال آتے ہیں جو بڑے بدبودار ہوتے ہیں۔ پیٹ میں تھوڑا تھوڑا درد بھی ہوتا ہے۔ اگر مرض شدید ہو تو سردی لگ کر بخار چڑھ جاتا ہے۔ زبان سرخ اور خشک ہوتی ہے۔ پیاس بہت لگتی ہے اور درد بھی بہت ہوتا ہے۔

اسباب مرض: سخت اور نا ہضم ہونے والی غذا کا آنتوں میں جمع ہو کر خراش کرنا۔ آنتوں پر چوٹ آنا۔ یازخم ہونا۔ رسولی سخت پاخانہ کا سد سے بن کر پھنس جانا۔ پیٹ کو سردی لگنا اور بعض امراض مثلاً توش جگر۔ مہیضہ۔ سل و عفونتی بخاروں میں بھی آنتوں میں سوزش ہو جایا کرتی ہے۔

## علاج

اسہال (دست) کے بیان میں جو علاج و ضروری ہدایات درج کی گئی ہیں۔ ان کا بغور مطالعہ کر کے مناسب علاج کرنا چاہیے۔ دیکھئے صفحہ ۷۲۶

# اسہال - دست

(DIARRHOEA)

اس مرض میں چھوٹی انٹرویوں کے فعل میں بعض اسباب سے فتور آجاتا ہے۔ جس کی وجہ سے بار بار پتلے پاخانے آتے ہیں۔ بعض اوقات پاخانہ کی مقدار میں تو کوئی زیادتی نہیں ہوتی۔ مگر حاجت بار بار ہوتی ہے۔

**علامات مرض:** جی متلانا۔ نفخ۔ انٹرویوں میں قراقر اور مروڑ، بعدہ پتلے پاخانے آتے ہیں۔ جو کبھی لیسار صفراوی یا خونی یا میاے رنگ کے یا جھاگ دار ہوتے ہیں، زبان سلی ہوتی ہے۔ تنفس میں بو آتی ہے اور ترش ڈکاریں آتی ہیں موسم گرما کے اسہال خصوصاً صفراوی ہوتے ہیں۔ پیٹ میں سخت درد ہوتا ہے ٹانگوں میں کڑاں پڑتے ہیں اور سخت نقابت ہوتی ہے۔

**اسباب مرض:** کھانے پینے میں بد پرہیزی، زیادہ کھا جانا، یا ثقیل یا باسی یا زیادہ مصالحو دار چیزیں کا کھانا۔ کچے میوؤں کا کھانا یا گل سٹری سبزیاں اور گلے سٹریے میوے۔ مرغن اور پرتکلف غذا۔ غلا سڑا یا بیمار جانور کا گوشت کھانا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ گندے پانی کے استعمال سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ موسموں کی تبدیلی یعنی موسم گرما کی گرمی، موسم سرما کے گرم دن اور سرد راتیں اکثر مرض اسہال کو پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔ پسینہ کے یکایک رک جانے یا بحالت پسینہ غسل کرنے سے بھی اسہال کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ زیادہ فکر و غم، فکر و تردد اور غصہ کرنے سے بھی دست آنے لگتے ہیں۔ کئی ایک امراض مثلاً تپ محرقہ۔ اسہال، تپ دن اور سل وغیرہ میں بھی اسہال آنے لگتے ہیں اور مریض بیضہ کے آغاز میں بھی اسہال آیا کرتے ہیں اور انٹرویوں میں درم یا زخم یا خراش یا سہا یا گرم وغیرہ کا ہونا نیز بار بار تیز جلابینا یہ سب اس کے اسباب میں سے ہیں۔ بعض حالات دست کو حمل کے دوسرے یا تیسرے مہینے بجائے تے کے دست سنے ملتے ہیں۔

## اقسام مرض

اس مرض کی موٹی موٹی قسمیں حسب ذیل ہیں :-

۱۔ خراشدار دست (IRRITATIVE DIARRHOEA) زیادہ غشیات یا خراش کرنے والی یا لندی اشیار کے کھانے یا پینے سے ۔

۲۔ سوزش یا ورمی اسہال (CONGESTIVE INFLAMMATORY) پھوٹی انتڑیوں کی لعاب دار جھلی میں اجتماعِ خون یا سوزش یا ورم کی وجہ سے ۔

۳۔ صفراوی دست (BILIOUS DIARRHOEA) گرم موسم کی وجہ سے

۴۔ سنگرہنی یا اسہال مزمنہ (DIARRHOEAL LIENTERICA) انتڑیوں کی از حد کمزوری کی وجہ سے ۔

۵۔ خونی دست (BLOODY DIARRHOEA) معدے میں زخم ۔

انتڑیوں میں ورم یا ان میں زخم یا سرطان یا بواسیر وغیرہ کی وجہ سے نیز بعض مستورات کو خون ماہواری کے رک جانے سے خونی دست آنے لگتے ہیں ۔

## علاج

ڈاکٹر جے بی بیل صاحب نے جو کتاب اسہال پر لکھی ہے اس میں اتنے یہاں ایسے سوچالیں ادویات کا ذکر کیا ہے ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی میں اسہال کا اتنا بھاری ذخیرہ ہے کہ اس میں مایوسی کا بہت کم امکان ہے ۔ وہی نہ ہونی روانی نہ درکار ہو باقی ہے اور یہی ہومیوپیتھی کی بڑی بھاری نصیبت ہے ۔ یہاں نہ ف چند ادویات کا ذکر کرتے ہیں ۔

آرسینیکم ۔ جب اسہال کا مریض ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ۔ اسہال کا نام سننے ہی آرسینیکم اور ڈاکٹر ماییم ہر دو ادویات جھٹ ۔ سننے آجاتی ہیں ۔ ان ہر دو ادویات کی امتیازی علامات حسب ذیل ہیں ۔

| آرسینیکم                        | ڈاکٹر ماییم                   |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ۱۔ پاخانہ مقدار میں تھوڑا تھوڑا | ۱۔ پاخانہ مقدار میں بہت زیادہ |

| درائٹرم ایلیکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آر سینیکم                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>۲۔ نہ بے چینی، نہ تفکر اور نہ ہی درد کے برداشت کرنے کی ناقابلیت</p> <p>۳۔ پیاس بہت زیادہ لیکن مریض بہت بہت پانی پیئے اور ٹھنڈے پانی کی طلب ہو۔</p> <p>۴۔ پاخانہ پھر چکنے کے بعد تقاہت بہت ہو لیکن اتنی زیادہ نہ ہو جتنی زیادہ مقدار میں دست آتے ہوں۔</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>۲۔ بے چینی، تفکر اور درد کے برداشت کرنے کی ناقابلیت۔</p> <p>۳۔ پیاس بہت زیادہ، لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں اور بار بار</p> <p>۴۔ تقاہت اور کمزوری بمقابلہ متلوں کے بہت زیادہ ہو۔</p> |
| <p>آر سینیکم کی چار موٹی موٹی علامات اسہال یہ ہیں :-</p> <p>۱۔ تھوڑی مقدار میں پاخانہ کا آنا۔</p> <p>۲۔ پاخانہ کا سیاہ رنگ ہونا۔</p> <p>۳۔ گندی بدبودار پاخانہ آنا۔</p> <p>۴۔ پاخانہ کے بعد سخت تقاہت کا ہونا۔</p> <p>اور بڑی بھاری علامت مبرز میں جلن کا ہونا ہے۔ پاخانہ سیاہی مائل زرد لیسدار یا خونی آتا ہو۔ اکثر اوقات پاخانہ سیاہی مائل مبرز اور بہت بدبودار آتا ہو اسہال کی زیادتی بوقتِ شب اور کھانے پینے کے بعد ہوتی ہو۔ کھانا کھانے کے بعد پاخانہ کا جھٹ آ جانا۔ یہ چائنا۔ فیرم اور آر سینیکم ہر سردیوں کی علامت ہے جب اسہال ٹھنڈی غذا کھانے، برف پینے یا آئس کریم کھانے سے یا باسی وگندی مٹھی غذا کھانے سے پیدا ہوئے ہوں تو آر سینیکم دوائی مؤثر ہوا کرتی ہے۔</p> <p>خوراک : ۳ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔</p> <p>درائٹرم ایلیکم کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں :-</p> <p>۱۔ بڑے کھلے اور بمقدار کثیر آبی دست جو کہ بہت زور سے خارج ہوں۔</p> <p>۲۔ دست آنے سے پہلے شکم میں درد</p> <p>۳۔ پاخانہ آنے کے بعد کمزوری بہت زیادہ ہو۔</p> <p>۴۔ ٹھنڈا پسینہ یا تریلی کا آنا اور جسم کا بالعموم ٹھنڈا و نیلا ہونا۔</p> |                                                                                                                                                                                        |

دراڑم ایلم کے اسہال آبی ہوا کرتے ہیں اور ایسے جیسے چا دلور، کی پیچھ ہوا کرتی ہے۔ دست آنے سے پہلے بہت سخت درد ہوتا ہے اور یہ درد بعض اوقات دست آتے وقت بھی ہوتا رہتا ہے، جب دست آچکتا ہے تو درد بند ہو جاتا ہے۔ دستوں کے ہمراہ اکثر اوقات جی بھی متلاتا رہتا ہے۔ ٹانگوں اور اڈوں میں بعض اوقات کڑل بھی پڑتے ہیں۔

جسٹروفا ووائی کے اسہال بھی آبی اور مقدار کثیر ہوتے ہیں اور بہت زور کے ساتھ نکلتے ہیں اور دراڑم کی مانند مریض ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔ لیکن امتیازی فرق یہ ہے کہ جسٹروفا کے اسہال کے ساتھ ہوا بہت خارج ہوتی ہے۔ کڑیل کو پریم میں بھی ہوتے ہیں لیکن کو پریم میں ٹھنڈا پسینہ نہیں ہوتا، دراڑم کی یہ بڑی قیمتی علامت ہے کہ مریض کو ٹھنڈے پانی کی طلب بڑی زبردست ہوتی ہے اور وہ بہت بہت مقدار میں پانی پینا چاہتا ہے۔

خوراک : ۳x یا ۶x یا ۱۲x یا ۳۰ ہر ایک، یاد دہنڈے کے بعد۔  
چائنا۔ جب کہ اسہال بلا درد کے آتے ہوں اور زرد رنگ کے ہوں۔ یا اسہال میں نامضم شدہ غذا خارج ہوتی ہو اور کھانا کھانے کے بعد فوراً پاخانہ آ جانا ہو۔ جب کسی شدید مرض کے بعد اسہال آنے شروع ہو جائیں تو چائنا دوائی مفید ہوتی ہے۔ موسم گرما کے اسہال کے لیے یہ ایک عمدہ دوائی ہے۔ نیز پھل کھانے کے بعد جب اسہال آنے شروع ہو جائیں تو ان کے لیے یہ ایک قیمتی دوائی ہے پیری میں اسہال مزمنہ کے لیے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔

خوراک : ۵ یا ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
آئرس ورسی کولر۔ اسہال جن میں کہ مقعد اور ممبرز میں پاخانہ بدلنے کے بعد جلن ہو۔ تھے میں کھٹا، بد مزہ مادہ بہت خارج ہو اور منہ اور حلق میں بھی جلن ہو۔ سر درد کی شکایت ہو۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
سلفر کے اسہال خاص صفت رکھتے ہیں۔ دستوں کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہو۔ زرد۔ آبی۔ لیسڈار نیز خنازیری مزاج والے بچوں کے اسہال میں کچی غذا

نکل سکتی ہو۔ صبح پاریا پانچ بجے کے قریب دست، زور کرتا ہو اور مریض کو جگا دیتا ہو اور اس کو بہت جلدی ٹی میں جانا پڑتا ہو۔ علی الصبح کے لیے کئی ایک اور بھی ادویات ہیں۔ مثلاً برائی ادویا ان میں سے ایک ہے لیکن برائی ادویا کا امتیاز کی نشان یہ ہے کہ مریض بستر پر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ذرا ادھر ادھر حرکت کرتا ہے تب اس کو پانمانہ کی حاجت ہوتی ہے۔ دوسری دوائی نیٹرم سلفن ہے۔ اس میں پاخانہ تو صبح کو آتا ہے لیکن ہوا بہت خارج ہوتی ہے اور جب مریض صبح کے وقت بستر پر سے اٹھ کر اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تب پاخانہ آتا ہے۔ رومیکس ایک اور دوائی ہے جس کی صبح والی علامت سافر سے ملتی جلتی ہے لیکن اس میں کھانسی بھی ساتھ ہوتی ہے۔ پوڈونائلم ایک اور دوائی ہے جو کہ اس صفت میں شاید سافر سے بہت زیادہ مشابہ ہے، پوڈونائلم کی بھی یہ علامت ہے کہ مریض بستر پر سے اٹھ کر پاخانہ جانے کی بہت جلدی کرتا ہے اور اس کے پاخانوں کی حالت بھی بہت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن اس میں جگر دکھن ضرور موجود ہوتی ہے اور بعض اوقات دست سارا دن ہی آتے رہتے ہیں۔

سفر کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ مہرز اور مقعد میں دکھن اور خارش ہوتی رہتی ہے۔ دست تیز آتے ہیں اور چڑے کو جلا دیتے ہیں۔ سفر کا پاخانہ بدبودار ہوتا ہے اور پاخانہ کی بو اس کے جسم سے آتی رہتی ہے، دست اور قبض باری باری سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور اگر مریض کو بواسیر کا عارضہ بھی ہو تو سفر دوائی کی یہ خاص علامت سمجھنی چاہیے۔ خارش دب جانے سے جب دست پیدا ہو جائیں تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک : ۳ یا ۲۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ایوز۔ پاخانہ کی حاجت لگاتار بنی رہتی ہو اور ساتھ ہی ہوا بھی بہت خارج ہوتی رہتی ہو، خاص علامت اس دوائی کی یہ ہے کہ بے چینی، کمزوری اور عضلات متعقد کے متعلق بہت بے یقینی۔ مریض ہوا خارج کرنے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ بار بار ہوا کے ساتھ دست اٹھ جائے۔ یہ حالت انشربچوں میں دیکھی جاتی ہے جب بار بار ہوا خارج کرتے ہیں تو اس کے ماتھ پاخانہ بھی نکل جاتا ہے۔



ایلووز میں بھی مانندِ سلفر کے یہ علامت پائی جاتی ہے کہ مریض بستر پر سے اُٹ کر ٹیٹھی میں جانے کی بہت جلدی کرتا ہے۔ کچھ کھانے کے بعد دست آجاتا ہے۔ مقعد کے عضلات کی کمزوری ایلوز کی مانند فاسفورک ایسڈ میں بھی پائی جاتی ہے یعنی رتخ خارج کرتے وقت پاخانہ بھی ساتھ نکل جاتا ہے۔ ایلوز میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے کہ پیشاب کرتے وقت پاخانہ بھی ساتھ نکل جاتا ہے۔

بواسیری سے پاخانہ کے ساتھ پھول جلتے ہیں اور درد کرتے ہیں، پاخانہ کا رنگ زرد اور لسی کی مانند آبی ہوتا ہے اور قبل پاخانہ کے شکم کے نچلے حصہ اور ناف کے ارد گرد بڑا سخت ڈوزد ہوتا ہے۔

ایلووز کی ضروری علامات یہ ہیں :-

- ۱۔ پاخانہ پانی پانی اور اُس میں مٹھیلے۔
  - ۲۔ شکم کے نچلے حصے میں پاخانہ کے پیشتر اور دوران میں سخت درد ہوتا ہے۔ پاخانہ اچکنے کے بعد درد موقوف ہو جاتا ہے۔
  - ۳۔ پاخانہ اچکنے کے بعد نہایت کمزوری ہوتی ہے اور سپینہ آتا ہے۔
- خوراک : ۱ یا ۲ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پوڈوفائیلیم - اس میں بھی دست علی الصباح آیا کرتا ہے۔ دست آبی زرد بہت مقدار میں اور زور سے نکل جاتے ہیں اور بلا درد کے ہوتے ہیں اور یہ حالت صبح تین بجے سے لے کر نو بجے تک رہتی ہے اور پھر دن بھر میں دست نہیں آتے بلکہ معمولی پاخانہ آتا ہے۔ پوڈوفائیلیم کی یہ ایک خاص علامت ہے کہ پاخانہ اچکنے کے بعد شکم اور مقعد میں بہت سخت کمزوری کا احساس رہتا ہے۔ پاخانہ آنے کے قبل کالچ رڈھنڈری نکل آتی ہے، دانت نکلنے کے زمانہ میں جب بچہ کو دست آئیں اور ساتھ ہی دماغی علامات بھی موجود ہوں تو یہ دوائی بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ بعض اوقات سرد درد اور رستوں کا غرضہ باری باری سے ہوتا ہے۔ پوڈوفائیلیم اور مرکبوس کی چند علامات مشابہ ہیں، دونوں میں جگر مائوف ہوتا ہے دونوں میں زبان پر دانتوں کے نشانات پائے جاتے ہیں لیکن مرکبوس میں کونٹھا بہت پڑتا ہے جو کہ پوڈوفائیلیم میں نہیں ہوتا۔

پوڈونائیم کی خاص علامات مندرجہ ذیل ہیں :-

- ۱۔ علی الصباح اسہال کا آنا۔
- ۲۔ آبی یا ماند لٹی اور زردنا ہضم شدہ غذا کے اسہال آنا اور ان کا زور کے ساتھ نکل جانا۔

۳۔ بلا درد کے اسہال آنا۔

۴۔ پاخانہ آنے کے بعد مقعد میں کمزوری کا محسوس ہونا۔

شریر خوار بچوں کو جو کہ کمزور ہوں اور جن کو بڑی سخت قبض رہتی ہو۔ ان کو یہ دوائی ۳ x میں بڑا نفع کرتی ہے۔

خوراک : ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس کار۔ پاخانہ کے وقت کو نتھنا مرکیورس کی خاص علامت ہے۔ اور یہ علامت مرکیورس سالو کی بجائے مرکیورس کار میں واضح طور پر ملتی ہے۔ مرکیورس کار پیمش میں ایک خاص دوائی ہے۔ جب اسہال چھپے اور خونی آتے ہوں اور ان کے ساتھ کو نتھنا اور مروڑ بہت پڑتے ہوں اور مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ابھی پاخانہ اور آئے گا اور بار بار حاجت ہوتی ہو اور اس کو زور لگانا پڑتا ہو تو ایسے حالات میں مرکیورس کار ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ جگر میں بھی دکھن ہوتی ہو۔ زبان پیلی (ڈھیلی) اور اس پر دانتوں کے نشانات پائے جاتے ہوں اور پاخانہ آنے سے پہلے بہت زور دار حاجت ہوتی ہو۔ پاخانہ آنے کے بعد کالچ بھی نکل آتی ہو۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا۔ معدہ و امعاء کی شکایات میں کلکیریا کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کھٹے بدبودار اور ناہضم شدہ اسہال کی یہ ایک بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ اسہال مزمنہ کے لیے یہ بہترین ادویات میں سے ایک ہے جن بچوں کی چندیا کی ہڈیاں آپس میں نہ جڑی ہوں اور وہ دانت نکال رہے ہوں اور ان کو اسہال کا عارضہ ہو تو کلکیریا کا رب ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ موٹے بچوں کو یہ بڑی موزوں پڑتی ہے۔ خنازیری اور رکٹی بچوں کے اسہال میں یہ اکثر کام آتی ہے۔

خوراک : ۳x یا ۶x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد

فاسفورس - مزمن اسہال کی یہ خاص دوائی ہے۔ اسہال علی الصبح بدول درد کے سبز آنوں سے ہوئے آتے ہیں اور اکثر کچی غذا نکل جاتی ہو۔ یہ دوائی اکثر لمبے در و بے پتلے اشخاص جن کی چھاتی کمزور ہو اور جن کا مزاج سستی ہو مفید ہوتی ہے۔ جب کہ دست کھلا اور زور سے نکل جاتا ہو اور اس میں سفید سا گودانہ کے سے اجزا تیرتے ہوں۔ ٹھنڈا پانی پینے کی زبردست خواہش ہو۔ لیکن جو نہی یہ پانی معدہ میں گرم ہو جاتا ہو تو قے کے ذریعہ سے باہر نکل جاتا ہو۔ مقعد کھلی رہے گویا مفلوج ہو گئی ہے۔

خوراک - ۳x یا ۳۰ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

فیرم - ایسے مریض کہ جن میں کمی خون ہو۔ کچا۔ پتلا پاخانہ بدول درد کے نکل جاتا ہو۔ بھوک بدستور ہو۔ کھانے کے بعد خوراک فوراً ہی بذریعے باہر نکل جاتی ہو۔

خوراک - ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹلا - اسہال جن کی وجہ مرغن غذا کی زیادتی ہو۔ متلی اور دکاریں آئیں۔ فائقہ خراب ہو۔ رنگت ہمیشہ تبدیل ہوتی رہے۔ کوئی رو پاخانے آپس میں نہ ملیں۔ دست رات کو پھل یا بالائی کھانے سے زیادہ آئیں۔ مریض ٹھنڈی اور تازہ ہوا کو زیادہ پسند کرے۔ منہ سوکھتا ہو لیکن پیاس نہ دارد۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

قابض ادویات دیکر اسہال کو بند کرنا بعض اوقات برے نتائج پیدا کرتا ہے ایک علامت کو تو آرام آجاتا ہے لیکن دیگر کئی علامات جاگ اٹھتی ہیں اور تکلیف کا موجب ہوتی ہیں۔ جب اسہال آنے سے طبیعت میں فرحت اور سبک معلوم ہو تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ قدرت کا دیگر امراض کو نشا دینے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ دانت نکالنے کے ایام میں بچوں کو دست آنے یا زیادہ کھا جانے کی وجہ سے اکثر ذریعہ اسہال قدرت تکالیف کو دور کرتی ہے گر پیٹ میں نامعظم شہرہ غذا یا فاسد مادہ خراش کرتا ہو۔ تو بعض اوقات بذریعہ

انیمیا خفیفہ مہل اس کو خارج کرنے کی ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ مریض کے جسم کو گرم رکھیں اور اس کو آرام دیں۔ جب مرض شروع ہو تو چوبیس گھنٹوں تک مریض کو کسی قسم کی غذا نہ دیں۔ صرف جوش دے کر سرد کیا ہوا پانی یا پھاڑے ہوئے دودھ کا پانی اور ابومین واٹر یعنی انڈے کی سفیدی کا پانی تھوڑا تھوڑا دیں۔ بعد ازاں گائے کا تازہ دودھ جوش دے کر سرد کیا ہوا دے سکتے ہیں یا دودھ میں لائٹ واٹر ملا کر دیں۔ اگر دودھ نفخ پیدا کرتا ہو تو اس کی بجائے ساگو دانہ یا اربوٹ پانی میں پکا کر یا مونگ کی دال کا پانی دیں۔ بعد ازاں وہی چاول، دال شوربہ چاول، کھجڑی اور دودھ ڈبل سوٹی بھی دے سکتے ہیں، اسہال مزمنہ یا سنگرہنی میں غذا کے متعلق نہایت احتیاط لازم ہے۔ ہر قسم کی ٹھوس غذا مریض کو نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ مریض کو صرف دودھ ہی کچھ عرصہ تک پلاتے رہیں۔ گائے کا عمدہ تازہ دودھ لے کر اور اس کو جوش دے کر سرد کر لیں اور ذائقہ کے لیے تھوڑی سی کھانڈ یا مصری ملا لیں اور ہر دو گھنٹہ کے بعد اس میں سے نیم پاؤ کے قریب پلاتے جائیں اور جب تک مرض کو بالکل آرام نہ ہو جائے تب تک مریض صرف دودھ ہی پئے۔ کیونکہ ٹھوس غذا کھانے سے مرض کے عود کر آنے کا اندیشہ ہوتا ہے جن مریضوں کو یہ دودھ مضم نہ ہوتا ہو ان کو دودھ میں لائٹ واٹر یعنی چونے کا پانی ملا کر دیں۔ اگر دودھ بالکل موافق نہ آتا ہو جگا دودھ کے چنے کا یا گوشت کا ہلکا شوربا یا بخنی پکا کر دیا کریں۔

شدید مرض میں مریض کو پورا پورا آرام دیں اور شکم میں سخت درد ہونے کی حالت میں ردی گرم کر کے پیٹ پر باندھیں یا فلائین یا کھڈر کا ٹکڑا گرم پانی میں بھگو کر اور نچوڑ کر اس سے شکم پر شکور کریں، اکثر رفع درد کے لیے یہ عمل نہایت مفید

۱۔ ابومن واٹر یعنی انڈے کی سفیدی کا پانی بنانے کی ترکیب حسب ذیل ہے :-

دو تازہ انڈوں کی سفیدی لے کر نصف سیر تازہ صاف پانی میں ڈال دیں اور اس کو خوب بلا دیں تاکہ سفیدی پانی میں حل ہو جائے پھر اس میں ذائقہ کے لیے تھوڑی کھانڈ یا مصری یا نلہ ڈال دیں۔ بچوں کو جب تھوڑے وقت کے بعد آتے ہوں اور ان کو کوئی چیز مضم نہ ہوتی ہو تو پانی ناشم ہو جاتا ہے۔

ثابت ہوتا ہے۔ مریض کے ہاتھ پاؤں اور شکم کو گرم رکھیں۔

## نفخ شکم - اپچارہ - پیٹ پھرنا

(FLATULENCE)

اس مرض میں اکثر نامفہم شدہ غذا کے متعفن ہونے سے شکم میں رنج پیدا ہو کر پیٹ میں اپچارہ ہو جاتا ہے۔ نیز بعض امراض جگر ورم اور کٹھیا و امراض معد و امعاء وغیرہ بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ عصبی مزاج کے اشخاص اکثر اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔ نفخ شکم کے ساتھ اکثر غشی و جی متلانا، دل دھڑکن اور دیگر کئی تکلیف دہ علامات شامل ہو جاتی ہیں۔

### علاج

کاربالک ایسڈ - نفخ شکم ہو۔ ڈکاریں آتی ہوں یا مریض گہرا سانس لیتا ہو۔  
خوراک : ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کاربووئیکی : معدہ تنا ہوا۔ زور نفخ کا اوپر کی طرف ہو۔ دم تکلیف سے آتا ہو یا تیز درویں سینہ میں ہوتی ہوں اور قبض نہ ہو۔ ڈکار سے افادہ ہوتا ہو۔

خوراک : ۶ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

لایکو پوڈیم - اپچارہ شکم کے نچلے حصہ میں ہو۔ دباؤ نیچے کی جانب ہو اور قبض ہو۔

خوراک : ۶ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

لایکس : نفخ شکم ہو۔ پیٹ میں درد ہوتا ہو اور ڈکار آنے سے درد میں افادہ ہو جاتا ہو۔

خوراک : ۱۲ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نکس ماشکاٹا - نفخ اور بدبوی ہو۔ ہر ایک چیز کھائی پی ہوئی ہو یا میں تبدیل ہو جاتی ہو۔

خوراک : ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیل - نفخ شکم ہو اور ڈکار آنے سے افادہ ہوتا ہو۔

خوراک : ۵ کے ایک یا دو قطرے گرم پانی میں ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

علاوہ ازیں آر جنٹم نائٹرکیم - کلکیر یا فلوریکا - کالین سونیا - متھاپیر پٹا - کاپچی کم اور سلفر وغیرہ ادویات بھی کام آتی ہیں -

## ضروری ہدایات

شیریں نشاستہ دارانہ غذا یہ نیز میوہ جات - چائے - لسی - شوربہ اور مہزی ترکیاری سے پرہیز کریں - اور شکم پر گرم پانی کی بوتل سے سینک کریں یا گرم روئی اوپر باندھیں غذا کے ہمراہ پانی کم پیا کریں - البتہ غذا کے ایک یا دو گھنٹہ کے بعد پانی پی لیا کریں - ہینگ کو گائے کے پیشاب میں رگڑ کر اور تھوڑا گرم کر کے پیٹ پر لپ کرنے سے اچھارہ دور ہو جاتا ہے -

## درد قونج - قونج

(COLIC)

اس مرض میں بڑی آنت کے عضلاتی ریشے سکڑتے یا انٹھتے ہیں اور شکم میں سخت تشنجی درد ہوتا ہے -

**علامات مرض:** ناف کے گرد نہایت سخت درد ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انتڑی کو کوئی مردڑ رہا ہے یا بل دے رہا ہے - پیٹ کو دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہے - مریض ٹانگوں کو پیٹ کے ساتھ سکیتا رہتا ہے اور مارے درد کے دوہرا ہوا جاتا ہے - کبھی شکم کے بل پڑا رہتا ہے اور کبھی فرش پر لوٹتا ہے اور نہایت جانکنی کی حالت میں ہوتا ہے - عموماً قبض ہوتی ہے اور اکثر پاخانہ جانے کی حاجت بار بار ہوتی ہے - لیکن خارج بہت کم ہوتا ہے یا صرف ہوا ہی خارج ہوتی ہے - بخار نہیں ہوتا اور نہ ہی ابتداء میں نبض تیز ہوتی ہے - البتہ بعد میں تشویش کی وجہ سے تیز ہو جایا کرتی ہے - درد ٹھہر ٹھہر کرتا رہتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آنت کے عضلات مادہ برازیل یا جمع شدہ ہوا کو نیچے کی طرف دھکیلتے ہیں اور نیچے کا حصہ سکڑا ہوا ہوتا ہے تو اس وقت غضب کی لہر کی درد پڑتی ہے -

**اسباب مرض:** غذا میں غلطی یعنی ثقیل غذیہ یا ترش پھلوں کا کھانا - ٹھنڈے پاؤں کا بھیگنا - گرم معاد اور قبض وغیرہ اس کے اسباب ہیں -

**تشخیص مرض :** درد قولنج کو (۱) درد گردہ (۲) ورم امعاء (۳) دردِ معدہ سے تشخیص کرنے کے لیے امتیازی علامات درج ذیل کی جاتی ہیں۔ چنانچہ

- ۱۔ درد گردہ مقام گردہ سے اٹھتا ہے اور درد کی ٹیس رانوں اور فوطوں تک جاتی ہیں اور پیشاب تھوڑا تھوڑا خارج ہوتا ہے۔
- ۲۔ ورم امعاء میں بخار ہوا کرتا ہے لیکن درد قولنج میں بخار نہیں ہوتا۔
- ۳۔ درد معدہ مقام معدہ پر ہوتا ہے۔ لیکن درد قولنج ناف کے آس پاس ہوتا ہے۔

## علاج

کالوسنتھ : گنٹیا اور جع المفاصل کے مزاج والے مریضوں کے لیے یہ دوائی اکسیر کا حکم رکھتی ہے جب کہ کاسٹے والی درویں ہوتی ہوں اور مریض دوہرا ہوا جاتا ہو۔ یا شکم کو کسی سخت چیز سے دبائے رکھا ہو۔ درد قولنج ہوا کے رکنے سے ناہضم شدہ غذا یا سردی کے باعث یا غصہ کے سبب سے پیدا ہوا ہو۔ اسہال آتے ہوں اور قبل و بعد اسہال کے درد ہوتا ہو اور ہوا کے خارج ہونے یا پاخانہ آنے سے درد کو آرام آتا ہو۔

دردِ حیض اور دردِ شانہ کے لیے بھی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کالوسنتھ عصبی درد قولنج میں مفید ہوتی ہے اور جب درد کی وجہ سوزش ہو تو پھر یہ مفید نہیں ہوتی۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ کے پانچ قطرے تک فی خوراک ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

ایکونائٹ : مریض کے دوہرا ہونے کی علامت ایکونائٹ میں بھی ملتی ہے جب بوجہ سوزش کے درد قولنج ہو تو یہ دوائی مؤثر ہوا کرتی ہے۔ مریض دوہرا ہونے کے لیے تو مجبور ہوتا ہے لیکن ایسا کرنے سے اس کو آرام معلوم نہیں ہوتا۔

ورائٹرم ایٹیم - جب مریض مارے درد کے دوہرا ہوا جاتا ہو اور آدم کی خاطر وہ چلنے پھرنے پر مجبور ہوتا ہو۔ ٹھنڈا پسینہ (توبلی) پیشانی پر آتا ہو شکم تنا ہوا اور قبض ہو۔

خوراک : ۱۰ ہر نصف گھنٹہ کے بعد۔

ڈایا سکوریا - جب درد ناف کے پاس ہوتا ہو اور متواتر لگاتار ہوتا رہتا ہو اور درمیان میں کبھی بہت تیز ہو جاتا ہو اور بجائے دوہرا ہونے کے جسم کو اکڑانے

سے آرام معلوم ہوتا ہو۔

صفراوی وجع المفاصلی اور اعصابی دردوں میں یہ دوائی کام آتی ہے۔ درویں سینہ اور کمر کی جانب پھیلی ہوں جب بد مضمی ہو اور ساتھ ہی درد قونج بھی ہو تو یہ دوائی بہت ہی مفید ہوتا کرتی ہے۔ جب مارے درد کے مریض کو پیچھے کی جانب جھکنا پڑے اور اس سے اس کو کچھ آرام معلوم ہو تو یہ دوائی مؤثر ہوتا کرتی ہے۔

خوراک : دو چھٹانک پانی میں بیس سے لے کر چالیس قطرے مدرٹنکچر کے ڈال دیتے ہیں اور ہر نصف گھنٹہ کے بعد اس میں سے ایک چمچہ بھر دوائی مریض کو دی جاتی ہے۔

نکس و امیکا : جب درد قونج کا عارضہ بد مضمی کے باعث ہو یا خانہ جلانے کی حاجت بار بار ہو۔ لیکن خارج نہ ہو یا بہت تھوڑا خارج ہوتا ہو۔ مریض چڑھری طبیعت کا ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ تھے ہونے سے پیٹ میں درد کو تھوڑی دیر کے لیے آرام ہو جاگے شکم سخت ہو اور اندر کو گھسا ہوا۔ پھولا ہوا نہ ہو۔ کھانے میں بے احتیاطی کے سبب درد معلوم ہو کہ آنتیں پتھروں کے درمیان کھلی جا رہی ہیں تھے کے ذریعے بہت کم مادہ خارج ہو۔ یا کچھ بھی خارج نہ ہو لیکن مریض کو ایسا معلوم ہو کہ بہت کچھ نکلے گا اور مکمل کچھ بھی نہ ہو اسیری مزاج والوں کے لیے یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک : ۱ x ہر نصف گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیللا - یہ دوائی بچوں اور مستورات کے درد قونج میں موزوں تر ہوتا کرتی ہے۔ جب درد قونج کے ساتھ ہی رخسارے گرم، چہرہ سرخ اور پسینہ آتا ہو جب درد قونج غم و غصہ کے باعث پیدا ہوا ہو۔ گرمی پہنچانے سے اور بوقت شب درد زیادہ ہوتا ہو اور کفنج بھی ساتھ ہو تو یہ دوائی ضرور دینی چاہیے۔

خوراک : ۱ x یا ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا - شیر خوار بچوں کے درد قونج میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ بچہ پیچھے کی جانب جھکتا ہے اور چلاتا ہے اور روہ مستقیم جس کو انگریزی میں ٹرانس ورس کولن کہتے ہیں۔ مانند گدی کے پھول گیا ہو۔ درد کے ساتھ پیٹ میں تشنج ہوا ایسا معلوم ہو کہ پیٹ کے اندر گولا سا بن گیا ہے۔



خوراک : ۱ x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

پلم بلم : جب درد شکم تمام اطراف میں پھیلتا ہو۔ شکم کی دیواریں اندر کی جانب کھچی ہوئی ہوں۔ ٹانگوں میں کڑل پڑتے ہوں اور بڑی سخت قبض ہو۔ لیکن نفخ نہ ہو شکم مانند پتھر کے سخت ہو اور ایسا محسوس ہو۔ گویا کہ شکم کی دیواریں رسی سے بندھی ہیں۔ کمر کی طرف کھچی جا رہی ہیں۔ مالش کرنے اور سخت دبانے سے آرام معلوم ہوتا ہو۔

خوراک : ۳ x سفوف کے دو سے لے کر چھ گرین تک ہر ایک یا دو گھنٹہ

کے وقفہ پر

کائیوس : جب نفخ کے ساتھ درد قونچ ہو اور مدت کو درد زیادہ ہو، ہواس کے خارج ہونے سے کوئی آرام نہ ہوتا ہو کیونکہ رتک پھر پیدا ہو جاتی ہے۔ دائیں پہلو میں درد ہوتا ہو اور آگے کی جانب بھکنے سے زیادہ ہوتا ہو۔ قبض بھی ساتھ ہو۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اگنیشیا - ہسٹریکل مزاج والے اشخاص کو جب درد قونچ کا حملہ ہوتا ہے جو کہ غنیمت سے جگا دیتا ہو اور غم کرنے سے درد قونچ پیدا ہوتا ہو۔ تو ایسی حالت میں یہ دوائی مفید پڑا کرتی ہے۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا - جب درد زیادہ نہ ہو۔ پیٹ میں چھبھی سی پڑتی ہو۔ حرکت سے زیادتی ہو۔ کھانا کھانے کے دو تین گھنٹہ کے بعد درد شروع ہو اور آہستہ آہستہ خود بخود آرام ہو جائے۔ قبض بھی ساتھ ہو۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹلا - جب مٹھائی یا مرغی غذا کھانے سے درد قونچ ہو اور ساتھ ہی ہری لگتی ہو۔ شکم میں گڑ گڑ کی آواز پیدا ہوتی ہو۔ ہسٹیریا کی مریض عورت اور حاملہ عورت کے پیٹ درد میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ پیشاب کی حاجت بار بار بار ہو۔

خوراک : ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

گنیشیا کارب : دردِ قولنج میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔ جب کہ سبزی بیدار پاخانے پھل یا سبزی کھانے کے بعد آتے ہوں اور مریض مارے درد کے دوہرا ہوا جاتا ہو۔  
 خوراک : ۳ x سفوف پانچ سے لے کر دس گرین تک گرم پانی کے ہمراہ ہر ایک گھنٹہ کے بعد لے

### ضروری ہدایات

فلالین کے ٹکڑے کو گرم کر کے شکم پر پٹیٹیں یا گرم پانی کی پچکاری یعنی انیما (حقنہ) کریں۔ اس سے اکثر بہت جلدی آرام آجایا کرتا ہے۔ ہر قسم کی سبزیات و نفاخ اغذیہ سے پرہیز لازم ہے۔ جن اشخاص کو یہ مرض گاہے بگاہے ہو جاتا کرتا ہے ان کو لازم ہے کہ وہ شکم کے گرد فلالین کا ٹکڑا باندھے رکھیں میز پاؤں کو حتیٰ الوسع بھینکنے نہ دیں۔

### سیسہ سے قولنج

(LEAD COLIC)

اس مرض میں شکم میں درد ہوتا ہے۔ پیٹ اندر کی طرف کھچا ہوتا ہے اور سوڑھوں پر اکثر ایک نیلی لکیر پڑ جاتی ہے۔  
 اسباب مرض : سیسہ کے برتنوں میں کھانا پینا۔ رنگ سازی۔ سیسہ کے برتن بنانا یا حروف بنانا۔ کپاڑیٹری کرنا۔ ایسے مکان میں جس میں تازہ رنگ کیا گیا ہو سونا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔

### علاج

اوپیم ۱۶ ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

الیومن ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

الیومینا ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

۱۷۔ بکھر علاوہ کاسٹیکم سٹیفنی سگریٹا۔ اپی کاک۔ اوپیم۔ کوپرم۔ کوپرم آرس اور سٹینم  
 ہی اپنی علامات کی موجودگی میں مفید ہیں۔

بیلڈونا - پلائنیم - پوڈونا یلم اور ایڈسلف ادویات بھی کام آتی ہیں۔  
نوٹ: ڈاکٹر ایس جوزایم ڈی لکھتے ہیں کہ ہچکڑی پسپی ہوئی ۵ رقی پانی ملا کر جوان  
مریض کو ہر دو گھنٹہ کے بعد دیتے جائیں۔ حتیٰ کہ آرام ہو جائے۔

## ضروری ہدایات

جو لوگ اس مرض کا شکار ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنا پیشہ بدل دیں۔ دورہ مرض  
میں پیٹ پر گرم ٹکڑ کر کے یا سینک کر کے۔ نیز گرم پانی اور صابن کی پچکاری کریں۔

## ہچکی آنا

(HICCUP HICCOUGH)

ہچکی درحقیقت ایک علامت ہے۔ جو کئی ایک امراض میں بطور پیچیدگی کے  
پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض حالات میں یہ ایک خطرناک علامت ہوا کرتی ہے۔  
جب حجاب حاجز (رڈایا فرام) میں تشنج ہو کر سکڑتا ہے، تو ہچکی آتی ہے۔ یہ مرض  
عموماً معدہ کے فتور سے پیدا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات شکم کے دیگر امراض کے  
باعث بھی۔

اسباب مرض: بچوں کو زیادہ کھانا کھا جانے یا ان کے معدہ میں دودھ  
کے زیادہ پھٹ جانے اور اچھارہ وغیرہ ہو جانے سے ہچکی آنے لگتی ہے۔ لیکن نوجوانوں  
اور بوڑھوں کو بوجہ بد مضمی کے یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ جگر کے فعل میں  
کستی و کلیجہ جلنا وغیرہ اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔

## علاج

جن سنگ: ہچکی کی یہ ایک خاص دوائی ہے۔ ڈاکٹر بورک فرماتے ہیں کہ

۱۔ ڈایا فرام۔ سینہ و شکم کا درمیانی پردہ۔ یہ ایک عضلاتی و غشائی پردہ ہے جو سینہ و شکم کے  
درمیان آٹے طود پر واقع ہے اور آلات تنفس کو آلات غذا سے جدا کرتا ہے یعنی دل  
اور پھیپھڑے اس کے اوپر ہوتے ہیں اور جگر و معدہ وغیرہ اس کے نیچے۔

بچکی کے ہر ایک کیس میں یہ دوائی شافی ہوتی ہے اور اگر کسی کیس میں ناکام بھی ہو جائے تو پھر نکس و امیکا ۳ x استعمال کرنی چاہیے۔

خوراک: ۵ مکے دس قطرے نصف ادس پانی میں ڈال کر ہر پین یا تیس منٹ کے بعد۔

کو پرم بھی ایک خاص دوائی بچکی کی ہے۔ دم سڑھنا، ڈکار آنا۔ پیٹ میں گڑگڑا، رقرقر، درد شکم اور قٹیوں کا آنا۔ یہ کو پرم کی خاص علامات ہیں۔ کو پرم میٹیلیکم کی بجائے کو پرم آر سینی ٹم بعض ڈاکٹروں کے نزدیک زیادہ معذوں ہوا کرتی ہے۔ خوراک: ۳ x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

ہائیوسائی مس۔ یہ دوائی کو پرم سے دوسرے درجہ پر ہے۔ غذا کھانے کے بعد بچکی کا شروع ہو جانا۔ کلیجہ جلنا۔ پیاس، جی متلانا اور گندے ڈکاروں کا آنا اس دوائی کی خاص علامات ہیں۔ جب آپریشن کرانے کے بعد درم ہو جائے تو ہائیوسائی مس خاص طور پر موثر ہوتی ہے۔

خوراک: ۳ x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا جب بد معنی ق یا ثقیل غذا کے کھانے اور اس کے بعد سرد پانی پینے سے یہ عارضہ شروع ہو جائے، معدہ میں کھٹائی زیادہ ہو۔ کلیجہ میں جلن ہو اور بدبودار ڈکار آئیں تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ تبا کو نوشی کے بعد اگر یہ عارضہ پیدا ہو تو نکس و امیکا دوائی شافی ہوتی ہے۔

خوراک: ۳ x ہر دس منٹ کے بعد۔

اگنیشیا: عصبی مزاج والے مریضوں کی بچکی میں یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔ جبکہ بعد دوپہر اور کھانے کے بعد بچکی شروع ہو۔ تبا کو نوشی سے مرض میں زیادتی ہوتی ہو۔ جب بچکی کا حملہ گلہے گا ہے ہوتا ہوا درنج و غم یا کسی امر میں مایوسی ہونے کے باعث یہ عارضہ ہوتا ہو تو اگنیشیا موثر ہوا کرتی ہے۔ ہسٹریکل مزاج کی مستورات کو جب بچکی کا حملہ ہو جائے تو یہ دوائی فوراً اپنا اثر دکھلاتی ہے۔

خوراک: ۲ x ہر دس منٹ کے بعد۔

لاکیولس: جب نکس و امیکا منظر ہو۔ لیکن وہ شفا دینے سے قاصر رہے تو

یہ دوائی اُدچی طاقت میں دی ہوئی فائدہ کرتی ہے۔ جب ہیضہ کے بعد یہ مرض شروع ہو جائے تو یہ دوائی نفع کرتی ہے۔

خوراک: ۶ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ

سائی کیوٹا: جبکہ ہیچکی آواز بلند آتی ہو اور بڑی خطرناک صورت اختیار کیے ہوئے ہو شکم ہوا سے پُر ہو اور جلتا ہو۔ بڑی سخت قین آتی ہوں اور پیاس لگتی ہو اسہال آتے ہوں تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے، مرض ہیضہ کے بعد جب ہیچکی شروع ہو جائے تو سائی کیوٹا شافی ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۳ x ہر دس منٹ کے بعد۔

بیلادونا: جب ڈکار اور ہیچکی ملے جلتے آتے ہوں ہیچکی بہت سخت ہو اور تنگی تنفس ہو۔ شکم میں گڑ گڑاہٹ ہو اور رات کو مرض کا زور ہوتا ہو۔

خوراک: ۳ x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

کاربوئیچی: ہیچکی کئی گھنٹوں بلکہ کئی روز سے جاری ہو شکم تنا ہوا ہو تھوڑی سی غذا کھانے سے دست آجاتے ہوں۔

خوراک: ۳ x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

علاوہ مذکورہ ادویات کے سائی کلیمین، نیٹرم میور، لاسکس، رینہیا۔ ہائیڈرو سیانک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ بھی اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

بسا اوقات سرد پانی یا برت کا پانی یا سیاہ مرچ کو حقہ میں رکھ کر پینا یا ناریل کا پانی پینا۔ ہیچکی کو آرام دیتا ہے جب ہیچکی کا عارضہ زیادہ کھانے کے باعث پیدا ہو تو غذا کو باقاعدہ کرنے سے آرام ہو جاتا ہے۔ خفیف قسم کی ہیچکی میں ایک لمبی سانس بھر کر ایک دو منٹ تک دم بند رکھنے سے آرام ہو جاتا ہے۔

# قبض

(CONSTIPATION)

یہ مرض عام ہے۔ اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مرض میں پاخانہ خشک سیاہی مائل۔ متعفن مقدار میں تھوڑا اور بڑی مشکل سے خارج ہوتا ہے اور بہت دیر لگتی ہے۔ بعض اوقات رنج حاجت کے وقت زیادہ زور لگانے اور سخت براز کی وجہ سے خون یا آنوں بھی آجاتی ہیں۔ شکم میں کم و بیش نفخ ہو جاتا ہے کیونکہ پاخانہ کے زیادہ عرصہ تک انٹریوں میں رُکے رہنے کی وجہ سے شکم میں متعفن رُک پیدا ہو جاتی ہے۔ مرض سست رہتا ہے۔ اکثر سردی کی شکایت بھی رہتی ہے۔ مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اور دل زیادہ دھڑکتا ہے۔

**اسباب مرض:** تخمیں اغذیہ کا کھانا۔ میدہ والی چیزیں یا زیادہ خشک غذا کا کھانا اور سبزیوں نہ کھانا۔ تازہ ہوا میں ہوا خوری نہ کرنا۔ چائے زیادہ پینا اور کثرت حقہ نوشی، بیر یا شراب کا بکثرت استعمال، ترشیوں کا زیادہ استعمال کرنا۔ بعض اوقات اپنے معمول پر پاخانہ نہ پھرنا۔ کمزریں یا کمزور کو کس کر باندھنا۔ نیز بعض امراض مثلاً بواسیر۔ موٹاپا۔ بعض عصبی امراض نیز بعض امراضِ رحم یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ اکثر بار بار جلاب لینے سے بھی آنتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ اپنا فعل بخوبی سرانجام نہیں دے سکتیں۔

**نوٹ:** ۱۔ جو اشخاص دماغی محنت بہت کرتے ہیں اور ورزش یا سیر کم کرتے ہیں ان کی انٹریوں کے پٹھے کمزور پڑ کر دائمی قبض کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔  
۲۔ مستورات بہ نسبت مردوں کے اس مرض میں زیادہ مبتلا پائی جاتی ہیں خصوصاً حاملہ مستورات کو قبض زیادہ ہوا کرتی ہے اور اکثر یہ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ دائمی قبض کی وجہ سے مستورات کے رحم اپنی جگہ سے ٹل جاتے ہیں۔

**اقسام مرض:** قبض دو قسم کی ہوتی ہے، ایک عارضی دوسری دائمی یا پرانی قبض۔

## علاج

نکس و امیکا: پاخانہ تھوڑا تھوڑا لیکن بار بار آئے اور ہر وقت حاجت بنی

رہے اور مریض کو ایسا محسوس ہو کہ ہر بار پاخانہ تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے دماغی کام کرنے والے یا گوشت یا شراب کے زیادہ استعمال کرنے والے آدمیوں کے لیے یہ دوائی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ نیز طلباء اور دیگر گھر کے اندر رہنے والے اشخاص کے لیے یہ دوائی موزوں تر ہوتی ہے جب کاہلی اور سستی کے باعث قبض کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو۔ مثلاً پاخانہ کو روک رکھنا اور رفع حاجت کے لیے ٹیٹھی میں نہ جانا۔ ورزش کرنا اور سستی میں پڑا رہنا۔ تو ایسے حالات میں یہ دوائی دافع قبض ہوا کرتی ہے۔ جی متلانا۔ سرور و نیند ٹھیک طرح نہ آنا۔ یہ علامات بھی اکثر قبض کے ساتھ شامل ہوا کرتی ہیں، لیکن جب پاخانہ جانے کی حاجت ہی پیدا نہ ہو تو ایسی حالت میں یہ دوائی مفید نہیں ہوتی۔

خوراک : x کے چار قطرے یا x کے سفوف پانچ گرین بوقت شام جب قبض رفع ہو جائے تو کل شفا کے لیے x ۳ طاقت استعمال کرنی چاہیے۔

برائی ادویا : پاخانہ لمبا۔ سخت اور خشک، گویا کہ جلا ہوا ہے۔ یہ برائی ادویا کی خاص علامت ہے۔ پیاس زیادہ اور منہ خشک ہو۔ سرور و بھی ساتھ ہو۔ جگر کے مقام پر درد ہو۔ پاخانہ کی حاجت بالکل پیدا ہی نہ ہو۔ ان اشخاص کے لیے جو کہ طبعاً وجع المفاصل طبیعت کے ہوں۔ یہ دوائی زیادہ موزوں ہوتی ہے۔

خوراک : x ۳ ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

ہائیدراسٹس : جب قبض سخت ہو اور حاجت نہ ہوتی ہو اور معدہ دھکیجہ گرتے جا رہے ہوں تو یہ دوائی دی جاتی ہے۔

خوراک : ۵ مدر ٹنکچر کے ایک یا دو قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر بوقت صبح۔

اناکارڈیم : جب ایسا احساس ہو کہ مقعد میں ڈاٹ ٹھونس دیا گیا ہے اور وہ دوا نہیں ہوتا تو یہ دوائی موثر ہوا کرتی ہے۔

خوراک : x ۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

اوپیم : انٹریوں کی حرکت بالکل بند ہو۔ ان کی جھلی خشک ہو اور قطعی حاجت نہ ہو۔ پاخانہ چھوٹی انٹریوں میں زیادہ دیر تک جمع رہے اور سخت سڈے جم گئے ہوں اور اگر پاخانہ آئے بھی تو چھوٹی چھوٹی سخت خشک گویاں خارج ہوں، جیسا کہ اپیم بم

میں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن پلم بلم میں کم دبیش پاخانہ جانے کی حاجت ہوا کرتی ہے اور اوپیم میں بالکل نہیں۔

خوراک: ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سلفر: اُن اشخاص کے لیے مفید ہوتی ہے جنہیں بواسیر کی شکایت ہو۔ پاخانہ کی حاجت بار بار ہو اور ایسا معلوم ہو کہ رودہ مستقیم میں کوئی پھیزاکی ہوئی ہے۔ نمکس دامیکا شام کو اور سلفر صبح کو۔

خوراک: ۳ x ٹری ٹورلین صبح کے وقت۔

لایسکو پوڈیم: پیٹ کے نچلے حصہ میں اچھا زیادہ ہو۔ پاخانہ سخت ہو اور شکل سے آئے۔ کھٹا سا پانی منہ میں جمع ہو جاتا ہو۔ پیشاب مریخ رنگ کا ہو۔ جس میں لالی سی ریگ موجود ہو۔

خوراک: ۶ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

پلم بلم: قبض کے ساتھ سخت درد ہو۔ ایسا معلوم ہو کہ پیٹ کورسی کی مانند کوئی چیز اندر کو کھینچ رہی ہے اور مقعد گھٹی ہوئی معلوم ہو۔ ایسا محسوس ہوتا ہو کہ مبرز اوپر کی جانب کھچی ہوئی ہے۔ سیاہ ڈھیلوں کی شکل میں پاخانہ خارج ہو۔ انتڑیوں میں تھکے جم گئے ہوں۔

خوراک: ۲ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس: تپ دق کے مزاج والے آدمی جو لمبے اور پتلے اور دبے ہوں۔ پاخانہ پتلا۔ لمبا اور سخت نکتے کے پاخانہ کی مانند آتا ہو۔ ساتھ ہی اس کے جلن بھی ہوتی ہو۔ خوراک: ۶ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ایلو مینا: جب پاخانہ بھیر کے پاخانہ کی مانند آتا ہو اور نرم پاخانہ بڑی شکل سے خارج ہوتا ہو۔

خوراک: ۶ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

کالین سونیا: قبض کو رفع کرنے میں یہ دوائی بھی نہایت معتبر ہے خاص کر حاملہ مستورات کی قبض کشائی میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک: ۵ کے پانچ قطرے دن میں دو مرتبہ رلے



## مفید امدادی ذرائع

۱۔ جو اشخاص جلاب پینے کے عادی ہوں اور اس عادت کو ترک کرنے سے خوف کھاتے ہوں ان کو لازم ہے کہ سلفرہ کے دو قطرے بوقت شب سوتے وقت لے لیا کریں۔

۲۔ صبح کو اٹھتے وقت ٹھنڈے پانی کا گلاس پی جانا اور اگر ٹھنڈا پانی موافق نہ ہو تو گرم پانی پی لینا اکثر مفید ہوتا ہے اور پاخانہ لاتا ہے۔

۳۔ ہائیڈراسٹس کے تین قطرے ایک پاؤ پانی میں منہ بہار صبح پی لینے سے قبض کشائی ہو جاتی ہے۔

۴۔ ٹھنڈے پانی یا شیر گرم پانی میں کپڑا بھگو کر رات کے وقت پیٹ کے اوپر لیٹنا قبض کشائی میں مددگار ہوتا ہے۔

## ضروری ہدایات

کھانا وقت پر کھانا چاہیے گوشت کم، سبزی ترکاری اور پکے ہوئے پھل بکثرت کھانے چاہئیں۔ چنانچہ آم، آٹو، زرد آلو، کشمیری ناشپاتی، آلو بخارا، آلوچہ، انگور، امرود، انجیر، سنگترہ، خربزہ یہ پھل عادی قبض کے رفع کرنے میں مفید ہوتے ہیں۔ مگر سیب اور بھی قابض گئے ہیں۔

گیہوں کے موٹے یا ان چھانے آٹے کی روٹی کھانا دافع قبض ہے اور دائمی قبض کے مریضوں کو تو ہمیشہ جلی کے موٹے آٹے کی روٹی کھانی چاہیے۔ مہیدہ یا باریک آٹے کی روٹی یا پوری کپوری۔ حلوا اور مٹھائی وغیرہ ثقیل ہونے کے باعث قبض پیدا کرتی ہیں جن اشخاص کو عادی قبض ہو ان کو چاول بھی کم کھانے چاہئیں، کیونکہ چاولوں میں اجزائے نشاستہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ قابض ہوتے ہیں۔

کھانے کے ساتھ بہت پانی نہیں پینا چاہیے۔ کیونکہ زیادہ پانی پینے سے معدہ کی رطوبات ہاضمہ محلول ہو کر قہلی ہو جاتی ہیں اور فعل مضغ بخوبی سرا بخام نہیں پاسکتا اور اس لیے کھانا بخوبی مضغ نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے کھانے کے ساتھ پانی بالکل نہ پینا بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ خشک غذا بھی بخوبی مضغ نہیں ہو سکتی

اس لیے کھانے کے ہمراہ پانی تھوڑا ضرور پینا چاہیے اور بہت نہیں پینا چاہیے۔  
بعض اشخاص کے اندر خشکی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ان کو کھی یا مکھن وغیرہ معمول  
کی نسبت زیادہ کھانے چاہئیں، کیونکہ غذا میں روغن کی کمی کی وجہ سے قبض ہو جاتا  
کرتی ہے۔

شراب منشیات اور بہت مصالحہ دار غذا اور بے وقت کھانا۔ یہ سب ترک کرنے  
چاہئیں، کثرت سگریٹ یا تمباکو نوشی سے بھی انتہا بیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور جن اشخاص  
کو دائمی قبض کی شکایت ہو، ان کو چاہیے وہ کچھ عرصہ تک روزانہ بذریعہ انیما قبض  
رفع کر لیا کریں اور مناسب ہو میو میٹھیک دوائی کا بھی استعمال جاری رکھیں۔ اس  
طرح کرنے سے ان کی عادی قبض دور ہو جائے گی۔ دودھ اور پانی مساوی ملا کر حقہ  
کرنا مفید ہوتا ہے۔ مثلاً چھ چھٹانک دودھ میں چھ چھٹانک گرم پانی ملا دیں اور  
اس سے پچکاری کیا کریں اور اگر اس میں ایک ڈرام خالص گلیسرین یا تھوڑا سا  
خالص شہد ملا کر پچکاری کریں تو سخت سے سخت قبض بھی رفع ہو جاتی ہے۔  
پیٹ پر مالش کرنا بھی دائمی قبض کو دور کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔

مالش کرنے کا طریقہ بڑی انتہائی کی وقوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی پہلے  
دائیں کوٹھے سے نیچے سے اوپر کو اور پھر پسلیوں کے پاس ناف سے اوپر سیدھا  
دائیں سے بائیں اور پھر اوپر سے نیچے کو مالش کرنا چاہیے۔  
بعض اشخاص کی انتہا بیاں سخت ہوتی ہیں۔ اس لیے ان کو قبض کشا دوا  
کی ضرورت ہوا کرتا ہے۔

## اندھی آنت کی سوچن

(TYPHILITIS APPENDICITIS)

اس مرض میں اندھی آنت میں درد ہو جاتا ہے۔ جی مچلاتا اور قہیں آتی ہیں  
طبیعت بے قرار رہتی ہے اور ساتھ ہی خفیف بخار بھی ہوتا ہے۔ حرارت عموماً  
۹۹ سے ۱۰۰ درجہ تک رہتی ہے۔ نبض کی رفتار تیز ہوتی ہے اور مرض کی زیادتی  
کے ساتھ یہ بھی بڑھتی جاتی ہے۔ درد کا عملہ یکایک سارے پیٹ میں ہو جاتا

ہے۔ اور خصوصاً مقامِ ماؤٹ میں، پھر وہ دردِ شکم کے دائیں جانب ایک مقام میں جس کو انگریزی میں (ILIAC FOSSA) یعنی مقامِ اتحادِ بڑی و چھوٹی انتریاں کہتے ہیں، ٹھیر جاتا ہے۔

زبانِ مریض کی میلی اور پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے، بستر پر مریض اپنی دائیں ٹانگ کو دھکیلا اور اوپنچا رکھتا ہے کیونکہ اس سے اس کو ماؤٹ مقام پر کھچاؤ نہ ہونے کے باعث آرام رہتا ہے۔ بعض حالتوں میں اندھی آنت کی سوزش پھوڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

**اسبابِ مرض:** کرمِ امعاء یا دائمی قبض کا ہونا، اندھی آنت میں سخت سہ یا کسی میوہ کی گٹھلی اور جھلکا کا پھنس جانا وغیرہ وغیرہ، نیز امراضِ دانت، ناک، حلق و گلو کے جراثیم پیٹ میں داخل ہو کر اس مرض کے پیدا کرنے کا موجب ہوا کرتے ہیں۔ یہ بیماری پندرہ سال سے لے کر تیس سال کی عمر میں زیادہ پائی جاتی ہے۔

## علاج

ایکونائٹ، جلا ڈونا، کالوسنتھ، مرکبوریس، سال یا مرکبوریس کار۔ رٹاکرس۔ برائی اوینا۔ لائیکوپوڈیم۔ نکس دامیکا، بیرسلف۔ سیٹیا۔ کلیریا۔ ڈائی سکوریا اور سلفر۔ یہ ادویات اس مرض میں زیادہ مستعمل ہوتی ہیں اور گاہے گاہے مندرجہ ذیل ادویات کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ امونیم۔ بیپٹیشیا۔ کالچی کم۔ کروٹیس۔ ایکنیشیا جن سنگ۔ لاکس، نیٹرم سلف۔ پلم بم۔ فرم فاس، اگنیشیا، کاربوئیچی وغیرہ۔

## ضروری ہدایات

مریض کو بڑے آرام سے بستر پر چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے اور اس کو مہل نہیں دینا چاہیے۔ مقامِ درد پر سینک کریں یا مریض کو گرم پانی کے ٹب میں بٹھلائیں یا گرم گرم پانی

۱۔ آرٹس ٹینکس ۵ یا ۳ x دینے سے اکثر درد کو آرام ہو جاتا ہے۔ اگر چند گھنٹے میں درد کو آرام نہ ہو تو سرجن سے مشورہ کرنا چاہیے۔

مقام درد پر باندھیں، گرم پانی اور صابن کا انیما (حقنہ) کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ اگر مرض کو قہیں آتی ہوں تو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چوسانے سے اکثر آرام آ جاتا ہے۔

## پیٹ کے کیڑے (INTESTINAL WORMS)

انسان کی انتڑیوں میں کئی قسم کے کیڑے پائے جاتے ہیں، لیکن مشہور تین قسمیں ہیں۔ جن کا مختصر ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

(THREADWORMS)

۱۔ چرنے، چھونے، سوتی کیڑے

(ROUND WORMS)

۲۔ کیچوے - حیات

(TAPEWORMS)

۳۔ کدو دانے

اب ہر ایک کا مختصر بیان ذیل میں لکھا جاتا ہے۔

۱۔ چرنے یا سوتی کیڑے: ہر ایک کیڑا لٹم سے لے کر ایک انچ تک لمبا

ہوتا ہے اور یہ سب سے چھوٹا کرم ہے جو کہ انسان کی انتڑیوں میں پایا جاتا ہے۔

یہ کیڑے تعداد میں بہت پائے جاتے ہیں اور بالعموم متعدد میں زیادہ رہتے ہیں۔ سفید

باریک دھاگے کی مانند ہوتے ہیں اور بہت جلدی اور حرکت کرتے پھرتے ہیں

کبھی یہ کیڑے آنٹوں یا معدہ میں چلے جاتے ہیں اور کبھی متعدد مقام سیلون کے

راستے چھوٹی لڑکیوں کے اندام نہانی میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب بچوں کو بازاری

دودھ یا شیرنی یا دیگر غذا دی جائے، تب یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بڑے بچوں اور نوجوانوں

میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کرم سندر جہ ذیل علامات پیدا کرتے ہیں۔ متعدد کے آس

پاس خارش یا جلن خصوصاً شام کو زیادہ۔ بھوک کا بہت لگنا یا گاہے کمی اشتہا و بدبودار

تنفس ناک کو کریدنا۔ دانت پسنا۔ رفع حاجت کے وقت بہت زور لگانا۔ بیخوابی اور کم و بیش

بے چینی، پاخانہ بار بار پھرنے اور زور لگانے کی وجہ سے کاویخ نکل آیا کرتی ہے اور یہ علامات

چرنوں کے رفع ہو جانے کے بعد بھی عرصہ تک جاری رہتی ہیں۔

۲۔ کیچوے یا حیات: یہ کرم لمبائی میں مختلف ہوتے ہیں چار انچ سے لے کر

۱۵ یا ۱۶ انچ تک لمبے ہوتے ہیں اور پلہ انچ تک موٹے ہوتے ہیں، اس کرم کے منہ میں چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، یہ کرم عموماً انسان کی چھوٹی آنٹوں میں رہتا ہے۔ عموماً ایک یا دو ہوتے ہیں اور کبھی کبھی زیادہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی دیگر سختوں میں یا معدے یا مقعد یا مچھری ابول یا جھنجرہ اور ناک کی طرف یا عورت کی اندام نہانی میں بھی چلے جاتے ہیں جب یہ کپڑا معدہ میں پہنچتا ہے۔ تو بذریعہ قے خارج ہو جاتا ہے۔ پتہ میں بھی پایا گیا ہے۔ اور نیز براستہ خوراک کی نالی یہ حلق میں بھی پہنچ جاتا ہے کبھی براستہ خوراک کی نالی یہ ہوا کی نالی میں بھی چلا جاتا ہے۔ جہاں کہ یہ دم گھٹنے سے ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ کرم عموماً تین سے لے کر دس برس کے بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور ایسے بچے جن کی پرورش درست طریقے پر نہ کی گئی ہو۔ یہ کرم مندرجہ ذیل موٹی موٹی علامات مریض میں پیدا کرتا ہے۔ شکم میں درد اور سوجن۔ کئی اشتہار۔ بدبودار سانس۔ پسداد پاخانے۔ کونٹھا۔ خارش مقعد اور بعض اوقات امہال مزمنہ جو کہ رات کو زیادہ آتے ہیں اور بدبودار اور تھوڑی مقدار میں آتے ہیں۔ کونٹھا بہت پڑتا ہے اور اکثر کانچ نکل آتی ہے۔ نیز عصبی علامات مندرجہ ذیل پائے جاتے ہیں۔ چہرے کا رنگ زرد۔ آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی۔ سرچکر، قیندبے آرام، اور دانتوں کو پینا۔ تشنچ اور ریشہ وغیرہ وغیرہ

۳۔ کدو دانہ : اس کرم کی لمبائی ایک سے پچاس گز تک دیکھی گئی ہے اور یہ کرم انسانی کی چھوٹی آنٹوں میں رہتا ہے اور شافو ونا اور معدہ میں بھی چلا جاتا ہے اور عموماً یہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کا سر آنت کی دیوار میں چبٹا ہوتا ہے اور یہ بڑھتا رہتا ہے۔ بعض اوقات اس کا ٹکڑا کٹ کر پاخانہ میں خارج ہو جاتا اور جب تک اس کا سر نہ نکل جائے یہ بڑھتا رہتا ہے۔

علامات جو اس کرم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ عموماً یہ ہیں۔ شکم میں بوجھ اور درد شکم مقام ناف میں بڑھا ہوا، بھوک بہت زیادہ، ناک اور مقعد میں بالعموم خارش۔ سستی اور کاہلی اور بعض اوقات ٹانگوں میں کڑل۔

علامات عامہ : ہر ایک کرم کے بیان میں مختلف علامات جو کہ یہ مریض میں پیدا کرتا ہے دی گئی ہیں وہاں ملاحظہ کر لیں۔ ذیل میں موٹی موٹی مشترکہ علامات درج کی

جاتی ہیں، مریض کا شکم عموماً پھولا رہتا ہے اور سخت ہوتا ہے اور اس میں گاہے درد ہونے لگتا ہے۔ چہرہ پھولا ہوا اور زرد جلد جسم خاکستری پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ ناک کو مریض کو دیتا ہے اور اس میں خارش ہوتی ہے اور مریض کو بار بار پاخانہ جانے کی حاجت ہوتی ہے۔ مگر بے سود اور کبھی اسہال آتے ہیں اور بہت زور لگانا پڑتا ہے دست بزرگ سیاہ لیسدار اور بدبودار آتے ہیں۔ سانس میں بو آتی ہے۔ خاص کر صبح کے وقت اور بعض اوقات سوتے ہوئے مریض کے منہ سے رالیں ٹپکتی رہتی ہیں، بھوک بہت لگتی ہے اور بھوک مرجاتی ہے اور مریض بچہ بالکل کچھ نہیں کھاتا۔ متعدد سے آلوں نکلتی رہتی ہے۔ اور چھوٹی لڑکیوں کے اندام نہانی سے بھی آنوں خارج ہوتی ہے۔ بعض اوقات پیشاب بڑی تکلیف اور درد سے آتا ہے اور پیشاب کا رنگ سفید و دودھیا ہوتا ہے۔ عصبی علامات بے چینی سوتے سوتے چونک اٹھنا۔ دانت پسینا خشک چھوٹی خراشدار یا تشنجی کھانسی کا ہونا۔ گہری آہیں بھرنا۔ ہچکی وغیرہ۔ بعض بچوں کو تشنج ہوتے ہیں۔

**اسباب مرض:** سبزی، ترکاری، ساگ پات، میوہ جات اور گندے پانی کے ذریعہ کرموں کے انڈے انسان کے پیٹ میں پہنچ کر کرم بن جایا کرتے ہیں۔ گندے گوشت کے کھانے سے کدو دانہ پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ غلہ کے اچھی طرح مضغ نہ ہونے اور نہ ہی تحمیل ہونے کے باعث آنتوں میں آنوں بہت پیدا ہوتی رہتی ہے اور وہاں ہی مٹرنے لگتی ہے اور کرموں کے پیدا کرنے کا موجب ہوتا کرتی ہے۔ نیز ایک مریض سے دوسرے مریض میں کرم چلے جاتے ہیں خصوصاً جبکہ ایک ہی بستر میں بیمار بچہ کے ساتھ دوسرے بچے سوتے ہوں۔ گندی جگہ پر ننگے پاؤں پھرنے سے بھی پیٹ میں کیرے ہو جاتے ہیں۔

### علاج

کرموں کا جسم سے خارج کرنا ہی کافی و دافعی علاج نہیں ہے بلکہ ہضم کا درست کرنا بھی ویسا ہی ضروری ہے تاکہ کرموں کو نشوونما پانے کا مصالحہ ہی نہ مل سکے۔  
سائینا، مریض بچہ ہزار چڑچڑا زرد زرد آنکھوں کے گرد حلقے ہوں اور رات کو دانت پٹیا ہو اور تشنج ہونے کی طرف طبیعت کا رجحان رہتا ہو۔ بھوک بہت لگتی

ہو یا برعکس اس کے بالکل ہی نہ لگتی ہو۔ ناک کو نوچتا ہو اور سوتے سوتے چیخ اٹھتا ہو ہاتھ اور پاؤں جھٹکتے ہوں اور شبیاب دودھیا ہو۔ بعض بچوں کو ابکائیاں اور قیئیں بھی آتی ہیں اور شکم میں درد ہوتا ہے۔

خوراک:  $1 \times$  یا  $2 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سیائی جیلیا، بھینگا پن، ہاتھ اور پاؤں کا جھٹکنا۔ چہرہ کا زرد ہونا۔ آنکھوں کے گرد نیلیوں حلقوں کا ہونا۔ غشی۔ جی مچلانا اور ناف کے ارد گرد درد کا ہونا، یہ سب اس کی علامات ہیں۔

خوراک:  $2 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

اس دوائی کے مد ٹیکچر کے چند قطرے رومال پر ڈال کر مونگھنے سے اکثر تشنج رک جاتے ہیں جو کہ کرموں کی وجہ سے ہوں۔

سینٹونائین: تمام قسموں کے لمبے اور بڑے کرموں کے لیے یہ دوائی بہت مفید مانی گئی ہے۔ لیکن بعض ڈاکٹر اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں۔

خوراک:  $2 \times$  ٹری ٹیوڈیشن ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سیننم: ڈاکٹر ہنری سن کے فرمان کے بموجب یہ دوائی کرموں کو ایسا بے حس و حرکت کر دیتی ہے کہ سہل دینے سے وہ بڑی آسانی سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں، زرد اور اندر کو دبا ہوا چہرہ اور آنکھیں اور ان کے گرد نیلیوں حلقے طبیعت کا بل دسست، سانس بدبودار تھوڑا تھوڑا بخار، مریض معدے کے بل لیٹنا پسند کرتا ہے۔

خوراک:  $2 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کلاڈیم: جب کرم مقام میون پر سے ہوتے ہوتے چھوٹی لڑکیوں کی اندام نہانی میں پہنچ کر خارش کریں اور حلق مارنے کی طرف طبیعت کو راغب کریں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک:  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

یٹو کریم: چرنوں کی بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ معدے میں وہ بہت خراش پیدا کرتے ہوں۔ ڈاکٹر ہیوگس مد ٹیکچر یا  $1 \times$  مفید بتلاتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے

کہ یہ دوائی کبھی فیل (نا کام) نہیں ہوتی۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سانی کیوٹا : جب کرموں کی وجہ سے تشنچ ہوں تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

اگنیشیا : نرم مزاج و ذکی الحس بچوں کے لیے یہ دوائی مزدوں تر ہوتی ہے۔

مقصد میں سخت خارش ہونے کی وجہ سے تکلیف بہت ہو، کالنج نکلتی ہو، چڑچڑاہٹ اور پست ہمتی ہو۔

خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

انڈی گو : یہ دوائی بھی چرنوں کے لیے بہت اعلیٰ ہے، جبکہ مریض بچہ مغموم ہو

اور مقام ناف میں سخت درد ہوتا ہو۔ نیز کرموں کے باعث تشنچ ہوتے ہوں

خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب : جب دیگر مناسب دوائی دینے سے کرم رفع ہو چکے ہوں تو

آئندہ کے لیے کلکیریا کی چند خوراکیں دے چھوڑنی چاہئیں تاکہ پھر کرم پیدا نہ ہوں۔ جن بچوں

کے مزاج میں کرموں کیلئے موروٹی رغبت ہوتی ہے۔ ان کے لیے یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۲x دن میں دو مرتبہ

کو پریم آکسی ڈیٹم نائیگرم : ڈاکٹر زونجی صاحب اپنے ساٹھ سالہ تجربہ کے

بعد یہ فرماتے ہیں کہ یہ دوائی ہر قسم کے کرموں کو دفع کرتی ہے۔ چرنوں بلکہ کدو دانہ کو بھی

وہ اس دوائی کو ۱x میں دیا کرتے تھے اور یہ دوائی اورکس و امیکا باری باری سے چار یا

پانچ مرتبہ دیتے تھے اور یہ علاج چار ہفتوں تک جاری رکھتے تھے پس اس علاج سے

کدو دانہ بھی دفع ہو جاتا تھا۔ بدول کسی قسم کی مریض کو تکلیف ہونے کے۔

خوراک : ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فانی ریکس ماس - کدو دانہ کو دفع کرنے کی یہ خاص دوائی ہے اور اس کو حسب

ذیل طریقہ پر استعمال کرنا چاہیے۔ اول مریض بارہ گھنٹہ تک فاقہ کرے اور بعد ازاں

دوائی کے ساٹھ قطرے ایک ادس پانی میں ڈال کر پی جائے اور اس کے دو گھنٹہ بعد مریض

ایک ادس کیٹر ایل پی لے۔ کدو دانہ دفع ہو جائے گا اور پاخانہ میں اس کو بغور دیکھے



کہ آیا کدو دانہ کا سرخارنج ہو گیا ہے یا کہ نہیں۔ اگر خارنج نہ ہوا ہو تو بہتر ہے کہ فانی لکس  
ماس ۵ مدرٹنکچر کے پانچ قطرے ہر آٹھ گھنٹہ کے وقفہ پر مریض دو یا تین ماہ تک  
لگاتا رہا استعمال کرتا رہے۔ ۱۷

پمپ کن کے بیج (کالشی پھل کے بیج) کدو دانہ کو دفع کرنے کے لیے  
یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ ایک یا ڈیڑھ چھٹانک بیج لے کر ابلتے ہوئے پانی میں ڈال  
کو صاف کر لیں اور اوپر کا پھلکا اتار کر بیج کا اندر کا گودا نکال کر اس میں دودھ یا  
بالائی بلا کر رگوں میں اور بوقت صبح منہ نہار مریض کو کھلا دیں اور اس کے دو گھنٹہ کے  
بعد کیسٹر آئیل پلا دیں۔

ارٹیکا یورنزا: جبکہ چرنوں کے باعث مقعد میں سخت خارش ہوتی ہو۔ اور  
خصوصاً بوقت شب۔

خوراک: ۱ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد  
ایٹم کروڈم: یہ دوائی انٹریوں کو درست کرتی ہے۔ بدیں وجہ کرم نشو  
ونما نہیں پاسکتے۔

خوراک: ۳ x دن میں دو یا تین مرتبہ۔  
سلفر: جب کرم رفع ہو جائیں تو طبیعت کو بحال کرنے کے لیے اس  
دوائی کی چند خوراکیں مریض کو دینی چاہئیں۔  
خوداک: ۳ x دن میں دو مرتبہ۔

نوٹ: کلکیریا کاب کے دینے سے بھی یہی مطلب حل ہو جاتا ہے۔

### ضروری ہدایات

مریض کو مقعد کے اندر روزانہ سرسول کاتیل لگانا چاہیے۔ اس سے خارش بھی  
کم ہو جاتی ہے اور کرموں کے انڈے بھی نشوونما نہیں پاسکتے۔ مٹھائی، چینی و کھانڈ  
وغیرہ اور نیز مکھن وغیرہ سے پرہیز لازم ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ استعمال کرنا

۱۷ کمالا (KAMALA) کدو دانوں کی بہترین دوا ہے۔ خوراک نصف ڈرام سے دو  
ڈرام تک مدرٹنکچر۔

چاہیے۔ نیز خراب پانی اور خراب میوہ جات و خراب گوشت اودان دھوئی سبزی  
ترکاری کھانے سے پرہیز لازم ہے۔

## انٹری میں بل پڑ جانا

(ILLEUS INTUSSUSCEPTION)

اس مرض میں انٹری کا بالائی حصہ اُس کے زیریں حصہ کے اندر چلا جاتا ہے اور اُس  
میں بل پڑ جاتا ہے۔ شکم میں نہایت سخت درد ہوتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے اور مقام  
ماؤف پر ایک اُبھار سا پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض سخت نڈھال ہوتا ہے۔ قیئیں آتی ہیں۔  
اور بلا فرقے میں پاخانہ خارج ہونے لگتا ہے اور پاخانے کا براستہ منہ خارج ہونا ہی  
اس مرض کی تشخیصی علامت ہے۔ مریض کو قبض بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ انٹریوں  
میں سوزش یا زخم یا سرطانِ امعا کی وجہ سے بھی انٹریوں کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور  
اس مرض کے پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔

### علاج

بیلادونا۔ پیم۔ اوپیم۔ نکس دامیکا۔ کالوسنتھ اور تھوجا وغیرہ ادویات اس مرض  
میں کام آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

اس مرض میں جلاب ہرگز نہ دینا چاہیے۔ گرم پانی سے حقنہ (نیما) کرنا مفید  
ہوتا ہے لیکن جب مرض ترقی یافتہ ہو جائے اور درد اور دفع نہایت سخت ہوں، تو  
عملِ جراحی کی ہوشیار اور تجربہ کار ڈاکٹر سے کرائیں۔

## درم صفاق پیٹ کی ابدار چھلی کی سوزش

(PERITONITIS)

اس مرض میں پیٹ کی آب دار چھلی ریه چھلی دیوارِ شکم کی اندرونی سطح پر ہوتی ہے  
اور تمام اعضاءِ شکم کو ملفوف کرتی ہے، میں درم ہو جاتا ہے۔ کبھی ساری چھلی  
(صفاق) مبتلائے مرض ہو جاتی ہے اور کبھی کوئی خاص حصہ ہی پہلے درد کسی خاص

حقد شکم میں شروع ہوتا ہے اور پھر تمام پیٹ میں ہونے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ کپڑے کا چھبانا بھی درد کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ذرا سی حرکت کرنے یا چھونے سے درد زیادہ ہونے لگتا ہے۔ بخار ہوتا ہے اور پیٹ تن جاتا ہے اور مریض اپنی ٹانگوں کو شکم کی جانب سکیڑتے رکھتا ہے۔ جی تلاتا ہے اور ابکائیاں آتی ہیں۔ قبض ہوتی ہے۔ ہچکچائیاں آنے لگتی ہیں۔ نبض نہایت باریک اور تیز چلتی ہے۔ نقابست بہت ہوتی ہے اور سرد پسینے (تولی) بکثرت آتے ہیں اور بالآخر مریض سخت نقابست کے عالم میں انتقال کر جاتا ہے۔

**اسباب مرض :** پیٹ پر ضرب آنا اور اس میں زخم آجانا۔ معدے یا آنت کا نکل جانا۔ جگر کے پھوڑے کا پھٹنا۔ سردی لگنا۔ بعض امراض مثلاً پمقرہ چھچک، وجع المفاصل و تقرس۔ مزمن مرض گودہ وغیرہ میں یہ مرض ہو جایا کرتا ہے زچسگی میں بھی اکثر یہ مرض ہو جاتا ہے۔ نیز رحم اور خصیتہ الرحم کے امراض بھی بعض اوقات اس مرض کے پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں۔

## علاج

**ایکونائٹ :** جب سردی لگنے کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوا ہو تو علامات یہ ہیں۔ بخار کا یکایک تیز ہو جانا اور صفاق میں شدید درد ہونا۔ بے چینی اور تشویش کا ہونا۔ خوراک : ۱x یا ۲x ہر نیدہ منٹ کے بعد۔

**فیرم فاس :** بھی مفید دعائی ثابت ہوتی ہے۔ جب کہ مرض بوجہ سردی لگنے کے پیدا ہوا۔ لیکن بے چینی و تشویش جو کہ ایکونائٹ کا خاصہ ہیں موجود نہ ہوں۔ خوراک : ۳x ہر نیدہ منٹ کے بعد۔

**برائی اونیاء :** جب پیٹ میں چھین کی دھڑکی ہوتی ہوں اور ہلنے چلنے اور دہن سے درد بہت بڑھ جاتا ہو۔ شکم پھولا ہوا گرم اور ذکی الحس ہو۔ قبض ہو اور ہاں کی زیادتی ہو لیکن اگر سہل آتے ہوں تو برائی اونیاء غرض نہیں ہوتی۔

**خوداک :** ۳x ہر نیدہ میں منٹ کے بعد۔  
**بیلادونا :** شکم مانتھ و صول کے پھولا ہوا ہو۔ چھوٹا بالکل برداشت نہ ہو سکتا

ہو۔ یہاں تک کہ مریض کپڑے کا چھونا بھی گوارا نہ کر سکتا ہو۔ جسم سخت گرم ہو اور خاص کر شکم تو مارے حرارت کے جلتا ہو۔ دماغ زیر اثر ہو اور ہڈیاں ہو۔ روشنی، اوجھا ہونا اور خفیف حرکت بھی ناقابل برداشت ہوں۔ بے چینی بہت ہو اور مریض کمر میں بدلتا لیکن چین نہ آتا ہو۔ آبکائیاں لگاتار آتی ہوں اور قہقہے آتی ہوں۔  
 خوراک: ۱x یا ۲x ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

مرکیورس: جب درم میں رطوبت بھرنی شروع ہو گئی ہو۔ شکم تنا ہوا ہو اور پسینے آتے ہوں، بیلا ڈونا کے بعد یہ دوائی فائدہ کرتی ہے۔ رات کو مرض کا زور ہو۔ گھنٹہ پانی کی طلب ہو۔ شکم میں گرڈ گڑا ہٹ ہوتی ہو اور اسہال آتے ہوں بخار میں سردی لگنا۔ پسینہ کا بار بار آنا۔ مگر اس سے بخار یا دیگر کسی علامت میں افادہ نہ ہونا بلکہ الٹا تکلیف کا بڑھ جانا۔ یہ مرکیورس کی خاص علامت ہے۔

خوراک: ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 رشاکس: بخار تیز۔ زبان خشک، زبان کا سرخ، تیز جلد، جسم خشک اور نقات بہت ہو۔ یہ اس کی علامات ہیں یہ دوائی مرض کے ابتداء میں کام نہیں آتی بلکہ برائی دنیا کے بعد کام آتی ہے۔ جب کہ قبض کے بعد اسہال آنے شروع ہوئے ہوں۔ جب مریض میں تب محرقہ کی سی علامات پیدا ہو گئی ہوں۔ تو یہ دوائی مفید تر ہوتی ہے۔  
 خوراک: ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

ٹیری بن تھینا: جب گردے بھی ساتھ ہی مبتلائے مرض ہو جائیں اور مقام گردہ میں شدید درویں ہوں۔ پیشاب تھوڑا اور خون آمیز آتا ہو یا پیشاب بالکل ہی رک گیا ہو۔ شکم سخت تنا ہوا ہو۔ کمزوری اور نقاہت بہت ہو تو یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک: ۲x یا ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ لاکس، ایپس، کالوسنتھ، آرسینک، آیوڈائیڈ اور آرسینک اٹیم بھی کام آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

مریض کو چپ چاپ بستر پر بڑے آرام سے لٹائے رکھیں اور اگر مریض برداشت

کر سکتا ہو تو مقام درد پر سینک دیں یا جوشاندہ پوست کی ٹکڑیاں گرم گرم گوم پلٹس باندھیں یا پیٹ کے اوپر بیلا ڈونا - گلیسرین لگا کر اوپر سے گرم فلائین سے ڈھانپ دیں - بعض اوقات سینک کرنے کی بجائے پیٹ پر برف رکھنا مفید ہے اس سے قلیوں کا آنا رک جاتا ہے -

غذا : مریض کو دودھ میں سوڈا یا لائٹ وائٹ ملا کر آش جو، شوربا، پنکھنی، ساگودانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں دیتے رہیں اور پیاس کی شدت میں برف کے ٹکڑے چوسنے کے لیے دیں -

## شقاق المتعد، متعدد کا پھٹنا

(FISSURE OF THE RECTUM OR ANUS)

اس مرض میں متعدد کے کنارے پر ایک لمبا شکاف یعنی زخم ہو جاتا ہے اور اس میں سخت درد اور جلن ہوتی ہے - خصوصاً رفع حاجت کے وقت یہ مرض بائیر کے ہمراہ ہو جاتا ہے اور مستحبات بہ نسبت مردوں کے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتی ہیں -

### علاج

نائیٹرک ایسڈ ۶x - گویفائٹس ۶x - ایسی کیولس ۳x - ریٹنہیا ۳x - اوجیات اس مرض میں کام آتی ہیں -

### علاج خارجی

مرہم کلینڈولا یا مرہم ہماہلس یا مرہم ایسی کیولس شکاف کے اوپر لگائیں، گرم پانی کا انیما بھی لگایا جائے تاکہ انٹریڈیوں کا فعل درست ہو جائے -

## متعد کی خارش

(PRURITIS ANI ITCHING OF THE ANUS)

اس مرض میں مقام متعدد میں پہلے میٹھی میٹھی خارش ہوتی ہے، لیکن بعد میں نہایت شدید اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے - رات کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے - اور

خصوصاً جب کہ مریض بستر میں گوم ہوتا ہے۔ مارے خارش کے نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات متعد چل جاتی ہے۔ یا پھٹ کر اس میں زخم ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض: چرنے یا سوتی کپڑے، بواسیر، ناسور، متعد، شقاق، متعد کا بچ کا نکلنا یعنی خروج متعد، متے اگنیز یا راجن دار پھنسیاں، سیلان اندام نہانی۔ بد معنی۔ انیون کھانے کی عادت، پاخانہ کا متعد میں رکا رہنا۔ یہ سب اس کے اسباب ہیں۔ اکثر امراض جگر یا امراض انضمام کے ساتھ خارش متعد بھی ایک علامت ہوا کرتی ہے۔ ایام حمل میں بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

### علاج

سلفرائیڈ نائٹرک، لائیو پوڈیم، اینٹیم کرودیم، اگنیشیا، الیوٹینا۔ آر سینکیم اور نیٹرم میوہ ادویات اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔ جب چرنوں کی وجہ سے خارش ہوتی ہو تو ساٹنا x ۳ دن میں چار مرتبہ دیں۔

### خارجی علاج

مرہم ہما میلس۔ مرہم کیلنڈولا۔ مرہم ایسی کیولس یا مرہم مولین آئل جاسے ماؤف پوٹیں، نیز کار بالک ایسڈ کے پانچ قطرے ایک اونس پانی میں ملا کر ماؤف مقام پر لگائیں اس سے عموماً بہت جلدی آرام ہو جاتا ہے۔ قبض ہو تو انیما کریں۔

### خروج المتعد کا بچ نکلنا۔ ڈھونڈری نکلنا

(PROLAPSUS ANI-FALLING OF THE BOWEL)

یہ مرض بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اور گاہے نوجوان اور بوڑھے بھی اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پہلے تو رفع حاجت کے وقت ہی کا بچ نکلتی ہے لیکن آہستہ آہستہ عضلہ متعد اتنا ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ کھانے یا زور سے ہنسنے سے بھی کا بچ نکل آتی ہے اور بعض اوقات اس پر زخم ہو جاتے ہیں اور رفع حاجت کے وقت سخت درد ہوتا ہے اسباب مرض: دائمی قبض، پرانے اسہال، پھیش، بار بار مسہل لینا۔ کرم اعداد۔ سنگ مثانہ اور عضلہ متعد کا کمزور ہونا کمزوری عامہ۔

## علاج

**انگیشیا:** یہ دوائی اس مرض میں اکثر اکیس ثابت ہوتی ہے اور خاص کر چھوٹے بچوں کیسے اس کی علامات یہ ہیں، پاخانہ جانے کی بار بار حاجت لیکن بے سود۔ کونٹھا۔ پاخانہ بمشکل خارج ہوتا۔ غارش اور ہر حاجت کے ساتھ کانچ نکلتا۔

**خوراک:** ۳ دن میں تین مرتبہ، دو یا تین یوم دیں، بعدہ ایک خوراک صبح اور ایک شام کو۔

**فیرم فاس:** جب ضعف اور بد ہضمی کی وجہ سے کانچ نکلتی ہو تو یہ دوائی سود مند ہوتی ہے۔

**خوراک:** ۳ یا ۶ دن میں تین مرتبہ۔

**نکس و امیکا:** قبض ہو اور رفع حاجت کے وقت کونٹھا پڑتا ہو اور کانچ نکل آتی ہو۔

**خوراک:** ۳ دن میں تین مرتبہ۔

**مرکیورس:** کانچ نکلتی ہو اور غارش ہوتی ہو اور زرد آنوں خارج ہوتی ہو۔ بہا ہوں۔ شکم سخت اور پھولا ہوا ہو۔

**خوراک:** ۳ دن میں تین مرتبہ۔

**پوڈوفاتیلیم:** ہر حاجت کے ساتھ کانچ نکل آتی ہو۔ دست آتے ہوں۔ کونٹھا پڑتا ہو اور دست بدبودار ہوں، پھینکنے سے کانچ نکل آتی ہو۔ دانت نکلنے کی آکساہٹ ہو۔

**خوراک:** ۶ دن میں تین مرتبہ۔

**میورسٹک ایسڈ:** پیشاب کتے وقت بھی کانچ نکل آتی ہو۔

**خوراک:** ۶ ہر چار گھنٹے کے بعد۔

دیگر ادویات لائیکو پوڈیم۔ سلفر۔ گسوجیا۔ کلیریا کارب۔ ایوز۔ سی پیا۔ آرسینک۔ انڈی گو۔ ایسی کولس اور برائی ادویات بھی کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

دوباتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اول کانچ کا اندر داخل ہونا اور دوسرا

اصل سبب کو دور کرنا۔ کانچ کو بڑی احتیاط سے انگلی سے اُوپر کر دینا چاہیے۔ مریض بچے کو بہت دیر تک کونٹھنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے آب دست کرنا اور نہانا طاق بخشتا ہے۔

**غذا:** سادہ اور مقوی دینی چاہیے۔

## ناسور مقعد

(FISTULA IN ANUS)

اس ناسور کا ایک منہ تو معائزیرین میں ہوتا ہے اور دوسرا منہ مقعد کی بیرونی سطح پر کھلتا ہے۔ پہلے مقعد کے اندر پھوڑا ہوتا ہے اور پھر وہ پھیلتا ہوا بیرونی سطح مقعد پر آجاتا ہے۔ یہ مرض اکثر رتلی مریضوں میں پایا جاتا ہے۔

**علامات مرض:** شروع میں مقعد کے پاس ایک سخت ابھار سا ماند جھوٹی گولی کے محسوس ہوتا ہے جو کہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور سخت درد کرتا ہے۔ مقام مقعد متورم اور سرخ ہو جاتا ہے، بعد اُس میں جلدی ہی مادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مریض رنج حاجت کے وقت درد کی شکایت کرتا ہے اور بعض اوقات پاخانہ کے ہمراہ خون کی لُس بھی آجاتی ہے۔ پھوڑے کے پھٹ جانے سے مریض کو بڑا آرام محسوس ہوتا ہے۔ سخت بدبودار مواد خارج ہوتا ہے اور درم کم ہو جاتا ہے لیکن مقعد کے نزدیک ایک جھوٹا سا سوراخ رہ جاتا ہے۔ جس سے گلہے گاھے پتلا مادہ خارج ہوتا رہتا ہے اور اُس مقام کو دبانے سے سخت جگہ محسوس ہوتی ہے۔ اسی کو ناسور مقعد کہتے ہیں۔ ناسور کا بیرونی منہ اکثر آٹا باریک ہوتا ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتا اور بعض اوقات وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔

## علاج

سلیشیا ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد اندر دیتے جائیں اور کیلنڈر دلاوشن (ایک ڈرام کیلنڈر دلا۔ مدد نکھر اور دواؤں آب مقطر کے ساتھ صاف کرتے رہیں اور علاج کچھ عرصہ جاری رکھیں۔

رتلی مریضوں کو چوتھے یا ہر ساتویں دن بیسی لائیم ۳۰ کی بھی ایک خوراک دیتے



رہنا چاہیے۔ نیز کلکیر یا فاس  $۳ \times$  چار گرین ہر آٹھ گھنٹہ کے وقفہ پر نیز کلکیر یا فلوریڈا اور  
کاسیکم  $۶ \times$  لائیکو پوڈیم، نکس و امیکا اور سلفر بھی کام آتی ہیں۔  
**ضروری ہدایت:** جانے ماؤٹ پر گرم گرم ٹکڑ کرکنی چاہیے۔

## بواسیر

(PILES HAMORRHOIDS)

اس مرض میں مقعد کے اندر اور اعمار زیریں کے منہ پر تھیلی کی شکل کے مسے پیدا  
ہو جاتے ہیں۔ اس میں خون جمع رہتا ہے، جس کی وجہ سے تکلیف و درد اور بعض  
اوقات سوزش اور خارش بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ خون بھی خارج ہوتا ہے۔ مٹر کے  
دانے سے لے کر اخروٹ کے برابر مسے ہوا کرتے ہیں۔

**اقسام مرض:** اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اندرونی یا خونریز بواسیر۔ دوسری  
بیرونی یا باری بواسیر، اندرونی متوں سے خون آتا ہے اور بیرونی بواسیر میں خون نہیں آتا  
مگر درد بہت ہوتا ہے۔

**علامات مرض:** خارش، جلن، بوجھ اور درد کی شکایت، مارے ڈر کے  
مریض رفع حاجت کے لیے نہیں جاتا۔ کیونکہ اس کو سخت درد ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا  
ہے کہ مریض کو قبض ہو جاتی ہے اور مرض زیادہ ترقی کر جاتا ہے۔ خون کبھی تو پاخانہ کے  
ساتھ ملا ہوا خارج ہوتا ہے اور کبھی پاخانہ کے بعد قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے۔ اور کبھی اتنا  
خارج ہوتا ہے کہ مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اندرونی مسے مقعد سے باہر نکل کر کبھی کبھی  
اس قدر متعده ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ مقعد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے اور بڑی سخت تکلیف  
کا موجب ہوتے ہیں، اگر مرض کو جلدی آرام نہ آئے تو بوجہ اخراج خون مریض کا رنگ  
ندد پڑ جاتا ہے اور وہ بہت لاغر اور کمزور ہو جاتا ہے۔

**اسباب مرض:** عیاشانہ زندگی بسر کرنا، کھانا، پینا، اچھا لیکن دندش نہ  
کرنا اور بیٹھا رہنا، کثرت میخواری اور نیز مصالحہ دار چیزیں کھانا۔ عارضی قبض کا ہونا، جگر  
کے فعل کا سست ہونا۔ زیادہ کس کر بیٹی باندھنا۔ گیلی جگہ پر بیٹھنا، بار بار تیز جلاب  
لینا چرنے یا سوتی کپڑے مستورات میں آیام عمل میں رفع حاجت کے وقت یا پیشاب کرتے

وقت بہت زود لگانا۔ کبھی یہ مرض موروٹی بھی ہوتا ہے۔

### علاج

**نکس و امیکا:** بادی بواسیر جبکہ خون نہ آتا ہو، کے لیے نکس و امیکا اور سلفر ہر دو بڑی مفید ادویات ہیں جو مریض زیادہ تر گھر کے اندر ہی بیٹھتے رہتے ہوں اور سوزش نہ کھاتے ہوں یا جو زیادہ تر عیش و عشرت میں اپنا وقت گزارتے ہوں اور قبض کا شکار رہتے ہوں۔ یعنی پاخانہ کی حاجت تو ان کو لگاتار نہ رہتی ہو۔ لیکن پاخانہ پورے طور پر خارج نہ ہوتا ہو یا شراب و کباب کے زیادہ عادی ہوں تو ایسے اشخاص کی بواسیر میں یہ دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔ مقعد میں جلن، ڈنگ مارنے کا سادہ اور سکرٹاؤ کا احساس رہتا ہو اور کمر بھی دکھتی ہو مستی اس قدر خارش کرتے ہوں کہ رات کو بیض نہ سو سکتا ہو اور ٹھنڈے پانی کے لگانے سے کسی قدر آرام معلوم ہوتا ہو، ان کے لیے یہ دوائی مفید پڑتی ہے، خونی بواسیر میں یہ دوائی اس وقت کام دیتی ہے۔ جبکہ پاخانہ کی حاجت لگاتار ہو اور بار بار رنج حاجت کرنے پر بھی پاخانہ کھل نہ آتا ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کچھ نہ کچھ باقی رہ گیا ہے۔

**خوراک:** ۳ x دن میں تین یا چار مرتبہ

**سلفر:** بواسیر کی ہر ایک قسم کے لیے یہ دوائی مجرب خیال کی جاتی ہے خصوصاً حرمین حالت کے لیے خونی بواسیر میں جبکہ خون کا آنا رک گیا ہو اور متے بہت بھر گئے ہوں اور درد کرتے ہوں یا خون کے رک جلنے کے باعث سر بوجھل اور جگر میں بے چینی سی محسوس ہوتی ہو اور ساتھ ہی قبض بھی ہو اور مقعد میں خارش ہوتی ہو تو ایسے حالات میں یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

**خوراک:** ۳ x دن میں تین یا چار مرتبہ۔

**نوٹ:** بہت سے ڈاکٹروں کا یہ تجربہ ہے کہ اگر سلفر ۳ x کی ایک خوراک صبح علی الصبح اور نکس و امیکا کی ایک خوراک شام کو سونے سے چند گھنٹے پہلے دی جائیں اور اس طرح سے کچھ عرصہ کے لیے دوائی جاری رکھی جائے تو یہ ایک شافی طریقہ ہوا کرتا ہے۔

**ہل میلز:** خونی بواسیر کی یہ ایک دوائی ہے جبکہ قبض کی شکایت مجدد نہ ہو۔

**خوراک:** ۵ یا ۱ x کے پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ایسی کیولس : خون یا تو بالکل ہی خارج نہ ہوتا ہو۔ یا اگر ہوتا بھی ہو تو تھوڑا لیکن مقدار مبرز میں سخت درد ہوتا ہو۔ کمزوری ہو۔ قبض کی سخت شکایت ہو اور چلنے سے سخت تکلیف ہو اور کانچ نکلتی ہو اس کی خاص علامت یہ ہے کہ مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کی مقعد میں چھوٹی چھوٹی پھڑپھڑیاں بھری پڑی ہیں۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم : جلن از حد ایسا معلوم ہو۔ گویا گرم گرم سوئیاں مقعد کے اندر چھوٹی جا رہی ہیں۔ کمزوری ناقابل برداشت ہو۔ کمزوری از حد زیادہ ہو۔ ماؤف مقام پر سینک کرنے سے آرام اور تسکین ہو۔

خوراک : ۳ یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کالین سونیا : ڈاکٹر برڈ صاحب فرماتے ہیں کہ سخت قسم کی بواسیر میں جبکہ خون لگاتار آتا رہتا ہو۔ کالین سونیا سے بڑھ کر اور کوئی دوائی نہیں ہے وہ اس کو دیکھنے میں برتنے کی سفارش کرتے ہیں۔ مستورات کی بواسیر میں یہ دوائی خاص اثر رکھتی ہے خاص کر حاملہ مستورات کی بواسیر میں جبکہ خارش ایک خاص علامت ہو۔ کالین سونیا کی یہ بھی ایک خاص علامت ہے کہ قبض اور مقعد میں ایسا احساس ہو۔ گویا چھوٹی چھوٹی پھڑپھڑیاں بھری پڑی ہیں۔ جب بواسیر کا خون رک کر دل میں درد ہونا شروع ہو گیا ہو تو کالین سونیا ایک بڑی اعلیٰ معانی ثابت ہوتی ہے۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ کے پانچ قطرے ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ایلووز : بواسیر کی یہ بھی ایک خاص دوائی ہے جو اس وقت منظر ہوتی ہے جبکہ انگوڑوں کے گچھے کی مانند تھے ٹکے ہوئے ہوں اور ان سے خون بمقدار کثیر اور بار بار نکلتا ہو اور ٹھنڈے پانی سے آرام معلوم ہوتا ہو۔ مقعد میں بہت جلن ہوتی ہو۔ اسہال کی طرف طبیعت کا میلان ہو اور عضلات مبرز پراثر ہو۔ کالین سونیا میں طبیعت کا میلان قبض کی طرف ہوتا ہے اسیلوز میں دستوں کی طرف۔

خوراک : ۵ یا ۱۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مندرجہ بالا ادویات اس مرض میں عام اور مشہور ہیں، ان کے علاوہ مندرجہ ذیل ادویات بھی گاہے گاہے کام آتی ہیں۔ جب کہ ان کی علامات سمجھ دھول۔ پٹلا۔ انیشیا

رہے ٹنیا، کیپ سی کم۔ میور آئٹک ایڈ، گریفائٹس، لائیکو پوڈیم۔ سی پیا۔ ورمیکم۔  
سلیفورک ایڈ، پیڑد سے لی نم وغیرہ لے

## خارجی استعمال

ہما میلس: مدرٹنکچر کے تین قطرے تین چھٹانک پانی میں ڈال کر لوشن تیار کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ صبح اور شام مستوں کو دھویا جاتا ہے اور نیز رات کے وقت کپڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا اس لوشن میں بھگو کر مستوں کے اوپر رکھا جاتا ہے یا تھوڑا سا مقعد کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اگر مستوں میں جلن و خارش ہوتی ہو تو مولین آئیل کی مرہم لگائی جاتی ہے۔ (مولین آئیل ایک ڈرام۔ ویلیں ایک اونس)

## ضروری ہدایات

مریض کو کافی۔ مریح۔ گرم مصالحہ۔ منشیات۔ مصالحہ دار اور ثقیل اغذیہ اور نیز شراب وغیرہ سے پرہیز لازم ہے، زیادہ گوشت خوری بھی منع ہے۔ سبزیاں اور پکے ہوئے پھل، نرم اور زود ہضم غذا کھانی چاہیے۔ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت پانی کا گلاس پی لینا چاہیے۔ سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں سرد، گیل یا سرد جگہ پر متواتر بیٹھنا، یاروئی یا پروں کی گدی کو گرمی وغیرہ پر رکھ کر لگاتار بیٹھنا مفید ہے۔ جب بواسیری مستوں میں سخت درد ہوتا ہو۔ تو جو شانہ پوست کی ٹکور کرنا یا مقعد پر پٹیس باندھنا مفید ہوتا ہے۔ جب مستے باہر نکلے ہوئے ہوں، تو ان پر ہالٹس یا ایسی کیولس کی مرہم لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

## فتق۔ ہرنیا۔ آنت اترنا

(HERNIA RUPTURE)

اس مرض میں آنت کا کوئی حصہ اپنی اصل جگہ سے ہٹ کر کسی قدرتی یا اتفاقی

لے قلی فولیم۔ بلاد و سرخ چکدار خون آنے میں مفید ہے۔

سوراخ کے راستہ باہر کو ابھرتا ہے اور وہاں سوج ہو جاتی ہے۔

## اقسام مرض

ہرنیا کی موٹی موٹی قسمیں یہ ہیں ۱۔

۱۔ امبلی کل ہرنیا : ناف کے مقام پر ایک چھوٹا سا آبجھار پیدا ہو جاتا ہے اور یہ عموماً شیرخوار بچوں میں ہوتا ہے۔

۲۔ ایٹنگو اینیل ہرنیا : اس میں انتردی جنگاسہ والی ناف کے راستہ اتر کر فوطوں میں آ جاتی ہے۔ یہ مرض مردوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔  
۳۔ فیمرل ہرنیا : اس میں انتردی کنج ران کے راستہ نیچے اتر آتی ہے۔ یہ مرض عموماً عورتوں میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔

۴۔ ری ڈیوس ایبل ہرنیا : یعنی وہ دبے والا فتق جو دبائے سے اپنی اصلی جگہ پر واپس جاسکے۔

۵۔ ارری ڈیوس ایبل ہرنیا : یعنی نہ دبے والا فتق جو دبائے سے اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ جاسکے۔

۶۔ سٹرنیگو لیٹیڈ ہرنیا : یعنی پھنسا ہوا فتق۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے پیٹ میں نفخ اور قولنج سادہ ہوتا ہے۔ قیئیں آتی ہیں، پاخانہ جانے کی حاجت بار بار ہوتی ہے مگر کچھ خارج نہیں ہوتا اور قیئوں کے راستہ براز خارج ہونے لگتا ہے۔

مریض کو پیاس بہت لگا کرتی ہے اور اس کی زبان خشک اور بھونسل ہوتی ہے اور نبض باریک اور تیز چلتی ہے۔

اسباب مرض : شکم کی دیواروں کا بہ سبب کسی مرض، چوٹ یا پیدائشی کمزور ہونا۔ زیادہ زور کا کام کرنا مثلاً زیادہ بوجھ اٹھانا۔ اجابت کے وقت بہت زور لگانا یا پیشاب کرتے وقت بہت کونٹھا۔ نیز سنگِ مثانہ، مرض استسقا اور عمل وغیرہ۔

## علاج

آنت کو اپنی اصلی جگہ پر لانے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں لگانی چاہیے۔ مریض کو

اس طرح سے ٹائیں کہ اس کے کوٹھے اوپنچے رہیں اور آہستہ آہستہ آنت کو اصلی جگہ پر واپس کریں۔ شیر گرم پانی کی پچکاری رانیما، حقنہ کھڑنا بھی بہت حالتوں میں مفید ثابت ہوتا ہے اگر اس سے بھی آرام نہ ہوتا ایک تختہ پر مریض کو اس طرح ٹا دیں کہ اس کی ٹانگیں اور کوٹھے اس کے سر کی نسبت بہت اوپنچے ہوں اور اس حالت میں ایک آدمی مریض کو پکڑے رکھے اور دوسرا آدمی ابھار کو بہت آہستہ آہستہ دبائے۔ آنت اپنی اصلی جگہ پر واپس چلی جائے گی اور گڑگڑ کی آواز پیدا ہوگی۔ جب آنت اپنی اصلی جگہ پر آجائے تو اُس پر پیٹی (رٹس) باندھ دینی چاہیے۔ تاکہ پھر آنت گرنے نہ پائے۔

نوٹ: مختلف قسم کی بنی ہوئی پیٹیاں مختلف قسم کے فتق کے لیے انگریزی دوا فروشوں کے ہاں لی سکتی ہیں۔

اگر مذکورہ بالا تدابیر ناکام ثابت ہوں تو پھر ہوشیار سرجن کی مدد لیں۔

نکس و امیکا ۱x اور ایکونائٹ ۱x باری باری سے ہر پندرہ یا بیس منٹ کے وقفہ پر دینے سے درد وغیرہ کا بہت آرام ہوتا ہے۔  
رکٹی پتوں کو کلکیر یا کارب ۶x یا سلیشیا ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد دیتے رہنا مفید ثابت ہوتا ہے۔ انگوئیل ہرجیا میں ایسی کیولس ۱x ہر چار گھنٹہ کے بعد دینے سے درد کا افاقہ ہوتا ہے۔

نوٹ: پیٹی لگانے سے شروع شروع میں تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ مگر دو چار روز میں یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ سارا دن پیٹی لگائے رکھنا چاہیے مگر رات کو سوتے وقت پیٹی کو اتار دینا چاہیے اور صبح کو چار پائی سے اٹھنے سے بیشتر ہی یعنی لیٹے ہوئے پیٹی لگائی چاہیے۔

## باب پانزدہم

# امراض جگر و حوال

## (رتلی)

☆☆☆

### جگر کا بڑھ جانا۔ جگر میں خون جمع ہونا۔ ورم جگر

HEPATITIS CONGESTION OF THE LIVER

SIMPLE ENLARGEMENT OF THE LIVER

علامات مرض: دائیں جانب پسلیوں کے نیچے گرانی محسوس ہوتی ہے خاص کر کھڑا ہونے کے وقت اور ماؤٹ مقام کو دبانے سے تھوڑا درد ہوتا ہے۔ مریض کا چہرہ زرد اور پھیکا پڑ جاتا ہے۔ زبان پر میل جم جاتی ہے۔ قبض ہوتی ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات جی متلاتا ہے۔ قیئیں آتی ہیں، سر درد اور کاہلی اور بیست ہمتی ہوتی ہے۔ نبض عموماً سست اور بے قاعدہ چلتی ہے۔

اسباب مرض: یکایک سردی لگ جانا۔ تیز مصالحہ دار غذا کھانا، بہت زیادہ کھانا، زیادہ گوشت کھانا، کثرت سے خواری غم اور غصہ۔ سورج کی گرمی میں سخت جسمانی محنت کرنا۔ آرام کی اور عیاشانہ زندگی بسر کرنا اور ورزش نہ کرنا۔ طیریا کا زہر جگر پر چوٹ لگنا۔ صفراوی پتھری اور مستورات میں فتور حسیض۔

### علاج

اس مرض کا علاج اور یرقان کا علاج اکٹھا درج کیا جاتا ہے۔ علاج درج کرنے سے پہلے یرقان کا مختصر بیان مندرجہ ذیل ہے۔

# یرقان

## JAUNDICE-ICTERUS

یرقان بذاتِ خود مرض نہیں۔ بلکہ بعض امراضِ جگر یا بعض دیگر امراض کی ایک علامت ہے۔

**علاماتِ مرض :** سب سے پہلے آنکھوں کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے۔ اس کے بعد ناخن اور پھر چہرہ اور گردن اور آخر میں سارے دھڑ۔ ٹانگوں اور بازوؤں کی رنگت بھی زردی مائل یا زرد ہو جاتی ہے۔ پیشاب کا رنگ بھی زرد یا گہرا براؤن ہو جاتا ہے اور کپڑے پر داغ دیتا ہے۔ پاخانہ سفید یا خاکستری رنگ کا آتا ہے۔ قبض سستی و کاہلی، تشویش۔ دردِ معدہ۔ تلخ ذائقہ اور عموماً بخار کم و بیش ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاص کر بچوں کو نا اہضم شدہ غذا کے پاخانے آتے ہیں۔ پست مہمتی اور نقاہت موجود ہوتی ہیں اور نبض کی رفتار سست ہوتی ہے۔ آنکھوں اور پیشاب کی رنگت کا زرد ہونا ہی اس امر کی کافی دلیل ہے کہ مریض یرقان کے مرض میں مبتلا ہے۔ اگر پیشاب میں تھوڑا سا نائٹریک ایسڈ (تیزاب شورا) ملایا جائے تو اس کی رنگت گہری سبز ہو جاتی ہے۔ کبھی مریض کو ہر ایک چیز زرد نظر آتی ہے، جب صفرا کی نالی میں صفراوی پتھری پھنس جاتی ہے تو تکلیف بہت بڑھ جاتی ہے دردِ دھڑیر ٹھیر کر ہوتا ہے اور اکثر تھکے اور ہچکے بھی ساتھ ہوتے ہیں۔

**اسبابِ مرض :** صفراوی نالیوں کا بند ہو جانا اور صفرا کا خون میں جذب ہو جانا لیکن بعض امراض میں صفرا کی نالیاں بند نہیں ہوتیں لیکن یرقان کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے تب زرد ادفا سفورس کے زہر میں اور نیز بعض امراضِ جگر۔ بدضمی، دائمی قبض اور کبھی سردی و غم و رنج بھی اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ بعض بخاروں میں کوہن کیلول وغیرہ کے کثرت استعمال کی وجہ سے بھی یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔

### علاج

شدید یرقان میں : ایکونائٹ۔ مرکبوس۔ نکس دامیکا۔ ہائیڈراسٹس ۵ قطرے ۵ کے فی خوراک۔



مزمن یرقان میں: چیلی ڈونیم - پوڈوفائیلیم، چائنا - ڈبچی ٹیلز - آریسٹیکم -  
فاسفوریس - نائٹرک ایسڈ وغیرہ -

صفراوی پتھری میں: ایکونائٹ، کلکیریا ۳۰ بربریس ۵ بیلڈونا نیز گرم محکوم -  
(درم جگر یا جگر کے بڑھ جانے اور یرقان کا مشترکہ علاج)

## تشریح المعلومات ادویہ

برائی اونیا: جب شکم کے دائیں پہلو میں چھین کا درد ہوتا ہو تو سب سے پہلے برائی  
اونیا دوائی خیال میں آنی چاہیے۔ اگرچہ دائیں طرف کے چھین کے لیے اور بھی ادویات ہیں  
مثلاً چیلی ڈونیم اور کالی کارب، لیکن برائی اونیا کی خاص علامات جگر کے یہ ہوتی ہیں -  
جگر پھوٹا ہوا اور متورم، حرکت کرنے سے درد زیادہ اور دائیں پہلو پر لیٹنے سے آرام -  
کیونکہ ایسا کرنے سے جہے ماؤف کو سانس پتے وقت حرکت کم کرنی پڑتی ہے -  
یرقان کی یہ بڑی اعلیٰ دوائی ہے جب کہ غصہ کی وجہ سے یہ عارضہ پیدا ہوا ہو۔ منہ  
کا ذائقہ کڑوا اور پاخانہ سخت اور خشک آتا ہو اور اگر پاخانہ نرم، گدے دار اور بمقدار  
کثیر آتے ہوں اور ساتھ ہی شکم میں درد بھی ہوتا ہو -

خوراک: ۳x یا ۳۰ یا ہر دو گھنٹہ کے بعد -

مرکیوریس: ذرا سا چھونے سے بھی جگر بہت دکھتا ہو اور جگر کے مقام میں  
دھیمادھیماء درد ہوتا ہو اور مریض دائیں پہلو نہ لیٹ سکتا ہو - جگر بڑھ گیا ہو - جلد  
جسم اور آنکھیں زرد ہو گئی ہوں -

پت کی عدم موجودگی کے باعث یا تو پاخانوں کا رنگ ٹیالا ہو گیا ہو اور زردی  
مائل سبز صفراوی اسہال مروڑ کے ساتھ آتے ہوں - زبان پر زردی مائل سفید فرجی ہو  
اور زبان پر دانتوں کے نشانات موجود ہوں - سانس بدبودار اور شہا نظر اور پست مہمتی  
بہت ہو - جب کوئین کے ناجائز استعمال کے باعث یرقان کا عارضہ ہو جائے اور بخار  
بھی موجود ہو تو مرکیوریس دوائی بہت مفید ہوتی ہے -

۷ کیو میلا میں بھی یہی علامت ہے -

جب جگر کا فعل سست پڑ گیا ہو تو مرکبوریس دوائی بہت بڑی کارآمد ہوتی ہے۔  
 بچوں کو جب یرقان کا عارضہ پیدا ہو گیا ہو تو مرکبوریس بہت مفید ہوتی ہے۔  
 ڈاکٹر کا پروڈیٹ کا قول ہے کہ مرکبوریس ڈس ۲x نرلی یرقان کے لیے ایک نہایت  
 ہی مؤثر دوائی ہے۔

خوراک: ۱x یا ۲x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

پوڈوفائلم: امراض جگر کی یہ ایک خاص دوائی ہے، یہ دوائی اس وقت مفید  
 ہوتی ہے جبکہ جگر کا فعل سست ہو، یا جگر کی مزمن سوزش ہو اور اسہال آتے ہوں۔  
 جگر بڑھ گیا ہو اور درد کرتا ہو۔ چہرہ اور آنکھیں زرد ہوں اور منہ کا فائقہ بہت بُرا  
 ہو۔ زبان پر فانتوں کے نشانات پائے جاتے ہوں۔ اگر قبض ہو تو مٹی رنگے پاخانے  
 آتے ہوں۔ پوڈوفائلم کی ایک اور علامت یہ ہے کہ مریض جگر کے مقام کو اپنے ہاتھ  
 کے ساتھ متواتر ملتا رہتا ہے۔

خوراک: ۱x ۵ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

چیلی ڈونیم: امراض جگر کی یہ بھی ایک خاص دوائی ہے۔ جگر کے مقام میں  
 دھکن اور جھین کی دریں ہوتی ہوں۔ لیکن چیلی ڈونیم کی خاص علامت یہ ہے کہ دائیں  
 کندھے کی ہڈی کے نیچے دریں ہوتی ہیں جو کہ چھاتی معدہ یا پلوؤں تک جاتی ہیں۔ جگر  
 متورم ٹھنڈک، بخار، یرقان، زبان پر زرد فر، ذائقہ کڑوا اور ترش و سیلی چیزیں مثلاً  
 اچار اور سرکہ پینے کو دل کرتا ہے۔ اسہال بمقدار کثیر اور چمکیلے، زرد آتے ہوں اور ان  
 کا رنگ میالہ ہوتا ہو۔ کال سٹون رچہ کی پتھری کے خارج کرنے میں یہ دوائی مددگار  
 ہوتی ہے احساس کا بننا بھی محدود ہو جاتا ہے۔ نرلی یرقان کے لیے تو یہ ایک  
 بالکل کافی دوائی ہے۔

خوراک: ۵ کے ۵ قطرے دن میں چار مرتبہ۔

ڈیجی ٹیلیس: جب یرقان کا عارضہ امراض دل کے باعث پیدا ہوا ہو۔ تو ڈیجی

ٹیلیس ایک اعلیٰ دوائی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں۔ غنودگی کڑوا فائقہ  
 دھکن، جگر کا بڑھ جانا اور درد کرنا۔ جب یرقان کا عارضہ بہت خراب صورت  
 اختیار کر چکا ہو اور نبض بے قاعدہ اور رک رک کر چلتی ہو اور طاقت آنا فنا زائل ہو

جاتی ہو تو یہ دوائی بہت سودمند ہوتی ہے۔  
خوراک: ۱۵ یا ۱۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد

نکس دامیکا: جب زیادہ مے خوری، زیادہ چٹ پٹی و مصالحہ دار چیزیں استعمال کرنے یا کومین یا مسہلات کے باعث جگر میں نقص واقع ہو گیا ہو تو ایسے حالات میں نکس دامیکا دوائی کو جھٹ خیال میں لانا چاہیے۔ جگر سوجا ہوا سخت اور چھوٹنے سے درد کرتا ہو۔ کپڑے کو کس کر پہننے سے بھی تکلیف معلوم ہوتی ہو۔ بعض اوقات جگر میں درد بھی ہوتا ہو۔ جب غصہ کے باعث یرقان کا عارضہ ہو گیا ہو تو بھی نکس دامیکا دوائی کام آتی ہے۔ اگرچہ اس عارضہ میں کیموسلا کا درجہ برتر ہے جو کہ عصبی مزاج والی زرد رنج مستور کے جگر صفرا کے لیے بڑی اعلیٰ دوائی ہے۔ خرابیوں کے بڑھے ہوئے جگر میں نکس دامیکا کے علاوہ سلفر۔ لاکس فلورک ایڈ، آرٹک اور انونیم۔ میورم ٹیکم ادویات بھی کام آتی ہیں۔

خوراک: ۳ x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

لایکو پوڈیم: اس دوائی کا اثر جگر پر بہت قوی ہوتا ہے۔ تمام جگر چھوٹنے سے دھتا ہوا اور اس میں تناوٹ کا احساس ہو گیا کہ ایک رسی مکر کے گود بندھی ہوئی ہے۔ مدیں دھیمی دھیمی اور دھکن نما ہوتی ہوں لیکن تیز اور بھالا مارنے کی سی دریں نہ ہوتی ہوں جیسی کہ چیلی ڈونیم میں پائی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی غذا کھانے سے بھی معدہ پُر ہو جاتا ہے۔ یرقان کی علامات پورے طوع پر واضح نہ ہوں۔ لیکن رنگت زردی مائل پیلی سی ہو گئی ہو۔

خوراک: ۶ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نیرم سلف: بارہ ٹشو ریڈین (الموسومہ بارہ اکیریں) میں سے امراض جگر کیلئے یہ ایک خاص دوائی ہے۔ سوزش جگر میں یہ دوائی بہت نافع ہوتی ہے جب کہ چھوٹنے سے درد کرتا ہو اور اس میں تیز بھالا مارنے کی سی دریں ہوتی ہوں۔ مریض بائیں پہلو نہ لیٹ سکتا ہو اور نہ ہی اس مقام پر کپڑے کا چھونا تک برداشت کر سکتا ہو۔  
خوراک: ۳ x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کارڈوس مر بانس: یہ دوائی یرقان میں بہت مؤثر ہوا کرتی ہے جبکہ

دھیما دھیما سر درد ہو۔ منہ کا ذائقہ کڑوا ہو۔ زبان سفید اور سرے پر سے سرخ، ابکیاں آتی ہوں اور سبز رنگ کا پانی مریض قے کرتا ہو۔ مقام جگر بھرا ہوا معلوم ہو۔ پاخانے صفردی آتے ہوں اور پیشاب سنہری رنگ کا آتا ہو۔ مقام معدہ اور دایاں پہلو چھوٹے سے درد کرتے ہوں۔

ڈاکٹر برنٹ صاحب کا قول ہے کہ جب سینہ کی ہڈی کے حصہ زیریں کے اوپر ایک سیاہ براؤن دھبہ موجود ہو تو اس کو کارڈو آس کی ایک بھاری علامت سمجھنی چاہیے جب جگر کی خرابی کے باعث جلد جسم پر چھوٹے چھوٹے دھبے نمودار ہو جائیں۔ تو ان کو کارڈو آس کی ایک علامت خاص سمجھنا چاہیے۔ دبائی زکام کے بعد جب صفرا کا زور ہو جائے تو کارڈو آس دوائی شفا بخش ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ کے ایک سے لے کر بیس قطرے تک دن میں تین مرتبہ۔  
ہائیڈراسٹس کی علامات ذائقہ کڑوا، عدم اشتہا، زبان پر زرد فرجی ہوئی اور زرد پیشاب، جب جگر کا فعل دیر سے سست چلا آتا ہو تو یہ دوائی مؤثر ہوا کرتی ہے۔ قبض بھی ساتھ ہوا کرتا ہے۔

خوراک: ۵ کے دو سے پانچ قطرے دن میں دو یا تین دفعہ۔  
سلفر: یہ دوائی جگر کے مزمن امراض میں کارآمد ہوتی ہے۔ جب کہ جگر میں بہت درد اور دھکن ہو۔

نکس و امیکا کے بعد اگر سلفردی جائے تو شفا کو تکمیل تک پہنچانے میں مددگار ہوا کرتی ہے۔ پارہ کے ناجائز استعمال سے جب جگر میں عارض پیدا ہو جائیں تو اکثر سلفر مددگار ہوا کرتی ہے۔ جب اسہال بے رنگ آتے ہوں یا یرقان۔ یا استسقاء شکم کا عارضہ زردی پر ہو تو سلفر دوائی مؤثر نہیں ہوا کرتی، بلکہ یہ علامات اس کے مخالف ہیں۔

خوراک: ۱ x ۳ یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

چائنا: جب کثرتِ مجامعت کے باعث یرقان کا عارضہ ہو جائے تو یہ دوائی شافی ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۱ x ۱ یا ۲ برتین گھنٹہ کے بعد۔

ٹر اکسا کھم : یہ جگر کی ایک مجرب دوائی ہے۔ اس کے علامات حسب ذیل ہیں۔  
 زبان پر نقش کی مانند لکیریں اور منہ کا فائقہ کڑوا۔ کھانا کھانے کے بعد سردی محسوس ہو۔  
 جگر کے مقام میں درد اور دھکن اور صفراوی اسہال۔  
 خوراک : ۵ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

چھو نینتھس : یہ بھی یرقان کی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ سرود ہو۔ زبان  
 سیلی ہو۔ جی متوتا ہو اور اشتہا بالکل ماری گئی ہو، صفراوی پتھری کے لیے یہ ایک بہت  
 اعلیٰ دوائی کہنی گئی ہے۔ یرقان اور درد جگر اس کی علامات ہیں۔ جب جگر میں دودھ  
 خون بہت سست ہو اور اس کے باعث کئی دیگر علامات پیدا ہو جائیں تو ایسے حالات  
 میں یہ ایک بہتر دوائی ہے۔

خوراک : ۵ کے پانچ قطرے دن میں تین مرتبہ۔

### ضروری ہدایات

آرام اور تبدیلی آب و ہوا بہت مفید ہوتی ہے۔ مریض دماغی و جسمانی محنت سے پرہیز  
 کرے اور غذیات وغیرہ سے قطعی طور پر پرہیز لازم ہے۔ مقام جگر پر شکور کرنا از بس ضروری  
 ہے اس سے درد کا فاقہ ہو جاتا ہے اور صفرا کی نالیوں کے کھٹنے میں مدد ملتی ہے۔ مریض  
 کو دودھ میں سوٹا داڑیاں یا آش جو بکریوں اور جب مرض کھٹنے لگے تو ساگودانہ یا پتی کھجری  
 یا بنجی وغیرہ تھوڑی تھوڑی دیں، لیکن مرض اور نشاستہ دارا غذیہ پوری صحت ہونے پر  
 دیں۔

## درد جگر صفراوی قو لنج۔ صفراوی پتھریاں

HEPATIC COLIC BILIAR COLIC BILIARY CALCULI

نوٹ : صفراوی پتھریاں کیونکر بنتی ہیں۔

پتہ میں صفرا کے منجمد ہونے یا کسی کرم وغیرہ کے اس میں چلے جانے سے صفراوی  
 تھیں اس پر حجم کو کنگریاں بن جاتی ہیں جن کی جسامت ماش یا چنے کے دانہ کے برابر  
 ہوتی ہے اور گول یا نوک دار ہوتی ہیں۔ تعداد بھی ان کی مختلف ہوتی ہے کبھی ایک آدھ

کبھی دس بیس اور کبھی سینکڑوں اور اُن کی ساخت میں کوئٹھین صفرادی رنگ گنیشیا پھونا۔ سوڈا اور پوٹاش وغیرہ اجزاء موجود ہوتے ہیں۔

جب کوئی کنکری پتھر سے نکل کر اُس کی نالی میں آتی ہے تو سخت درد ہوتا ہے جسے دردِ جگر یا وجعِ الکبد کہتے ہیں اور ڈاکٹری میں ہیپےٹک کوئٹھین کہتے ہیں۔

علاماتِ مرض : شدت کا درد یکا یک دائیں طرف کی پسلیوں کے نیچے ہونے لگتا ہے اور آفا سخت ہوتا ہے کہ مریض مارے درد کے لاچار ہو جاتا ہے اور درد کی ٹیسیں پشتِ شکم اور دائیں کندھے تک جاتی ہیں کبھی شدت درد سے مریض بیہوش ہو جاتا ہے اور جب تک پتھری پتھر میں واپس نہ چلی جائے یا ڈیوڈی نم دوبارہ انکشتی آنت میں نہ جا کرے تب تک درد ہوتا رہتا ہے اور اگر یہ پتھری نالی میں پھنس کر صفر کی نالی کو بند کر دے تو یرقان کا عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مریض کا جی تلتا ہے اور کبھی ہچکیاں آتی ہیں۔ قبض کی شکایت ہوتی ہے اور مریض سخت اندوگین اور ڈنڈھال ہوتا ہے۔ اسبابِ مرض : دائمی قبض، پتھر کی سندش و دیگر امراضِ جگر اس مرض کو پیدا کرنے کا موجب ہوتے ہیں، نیز زیادہ گوشت کھانا یا زیادہ شراب پینا، سست اور عیاشانہ زندگی بسر کرنا، ورزش نہ کرنا، یہ سب اس کے اسباب ہیں۔

### علاج

گلکے باکارب ۳ x بربریس و لکیریس ۵ ایکونائٹ، بیلادونا، سلیشیا، سلفر، ہیر سلف، ڈیجیٹلس، کیومیلا، آرسینک، برائی اوینا۔ ڈایا سکودیا۔ چلی ڈونیم پھونٹیس وغیرہ ادویات کام آتی ہیں۔ ان ادویات کا مفصل حال و تشریح درمِ جگر اور یرقان کے باب میں مطالعہ فرمائیں۔

### ضروری ہدایات

حکام درد پر جو شانہ پوست کی لٹور کریں یا گرم گرم ہاسی کی پلٹس باندھیں۔ یا گرم پانی بوتل میں بھر کر سینک دیں۔ اگر مریض کو بار بار قبض آتی ہوں تو برف کے ٹکڑے جو سسے کے لیے دیں۔ اگر قبض ہو تو اُسے فوراً بذریعہ اینارفع کریں۔

پینے کے لیے سوڈا وائٹ یا دودھ اور سوڈا وائٹ ملا کر دیں، روغن بادام کا استعمال

کرائیں۔ تازہ میوہ جات نیز سبزیوں کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ شراب و نشاستہ دار  
اغذیہ سے پرہیز لازم ہے۔

## جگر کا سکڑ جانا۔ جگر کا چھوٹا ہو جانا

(CIRRHOSIS OF THE LIVER)

اس مرض میں جگر سکڑ کر چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے اصلی ذرات زائل ہو جاتے ہیں۔  
علامات مرض: مریض کے دائیں طرف کی سپلیوں کے نیچے درد ہوتا ہے۔ اس  
کے اضمہ میں فتق ہوتا ہے۔ کبھی جی متلاتا ہے اور ابکائیاں آتی ہیں۔ کبھی خفیف بخار  
بھی ہو جاتا ہے۔ قبض۔ نفخ شکم کی تکلیف رہتی ہے۔ اور جلد جسم خشک ہوتی ہے  
مریض روز بروز لاغر و کمزور ہوتا جاتا ہے۔ کبھی اس مرض کے ساتھ استسقا یا  
یرقان کا ماضہ بھی ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض: نقص اضمہ، کثرت شراب نوشی، تیز مصالحہ دار چیزوں کا کھانا  
پیٹ کے کیرے۔ زہر طیریا۔ مرض آتشک اور شدت کی گرمی وغیرہ  
علاج

- ۱۔ فاسفورس ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔
- ۲۔ آرسینیکم آیوڈائیڈ ۳ x ٹری ٹیورین دو گرین کھانا کھانے کے بعد۔
- ۳۔ چائنا ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔
- ۴۔ آرم میو رائیکم ۳ x سفوف دو گرین ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

اس مرض میں دودھ نہایت اعلیٰ غذا ہے۔ دودھ میں سوڈیا یا آتش جو بھی ملا کر دے  
سکتے ہیں۔ نیز مونگ کی دال کا پانی بھی دے سکتے ہیں۔ اور پھر آہستہ آہستہ مریض سبزی  
ترکاری بھی استعمال کر سکتا ہے۔ شراب سے قطعاً پرہیز لازم ہے۔ تیز گرم مصالحہ نمک

اس کے علاوہ کارڈس میریانس۔ ہیپوڈیم۔ سٹیکو پوڈیم۔ مرکوریس۔ نائٹریٹم ایکوائٹیم  
بھی اس مرض کی مفید ادویات ہیں۔

اچار، لال مرج، چٹنی، چائے، گوشت وغیرہ سے بھی پرہیز کریں۔ اگر مریض کو قہقہے آئیں۔ تو اسے ایک دن رات کسی قسم کی غذا نہ دیں اور اس کو بالکل آرام۔ سے لگے رکھیں برف چھوٹا یا برف سے سرد کیا ہوا دودھ تھوڑا تھوڑا دینا قہقہوں کو روکتا ہے۔ گرم پانی اور صابن کا انیما بھی کریں۔

## تلی کا بڑھ جانا۔ عظم الطحال

ENLARGEMENT OF THE SPLEEN.

اس مرض میں تلی بڑھ جاتی ہے۔ مریض کا پیٹ کسی قدر بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے پیٹ کے بائیں طرف ٹٹونے سے بڑھی ہوئی تلی بخوبی معلوم پڑتی ہے۔ مریض کا ہانہ خراب ہوتا ہے اور اس کا رنگ پھیکا اور مدہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اسباب مرض، طیریائی یا موسمی بخاروں میں تلی عموماً بڑھ جاتی ہے اور طیریا کا زہر تلی میں سرایت کر جاتا ہے۔ لیکن کبھی تلی کی ساخت میں خرابی ہونے کی وجہ سے یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔

### علاج

سیانوفکس: اس مرض میں اس دوائی کا درجہ سب ادویات سے افضل ہے اور اس مرض میں یہ اکیس مانی گئی ہے۔ جب مقام طحال میں درد ہوتا ہو اور چھب چھب پڑتی ہو تو بھی یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ کے پانچ سے پندرہ قطرے دن میں تین مرتبہ  
نیزم میور: طحال بڑھی ہوئی ہو اور خواہ اس میں چھب کی مددیں بھی ہوتی ہوں تو بھی یہ دوائی موثر ہوتی ہے۔ مریض کمزور ہو اور طیریا، بخار کا شکار رہا ہو۔ اگر مریض نے کوئین بہت کھائی ہو تو یہ دوائی خاص طور پر نافع ہوتی ہے۔ مریض نمک کی بہت خواہش کرتا ہو۔

خوراک: ۱۲ x ۳۰ یا ۳۰ دن میں دو مرتبہ  
نوٹ: نیزم میور ۱۲ x یا ۳۰ کی دو خوراکیں صبح بارہ بجے سے پہلے اور بارہ بجے کے بعد سیانوفکس کی دو خوراکیں دینا بہتر علاج ثابت ہوتا ہے۔ نیز مریورس بن ایڈاڈ



چائنا- فرم- گریڈ لیا- ارے نیا ڈایا ڈی ما- آرٹیکا میلینیتھس وغیرہ ادویات بھی کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

تبدیلی آب و ہوا صاف اور کھلی ہو، اچھی غذا کھانا اور قبض نہ ہونے دینا۔ یہ سب ضروری ہیں۔ باہر تلی پر سیانو تھس کی مالش کرنا یا انگریجو آوڈین لگانا مفید ہوتا ہے۔  
نوٹ: یہ مرض آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا علاج تین یا چار ہفتہ تک بلکہ بعض اوقات زیادہ عرصہ تک جاری رکھنا پڑتا ہے۔

## باب شانزدہم

# امراض گردہ مشائے گردہ کی سوجن۔ براؤنڈس ڈیزیز

NEPHRITIS

BRIGHTS DISEASE

اس مرض میں گردے کی ساخت میں نقص واقع ہو کر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی استسقاء اور پیشاب میں ابومن بھی خارج ہونے لگتی ہے۔ جب یہ مرض مزمن صورت اختیار کر جاتا ہے تو گردہ کی ساخت میں دیرینہ نقص واقع ہو کر اس کے ذرات چربی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔

نوٹ: یہ مرض دو قسم کا ہوتا ہے :-

۱- شدید ۲- مزمن

گردہ کی شدید سوجن کی علامات حسب ذیل ہیں :-

۱- مریض کے ہاتھ پاؤں، تیز چہرہ پھول جاتا ہے اور تمام جسم سوج جاتا ہے۔ بخار لرزہ سے پڑھ جاتا ہے۔ نبض تیز اور سخت چلتی ہے۔ جلد خشک اور کھردری ہوتی ہے۔ اور پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، سر درد کرتا ہے اور ساتھ ہی معدہ میں نقص

واقع ہو کر جی متلاتا اور آبکیاں آتی ہیں۔ مگر دونوں گمردے مرض میں مبتلا ہو جائیں تو سارا جسم پھول جاتا ہے چہرہ اور پوٹے تو اس قدر پھول جاتے ہیں کہ آنکھیں بیچ میں چھپ جاتی ہیں۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے لیکن پیشاب تھوڑا تھوڑا بدبودار نہایت رنگینی یا دھواں نما خارج ہوتا ہے جس میں بکثرت البومن خارج ہوتی ہے۔ جب مرض کا حملہ شدید ہو تو پیشاب بالکل ہی نہیں آتا۔ شکم میں پانی بھر جاتا ہے اور استسقاء کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ جب مرض گھٹنے لگتا ہے تو استسقاء کم ہوتا جاتا ہے اور پیشاب صاف آنے لگتا ہے اور اس میں البومن نہیں آتی، برعکس اس کے اگر اس مرض کے ساتھ مرض یورے میا (سمیت بول) یا مرض نمونیا وغیرہ ہو جائیں تو مرض بہت خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے اور اکثر ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

۲۔ گمردے کی پرانی سوجن کی علامات (مزمن براکیٹس ڈیزیز) کمزوری جلد کا رنگ زرد، پیشاب جانے کی حاجت بار بار اور خصوصاً بوقت شب زیادہ مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے۔ مریض کا چہرہ پھیکا اور پھولا ہوا ہوتا ہے۔ جھوک مر جاتی ہے، کھٹے ٹکار آتے ہیں اور جی متلاتا ہے۔ اصرہ بگڑ جاتا ہے اور جود اس بات کے کہ غذا میں کوئی بد پرہیزی معلوم نہیں ہوتی۔ پیشاب کا وزن مخصوص معمول کی نسبت کم ہوتا ہے۔ مرض کی ابتدا میں البومن بہت خارج ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں بہت گھٹ جاتی ہے اور پیشاب بھی مقدار میں کم آتا ہے۔ مرض کی ابتدا میں پیشاب بہت سیاہ یا دھواں نما ہوتا ہے لیکن بعد میں زرد ہو جاتا ہے۔ مزمن ورم گمردہ کی دو علی اقسام یہ ہیں۔

۱۔ جب کہ یہ عارضہ شدید ورم گمردہ کے بعد ہو گیا ہو۔

۲۔ جب کہ مرض مزمنہ ابتدا سے ہی چپ چاپ شروع ہو گیا ہو۔

اول الذکر میں استسقاء خاص علامت ٹھاکرتی ہے۔ مریض روز بروز کمزور و لا ہوتا جاتا ہے۔ پاؤں اور ٹخنے سوج جاتے ہیں اور مرض جب بہت ترقی یافتہ ہو جاتا ہے تو استسقاء کا عارضہ بہت نمایاں ہوتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ اس مرض میں استسقاء کوئی لازمی علامت نہیں۔ بعض اوقات استسقاء نہیں ہوتا اور مریض سمیت بول

کی وجہ سے راہی ملک عدم ہوتا ہے۔ سمیت بول کے علامات ہریان تشنج اور بے ہوشی ہیں اور بے ہوشی کے عالم میں ہی مریض فوت ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض : شدید ورم گروہ کا باعث سمیات خصوصاً سرخ بخار ٹھنڈا لگنا یا بھیگنا اور شراب وغیرہ ہیں۔ آتشک اور سل وغیرہ امراض بھی اس کا سبب ہوتے ہیں۔ مزہی برائٹس ڈیزیز کے اسباب بھی غذائیں بد پرہیزی، منشیات کا استعمال بھیگنا اور نقرس ہوتے ہیں۔ اکثر ضعیفی میں نقرس مزاج کے اشخاص کو یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں اس کو گاؤٹی گڈنی (نقرسی گروہ) بھی کہتے ہیں۔ سمیت سیسہ کے باعث بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ چنانچہ رنگ سارہ اور دیگر سیسہ کا کام کرنے والے اس مرض میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ کبھی دم مٹانہ یا دل کے بعض امراض یا آتشک یا طیر یا بخار کے بعد بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے۔ حاملہ عورتیں بعض اوقات اس مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ رحم کا بوجھ گروہوں پر پڑ کر اس مرض کے پیدا کرنے کا موجب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ مرض موروثی ہوتا ہے خصوصاً ایسے کنبہ میں کہ جس میں نقرس کی شکایت ہو۔

### علاج

بیلہ ڈونا : ابتدائی حالت میں جبکہ بخار شدید ہو اور سر کی طرف اجتماع خون ہو۔  
خوراک ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اسپیس : جب گروہ کی سوچ کی وجہ سے استفادہ ہو گیا ہو۔ پیاس نہ ہو۔

خوراک ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کینتھرس : پیشاب بالکل بند ہو۔ یا قطرہ قطرہ اور وقت و درو کے ساتھ

خارج ہوتا ہو۔

خوراک ۱x یا ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

اسینیکیم : ہر دو حاد اور مزمن حالتوں کے لیے جب کمزوری و نقاہت زیادہ ہو

لگی ہو۔ پیاس بار بار لیکن تھوڑی مقدار میں پانی مریض پیتا ہو۔ پیشاب میں ابومن بھی

خارج ہوتی ہو۔ بے چینی۔ استفادہ اور اندرونی جلن ہو۔

خوراک ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مرکبورس: دورانِ حمل میں جب گرمیہ کی سو جن واقع ہو اور پیپ پڑ جانے کا اندیشہ ہو۔ پسینہ زیادہ اور تکلیف زیادہ رات کو ہو۔

خوراک ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فیرم میٹلیکیم۔ چہرہ زرد۔ کمی خون، خوراک کھانے کے بعد تے ہو جائے۔ یا ناہضم شدہ حالت میں ہی خارج ہو جائے۔ نکسیر چھوٹے۔

خوراک ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

ٹیری بن تھینا: یہ دوائی بھی اس مرض میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ گرمیہ میں اجتماعِ خون بہت ہو سکر میں دھیمی دھیمی درد ہوتی ہو اور یہ درد پیشاب کی نالیوں تک جاتی ہو۔ پیشاب سیاہ دھواں نما آتا ہو۔ استسقاء ہواور پیشاب میں خون اور البومن بکثرت خارج ہوں۔ جب یہ عارضہ سرخ بخار کی وجہ سے ہو تو یہ دوائی خاص طور پر مؤثر ہوتی ہے۔ تقابہت بہت ہو۔ لیکن آرسینکیم کی طرح بے چینی نہ ہو۔ خوراک ۳ x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

دیگر ادویات ایکونائٹ (ابتداء میں) چیلی ڈونیم، سلفر۔ فانی ٹولا کا۔ اپوسائیٹم نکس دامیکا۔ کریوزوٹ۔ نائٹرک ایسڈ۔ فیرم، ادیم۔ ڈیجی ٹیلس۔ کنولیریا ایسڈ فاس۔ پیم بک۔ کالجی کم وغیرہ ادویات بھی کام آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

غذا مریض کو صرف دودھ ہی دینی چاہیے۔ ڈاکٹر ستمتھ کا قول ہے کہ جب کوئی دوائی کارگر نہ ہوتی ہو تو صرف دودھ کی غذا ہی مرض کو دودھ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ دودھ میں آتش جو بھی بلا کر دیا جاسکتا ہے۔ اگر دودھ سے مریض کو نفرت ہو تو اسے دہی اور چھاچھ بھی دے سکتے ہیں۔ پھر دودھ میں ساگودانہ بھی پکا کر دے سکتے ہیں لیکن شراب و کباب انڈے اور گوشت سے قطعی پرہیز لازم ہے۔ مرض کی شدت حالت میں گرم حمام میں غسل کرنا یا گرم بھپھارہ دینا مفید ہوتا ہے تاکہ پسینہ آکر استسقاء میں کمی واقع ہو اور نیز بذریعہ پسینہ خون کا زہر بلا مادہ خارج ہو جائے۔ اگر پانی

۱۔ دودھ مکھن نکلے دینا چاہیے۔

میں ایک کبل یا چادر کو بھگو اور پھر کمر اُس میں مریض کو گردن تک لپیٹ دیں اور اُس پر اُس کے ایک یا دو کبل لپیٹ دیں۔ پسینہ بندہ بیس منٹ میں کھل کر آجائے گا اُس کے بعد مریض کے جسم کو فوراً خشک کر دیں اور اُس کے اوپر کبل ڈال دیں۔ تازہ جو انخوری کرنا۔ لیکن محنت اور تھکاوٹ سے بچنا لازمی ہے مریض کے جسم پر مالش کرنا اور پھر گرم پانی میں تولیہ بھگو اور خوب پھوڑ کر اُس سے جسم کو ملنا مفید ہوتا ہے۔ مریض کو چپ چاپ آرام سے بستر پر پڑا رہنا چاہیے۔ پورا آرام اس مرض میں خاص ضروری ہے۔ پانی بہت پینا چاہیے۔ دودھ رکھن نکلا ہوا استعمال کریں۔

## درِ گروہ و پتھری۔ سنگ مثانہ و ریشیاب میں کنکریاں

(RENAL COLIC CALCULUS OF STONE IN THE BLADDER AND GRAVEL)

اس مرض میں گروہ یا مثانہ کے اندر رگ یا پتھری پیدا ہو جاتی ہے جب پیشاب کی حالت غیر معمولی ہو جاتی ہے تو اس کی تہہ میں معدنی قسم کا پتھریٹ بیٹھ جاتا ہے یہ معدنی ذرات جو پیشاب میں تہہ نشین ہوتے ہیں کبھی تو یہ الگ الگ پڑے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اس کو رگ مثانہ یا رگ گروہ کہتے ہیں اور کبھی ان ذرات بول کے باہر نکلنے سے کنکریاں یا پتھریاں بن جاتی ہیں۔

بعض خاندانوں میں پتھری اکثر پائی جاتی ہے اور بعض ملکوں میں یہ عام ہوا کرتا ہے۔ مثلاً ہنگری۔ پاکستانی و ہند اور چین پتھری کا مرض مرد و زن ہر دو میں پایا جاتا ہے کنکریاں یا پتھریاں اکثر گردوں اور مثانہ میں ہی بنا کرتی ہیں اور وہاں ہی اکثر پائی جاتی ہیں جو پتھریاں گروہ میں بنتی ہیں وہ براستہ یوری ٹر (حالب) گروہ سے مثانہ میں آجایا کرتی ہیں اور مثانہ سے پیشاب کے ساتھ باہر نکل جاتی ہیں اور کبھی کبھی گروہ میں یہ پتھریاں اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ یوری ٹر گروہ و مثانہ کی درمیانی نالی میں سے گزر نہیں سکتیں اور یا مثانہ میں آئی پر معدنی اجزاء تہہ جہ جم کر ایک بڑی پتھری بنا دیتے ہیں اور یہ پتھری وہیں رہ جاتی ہے، کبھی تو ایک ہی پتھری ہوتی

ہے اور اس کے خارج ہو جانے کے بعد دوبارہ پتھری نہیں ہوتی لیکن بعض مریضوں میں  
دقتاً وقتاً سینکڑوں پتھریاں پیشاب میں خارج ہوتی رہتی ہیں۔

نوٹ: جب پتھری یوری ٹر کی راہ گردہ سے نکلتی ہے تو نوبت بہ نوبت تشنجی درد ہوتا  
ہے اور اس کو درد گردہ کہتے ہیں۔ یہ درد جنگاسہ سے شانہ خصیہ یا ران تک  
جاتا ہے، اُبکائیاں اور تھکے کپکپاہٹ اور کو لیس اور سرد پسینہ (تریل) ہمراہ  
ہوتے ہیں۔ پیشاب کی حاجت بکثرت ہوتی ہے۔ اور تھوڑا خون آمیز پیشاب  
خارج ہوتا ہے اور یہ درد نوبت بہ نوبت رہتا ہے۔ حتیٰ کہ پتھری شانہ میں  
پہنچ جاتی ہے یا بعض اوقات ایک یا دو مرتبہ درد ہو کر پھر مفقود ہو جاتا ہے۔  
کیونکہ پتھری گردہ میں ہی ایک مقام پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب پتھری گردہ میں  
پڑی رہے تو وہاں بوجھ سا محسوس ہوتا رہتا ہے۔

سنگِ شانہ: اکثر اوقات تو گردے کی پتھری شانہ میں آ جاتی ہے اور  
وہاں یہ قد میں بڑھ جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ پتھری شانہ میں ہی پیدا ہو جاتی ہے۔  
بچوں میں پتھری: بعض اوقات بچوں کے شانہ میں پتھری بن جاتی ہے اس  
کی علامات یہ ہوا کرتی ہیں۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے یا بے اختیار لگتا رہتا  
ہے۔ پیشاب کرتے وقت سخت درد ہوتا ہے۔ بعض اوقات پیشاب میں پیپ اور  
خون ملے ہوئے آتے ہیں۔ بیمار بچہ حشفہ کے گھونگھٹ کو متواتر کھینچتا رہتا ہے جس  
کے باعث گھونگھٹ بڑھ جاتا ہے۔

علامات سنگِ شانہ: سنگِ شانہ کی چار موٹی موٹی علامات یہ ہیں:-

۱۔ پیشاب کا بار بار آنا۔ خاص کر دن میں جب کہ مریض حرکت کرتا رہتا ہوا  
رات کو کم۔ جب کہ آرام میں ہوتا ہو۔ مثلاً گھوڑے کی سواری کرنے سے پیشاب  
بار بار آتا ہے۔

۲۔ پیشاب کرتے وقت اور پیشاب کرنے کے بعد قصب میں درد ہوتا ہے

اور چند منٹوں تک متواتر پیشاب کی حاجت بنی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ نیا پیشاب شانہ میں  
جمع ہو کر تھوڑی تسکین کا موجب بنتا ہے۔ کیونکہ اس سے پتھری شانہ کی گردن  
کے اتر والی جھلی سے الگ ہو جاتی ہے۔

۲۔ پیشاب میں پیپ خارج ہوتی ہے۔

۴۔ گلہبے گلبے خون بھی تھوڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ یہ تمام علامات حرکت کرنے سے زیادتی اختیار کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بہ نسبت شب کے دن کے وقت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جس وقت تک شانہ میں سوزش واقع نہیں ہوتی اُس وقت تک پیپ چاہے پڑا رہنے میں آرام رہتا ہے۔ کبھی یکا یک پیشاب بند ہو جاتا ہے اور شانہ کے منہ پر پتھری کے آجانے کے باعث حبس بول کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ شانہ کی درم شامل حال ہو جاتی ہے۔ پیشاب کھاری ہو جاتا ہے اور پتھری قد میں بڑھ جاتی ہے ایسی حالت میں آرام سے پڑا رہنا کوئی آرام نہیں دے سکتا، اور مریض شب در در زور ہوتا رہتا ہے جبے مرض زیادہ ترقی پر ہوتا ہے تو صحت اور بھی خراب ہو جاتی ہے اور سوزش گردوں تک پہنچ جاتی ہے۔

### علاج

اس مرض میں جو ادویات زیادہ مفید ہوتی ہیں اُن کے نام یہ ہیں، ایسٹھ فاسس۔  
نکس و امیکا۔ اکسالک ایسٹھ، لائیکو پوڈیم، کینا بس۔ بریوس۔ جیسی میم۔ کینتھرس۔ نیم  
کارب، پوڈوفالیم۔ مرکورس۔ بیلادونا۔ کلکیریا کارب۔ سلیشیا۔ نائٹریک ایسٹھ۔  
پٹلا۔ سلفر وغیرہ وغیرہ۔

### چند ادویات کی علامات کی تشریح

نکس و امیکا: جب درد دائیں طرف کے گردہ سے شروع ہو کر نیچے خیمہ کی طرف جاتا ہو۔ مریض کو پیشاب اور پاخانہ کی حاجت بار بار ہوتی ہو۔ مزاج چڑچڑا۔ شراب خوری کے عادی اشخاص کے لیے یہ بہت مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک: ۱ یا ۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بریوس و لکیرس: بائیں طرف کا درد گردہ، کمر اور کھٹے کے جوڑوں میں شدید دردی ہوں۔ معمولی سی تھکاوٹ کی وجہ سے دردوں میں کافی زیادتی ہو جاتی ہو۔ یہ دوائی اس مرض میں نہایت مؤثر ہوتی ہے۔

خوراک: ۵ یا ۱ ہر ایک یا نیم گھنٹہ کے بعد۔

لائیکو پوڈیم : پیشاب سے پہلے کمر میں سخت درد ہو۔ خصوصاً دائیں طرف سُرُخ رنگ کی ریگ کا اخراج۔ زیادتی شام چھ بجے سے میکرا آٹھ بجے تک۔ پیٹ میں ہوا بہت ہوتی ہو۔ دردوں کے درمیان میں دینے سے پتھری کی پیدائش رک جاتی ہے۔  
خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب : پتھری پر اس کا اثر قابلِ تعریف ہے۔ اور پتھری کے باعث جو درد ہوتا ہے۔ اس کو بھی یہ دوائی رفع کرتی ہے، درد گودہ میں اس دوائی کا اثر مجرب مانا گیا ہے۔

خوراک ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

جن مریضوں کو ریگ یا سنگ گودہ و مثانہ کا عارضہ ہو۔ اسی کو لازم ہے کہ وہ اعتدال و آرام کی زندگی بسر کریں غذا و وقت معینہ پر کھائیں اور زیادہ مرغن و ثقیل اشیاء سے اور زیادہ گوشت خوری سے پرہیز کریں۔ اور ہاضمہ کو ٹھیک رکھیں۔ شراب وغیرہ سے تو قطعی پرہیز لازم ہے۔ جب مزاج میں یورک ایسڈ کا غلبہ ہو یا پیشاب میں ریگ یا رنگ سُرُخ آتی ہو تو ایسی حالت میں شراب و کباب اور گوشت وغیرہ کا استعمال نہایت غیر مفید ہوتا ہے۔ سبزیاں اور نباتات وغیرہ کا کھانا زیادہ مفید ہوتا ہے۔ کھلی ہوئی میں دل پسند ورزش کرنا اور خالص پانی، یا سوڈا واٹر کا زیادہ استعمال مریض کے لیے مفید ہوتا ہے اور اس کا لک ایسڈ کا غلبہ ہو۔ یعنی پیشاب میں اس کا لک ایسڈ کے ذرات یا ریگ موجود ہو تو ایسے مریضوں کو سبزی ترکاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کیونکہ سبزیات میں اس کا لک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے۔

### مزید ادویات کی تشریح

مندرجہ ذیل ہے

پتھری کا مرض ہمارے ملک میں عام ہے۔ ڈاکٹر دولت سنگھ نے اس سلسلے میں صرف چار ادویہ کی تشریح کی ہے جو میرے خیال میں ناکافی ہے اس لیے مزید چند اہم ادویات کی تشریح پیش خدمت ہے۔  
(رفاعی)



آر جینٹل : نائٹریکیم : شانے اور کمر کے نچلے حصے میں درد - پیشاب کی یکایک خواہش  
 پیشاب میں جلن - پیشاب کے ساتھ خون آئے - اگر کینتھرس ناکام رہے تو یہ دوا دینی چاہیے  
 اپنی جگہ : پیشاب میں بغم (آنوں) - پیپ - یورک ایسڈ اور بھورے رنگ کی  
 باریک ریت خارج ہو - پیشاب کرتے وقت عموماً شانے میں جلن اور بعد میں اینٹھن -  
 اوسیم کینم : دائیں گردے اور شانے میں درد - پیشاب میں شک کی سی بو یا  
 خوشبو - مرنج یا زرد ریت تہ نشین ہو جائے - تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شدید قسم کی قے -  
 ایکوی زے ٹم : دائیں گردے کی گرائی میں درد جو شکم کے نچلے حصے کو جائے -  
 ساتھ ہی پیشاب کی شدید حاجت ہو -

پریبرا بریوا : پیشاب کی مسلسل حاجت - پیشاب سیاہ - بغم اور خون ملا اس  
 میں سے امونیا کی تیز بو آئے - پیشاب کرتے ہوئے رانوں میں درد جو پاؤں کے پنجوں اور  
 تلووں تک جائے - شانے میں اور کبھی کبھی کمر میں بھی شدید درد -  
 ٹوبیکم : غالباً پیشاب کی نالی میں شدید درد - ٹھنڈا پسینہ اور شدید متلی - مریض  
 بار بار پیٹ پر سے کپڑا ہٹائے - پیٹ ننگا کرنے سے کچھ سکون ہو -  
 ڈائسکوریا : داہنے کولہے کی بڑی کے بالائی ابھار پر ایک چھوٹے سے مقام پر  
 پاگل کر دینے والا درد جو داہنی ٹانگ - داہنے خبیثے اور شانے تک پھیلے - سرد پسینہ - پیشاب  
 کی بار بار حاجت -

سار سپر بلا : خون آمیز پیشاب - مقدار میں کم - پیشاب کے اختتام پر شدید درد  
 دائیں گردے سے نیچے کو جائے - بچہ پیشاب کرتے ہوئے چیخے -  
 کوکس کیکیٹی : گردے سے شانے تک برہمی لگنے کے سے درد - گرم رنگ کا گٹھا  
 پیشاب - مرنج یا سفید سوب تہ نشین ہو جائے - پیشاب کی حاجت -  
 کینتھرس : خون آمیز پیشاب - شدید درد کے ساتھ قطرہ قطرہ نکلے - درد والی  
 جگہ پر چھونا برداشت نہ ہو -

# پیشاب میں ریگ آنا

(URINARY SAND RENAL SAND URINARY DEPOSITS)

پیشاب میں دو طرح کی ریگ خارج ہوا کرتی ہے۔ ایک سُرخ رنگ کی جس میں یوریا اور یورک ایسڈ ہوا کرتے ہیں اور یہ شکایت اُن لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ جو کثرت سے گوشت وغیرہ کھاتے ہیں اور ورزش نہیں کرتے، دوسری قسم یعنی زرد یا سفید ریگ کی شکایت عموماً غریبا کے اُس طبقہ میں پائی جاتی ہے جو بوجہ غریبی اچھی خوراک نہیں کھاتے اس حالت میں جہاں بھی مریض پیشاب کرتا ہے وہ جگہ سفید ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات بد مضمی بھی اس مرض کی وجہ ہوا کرتی ہے۔

## علاج

لائیکوپوڈیم: جب پیشاب میں سُرخ رنگ کی ریگ پائی جائے۔ بد مضمی کی شکایت ہو اور پیٹ ہر وقت پھولا رہتا ہو۔ قبض ہو۔  
خوراک  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

ارٹیکا یورنرہ: جب لائیکوپوڈیم سے فائدہ نہ ہو تو یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔  
خوراک:  $5$  یا  $1 \times$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورک ایسڈ: جب سفید رنگ کی رطوبت اور ریگ سفیدی مائل خارج ہوتی ہو۔ کمزوری بہت ہو۔  
خوراک:  $3$  یا  $30$  یا  $200$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

گریفائیٹس: جب پیشاب کچھ دیر تک رکھا جائے تو اس میں سفیدی ظاہر ہونے لگے۔ پیشاب کی بوتل زیادہ ترش ہو۔  
خوراک:  $6$  یا  $20$  ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

بنزائیک ایسڈ: پیشاب از حد بوزدار اور گھوڑے کے پیشاب کی مانند اس سے بڑھتی ہو۔ رنگت بہت گہری ہو۔  
خوراک:  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

چائنا: گرے رنگ کی دانہ دار ریگ پیشاب کے نیچے نہ نشین ہو جاتی ہو۔

## خوراک : ۱x یا ۲x یا ۳۰ ہر تہی گھنٹہ کے بعد۔ ضروری ہدایات

ہاضمہ کی خرابی کو دور کریں۔ غذا مریض کو مناسب مقدار میں اور وقت معینہ پر دیں۔ زیادہ میٹھی اور بوغنی اغذیہ سے پرہیز لازم ہے، سبزی ترکاری کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ نشیات سے سخت پرہیز لازم ہے جس قدر مریض پانی پیئے اُسی قدر مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے پیشاب زیادہ پیدا ہو کر رگ و غیرہ کے خارج ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔

## پیشاب میں البومن آنا۔ بولن لالی

(ALBUMINURIA)

اس مرض میں پیشاب کے ساتھ البومن خارج ہوتا ہے۔ درحقیقت یہ خود کوئی مرض نہیں بلکہ یہ بعض امراض گروہ مثلاً حاد مزمن، ورم گردہ، گردہ میں پتھری اور سہلی وغیرہ کی ایک علامت ہے۔

**علامات مرض :** اس مرض کا مریض روز بروز کمزور و لاغر ہوتا جاتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ جی متلاتا ہے۔ کبھی قبض اور کبھی دست آنے لگتے ہیں، دل دھڑکتا ہے اور جسم کا رنگ بھیکا پڑ جاتا ہے اور آخر کار مریض مرض استقرار میں مبتلا ہو جاتا ہے مریض کو بوقت شب کئی بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے۔

**اسباب مرض :** کمی خون۔ بعض بخاروں مثلاً مرنج، بخار، خناق وغیرہ نیز دورانِ حمل میں بھی یہ عارضہ ہو جاتا ہے۔ بعض سمیات بھی اس مرض کو پیدا کرتی ہیں مثلاً کینسر ایڈمز، تارپین کا تیل، شکبیا، فاسفورس اور مارفیا کا زیادہ استعمال، بد ہضمی، ایسی غذا بکثرت کھانا کہ جس میں البومن کا مادہ بہت ہو۔ مثلاً انڈے وغیرہ، سرد پانی میں غسل کرنا۔

۱۔ البومن وہ مادہ ہے جو کہ حیوانات و نباتات کی ساخت میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ انڈے کی سفیدی خالص البومی ہے اور یہی مادہ ہے جو کہ اعضاء و عضلات و استخوان وغیرہ کی ساخت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔

**تشخیص :** ۱۔ پیشاب کو تیشے کی نلی میں ڈال کر گرم کرنے سے سفید مادہ جم جائے۔

۲۔ اگر ڈائلیوٹ ایسی ٹمک ایسڈ کو پیشاب میں ڈالا جائے تو سفید مادہ حل نہ ہو بلکہ قائم رہے۔

۳۔ مقطر پانی کو گلاس میں بھر لیں اور اُس میں مریض کے پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیں۔ اگر یہ سفید حلقہ سا بنادے تو سمجھیں کہ پیشاب میں البومن موجود ہے یہ سادہ اور آزمودہ ٹیسٹ ہے۔

### علاج

۲۔ سینکیم۔ بربرین و لکیرس، کالی میور  $2 \times$  کلہیا۔ مرکبوس کار، فاسفورس ٹیری بن تھینا۔ لائیکوپوڈیم۔ ہیلونا سز اور اپوسائی نم وغیرہ ادویات اس مرض میں کام آتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

۱۔ مرض کے اصل سبب کو دریافت کریں اور اُس کے مطابق اُس مرض کا علاج کریں۔ اگر غذا وغیرہ کی بد پرہیزی کی وجہ سے یہ عارضہ ہو تو اس کی اصلاح کریں۔

۲۔ کثرتِ شراب خوری کی وجہ سے جب یہ عارضہ ہو تو شراب کا استعمال قطعاً بند کر دیں۔

۳۔ اگر غم و رنج اور فکر و تردد کی وجہ سے یہ بیماری ہو تو اصل سبب کو دور کریں۔

۴۔ اگر حلق مارنے یا کثرتِ مجامعت کے باعث یہ عارضہ ہو جائے تو مریض کو حلق کی بد عادت ترک کر دینے کی سخت فہمائش کریں اور مریض کو جماع سے پرہیز کرنے کی سخت تاکید کریں۔

۵۔ اگر مریض محنتِ جسمانی بہت کرتا ہو اور اُس کی وجہ سے یہ عارضہ ہو، تو مریض کو آرام کرنے کی ہدایت کریں۔

۶۔ اگر انڈے یا گوشت وغیرہ کے بکثرت استعمال کی وجہ سے یہ بیماری ہو تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، نیز مٹھائی، زیادہ گرم مصالحہ اور لال مروج سے بھی پرہیز لازم ہے۔ ہیزی، ترکاری اور دودھ، روٹی بہت عمدہ غذا یہ ہیں۔

۷۔ اگر بخاروں کی وجہ سے پیشاب میں البومن خارج ہو تو بخار کا مناسب علاج

کریں اور اس کی بعد کی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے زود، مضمم اور لطیف غذا دیں۔ نیز مناسب دوائی مثلاً آرسینکیم اور چائنا وغیرہ استعمال کرائیں۔

۸۔ حاملہ عورت کو جب یہ عارضہ ہو جائے تو اس کی غذا کا خاص خیال رکھیں اور اس کو آرام دیں اور مذکورہ بالا ادویات میں سے جو دوائی مناسب حال ہو دیں۔

## حبس بول پیشاب کا رک جانا پیشاب کا مشکل سے آنا

(DYSURIA RETENTION OF URINE)

اس مرض میں پیشاب مشکل سے آتا ہے یا بالکل بند ہو جاتا ہے اس کی تین مختلف حالتیں ہوتی ہیں :-

۱۔ ڈائسوریہ (DYSURIA) یعنی پیشاب کا مشکل سے آنا۔

۲۔ سٹرینگوریا (STRANGORIA) یعنی پیشاب کا رک رک کر آنا۔

۳۔ ایسکیوریا (ISCIRIA) یعنی پیشاب کا پیدانہ ہونا۔

یہ بیماری کئی ایک امراض کی علامت ہوا کرتی ہے۔ بہت دردناک ہوتی ہے اور بعض حالتوں میں توجان کے لالے پڑ جاتے ہیں، حبس بول یا تو مثانہ کی رگوں اور پٹھوں کے شل ہو جانے کے باعث پیدا ہو جاتا ہے، یا دیگر کئی خارجی رکاوٹیں پیشاب کے اخراج کو روک دیتی ہیں۔ مثلاً پیشاب ہرنیا کے دباؤ خضیوں اور فوطوں کی سوزش یا مقعد میں پاخانہ کے جمع ہو جانے کے باعث رک جاتا ہے۔ عورتوں میں رحم یا خیمتہ الرحم کے امراض یا مرض باؤ گولہ کے باعث پیشاب میں رکاوٹ واقع ہوتی ہے۔ پتھری وغیرہ کے سبب سے بھی پیشاب کی نالی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ یا سٹرکچر یا غدہ قدامیہ کی سوزش یا خسفہ کے گھونگھٹ کے بند ہو جانے یا کچھاوٹ کے باعث پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ جب پیشاب بالکل بند ہو جاتا ہے تو مقام سیون میں بہت بوجھ سا معلوم ہوتا ہے۔ بول کی حاجت بار بار ہوتی ہے لیکن مریض خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ دریں گروہوں سے سپاری تک جاتی ہیں۔ چلنے پھرنے یا کھانسنے یا گھسی پر سے اٹھنے کے وقت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے۔ فسر اور بے چینی اس کے ہمراہ ہوتی ہیں۔

پیشاب خارج کرنے کی تمام کوشش بے سود ہوتا کرتی ہے۔ جی متلاتا ہے اور چھاتی پر بوجھ پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ چہرہ اور آنکھیں سرخ، دل کی دھڑکن تیز۔ پسینہ اور قینیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب مثانہ پیشاب سے بھر جاتا ہے۔ تو یہ پھیل جاتا ہے اور پیٹ میں اچھارہ سا معلوم ہوتا ہے۔ جب پیشاب کی رکاوٹ اس درجہ تک پہنچ جائے اور اگر جلدی پیشاب خارج نہ ہو۔ تو یہ خون میں جذب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور سمیت بول کے باعث شدت کا بخار اور بے ہوشی آ گھیرتی ہیں۔

### علاج

اگر حبس بول پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے کے باعث پیدا ہوا ہو تو کیتھی ٹر (سوا) ایک مرتبہ داخل کرنے سے یہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کی بٹی باندھنا جس سے مثانہ فوراً سکڑ جائے، یہ بھی ایک مفید علاج ہوتا کرتا ہے۔ جب مثانہ مفلوج ہو جائے تو کیتھی ٹر (سوا) استعمال کرنا چاہیے۔ بلکہ چوبیس گھنٹہ تک مثانہ میں رکھنا چاہیے۔ دیگر رکاوٹیں کا بھی مناسب علاج کرنا چاہیے۔ گرم پانی کی ٹکوراؤ۔ گرم پانی میں کوئلے تک بیٹھا بھی مفید ہوتا کرتا ہے۔

مندرجہ ذیل ادویات اکثر اس مرض میں مفید ثابت ہوتی ہیں۔

ایکونائٹ : یہ دوائی نہایت مفید ہے۔ جب کہ مثانہ میں بوجھ ہو، جنگامہ میں دروہ ہوں۔ پیشاب کے نیچے خونی تلچھٹ بیٹھتی ہو اور مثانہ کی گردن میں گڑی محسوس ہو۔ پیشاب کی خواہش متواتر بنی رہتی ہو اور خاص کر جبکہ بخار بھی ساتھ ہو۔  
خوراک : ۱ کے ۵ قطرے ایک چھٹانک پانی میں ہر ایک یا دو گھنٹہ کے وقفہ پر بوجھ حالات دینا چاہیے۔

کینتھر س : پیشاب کی تسخیر رکاوٹ، مثانہ میں درد، پیشاب کرنے کی فوری اور بے سود کوشش ساتھ ہو۔ یا پیشاب قطرہ قطرہ اور درد سے آتا ہو۔

خوراک : ۳ x ۳ ڈائی یوشن کے ۳ قطرے ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

کینالیں : جب پیشاب کی رکاوٹ بہت ہو اور حبس بول بوقت شب

واقع۔ یا پیشاب تھوڑا اور خونی آئے اور قطرہ قطرہ خارج ہو۔

خوراک : مدرٹنکچر کے ۳ قطرے ہر دوسرے یا تیسرے گھنٹے کے بعد ۔  
 نکس و امیکا : یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے ۔ خاص کہ جب کہ تھام مغز کے  
 ستون کا پھیلا جھٹہ ماؤف ہو جس کے باعث پیشاب کی بے سود حاجت بنی رہے شانہ  
 میں درد ہو اور اس میں کشتی کاوٹ ہو ، پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہو ۔  
 خوراک : ۱ x ڈائی لیوشن کے چار قطرے ہر تیسرے گھنٹے کے بعد ۔  
 پلسٹلا : جب پیشاب میں بے قرار کرنے والی درویں ہوں ۔  
 خوراک : ۱ x ڈائی لیوشن کے ۳ قطرے ہر ایک یا دوسرے گھنٹے کے بعد ۔  
 سلفر : یہ دوائی ان حالتوں میں دی جاتی ہے ۔ جب کہ پیشاب رک چکا ہو  
 اور اگر تھوڑا آئے بھی ، تو زور لگانے سے بہت درد کے ساتھ آئے اور بعض اوقات  
 اس میں خون ملا ہوا ہو ۔

خوراک : ۳ x ڈائی لیوشن کے ۳ قطرے ہر دوسرے گھنٹے کے بعد ۔  
 کیمفر : یہ دوائی ان حالتوں میں زیادہ مفید ہوا کرتی ہے ۔ جب کہ گردن  
 شانہ کے تشنج کے باعث جس ابول ہوا ہو اور یا یہ کینتھرا میڈس کا پستر لگانے سے  
 پیدا ہو گئی ہو ۔

خوراک : مدرٹنکچر کے دو قطرے کھانڈ یا مصری پروڈال کریم یا ایک گھنٹے کے  
 بعد ۔  
 کلیمیسٹس : جب کہ جس ابول سٹرکچر کے پیدا ہونے کے باعث پیدا ہوا ہو ۔  
 گرمی تھوڑی جلن اور درد ہمراہ ہوں ۔

خوراک : ۱ x ڈائی لیوشن کے تین قطرے ہر دوسرے گھنٹے کے بعد ۔  
 اوپیم : جب کہ ہسٹریکل مریضوں میں پیشاب رک جائے یا ہسٹریکے حملہ کے  
 بعد جس ابول کا مرض پیدا ہو جائے تو یہ دوائی مفید پڑتی ہے ۔  
 خوراک : ۱ x ڈائی لیوشن کے تین قطرے ہر دوسرے گھنٹے کے بعد ۔

۱۰ اس کے علاوہ سیبل سرواٹا ۵ تین سے تیس قطرے یا ۳ بہت مفید ثابت ہوا ہے ۔  
 سولی ڈاگورگا ۵ بھی بعض اوقات حیرت انگیز کام کرتا ہے ۔

## ضروری ہدایت

مریض کو گرم پانی میں بٹھانا مفید ہوتا ہے۔

## سلسل بول۔ بے ارادہ پیشاب نکل جانا

(INCONTINENCE OF URINE OR ENURESIS)

اس مرض میں پیشاب بلا ارادہ اور بے اختیار خارج ہوتا رہتا ہے۔ یہ مرض خطرناک نہیں ہے۔ لیکن تکلیف دہ بہت ہے۔

یہ مرض اکثر بڑھاپے میں زیادہ ہوا کرتا ہے اور نوجوانوں میں یا بچوں میں بھی ہو جاتا ہے جس کا باعث کمزوری یا شانہ کے عضلہ کا شل ہو جانا ہے۔ پیشاب بدل روک تھام کے قطرہ بہ قطرہ گرتا رہتا ہے اور کبھی البومی نیر یا یا ذیابیطس کے سبب سے بھی یہ شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ پیشاب کے ترش ہو جانے سے شانہ میں خراش کا ہونا۔ یا شانہ میں پتھری کا ہونا بھی اس مرض کا سبب ہوا کرتا ہے۔

بچوں میں گھونگھٹ کا لمبا ہونا یا سپاری میں خراش یا درم کا ہونا یا مقعد میں چمبونوں کی موجودگی کے باعث خراش کا ہونا۔ یا کالج نکلنا۔ باضمہ میں نقص یا رات کو سردی لگنا وغیرہ بھی اس کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔

## علاج

رات کو دو تین مرتبہ بچوں کو اٹھا کر پیشاب کروانا چاہیے تاکہ پیشاب کرنے کی باقاعدہ عادت پڑ جائے، جو بچے اس مرض میں مبتلا ہوں ان کو سونے سے پہلے بہت تھوڑا کھانا پینا چاہیے اور ان کو پیشاب کر کے سُلانا چاہیے۔ پہلو کے بل سونا مناسب ہوا کرتا ہے۔ پشت کے بل سونا بہت نقصان دہ ہے، روزانہ پیٹ کو ٹھنڈے تولیہ سے ملنا مفید ہوتا ہے۔

ایکونائٹیم: جب یہ مرض ہسٹیریا کے مزاج والی مستورات میں واقع ہو۔ یا خوف یا ٹھنڈے سے پیدا ہو۔ پیشاب چلا اور پتلا پانی کی مانند آتا ہو۔

خوراک: ۱x ڈائی یوشن کتے ۵ قطرے ایک چمچہ بھر پانی میں ہر دو یا تین گھنٹہ بعد



پیسٹرو لیم: پیشاب کا رنگ سُرخ مائل براؤن ہو اور بدبودار ہو۔  
 خوراک: ۳x ڈائی لیوشن کے تین قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
 بیلا ڈونا: خنازیری مزاج فالوں کے لیے جن کو سرد رہتا ہو۔ پاؤں ٹھنڈے  
 اور گاہے گاہے ناک سے خون بہتا ہو یہ دوائی بہت مفید ہے۔  
 خوراک: ۴x ڈائی لیوشن کے دو قطرے ہر تین گھنٹہ کے بعد۔  
 سی پیا: مرض کا نور شب کے اوّل حصّہ میں ہو اور پیشاب کرنے کی خواہش  
 بکثرت اور بے سود ہو۔

خوراک: ۳x ڈائی لیوشن کے ۵ قطرے ایک چمچ بھر پانی میں ڈال کر ہر آٹھویں  
 گھنٹہ کے بعد۔  
 سلفر: جب مریض کے جسم پر اکثر پھنسیاں نکلتی رہتی ہوں اور وہ خنازیری  
 مزاج کا ہو اور دن کے وقت پیشاب کرنے کی خواہش متواتر بنی رہتی ہو۔  
 خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے تین قطرے صبح اور شام  
 سائنا یا سپائی جلیا۔ جب مرض کا باعث چمبونوں کی موجودگی ہو تو ان ادویات  
 میں سے کوئی ایک دینی چاہیے۔  
 خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے دو قطرے ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔  
 جلسی میم: شانہ کا ڈھیلا پڑ جانا۔ یا شل ہو جانا اور پیشاب کا شب و روز  
 بے اختیار نکلتے رہنا۔

خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے تین قطرے ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔  
 مولین آئیل: یہ اس مرض کے لیے ایک خاص دآزمودہ دوائی ہے۔  
 خوراک: ۵ یا ۱x دن میں چار مرتبہ۔  
 مذکورہ بالا ادویات کے علاوہ کاسٹیکم۔ کینتھرمس۔ نکس و امیکا۔ کو نیم ایسڈ فاس۔  
 پوڈوفائیلیم۔ کلکیریا کارب۔ نائٹرک ایسڈ۔ ادپیٹ۔ لائیکو پوڈیم۔ ایسڈ بنزائیکم ٹیری بن  
 تھینا۔ سلیشیا اور کھومیل وغیرہ ادویات اپنی اپنی علامات کے ساتھ مستعمل ہوتی ہیں۔

### ضروری ہدایات

چونکہ یہ ایک عارضہ ہے۔ اس لیے مریض بچوں کو جسمانی سزا دینے سے کچھ فائدہ

نہیں ہوا کرتا، یہ علاج ہی سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس مرض کا تدارک کرنے سے پہلے سبب کا معلوم کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔ دن کے وقت پیشاب روکنے کی مشق کرنی چاہیے۔ تمام نمکیں تیز اور ترش اشیاء کا کھانا۔ بئر، شراب، چائے اور کافی کا پینا ممنوع ہے۔ گوشت بھی حتیٰ الوسع کم کھانا چاہیے۔ پھل بھی تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور ایسی کوئی غذا نہیں کھانی چاہیے جو نفخ پیدا کرنے کا باعث ہو۔ سہ پہر اور سوتے وقت کے درمیان گرم اشیاء نہیں کھانی چاہئیں۔ سلوہ پانی پینے کے لیے ایک اچھی چیز ہے۔ ٹھنڈا صاف پانی یا لعاب دار اشیاء کا استعمال پیشاب کی ترشی کو کم کرنے میں مددگار ہوا کرتا ہے۔ مریض کو کھلی ہوا میں سیر کرنی چاہیے اور ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے۔

## بول الدم - خونی پیشاب آنا

(HAEMATURIA.)

اس مرض میں پیشاب خون آمیز آیا کرتا ہے۔ علامات مرض: کبھی خون پیشاب سے قبل اور کبھی مابعد آتا ہے اور کبھی پیشاب کے ساتھ ملا ہوا آتا ہے اور کبھی خالص خون ہی بجائے پیشاب کے آتا ہے۔ بعض کمزور اشخاص میں جب خونی پیشاب آنے کا سبب شدت کی سردی ہو۔ تو پہلے مریض کو جاڑا معلوم ہوتا ہے وہ کا پتا ہے، پھر کم و بیش خون پیشاب کے ساتھ آتا ہے۔

اسباب مرض: گردہ مثانہ میں پتھری کا ہونا شدید دم گردہ، گردہ میں رسولی، مادہ سل کا موجود ہونا۔ چوٹ لگنا۔ غدہ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ) و نائزہ کے بعض امراض۔ بعض خراش دار ادویات مثلاً ٹرین ٹائن یا کینتھرائیڈس کا رباک ایڈ وغیرہ استعمال کرنا۔ بوا سیر کے خونی کایا یک بند ہو جانا۔ بعض عورتوں کو بجائے خون حیض کے پیشاب میں خون آنے لگتا ہے۔ کبھی سخت سردی لگنے سے خونی پیشاب جاری ہو جاتا ہے۔ رنج و غم وغیرہ یا ولی صدعات بھی اس شکایت کے پیدا کرنے کا موجب ہوا کرتے ہیں۔ بعض بخاروں میں بھی کبھی خونی پیشاب

آجایا کرتا ہے۔ مثلاً میر یا وغیرہ۔

نوٹ : ۱۔ اگر خون گردے سے آئے تو کمزری نہایت شدید درد ہوا کرتا ہے اور سردی بھی لگتی ہے۔ تشویش اور حاجت پیشاب ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ رانوں میں بہت ٹھنڈک معلوم ہوتی ہے اور اگر خون مثانہ سے آئے تو مریض کو شکم کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے۔ آلات بول اور مقعد میں گرمی اور خراش ہوتی ہے، درد مقام سیون سے حشفہ تک جاتا ہے۔ اور خون آمیز پیشاب آتا ہے۔ جب نائزہ سے خون آتا ہے۔ تو خون خالص خارج ہوتا ہے۔ پیشاب کے ساتھ ملا ہوا نہیں آتا اور خون آنے سے پیشتر پیشاب کی حاجت مجبور نہیں کرتی۔ جب پیشاب کے ہمراہ پیپ ملی ہوئی ہو تو معاملہ بہت خطرناک ہوا کرتا ہے اور اس کے ٹھیک کرنے میں بہت ہوشیاری اور تجربہ کاری درکار ہوتی ہے۔

۲: یہ مرض اکثر بڑھاپے میں ہوا کرتا ہے۔ مستورات کی نسبت مردوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض کیسوں میں تو خون بہت کم آتا ہے۔ لیکن بعض میں اتنا زیادہ خون آتا ہے کہ مریض کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔

### علاج

ایکونائٹ : جب مریض دمو میزاج کا ہو۔ یا مرض کا باعث بیرونی اثرات

ہوں۔

خوراک : ۱x ڈائی یوشن کے پانچ قطرے ایک چھٹانک پانی میں ہر تھیرے گھنٹے کے بعد۔

کینتھیرس : جبکہ پیشاب درد اور تکلیف سے آئے شکم کے نچلے حصہ میں کاٹنے والی اور تسخنی در دیں ہوں۔ پیشاب کے ہمراہ خون ملا ہوا آئے یا خون اور پیپ یا صرف خون ہی نائزہ سے متواتر خارج ہوتا رہے۔

خوراک : ڈائی یوشن کے چار قطرے ہر تین گھنٹے کے بعد۔

میزیریم۔ ہما میلس : اس عارضہ میں یہ دونوں ادویات بڑی ضروری ہیں۔

جب درد خفیف ہو اور خون شاذ و نادر ہی منجمد ہوتا ہو۔ تو میزیریم دوائی نہایت مفید پڑتی ہے۔ لیکن جب اجزائے خون بکثرت ہوں اور خون کا جوش مقام ماؤف کی طرف

زیادہ ہو اور پیشاب کرنے کی حاجت بہت ہو۔ تو ہامیلین دوائی بہت مفید ہوتی ہے۔

خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے ہر تیسرے گھنٹے کے بعد۔

نکس و امیکا۔ سلفر۔ کلکیریا کارب: یہ ادویات نہایت مفید ہوتی ہیں جبکہ

مریض کا باعث بواسیر کا دب جانا یا بکثرت شراب نوشی اور کمر میں بہت درد ہو اور

نائیزہ میں جلن ہو۔ کلکیریا کی خاص علامت یہ ہے کہ خون بوٹیوں میں خارج ہوتا ہے۔

خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد۔

یہ تینوں ادویات اگر باری باری سے دی جائیں تو اثر نہایت مفید رہتا ہے۔

پلسٹلا: یہ دوائی مستورات کے لیے مفید ہے۔ جبکہ خون سیاہ بوٹیوں میں خارج ہو۔

مردوں کے لیے بھی یہ دوائی تجویز کی جاسکتی ہے۔ جب کہ ناف کے ارد گرد ایسا محسوس

ہو جیسے کوئی چیز کاٹ رہی ہے، درد کمر تک پھیلتا ہو اور نائیزہ میں جلن ہوتی ہو۔

خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے پانچ قطرے ہر تیسرے گھنٹے اور اگر اس کے بعد

کلکیریا کارب دیا جائے تو نتیجہ اعلیٰ برآمد ہوتا ہے۔

مرکیورس: یہ دوائی نہایت مفید پڑتی ہے جبکہ پیشاب نیند میں خارج ہو جاتا

ہو اور اکثر احتلام بھی ساتھ ہو جاتا ہو۔

خوراک: ۶x ڈائی لیوشن کے تین قطرے دن میں دو مرتبہ۔

کلیمیسٹس: یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ پیپ خارج ہو۔ پیشاب کرنے کے

آغاز میں جلن ہو۔

خوراک: ۱x ڈائی لیوشن کے تین قطرے ہر تیسرے گھنٹے کے بعد۔

ہیپر سلف: یہ دوائی اس وقت زیادہ مفید ہوتی ہے۔ جبکہ نائیزہ یا مثانہ

کی رطوبتی جھلی بہت متورم ہو اور اس میں سے سبز یا زرد رنگ کا مواد خارج ہو

اور پیشاب کا رنگ سُرخ یا براؤن ہو۔

خوراک: ۳x ڈائی لیوشن کے ۵ قطرے ہر چھ گھنٹے کے بعد۔

یو اے آر سی: جب کہ پیشاب کیچڑ کی مانند پیپ دار آئے، خون آمیز ہو اور خواہ نہ ہو

خوراک : x مدر ٹیکر کے چار قطرے ہر چھ گھنٹہ کے بعد  
 اری جیرن : ڈاکٹر ہمپل صاحب فرماتے ہیں کہ بول الدم کے عارضہ میں اری  
 جیرن کو کبھی نہیں بھڑکانا چاہیے۔ خون چمکدار سرخ۔  
 خوراک : ۵ کے ۵ قطرے دن میں چار مرتبہ۔

### ضروری ہدایات

شراب و گوشت وغیرہ سے پرہیز لازمی ہے اور جو باتیں خواہش نفسانی  
 کو بھڑکانے والی ہوں تو ان کو ترک کر دینا چاہیے۔ اگر مرض کا باعث بواسیر کا  
 دب جانا یا جھن کے خوں کا نہ آنا ہو تو مریض کو لازم ہے کہ کھلی ہوا میں درزش کیا کرے۔

## سمیت بول پیشاب کا زہر چڑھنا

(UREMIA)

اس مرض میں خون زہر آلودہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پیشاب کے زہریلے مادے اس  
 میں جذب ہو جاتے ہیں۔ ہڈیاں، تشنج اور بے ہوشی وغیرہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔  
 علامات مرض : پیشاب کی بدبو مریض کے سانس سے آنے لگتی ہے اور  
 غنودگی۔ ہڈیاں اور بے ہوشی ہوتی ہے۔ طرح طرح کی تشنجی حرکات ظاہر ہوتی ہیں  
 سر چکراتا ہے اور اس میں بہت سخت درد ہوتا ہے۔ پیشاب بہت ہی تھوڑی  
 مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

اسباب مرض : پیشاب کا پیدا ہونا اور پیشاب کے زہریلے اجزاء کا  
 الی میں جذب ہو جانا۔ مثلاً میں پیشاب کا رکنا رہنا امراض گروہ۔ گردوں اور مثلاً  
 کی درمیانی نالیوں میں رکاوٹ کا ہونا۔

### علاج

کاربالک ایسڈ : ۲x ہر پندرہ منٹ کے بعد دیں، اگر اس سے کوئی آرام  
 نظر نہ آئے تو اوپیم ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد دیں یا ارنیکا یورنزہ کے پانچ قطرے  
 ہر چار گھنٹہ کے بعد دیں۔ اگر تشنج ہوتے ہوں تو کوپریم ایسی ٹیٹ ۳x ہر پندرہ منٹ  
 کے بعد دیں۔

## ضروری ہدایات

گودہ کے مقام پر سینک دیں، گرم غسل دیں یا گرم چادروں میں لپیٹیں، تاکہ خوب کھل کر پسینہ آجائے گرم گرم پلٹس باندھیں۔ شیر گرم پانی کے ساتھ انیما کریں۔  
غذا: مریض کو سوائے دودھ کے اور کچھ نہ دیں۔

## خراش و جلن مثانہ۔ تشنج مثانہ۔ پیشاب کا تکلیف سے آنا

(IRRITABILITY OF THE BLADDER AND SPASM OF BLADDER STRANGUARY)

اس مرض میں پیشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے، چنانچہ ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ پیشاب مقدار میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور جلن دھن یا تشنجی درویں۔ پیشاب کرتے وقت ہوتی ہیں اور یہ درویں مثانہ میں اور بعض اوقات قصب کے سرے تک بلکہ رانوں تک جاتی ہیں۔ ابتداء میں تو پیشاب میں چنداں طبعی تبدیلی نہیں ہوتی لیکن جب مرض دیرینہ ہو جائے تو پیشاب کے ہمراہ پیپ یا گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے (نزله مثانہ)

مریض پیشاب کو روک نہیں سکتا اور اگر روکے بھی تو پیڑوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ یہ عارضہ بچوں میں بعض اوقات کرموں کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔  
نوٹ: بحالتِ صحت ایک شخص دن رات میں پانچ چھ مرتبہ پیشاب کرتا ہے اور عموماً رات کے وقت اس کو جاگ کر پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی لیکن جب مثانہ میں کسی قدر سوزش ہو تو مثانہ کی عبادار جھلی متورم ہونے کی وجہ سے زیادہ نہیں پھیل سکتی۔ اس لیے جب پانچ یا چھ اونس بلکہ اس سے بھی کم مقدار میں پیشاب مثانہ میں جمع ہو جاتا ہے تو پیشاب خارج کرنے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بحالتِ تندرستی بدوں کسی تکلیف کے مثانہ پندہ یا سولہ اونس پیشاب اپنے اندر رکھ سکتا ہے۔

اسبابِ مرض: سوزش مثانہ، پتھری، سوزاک اور نفرس، ہسٹیریا وغیرہ بد معنی نظامِ عصبی کی خرابی، چرنے یا سوتی کیڑے یا پیشاب میں زیادہ ترشی کا پیدا

ہو جانا۔ یا کسی خراشدار مادہ کا خارج ہونا۔ مستورات میں رحم کا ٹل جانا۔ یا آیامِ حمل وغیرہ۔

### علاج

ایپس : پیشاب جلنے کی حاجت بار بار ہو اور خفیف جلن ہوتی ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کینتھرمن : حاجت لگاتار ہو۔ لیکن پیشاب کے صرف چند قطرے خارج ہوں

جلن دار ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بربریس : مجری البول میں جلن دار کاٹنے والی دردیں دورانِ پیشاب میں یا پیشاب

کرنے کے بعد ہوتی ہوں۔ حاجت بار بار ہوتی ہو۔

خوراک :  $5$  کے پانچ قطرے ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

یٹری بن تھینا : مقامِ گردہ، شانہ اور پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہو اور دقت

سے آتا ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

کوپے با : بوڑھی مستورات کے مجری البول اور گردنِ شانہ میں جلن و خراش ہوتی ہو

خوراک :  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فرم فاس : پیشاب بار بار آتا ہو اور خصوصاً دن کے وقت۔

خوراک :  $4 \times$  سفوف کے  $5$  گرین ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : نقرسی یا شرابی اشخاص کے شانہ میں خراش ہوتی ہو اور بار بار پیشاب

کرنے کی اور پاخانہ جانے کی حاجت ہوتی ہو۔ لیکن بہت تھوڑا یا بالکل ہی نہ آتا ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سنے گا : سوتے وقت پیشاب بے اختیار نکل جاتا ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

بیلڈونا : سوتے وقت پیشاب خواہ دن کو اور خواہ رات کو خارج ہوتا رہتا ہو۔

خوراک :  $1 \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

کاشی کم : کھانے یا پھینکنے پر پیشاب بے اختیار نکل جاتا ہو۔

خوراک : ۱ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

لائیکو پوڈیم : جب کہ پیشاب میں سرخ ریگ بہت خارج ہوتی ہو اور مثانہ میں خراش ہو۔

خوراک : ۶ x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کیمفر : ناگمانی دردناک حاجت پیشاب کی ہو جاتی ہو۔

خوراک : ۵ کے دو قطرے ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

کو لھے تک گرم پانی میں بیٹھنا مفید ہوتا ہے، مرض کے اصل سبب کو دور یافتہ کر کے اُس کے مطابق اس کا علاج کریں۔

## مثانہ کی سوجن، ورم مثانہ

(INFLAMMATION OF THE BLADDER)

۱۔ مثانہ کی شدید سوجن کا عارضہ شاذ و نادر ہی ہوتا کرتا ہے۔ سوزاک، پتھری یا صدمہ

یا چوٹ یا کسی اوزار کا مثانہ میں داخل کرنا۔ اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ گاہے سردی لگنے یا بھگنے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

**علامات مرض :** مقام مثانہ میں عموماً درد، گرانی، دبانے سے تکلیف اور

سخت خراش ہوتی ہے۔ پیشاب کرتے وقت تشنجی دریں ہوتی ہیں بہت زور لگانا

پڑتا ہے اور بعض اوقات پیشاب کے ہمراہ مادہ یا پیپ خون آمیز خارج ہوتی

ہے۔ جب شدید ورم مثانہ ہو تو بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جی متلاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ

سوزش پیشاب کی نالیوں گردوں یا رحم تک بھی پھیل جاتی ہے اور مرض نڈھال ہو

جاتا ہے اور بحالت ہریان راہی ملک عدم ہو جاتا ہے۔

۲۔ مثانہ کی پُرانی سوجن (مثانہ کی مزمن ورم) یہ مرض عام ہے اور بعض اوقات یہ

شدید مرض کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ یا پتھری، امراض غددہ قدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ) سٹریکچر

دیگرہ کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے اور سونے کے دخول کے بعد یہ ورم اکثر باقی رہ جاتی

ہے۔ مثانہ میں خراش رہتی ہے۔ باقی علامات وہی ہوتی ہیں جو کہ شدید ورم مثانہ میں



اوپر درج کی گئی ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ علامات زیادہ شدید نہیں ہوتیں۔ پیشاب میں بلغم بکثرت خارج ہوتا ہے۔

### علاج

شدید درمِ مٹانہ میں ایکونائٹ، کینتھرس، ڈلکاماراد وغیرہ۔  
مزمن سوزشِ مٹانہ میں کینتھرس، پلسٹا، ہنز ایک ایسڈ، ٹائٹریک ایسڈ اور  
چمائیلا وغیرہ۔

### بہت ادویات کی علامات کی تشریح

کینتھرس: جب مرض شدید ہو اور پیشاب آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہو اور پیشاب  
قطرہ قطرہ جلن تکلیف کے ساتھ خارج ہوتا ہو۔  
خوراک:  $x$  کے ۵ قطرے ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
پلسٹا: جب رات کے وقت پیشاب خود بخود نکل جاتا ہو۔  
خوراک:  $x$  ۳ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
ہنز ایک ایسڈ: پیشاب سے گھوڑے کے پیشاب کی مانند بو آتی ہو۔  
خوراک:  $x$  ۲ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔  
ایکونائٹ: ابتدائی حالت میں جبکہ تکلیف بہت زیادہ ہو اور سوزشی علامات  
ابھی تازہ ہوں۔

خوراک:  $x$  ۲ ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔  
چمائیلا: جب دیگر ادویات ناکام ثابت ہوں، تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔  
خوراک: ۵ کے پانچ قطرے ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

مٹانہ پر گرم گرم ٹکڑ کرنا اور شدید کیوں میں کمر کے بل چپ چاپ لیٹے رہنا۔  
گرم ہپ باجھ رکھنے تک گرم پانی میں بیٹھنا، شکم پر بھسکی ہوئی پٹی باندھنا۔ مٹانے کا  
دھونا۔ یہ سب احمدمفید ہیں لیکن مٹانہ کے دھونے کا عمل ایک ہوشیار ڈاکٹر ہی کر سکتا  
ہے، شراب، کباب، سرخ مرچ، دگرم مصالحہ، اچار، چٹنی اور مٹھائی سے پرہیز کرنا  
اور دودھ، آتش جو، ساگودانہ وغیرہ غذاریں۔

## باب ہفتم

## جلد۔ بال اور ناخن کے امراض

## جلد کا سرخ ہو جانا

(ERYTHEMIA)

اس مرض میں جلد جسم سرخ ہو جاتی ہے اور درم یا آبھار نہیں ہوتا شروع مرض میں بے چینی اور اعضاء شکنی ہوتی ہے۔ کبھی تھوڑا بخار بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ نہ تو خارش ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ جلن ہوتی ہے۔

اسباب مرض: پرانی بد مضمی، کھانا کھانے کے بعد جلد سرخ ہو جاتی ہے۔ اور چہرہ تماتا ہے۔ گرم ہوا یا تیز دھوپ۔ کسی جقتہ جسم کی جلد کا باہم رگڑ کھانا وغیرہ۔

## علاج

بیلادونا: ایک خاص دوائی ہے۔ نیز ایکونائٹ، ایپس، رٹاکس، کالی بائی کرومیکم۔ نکس دامیکا۔ برائی اوینا۔ فیکانم سیفرم۔ آر سینیکم، زینن کیولس بیومس اودیات کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

کھلی ہوا میں روزانہ درز کش کیا کریں، کھانا چبا کر کھائیں۔  
غذا سادہ کھائیں اور جلد جسم کو صاف رکھیں، اگر تیز دھوپ یا لو لگنے سے یہ مرض ہو تو تازہ مکھن یا بادام روغن یا دیزلین جلد پر ملیں اور دھوپ دلو سے جسم کو محفوظ رکھیں۔

## پتی اچھلنا۔ پتی چھپاکی

(URTICARIA, NETTLE - RASH)

اس مرض میں گول گول سُرخ پتلی یا سفید دھتے تمام جسم پر نمودار ہو جایا کرتے ہیں

اور اُن میں شدت کی خارش اور جلن ہوتی ہے اور پھر وہ غائب بھی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن پھر وہ ظاہر ہو جایا کرتے ہیں اور اسی طرح سے چند یوم مریض کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب مرض پُرانا ہو جائے تو مہینوں اور برسوں تکلیف بنی رہتی ہے۔ شدید مرض میں نحیف بخار بھی عموماً ہو جایا کرتا ہے۔

**اسبابِ مرض:** بد ہضمی غذا میں بد پروہیزی، گرم یا تیز اغذیہ، مثلاً نمکین گوشت یا پھلی وغیرہ کا کھانا۔ ترش پھل کھانا، بچوں میں دانت نکالنا۔ بعض ادویات مثلاً کوپسبا یا ردغن تارپین وغیرہ کا استعمال کرنا۔ بعض اشخاص میں کسی خاص قسم کی غذا یا اشیاء کے کھانے سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً بعض میں آم یا بینگن وغیرہ کے کھانے سے بعض امراضِ رحم یا دیگر امراض کے سبب سے بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اور بہت عرصہ تک تکلیف دیتا رہتا ہے۔ ٹھنڈ کا لگنا۔ بھینگنا۔ یکا یک موسم کا تبدیل ہو جانا۔ اس مرض کے اسبابِ مؤیدہ ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کا سبب البرجی ہے۔

### علاج

- ۱۔ سادہ مرض میں ایپس۔ آرٹیکا یورنز۔ ایکونائٹ، کلورل ہائیڈریٹ
  - ۲۔ بد ہضمی کی وجہ سے۔ اینٹم کوڈوم۔ نکس و امیکا۔ پستلا
  - ۳۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ایکونائٹ۔ ڈکامارا
  - ۴۔ دیرینہ مرض میں آر سینکم۔ چینم صلف۔ ایپس۔ سلفر۔ کلورل ہائیڈریٹ
- نیزم میور۔

نوٹ: اس مرض میں آرٹیکا یورنز ایک نہایت معتبر دوائی ہے۔ یہ ۵ یا ۲x طاقت میں ہر چار گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے۔

### ضروری ہدایات

گرم پانی میں بیٹھا بہت مفید ہوتا ہے۔ لیموں کے ٹکڑے کاٹ کر جسم پر ملنے سے جلن اور گرمی کو آرام آ جایا کرتا ہے۔ سادہ غذا کھانا اور خشک و معتدل آب دہوا میں رہنا چاہیے جسم کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ قلیل اغذیہ سے پروہیز کریں

# مہاسے - کیل

(ACNE PIMPLES)

اس مرض میں چھوٹے نوکیلے دانے چہرے گردن یا سینے پر پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دانے پک جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کیل نکل آتے ہیں اور تھوڑی سی پیپ بھی خارج ہوتی ہے۔ جب چکنا ہٹ پیدا کرنے والے غدودوں کی رطوبت بند ہو جاتی ہے تو یہ کیل نکل آتے ہیں۔

اسباب مرض : جوانی میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔ خون کی خرابی یا نقص ہاضمہ کی وجہ سے یہ بیماری ہوا کرتی ہے۔ نیز گرم اغذیہ کا کھانا اور قبض رہنا بھی اس کے اسباب ہیں۔ کبھی خون بوا سیر کے یکایک بند ہو جانے سے بھی یہ عارضہ ہو جایا کرتا ہے۔ حیض میں نقص ہو جانے کی وجہ سے جوان عورتوں کو کیل نکل آیا کرتے ہیں اور آیام حمل میں بھی یہ مرض ہو جایا کرتا ہے، جو نوجوان مشقت زنی کی بدعات میں مبتلا ہوا کرتے ہیں اور ان کا ہاضمہ بوجہ عصبی کمزوری کے خراب ہو جاتا ہے۔ ان کو بھی یہ مرض تنگ کرتا رہتا ہے۔

بعض ڈاکٹروں کا یہ قول ہے کہ یہ ایک متعدی مرض ہے اور ایک شخص سے دوسرے کو لگ جاتا ہے اور اس کا سبب ایک ماص قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو نوجوان کھٹیا قسم کے صابن منہ پر ملتے رہتے ہیں۔ ان کو بھی منہ پر کیل نکل آیا کرتے ہیں۔

## علاج

بیلادونا : دومی مزاج کے اشخاص کو جب سرخ کیل تنگ روستے ہوں تو یہ دوائی شانی ہوتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

پلسٹلا : نوجوان مستورات کے لیے یہ دوائی مفید ہوتی ہے۔ جبکہ ماہواری آیام میں نقص ہو اور چہرہ زرد ہو۔ طوے اور تھلیاں گرم رہتے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورک ایسڈ : کمزور اشخاص کے لیے -

خوراک : ۳ x ہر چار گھنٹہ کے بعد -

ہائیڈروکوٹائیل : جب یہ مرض خون کی خرابی کی وجہ سے ہو یا جب کہ مستوراً کے ماہواری خون میں بے قاعدگی ہو -

خوراک ۵ کے دس قطرے نصف چھٹانک پانی میں ڈال کر دن میں دو مرتبہ یا ۳ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد -

### ضروری ہدایات

مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو دور کریں، اگر ہاضمہ کی خرابی یا قبض کی وجہ سے ہو تو اس کا مناسب علاج کریں۔ خودتوں میں ماہواری آیام کو درست پر لائیں، سُرخ مرچ اور گرم مصالحہ کم کھائیں، تازہ ہوا اور صاف پانی اور صاف شہرار ہنا۔ یہ سب ضروری ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں غسل بھی مفید ہوتا ہے منہ پر دہی کی بالائی ملنا بھی مفید ہوتا ہے -

### مزید ادویات کی تشریح

(از ڈاکٹر خورشید احمد خان ایم۔ اے۔)

آرسنک آئیوڈیٹیم : کیل سخت - بڑ سخت - نوک میں پیپ یا مواد بھرا ہوا گاڑھی زرد رطوبت نکلے -

آرسنک بروڈیٹیم : چہرے پر سُرخ رنگ کے کیل (ACNE ROSACEA) جن کی زیادتی موسم بہار میں ہو - بنفشی رنگ کے ابھار -

آرم میوز نیوٹروٹیم : کیل جن میں خارش ہو خصوصاً ان مستورات کے لیے جن میں جنسی تکالیف اور حیض کی خرابیاں موجود ہو

انٹی مونیم ٹارٹ : خدی قسم کے کیل جن میں پیپ پڑنے لگے -

انٹی مونیم کروڈم : زبان سفید - معدہ خراب - پیاس - چہرے پر چھوٹے

چھوٹے سُرخ دانے - جیسے کیردوں کے ڈنک مارنے سے ابھرتے ہیں -

بربرس ایکوی فولیم : جلد کھردری - خشک - چھلکے اتریں -

بووسٹا: کریم پوڈر وغیرہ کے استعمال سے کیل نکلتے ہوں جن کی زیادتی موسم گرمیوں میں ہو۔

جنگنس ریجیا: چہرے کے کیل ایسی مستورات کے جن کو ماہواری میں سیاہ لوتھڑے آتے ہوں اور ماہواری جلد ہو جاتی ہو۔ پیٹ پھولا ہوا ہو۔  
تھو جا: سائیکوٹک مزاج، مٹے نکلیں کھلی کرنے سے تکلیف میں زیادتی۔  
جلد خشک۔

سلفر: مزمن تکلیف۔ جلد سخت اور کھردری۔ پانی سے زیادتی ACNE

(PUNCTATA)

سلفر آیوڈیٹم: ACNE ROSACEA: ضدی مرض  
شگونیریا: مستورات کے لیے خصوصاً مفید ہے۔ قلت حیض۔ دوران خون  
بے قاعدہ۔

کالی بروٹیم: جنسی بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا شدہ تکلیف۔ کیل سخت۔  
اعصابی مستورات کے لیے۔

کلکیریا پکراٹا: چہرے کی ہڈیوں پر جہاں گوشت کم ہو اگر بار بار پھنسیاں نکل  
آئیں تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

کلکیریا سلف: کیلوں سے پیپ خارج ہوتی ہو۔

کلکیریا کارب: مستورات جن کا زحمان فریبی کی طرف ہو۔ جنسی خرابیاں ہوں۔  
کاربو انیملس: تانبے کے رنگ کے سرخی مائل دانے۔

لاپا آکٹیم: یہ بھی نوجوان لڑکیوں کے چہرے اور گردن پر کیل۔ پمپلز وغیرہ  
کے لیے مفید ہے۔

لیڈم پال: چہرے اور رخساروں پر سرخ کیل۔ پھیرنے پر ڈنک لگنے کا سا

درد ہو۔

نکس و امیکا: جلد سرخ اور دھبوں والی۔ مرغی غذا اور چٹ پٹی اشیاء  
کے شوقین۔

نیزم میور: چہرہ ہر وقت چکنا رہے۔ نمکین اشیاء کی خواہش قیض ہو۔

یوجینیا جمبوس : عام کیل - سخت کیل - سرخ کیل - کیل کے ارد گرد دالی جگہ

میں درد ہو۔

## خارش - سوکھی کھجلی (PRURIGO)

اس مرض میں جسم پر شدت کی خارش ہوا کرتی ہے۔ جلد جسم خشک اور کھردری ہوتی ہے اور جسم پر چھوٹی چھوٹی پھنسیاں متفرق طور پر گاہے گاہے نکل آتی ہیں اور مریض کو سخت کھجلی ہوتی ہے کھجلائے کھجلائے چمڑہ چھل جاتا ہے اور لہو نکل آتا ہے نیند خراب ہو جاتی ہے اور مریض سخت وق ہوتا ہے۔

اسباب مرض : خون کی خرابی - نقص ہاضمہ، غلیظ و میلہ کچیلار ہنا فعل جگر کا درست نہ ہونا - مستورات میں ماہواری آیام کی خرابی اور آیام عمل وغیرہ۔

### علاج

سلفر : یہ مشہور دوائی ہے۔ شدت کی کھجلی، جلد جسم خشک، پیاس، رات کو بستر میں کھجلی زیادہ۔ یہ دوائی اس مرض میں اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

خوراک : ۱۲ x یا ۳۰ دن میں تین مرتبہ۔

آر سینیکم : کھجلی کے ساتھ جلن ہو۔ مریض سخت کمزوری محسوس کرتا ہو۔ مزمن مرض میں یہ دوائی نافع ہوتی ہے۔

خوراک : ۳ x یا ۱۲ دن میں تین مرتبہ

ہائیڈرو کوٹائیل : یہ اعلیٰ درجہ کی مصفی خون دوائی ہے۔ کھجلی نہایت شدید ہو۔ بلکہ ناقابل برداشت ہو۔

خوراک : ۴ کے دس قطرے صبح، دس قطرے دوپہر اور دس قطرے شام

نصف چھانک پانی میں ڈال کر۔

دیگر ادویات : لائیو پوڈیم - رٹاکس - رو میکس - کرسس، میزیریم

کاربوویکی - اپوسائیٹیم - ریڈیم - بعض اوقات اس مرض میں جادو کا اثر دکھائی

ہے۔

## ضروری ہدایات

غذا صحت بخش اور باقاعدہ وقت پر کھائیں تازہ ہوا میں سیر کریں۔ روزانہ سرد یا نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ جسم کو صاف ستھرا رکھیں۔ منشیات، مٹھائی اچار اور ثقیل غذیہ سے پرہیز کریں۔ جب کھجلی نہایت شدید ہو تو میز پریم دوائی ایک حصہ اور پانی دس حصے ملا کر لوشن تیار کریں اور کھجلی کے مقام پر ملیں۔ اس سے بعض اوقات فوری آرام ہو جاتا ہے۔ مرہم یا دیگر کسی تیز دوائی کو جسم پر نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس سے کھجلی کا مادہ دب جاتا ہے اور یہ نہ ہر کسی اور مقام پر جانہوار ہوتا ہے اور زیادہ خطرناک امراض کے پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے اگر مستورات میں ماہواری آیام کی خرابی ہو تو اس کا مناسب علاج کریں، میٹھے تیل کی مالش بھی مفید ہوتی ہے۔

## پچھان - نار فارسی - ایکزیما

(ECZEMA)

اس مرض میں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں بہت تعداد میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان میں شدت کی خارش درد اور جلن ہوتی ہے، مقام ماؤف بہت سرخ ہو جاتا ہے تیسرے یا چوتھے روز ان پھنسیوں میں رطوبت بھر جاتی ہے اور پھٹ کر یہ رطوبت بطور کھرنڈ یا پیپڑیوں کے جم جاتی ہے اور ان کھرنڈوں کے نیچے ایک پتلی رطوبت مثل پانی کے پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ مرض سر پر بہت ہوتا ہے اور بعض اوقات چہرہ پر بھی شیرخوار بچوں سے لے کر بوڑھوں تک یہ مرض ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض: سخت سردی یا سخت گرمی عام جسمانی کمزوری، نقص ہاضمہ امراض نقرس و وجع المفاصل، مقامی خراش، پتھوں میں پیٹ کے کپڑے یا دانت نکالنا اس مرض کے اسباب ہیں۔ یہ مرض بعض اوقات موروثی بھی ہوتا ہے، نوجوانوں میں کثرتِ کار، فکر و اندیشہ اور بے قاعدگی غذا سے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔



## علاج

جتنی نم سلف، رٹاکس، کینتھرس، میزیریم، سلفر، پٹرو لیم، بیلادونا، کرون، ٹیکسیم، ہیرسلف، کلیریکارب - اولی انڈر - ایومینا - گریفائٹس ایسڈ نائٹرک، سلیشیا، نکس و امیکا - لائیکوپوڈیم اور ہائیڈرو کوٹائیل وغیرہ

## ضروری ہدایات

مقام ماؤف کو بہت صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ سرد یا شہر گرم پانی سے دھونا چاہیے اور پھر کرون ٹیکسیم x ۲ یا ۳ ڈائی لیوشن بنا کر اس کے اوپر لگانا چاہیے اکثر تو ایک ہی مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ دو تین مرتبہ لگانے سے آرام ہو جاتا ہے۔

کاربالک ایسڈ کی مرہم (ایسڈ کاربالک ہین قطرے، ویزلین ایک اونس) لگانا مفید ہوتا ہے۔ خارش کا بھی آرام ہو جاتا ہے اور صحت بھی جلدی ہو جاتی ہے۔ ہسمتھ کی مرہم (ہسمتھ ایک ڈرام، ویزلین دو اونس) بھی جلد کو دور کرنے میں سرچ تاثیر ہوتی ہے۔ مقام ماؤف پر کپڑوں کی رگڑ نہیں لگنی چاہیے کمزور بچوں اور نوجوانوں کو کاڈلور آیل استعمال کرنا چاہیے۔ شراب، کباب، گوشت، انڈے، لہسن، پیاز، سرخ مرچ گرم مصالحہ اور مینگن نیز ترش اور میٹھی اشیاء سے پرہیز لازم ہے۔ دودھ ایک عمدہ غذا ہے نیز ٹھنڈی سبزی ترکاری مثلاً ٹنڈے یا مونگ کی دھل ہوئی دال وغیرہ مفید ہیں۔

## چمبل، اپرل سوریس

(PSORIAS)

اس مرض میں چھوٹے چھوٹے گلابی رنگ کے آبشار جلد پر پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ آبشار آہستہ آہستہ بڑھتے جاتے ہیں اور بہت سے مل کر ایک جال سا بنا دیتے ہیں۔ ان میں خارش بہت ہوتی ہے۔ جو کہ مریض کو تنگ کرتی ہے۔ اسباب مرض: نقص ہاضمہ، غلیظ و گندہ رہنا، کثرت شراب خوری، امراض

نقرس، وجع المفاصل یا آتشک وغیرہ زیادہ دماغی محنت کرنا - ناکافی اور خراب غذا کھانا - تشویش و فکر بھی اس کے اسباب ہیں -

### علاج

ہائیڈرو کوٹائل : ۵ دس قطرے صبح، دس دوپہر اور دس شام کو نصف چھٹک پانی میں ڈال کر -

مرکیورس - آیوڈیم - ایڈنائٹرک - آئرس، سلفر، لائیکو پوڈیم - نکس جو گلازہ - کالی ہائیڈرائڈیم، پٹرولیم، ایڈ کاربالک - آرسینیکم وغیرہ ادویات کام آتی ہیں -

### ضروری ہدایات

ماؤن مقام کو گرم پانی سے دھو کر صاف و ستھرا رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر کرائی سا دبی نم کی مرہم (ایڈ کرائی سا رو بی نم نصف ڈرام - دیزلین دو ادس) دن میں ایک مرتبہ لگائیں - یہ چھب کو دور کرنے میں اکیر کا حکم رکھتی ہے ہاضمہ کو درست کریں - مقوی غذا کھائیں اور تازہ ہوا میں سیر کریں -

### آبلے - چھالے

(PEMPHIGIUS KUPIA)

اس مرض میں جسم پر بڑے بڑے پھالے پیدا ہو جاتے ہیں جو آبی طوبت سے پُر ہوتے ہیں - چھالے پھٹ کر طوبت نکل جاتی ہے اور وہاں پر باریک کھرنڈ جم جاتے ہیں - ان میں جلن اور درد تو کم ہوتی ہے لیکن مریض کمزور ہوتا جاتا ہے -

اسباب مرض : جن بچوں کے والدین کو آتشک کا مرض ہو ان کی ہتھیلیوں اور تلوؤں پر آبلے پیدا ہوتے رہتے ہیں، نیز جسم کا میلا کچھلا رکھنا - نقص ہاضمہ، سورج کی گرمی - تشویش اور فکر و رنج و غم وغیرہ اس مرض کے اسباب ہوتے ہیں -

## علاج

کالی ہائیڈرادیٹیم، آئیوڈیم - ایسڈ نائٹرک، مرکبوس - آرم میٹلیکیم نیز رشاکس  
وغیرہ ادویات کام آتی ہیں -

## ضروری ہدایات

مریض کو غذا مقوی اور زرد، منجم دیں - تازہ ہوا میں رکھیں اور جسم کو صاف  
رکھیں -

## بھائیں - چھائیں - سیاہ داغ

(FREKLES LENTIGO CHLOASMA)

اس مرض میں سیاہی مائل داغ یا چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے داغ چہرے  
پر ابد ہاتھوں کی پشت پر واقع ہوتے ہیں اور چہرے کی خوبصورتی کو بگاڑ دیتے ہیں -  
اسباب مرض : سورج کی دھوپ، گرمی اور مستورات میں ماہواری  
خون میں نقص نیز حمل وغیرہ -

## علاج

ایسڈ نائٹرک - سسی سی فیوگا - سی پیا - نیرم میور - سلفر - گریفائیٹس اور  
فاسفورس وغیرہ -

## ضروری ہدایات

مرض کے اصل سبب کو رفع کریں - عورتوں میں ماہواری آیام کو درست  
کریں - سسی سی فیوگا ۵ اندرونی دینی مفید ہوتی ہے - سورج کی گرمی اور  
دھوپ سے چہرے کو محفوظ رکھیں اور چہرے کو صاف ستھرا رکھیں - تازہ ہوا خوری  
کرنا مفید ہے - اگر ہاضمہ خراب ہو تو اس کی اصلاح کریں -

## برص - سفید داغ - پھلہری

(LEUCODERMA)

اس مرض میں سفید داغ جلد جسم پر جا بجا پڑ جاتے ہیں اور عموماً چہرے، یا

ہاتھوں پر زیادہ ہوا کرتے ہیں، شروع میں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ بڑھ جاتے ہیں۔

**اسباب مرض:** یہ مرض موروثی ہوتا ہے۔ نیز عصبی کمزوری و مرض بالچرخ اور مرض آتشک بھی اس کے اسباب ہیں۔ یہ بات بھی عام مشہور ہے کہ بچلی کھانے کے بعد اگر فوراً دودھ پی یا جائے تب بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے۔

### علاج

**ہائیڈروکوٹرائسل:** اس مرض میں نہایت مفید و آزمودہ ہے۔ یہ دوائی کچھ مدت تک استعمال کرنی چاہیے۔ تب اس کا نمایاں اثر معلوم ہوتا ہے۔  
**خوراک:** ۵ کے پندرہ قطرے صبح اور پندرہ قطرے شام کو نصف چھانک تازہ پانی میں ڈال کر۔

نیز ہائیڈروکوٹرائسل کی مرہم بھی داغوں پر لگانی چاہیے۔  
**آر سینیکم سلفیورٹم فلیوم:** یہ دوائی بھی اس مرض میں مشہور ہے۔ خاص کہ جب کہ زہر آتشک اس مرض کا سبب ہو۔  
**خوراک:** ۳ x کتے میں گرین دو مرتبہ روزانہ۔

## اٹن۔ گٹ۔ چنڈی

(CORN CLAVUS)

اس مرض میں تنگ جوتا پہننے یا رگڑ یا دباؤ کی وجہ سے پاؤں کے کسی حصہ اور عموماً انگھوٹھے یا چھوٹی انگلی کے جوڑ وغیرہ کی جلد سخت ہو جاتی ہے اور چلتے وقت درد ہوتا ہے۔

### علاج

**فیرم پکری کم:** ۳ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔  
**ایسڈ نائٹرک:** ۱ x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

### مقامی علاج

۱۔ مرہم ہائیڈرائسٹس رات کے وقت امپرلین (ہائیڈرائسٹس) ایک ڈرام

ویز لین ایک ادس)

۲۔ ایڈسلی ساک ایک حصہ اور پانی پانچ حصہ ملا کر رات کو موتے وقت چنڈیوں پر لپ کیا کریں۔ دو یا تین رات لگانے سے بہت آرام آجائے گا۔

## ضروری ہدایات

تنگ جوتا پہنا ترک کر دیں۔ نیز سخت دلی جوتا بھی نہیں پہنا چاہیے بلکہ نرم و ملائم پہنا چاہیے۔

## مسے - وارٹس

(WARTS)

چہرے یا ہاتھ وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے مسے مانند نوکیلے دانوں کے نکل آتے ہیں اور اکثر یہ دانے مثل گو بھی کے پھول کے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ بچوں میں پائے جاتے ہیں۔ عام طور پر یہ الگ الگ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات گنجان ہوتے ہیں۔ اس صورت میں درم پیدا ہو جاتا ہے۔

اسباب مرض: مادہ آتشک بھی اس کا سبب ہے۔ نیز اور بھی کئی اسباب سے یہ دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔

## علاج

تھوچا: مسوں کی خاص دوائی ہے۔

خوراک: ۴x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔ تھوچا ۵ صبح اور شام مسوں پر لگانی بھی چاہیے۔

نیز ایڈسٹریک۔ کلکیریا کارب، فیرم پجری کم، سلفر۔ کاسٹی کم، اینیم مارٹ کالی میور۔ نیٹرم میور اور سی پیا بھی اس مرض میں کام آتی ہیں۔

## بوائی پھٹنا

(CHAPPED HANDS CHILBLAINS)

پاؤں کا کوئی نہ کوئی مقام سردی کے دنوں میں سرد ہوا یا اگر دوغبار یا دیگر کسی  
نخا شدار شے کے لگنے سے پھٹ جاتا ہے اور سخت درد کا باعث ہوتا ہے ۔

### علاج

پٹرو لیم - اگاری کس، رٹاکس وغیرہ ادویات کام آتی ہیں

### علاج مقامی

مرہم کیلنڈولا (کیلنڈولا ایک ڈرام، ویزلین ایک اونس) بوائیوں پر  
لگانی چاہیے ۔

### ضروری ہدایات

ہاتھ اور پاؤں کو سردی اور گردوغبار سے محفوظ رکھنا چاہیے ۔ رات کو سوتے وقت  
گرم پانی سے پاؤں اور ہاتھوں کو دھو کر تولیہ سے خوب خشک کر لینا چاہیے ۔

## بدبودار پسینہ آنا

(BROMIDROSIS)

اس مرض میں مریض کو جس قدر پسینہ پیدا ہوتا ہے وہ بدبودار ہوتا ہے ۔ پسینہ  
پیدا کرنے والی غدودوں کے فعل میں فتور آجانے کی وجہ سے پسینہ میں بو پیدا ہو  
جاتی ہے ۔ بعض اوقات اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ مریض کسی مجلس یا مجلس میں بیٹھنے  
کے قابل نہیں رہتا ۔

### علاج

سلفر سٹانی سیگر یا وغیرہ ادویات اس مرض میں کام آتی ہیں ۔

### ضروری ہدایات

کار بالک سوپ اور گرم پانی سے جائے ماؤف کو دھو کر خشک کر لیں اور  
پھر اس کے اوپر ٹیکچر آ یو ڈین لگائیں ۔

## بھوسی - بفا (SEBORRHEA)

اس مرض میں چکناہٹ پیدا کرنے والے غدودوں کی رطوبت جلد پر بھٹی کی مانند جم جاتی ہے اور بھوسی کی مانند اُترتی ہے۔ یوں تو سارے جسم پر یہ مرض ہو سکتا لیکن سر پر اکثر ہوا کرتا ہے اور گنج پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ یہ مرض عموماً کئی خون یا جسم کی کمزوری کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔

### علاج

- ۱۔ آر سینکیم ۳x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۲۔ بفو ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۳۔ گریفائیٹس ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۴۔ لائیکوپوڈیم ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۵۔ نیٹریم میور ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۶۔ پلم بک ۳۰ ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۷۔ سٹانیسیگرا ۳۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔
  - ۸۔ سی پیا ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔
  - ۹۔ سلفر ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔
  - ۱۰۔ آیوڈیم ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔
- ان میں سے ایک یا دوسری دوائی حسب علامات اندر کھلائیں۔

### ضروری ہدایات

گلیسرین سوپ سے جائے ماؤف کو خوب دھوئیں اور جلد کو خوب صاف کریں۔ تاکہ بھوسی کا نام نہ رہے اور اس کے اوپر زیٹون کا تیل مل دیں۔  
مرہم سلفر آد پر لگائیں۔



# بال جھڑنا۔ بال گرنا۔ بالچر

(BALDNESS, ALOPECIA)

اس مرض میں سر کے بال کبھی کبھی تھوڑے اور کبھی سارے گر جاتے ہیں۔ یہ مرض کبھی مودوئی ہوتا ہے۔ بعض شدید امراض مثلاً بعض قسم کے بخار، آتشک مرض سل یا سر کی جلد واویلا وغیرہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔

## علاج

سی پی ا ۲x بہت مفید دوائی ہے۔

فلورک ایسڈ ۶x اور فاسفورک ایسڈ ۱x بھی کام آتی ہیں۔

## ضروری ہدایات

۱۔ جائے ماؤف کو خوب صاف ستھرا رکھیں اور بن آئیو ڈاٹڈ آف مرکری ایک گرین اور ویزلین دو اونس ملا کر مرہم تیار کریں اور ہفتہ میں ایک مرتبہ لگائیں۔

۲۔ لے نیو۔ دوائی تیار شدہ بورک اینڈ ٹیفل امریکہ کے کارخانہ سے آتی ہے وہ جائے ماؤف پر روزانہ لگانی چاہیے نہایت مفید دوائی ہے۔ یہ دوائی ہومیو پیتھک سٹورڈل سے مل سکتی ہے۔

مریض کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور اس کو مقوی اور زود ہضم غذا دیں نیز تازہ ہوا اور ورزش کا بھی خاص خیال رکھیں۔

## بسہری۔ بلیٹوہا (پنجابی)

(ONYCHIA)

اس مرض میں ناخن کی جڑ امداس کے ارد گرد کے مقام میں درم ہو جاتا ہے اور سخت درد ہوتا ہے۔ ناخن کے نیچے زخم بن جاتا ہے اور اگر ناخن کو دیا یا جلے تو نیچے سے مواد خارج ہوتا ہے اور بالآخر ناخن انگلی سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور خراب زخم نیچے سے نکل آتا ہے۔

اسباب مرض: ضرب یا چوٹ آنا۔ امراض آتشک اور خنازیر۔ جلن دار



پھنسیوں، چمپل یا دار کے مواد کا ناخن میں سرایت کر جانا وغیرہ وغیرہ۔

### علاج

سلیشیا ۶x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

### مقامی علاج

۱۔ کیلنڈولا ۵ دو ڈرام میں آدھ پاؤ پانی ملا کر لوشن تیار کر لیں اور اس سے

ناخن کو دھوئیں یا

۲۔ بورک ایسڈ، ایک ڈرام، ایک چھٹانک پانی میں حل کے اس سے ناخن

کو دھوئیں۔

## چھوٹا رخارش۔ چھوٹا رکلی

(ITCH-SCABIES)

یہ ایک چھوٹا مرض ہے جلد پر جا بجا پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ان میں سخت خارش ہوتی ہے۔ ابتداء میں ان پھنسیوں کے اندر شفاف رطوبت ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پیپ بن جاتی ہے اور پھٹ کر وہاں زردی مائل کھڑ بن جاتے ہیں۔

اسباب مرض : اس بیماری کا باعث ایک باریک کرم ہوتا ہے اور یہ مرض ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتا ہے۔ مریض کے کپڑے پنہنے سے اس مرض کی چھوٹ تندرست شخص کو لگ جاتی ہے۔

### علاج

سلفر ۳x یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد اور اگر ضرورت ہو تو سلفر کے بعد سولائیم ۳۰ کی چند خوراکیں ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد مریض کو کھلائیں۔

۱۔ اس مرض میں جب شدید درد اور بے چینی ایسی ہو کہ مریض سونہ سکے۔ راتیں ٹھل ٹھل کر گزارے۔ جائے ماؤف نیلی ہو گئی ہو تو ٹیز ٹولا کیو نمبس جلو کا کام کرتا ہے۔

## ضروری ہدایات

جسم کو صاف ستھرا رکھیں۔ کاربانک صابن سے دھوئیں اور پھر بدن کو خشک کر کے اس کے اوپر زیتون کا تیل مل دیں یا آئیل آف لونڈر لگائیں۔ روزانہ دھو بی کے کھلے نوئے کپڑے پہنیں۔ کپڑے روزانہ تبدیل کریں۔

## داد-تویا-دھدرنی

(RINGWORM)

یہ ایک چھوٹا لا امراض ہے اور عموماً گردن، پشت وغیرہ مقامات پر ہوتا ہے۔

**علامات مرض :** ابتداء میں جلد سرخ ہو کر وہاں چھوٹی چھوٹی پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ پھوٹ کر اور کھرنڈ بن کر جھڑ جلتے ہیں اور ان کی شکل گول شکل پتھلوں کے ہو جاتی ہے۔ جن کے کنارے تھوڑے اُبھرے ہوئے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ مرض پھیلتا جاتا ہے۔ اور وہاں پر شدت کی خارش ہوتی ہے۔

**اسباب مرض :** اس مرض کا سبب ایک خاص قہم کار کر رہے ہے۔

## علاج

اگر دھدرنی سر میں ہو یا ایسے مقام میں ہو جہاں کہ بال ہوں تو بال کٹوا کر جاکوٹ کو صاف کر لیں اور صابن سے خوب دھو ڈالیں اور اس پر تھوڑا سا کاڈ لیور آئیل (روغن ماہی) مل دیں اور یہ عمل ہر چوتھے روز کرنا چاہیے۔

بلیسی لائینم : ۳۰ یا ۲۰ کی ایک خوراک ہر ساتویں دن دینی چاہیے۔

سلفر : نقص ہاضمہ ہو، ترشی ہو، جی متلاتا ہو۔ بھوک مرگئی ہو۔ رات کو بھینپی

رہتی ہو، سر گرم اور پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سی پی ا : سلفر کے بعد یہ دوائی بھی استعمال کی جاتی ہے۔

خوراک : ۶x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نیز داد کو بالوں سے پاک کر کے اور صابن دہانی سے خوب دھو کر اور خشک

کر کے اُس پر سی پیا x اسفوف میں تھوڑا پانی ملا کر اور لٹی سی بنا کر ہر رات کو داد پر لگانا چاہیے۔

کلکیر یا کارب : دومی مزاج والے مریضوں کو یہ دوائی سودمند ہوتی ہے۔ جب کہ پاؤں ٹھنڈے اور بھیگے ہوئے عموس ہوں۔

خوراک : ۳۰ صبح اور شام

کوائی سوفاتک ایسٹ : ۴۰ گرمی ویزلین ایک اونس میں ملا کر مرہم تیار کر لیں اور رات کو ایک مرتبہ داد پر لگادیں۔ چند دنوں میں ہی داد کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ اس مرض کی یہ ایک اکیس دوائی ہے۔

آر سینکم۔ جبکہ کمزوری اور نقاہت بہت ہو۔

خوراک : ۴x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

انجیر کے درخت کا دودھ دھدی پر لگائیں۔ دو تین مرتبہ لگانے سے بالکل آرام ہو جاتا ہے۔

ویزلین میں انجیر کا دودھ حل کر دھدی پر چند مرتبہ لگائیں، آرام ہو جائیگا۔

## گنج

(FAVUS)

یہ ایک چھوٹ دار مرض ہے، اکثر سر میں ہی ہوتا ہے اور گاہے عضو تناسل فوطوں، رانوں یا کندھوں پر بھی ہو جاتا ہے۔

علاماتِ مرض : بال خود بخود اس مرض میں گر جاتے ہیں اور جلد نشگی ہو جاتی ہے۔ کھجلی ہوتی ہے اور بالوں کی جڑوں میں چھوٹے چھوٹے چھلکے پیدا ہو کر وہاں کھڑ بند بن جاتے ہیں اور جو ہوں کی سی جو مقامِ ماؤف سے آتی ہے۔ اگر اس مرض کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو برسوں یہ مرض نہیں جاتا۔

## علاج

کمزروں پر پیش باندھیں اور بار بار پیش لگائیں تاکہ چھلکے دور ہو جائیں اور

سلیفورک ایسٹ کے لوشن رسلفورک ایسٹ ایک حصہ اور مقطر پانی تین حصہ، سے جائے  
ماؤنٹ کو تر رکھیں۔ اگر دو مقلہ یہ علاج کرنے پر ناکامی ہو تو کورا سوسبلی میٹ ایک  
حصہ ادساپ مقطر پانچ گنا ملا کر سولیوشن تیار کریں اور روزانہ صبح اور رات کو جائے  
ماؤنٹ پر لگائیں۔

سی پی ا ۶x۳ ہر چھ گھنٹہ کے بعد دیں۔

کوڈلور آیل : کمزور بچوں کو پلائیں۔

میڈ ہورنیم : ۲۰۰ کے چار قطرے ہر ساتویں یا پندرہویں دن مریض کو استعمال  
کرائیں۔ جب کہ سخت بدبو آتی ہو۔

ٹاکٹر فدیڈک صاحب لکھتے ہیں کہ گنج کا کامیاب علاج اکیس ریزہ ہے۔

## جوشیں پڑنا

(PEDICULOSIS LICE)

سر یا کپڑوں میں جوشیں پڑ کر بڑی تکلیف کا موجب ہوتی ہیں۔ خارش کرتی ہیں  
اور نخی کو چوستی ہیں۔ یہ ایک متعدی مرض ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کو  
چمٹ جاتی ہیں۔ نیز میلہ کچیلارہنے سے بھی جوشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔

### علاج

سب سے مقدم بات صاف ستھرا رہنا ہے اور بالوں کو کتر واکر سر کو کاربانک  
صابن یا مرکری صابن سے خوب دھوئیں، چونکہ مستورات کا بال کٹوانا غیر مرسوم  
اور نامناسب معلوم ہوتا ہے اس لیے پیرانیمن یا پٹرولیم سے بالوں کو تر کر کے  
اوپر ایک دو مرتبہ ایسا کرنے سے جوشیں مرجائیں گی۔ اگر کپڑوں میں جوشیں پڑ گئی  
ہوں تو کپڑوں کو اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں جوشیں مرجائیں گی۔

شٹانی سیگریا یا ایک یا دو چمچ بھر چھ اونس پانی میں ملا کر اس سے سر  
یا جسم کے دیگر بالوں والے حصے جہاں کہ جوشیں ہوں، تر کریں اور چند بار ایسا کرنے  
سے جوشیں مرجائیں گی۔ یہ ایک نہایت ہی مجرب علاج ہے۔ نیز شٹانی سیگریا یا ۳  
کی چند بخور اکیس مریض کو استعمال بھی کرائیں۔ لے

# تل - چاند گرہن کے نشانات

(NAEVUS MOLES, MOTHER'S MARK)

یہ تل مختلف سائز کے ہوتے ہیں، پن کے سرے کے برابر بھی ہوتے ہیں اور بہت بڑے بھی ہوتے ہیں، عام خیال یہ ہے کہ ماں کے رحم میں ہی بچہ کے جسم پر تل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کئی قسم کی کہادیں اسی کے متعلق رائج ہیں۔ بعض لوگ چاند گرہن سے ان کا تعلق بتاتے ہیں۔

## علاج

۱۔ تھو جا x یا ۳۰ ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔ نیز تھو جا ۵ صبح اور شام تل کے مقام پر لگائیں۔

۲۔ کلکیریا کارب : x یا ۶ ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

۳۔ فاسفورس : x یا ۳ یا ۶ ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

۴۔ لائیکو پوڈیم : x یا ۶ ہر چھ گھنٹہ کے بعد بھی دی جاتی ہیں۔



## باب ہشودہم

# فصل اول

## امراض متعلقہ جراحی

(SURGICAL DISEASES)

## سوچن - ورم - سوزش

(INFLAMMATION)

جس جگہ پر چوٹ لگے یا کسی اور وجہ سے سوزش پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے

اس مقام پر خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں اس جگہ کا دورانِ خون رُک جاتا ہے اور اگر کچھ دیر تک یہی کیفیت رہے تو وہاں پیپ پڑ جاتی ہے اور وہ حصہ مرّا پڑ جاتا ہے۔ سوزش کی وجوہات بہت سی ہیں۔ مثلاً کمزوری، قلتِ خون۔ مقامی پوٹ کی وجہ سے اجتماعِ خون، خون میں کسی زہریلے مادہ کا پیدا ہو جانا۔ مقامی طور پر کسی زہریلے مادہ کے گھسنے سے۔ گرمی سردی سے یا کسی زہریلے جانور کے کاٹنے سے سوزش ظاہر ہو پڑتی ہے۔

سوزش دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حاد یعنی وہ حالت جبکہ کسی سبب سے دفعۃً سوزش ظاہر ہو اور جلد جلد بڑھتی جائے۔ مقامِ سُرخ ہو اور دوسری خفیف

## علاج

مقامی سوزش کے ظاہر ہونے کے چوبیس گھنٹہ تک سرد اشیا کا استعمال خارجی طور پر کرنا چاہیے اور اس عمل سے اکثر اوقات سوزش رُک جاتی ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ دیر تک سردی کا استعمال رکھا جائے تو مواد جلد پیدا ہو جاتا ہے اور مقامِ ماؤف کے مرنے کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب مواد بننا شروع ہو تو اس کے بعد ہرگز سردی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اس کے بعد سینک وغیرہ کے ذریعہ گرمی پہنچانی چاہیے اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سردی یا گرمی حالات کے موافق دینی چاہیے۔ نہ کہ تھوڑی سردی کے بعد فوراً گرمی اور نہ گرمی کے بعد سردی شروع کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے سخت نقصان کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔

## اندرونی علاج

ایکونائٹ : جب سوزش تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہو اور اس کی وجہ سرد خشک ہوا کا لگنا ہو۔ مریض بے چینی کی حالت میں ہٹا کرتا ہے۔ نبض تیز۔ پیاس زیادہ مقامِ ماؤف میں درد کی تکلیف اٹھنے پر زیادہ بڑا کرتی ہے۔ ابتدائے مرض میں یہ دوائی زیادہ مفید ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۱ یا ۳ x ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلٹ ڈونا : سوچن کے ساتھ مقام ماؤف از حد سرخ ہوا اور تپکن کا درد ہو۔ جستماع  
خون بہت زیادہ ہو۔ جلد خشک اور گرم سوچن والے مقام پر جلن محسوس ہوتی ہو۔  
خوراک : ۳x۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
فیرم فاس : سوزش کی ابتدائی حالت کے لیے پیشتر اس کے کہ مواد بننا شروع  
ہو۔ مریض کمزور اور اسے کئی خون کی شکایت ہوا کرتی ہے۔  
خوراک : ۳x۱ ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

## بال توڑ پھنسی

(BOIL)

اسے بال توڑ بھی کہتے ہیں اور شروع ہونے سے پہلے مقام ماؤف پر جلن سی معلوم  
ہوتی ہے جس کے بعد ایک سرخ رنگ کا آبشار سا ظاہر ہو جاتا ہے جس میں کھجلی ہوتی  
ہے اور کچھ دیر بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اور مواد پیدا ہو کر یہ مقام اونچا بھار  
کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالآخر چوٹی کے مقام سے پھنسی پھوٹ جاتی ہے اور مواد  
خارج ہو جاتا ہے۔ جب پھنسی سخت قسم کی ہو، یا بہت سی جگہ گھیرتی ہو تو ساتھ ہی  
بخار بھی بہت تیز ہو جاتا ہے اور درم اور مد بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

### علاج

بیلٹ ڈونا : جب سوزش ابتدائی حالت میں ہو اور آبشار میں پیپ نہ پڑی  
ہو۔ درد سخت جھٹکوں میں ہوتا ہو۔  
خوراک : ۳x۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
سلیشیا : مواد بن چکا ہو اور خارج بھی ہو رہا ہو۔ پھنسی کے اندر انگوٹھ دھنکے  
لیے یہ دوائی نہایت مفید ہوا کرتی ہے۔ ابتدائی علامات کے بعد جب مواد بھی بننا شروع  
ہو۔ تو اس دوائی کی اونچی طاقت اس عمل کو روک دے گی۔

خوراک : ۳ x یا ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد -

ہیپر سلف : اُن حالتوں کے لیے جبکہ پیپ بن چکی ہو اور اس کا اخراج مطلوب ہو - تو اس دوائی کی نیچی طاقت کم وقفہ کے بعد دہرانے سے پھنسی پھٹ جاتی ہے اور مواد باہر نکل جاتا ہے -

خوراک : ۲ x یا ۳ ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

سلفر : جب پھنسیاں متوازن اکٹھی ظاہر ہوں یعنی جب ایک کو آرام آئے تو دوسری نکل پڑے اور غلیٰ ذائقہ ۳ x دن میں تین مرتبہ -

آرنیکا : پھنسیوں کے ظاہر ہونے کو روکتا ہے -

خوراک : ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

## ہزار چشم - کاربنکل شست چراغ

(CARBUNCLE)

یہ ایک قیم کا زہریلا پھوڑا ہوتا ہے - جو عموماً پیٹھ یا گردن پر نکلتا ہے اس کے بڑے اسباب مرض ذیابیطس اور مزمن ورم گودہ ہوا کرتے ہیں - اس میں سوزش جلد اور اس کے نیچے کی ساخت میں پھیل جاتی ہے - علاوہ ذیابیطس کے دیگر خونی یا ساختی نقائص بھی اس مرض کا باعث ہوا کرتے ہیں ، مقام ماؤف کی جلد پہلے بہت سرخ ہو جاتی ہے اور سوزش اس قدر بڑھ جاتی ہے - کہ ورم کاربنکل سیاہی مائل ہو جاتا ہے - اس میں جلن از حد ہوتی ہے - جب پھوڑا پھٹتا ہے تو اس میں بہت سے سوراخ دکھائی دیتے ہیں - جس سے پتلی پیپ یا لیس دار مادہ خارج ہوتا ہے - کبھی یہ سوراخ پھلنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور کبھی تمام سوراخوں کی بجائے صرف ایک غار ہی دکھائی دیتا ہے - جلن درو اور ٹیس پڑنے کی شکایت از حد ہوا کرتی ہے - مریض بہت کمزور ہو جاتا ہے -

نوٹ : عام ڈاکٹروں کا یہ خیال بہت حد تک غلط ہے کہ کاربنکل کا علاج صرف اپریشن ہے - ہومیوپیتھک ادویات انداز استعمال کرنے سے نہایت اچھے نتائج پیدا ہوتے ہیں اور کسی قسم کا خطرہ بھی نہیں ہوتا - عمل جراحی سے جان کا خطرہ ہوتا



ہے۔ چونکہ یہ بیماری بوجہ سمیت نکل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا علاج بھی اندرونی ہونا چاہیے۔ مقامی طور پر کانٹ چھانٹ کر نا بیماری کے بڑھنے کا سبب ہوا کرتا ہے۔

## علاج

آر سی نی کمی: جلن نہایت سخت، ایسا معلوم ہو گیا گرم گرم کوئلے رکھے ہوئے ہیں یا جلد کے نیچے اُتبا ہوا پانی بہ رہا ہے۔ بے آرامی زیادہ، مریض مایوسی کی حالت میں ہوا کرتا ہے۔ کمزوری درد کی تکلیف خصوصاً آدھی رات کے بعد زیادہ۔ گرمی پہنچانے یا سیک دینے سے مریض کو درد کا آرام معلوم ہوتا ہے۔

خوراک: ۳ یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

این تھریک سائٹیم: ایسی سخت جلن ہو کہ مریض جس سے بڑھ حال ہو جائے دماغی خوابی ظاہر ہو پڑے یا بدبودار مواد بننا شروع ہو گیا ہو۔ جب آر سینک موثر دینے کے بعد بھی جلن میں ذرا تخفیف معلوم نہ ہو، تو یہ دوائی مددگار ہوا کرتی ہے۔

خوراک: ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا: سوجن بہت زیادہ، مقام ماؤف از حد سرخ، اجتماع خون، درد جس میں تپکن پائی جائے۔ سر درد سخت، نیند نہ آئے۔

خوراک: ۳ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

لاکس: کمزوری بہت ہو جائے اور خون زہر آلود ہو جائے۔ پھوڑا نیلا آسمانی رنگت کا ہو۔ پھوڑے سے سخت درد ہو، یہاں تک کہ پٹی کا لگانا بھی مشکل ہو۔

خوراک: ۶ یا ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سلیشیا: جب مواد بننا شروع ہو گیا ہو یا ناسور بن گیا ہو یا بعد میں جو دم باقی رہ جائے۔ اس کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔

خوراک: ۳ یا ۳۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

ہیپر سلف: پھوڑے کے مقام پر یا اس کے گرد نیش زنی کے درد ہوں سرد ہونا قابل برداشت۔ جاڑا بہت لگتا ہو۔ درد بہت زیادہ، معمولی سا پھوڑا بھی ناگوار معلوم ہو۔ اگر مواد بننا شروع نہیں ہوا تو اونچی طاقت میں دینے اور

جلد جلد نہ دہرانے سے تمام سوزشی مادہ تحلیل ہو جاتا ہے لیکن جب پیپ پڑ جائے تو اس کے اخراج کے لیے نیچی طاقت جلد جلد دہرائی پڑتی ہے۔ جب پیپ گاڑھی زردی مائل سبز رنگ کی ہو۔

خوراک : ۳۰ یا ۴۰، ایک گھنٹہ یا چار گھنٹہ کے بعد۔

سلفر: جب زخم جلد جلد بھرنے میں نہ آئے، یا ایک کے بعد دوسرا پھوڑا نکل آئے۔ جلن از حد، مریض کو پھوڑے پھنسیوں کی شکایت عام رہتی ہو۔

خوراک : ۳۰ یا ۴۰ دن میں تین مرتبہ۔

رٹاکس : پھوڑے کے گرد جلن اور کھجلی، بے چینی بہت زیادہ، متواتر

حرکت کرنے سے آرام معلوم ہو۔ ابتدائے مرض میں جب بخار بھی ساتھ ہو۔

خوراک : ۳۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

## زخم - گھاؤ

(ULCER)

اصلی زخم میں درد یا تو بالکل نہیں یا بہت تھوڑا ہوتا ہے اور اس کی سطح ہموار اور سرخی مائل ہوا کرتی ہے۔ انگوڑ جو زخم پر آتا ہے یکساں ہوا کرتا ہے اور مواد بھی معمولی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہو تو سمجھنا چاہیے کہ زخم اصلی حالت میں ہے۔

### علاج

سلیشیا : زخم سے پتلا پانی کی مانند مواد خارج ہوا اور ساتھ ہی خون کی آمیزش بھی ہو۔

خوراک : ۱۲۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

سلفر: پڑانے زخم، ارد گرد زیادہ سرخی پائی جائے، کناروں پر دلنے سے

ہموار ہوں۔

خوراک : ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

نائٹرک ایسڈ: چھونے سے خون خارج ہو جائے، کلٹنے والے درد، جن

کے کنارے سخت بے ترتیب آتشک کے بعد کے زخم -

خوراک : ۳۰ یا ۳۵ ہر چار گھنٹہ کے بعد -

آر سی ٹیکم : زخم میں جلن اور درد ہو - سبز پتلا یا خون پلا ہوا مواد ہو - جلد نیلے رنگ کی ہو - کمزوری زیادہ ہو -

خوراک : ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -

## بسہری - بلیٹوہا

(WHITTLOW)

دیکھو بیان بسہری صفحہ نمبر ۸۱۸

## پھوڑا

(ABSCCESS)

ابتداء میں سوزشی علامات یعنی درم سرخی و گرمی اور درد ہوتا ہے اور کبھی بخار بھی ہوتا ہے۔ ماؤف مقام کسی قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ جگہ نرم ہو کر پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے پیپ یا خونی مواد خارج ہوتا ہے اور اس کے بعد آرام آ جاتا ہے -

اسباب مرض : بال ٹوٹ جانا یا چوٹ لگنا یا خون کی خرابی یا کسی کانٹے وغیرہ کا چبھ جانا -

## علاج

بیلادونا : جب مقام ماؤف سرخ، گرم اور درد کرتا ہو - لیکن ابھی مواد نہ بنا ہوا ہے نہ ہی درم بہت بڑھ گیا ہو -

خوراک : ۱ ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

ایپس : درم بہت ہو - سرخی خواہ ہو یا نہ ہو - جلن، تپکن اور ڈنگ مارنے کا سادہ ہوتا ہو -

خوراک : ۳۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

مرکیورس : جب باوجود بیلاڈنا یا ایپس کے استعمال کے ورم بڑھتا جائے  
تو دوائی شافی ہو جاتی ہے -

خوراک : ۶x ہر دو گھنٹہ کے بعد -

ہیمر سلف : جب پھوڑے میں مواد بن چکا ہو تو یہ دوائی کام آتی ہے -

خوراک : ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

سلیشیا : جب مواد پکنے کے باوجود بھی پھوڑا پھٹتا نہ ہو یا پھٹنے کے بعد جلدی

شفا یاب نہ ہوتا ہو -

خوراک : ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

کلکیریا کارب : جب پھوڑے کو چیرا دیا جا چکا ہو یا خود بخود ہی پھٹ گیا

ہو تو اس دوائی کی چند خوراکیں دینی مفید ہوتی ہیں -

خوراک : ۶x - سفودن پانچ گرین ہر چار گھنٹہ کے بعد -

سلفر : گاہے گاہے اس دوائی کی خوراک، بھی دینی چاہیے تاکہ شفا جلدی

ہو -

خوراک : ۳x ہر چوتھے یا ساتویں دن -

### علاج مقامی

شروع پھوڑا میں گرم کیلنڈر لالوشن سے ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد دھوتے رہنا

چاہیے اور جب پیپ بن جائے، تو بھی گرم کیلنڈر لالوشن میں صاف کپڑے کا

ٹکڑا بھگو اور پھوڑے کو مکور کرنی چاہیے اور جب پھوڑا پھٹ جائے اور اس میں

سے پیپ خارج ہو تو کیلنڈر لالوشن میں کپڑے کا ٹکڑا یا صاف روئی بھگو کر اوپر

باندھنی چاہیے اور بار بار اس کو تبدیل کرتے رہنا چاہیے اور جب بخوبی خارج ہو

چکے تو مرہم کیلنڈر لالوشن پر لگاتے رہنا چاہیے -

نوٹ : کیلنڈر لالوشن پر ایک ڈرام اور پانی ڈیڑھ پاؤنڈ لالوشن تیار کیا جاتا ہے -

ڈاکٹر کلارک صاحب لکھتے ہیں کہ بمقابلہ پلش کے گرم کیلنڈر لالوشن بدرجہا بہتر

ہوتا ہے -

ضروری ہدایات : شدید پھوڑے کی حالت میں مریض کو آرام سے

لیٹے رہنا چاہیے۔ ابدار میں جب درم خفیف ہو: در مواد بننا شروع نہ ہوا ہو، تو ٹنچر  
آیوڈین لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔ نیز پش باندھنا بھی۔

## گھیکہ - گلہڑ

(GOITER, BRONCHOCELE)

یہ مرض پاڑی مقامات میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ چھوٹا گلہڑ تو تکلیف کا موجب  
نہیں ہوا کرتا۔ لیکن جب بڑا ہو کر شک جائے تو پھر بوجھ کی تکلیف ہوتی ہے۔  
اور بعض اوقات سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جن علاقوں کے پانی میں  
آیوڈین کی کمی ہوتی ہے وہاں یہ مرض اکثر ہوتا ہے۔

### علاج

فیکس ویسی کیولاسس: ڈاکٹر کلا ر ک صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دوائی  
اس مرض میں بہت شافی مانی گئی ہے اور خاص کر جوان مریضوں میں کہ جن کی  
عمر تیس برس کے اندر ہو۔ یہ دوائی اکیر کا حکم رکھتی ہے اس دوائی کو کئی ماہ  
تک جاری رکھنا چاہیے۔

خوراک: ۵ کا نصف ڈرام دن میں تین مرتبہ۔

تھائی ری ڈین ۶x ہر آٹھ گھنٹہ کے بعد۔

آیوڈیم ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب ۶x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

ایڈ فلوریکم ۶x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

پنسیا ۳x ہر چار گھنٹہ کے بعد۔

علاج کئی ہفتوں تک جاری رکھنا چاہیے۔



۵ FUCUS VESICULOSUS گھیکہ اور موٹا پا دور کرتا ہے۔

# آگ سے جلنا۔ گرم پانی وغیرہ سے جلنا

(SCALD , BURN )

اس کی تین حالتیں ہیں :-

۱۔ جلد صرف سُرخ ہو جاتی ہے اور تھوڑے عرصے کے بعد ٹھیک ہو جاتی

ہے۔

۲۔ آبلے پڑ جاتے ہیں جو کہ خفیف حالت میں جلدی خشک ہو جاتے ہیں۔ اور اوپر کا چمڑا اتر جانے کے بعد نیچے سے نیا چمڑا نکل آتا ہے لیکن شدید حالت میں ماؤف جگہ ناسور کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

۳۔ جلد کا گہرا طبق جل جانے کے سبب سے جائے ماؤف مرنے ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اس میں درد نہیں ہوتا لیکن بڑے خطرے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جب کوئی حصہ زیادہ جل جائے تو مریض کی عام جسمانی حالت پر بہت بُرا اثر پڑتا ہے۔

اول : جائے ماؤف میں چار یوم تک خون کا اجتماع ہو جاتا ہے۔

دوم : سوجن ہو جاتی ہے اور مریض کو پیٹ۔ سینہ یا سر کا کوئی عارضہ ہو جاتا ہے۔

سوم : پیپ پڑ جاتی ہے۔ مریض کمزور ہوتا جاتا ہے اور بعض اوقات یہ خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ مریض تپ محرقہ یا ذات الجنب کے عارضہ میں گرفتار نہ ہو جائے۔ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کے جلنے کی نسبت سر گردن اور سینہ کا جلنا زیادہ تکلیف دہ اور خطرناک ہوتا ہے۔

## علاج

۱۔ خفیف کیسوں میں جب کہ آبلے نہ پڑے ہوں، اسٹیکایورنزد ٹنکمر ایک حصہ اور پانی چار حصے ملا کر لوشن تیار کریں اور اس میں صاف کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر جلے ہوئے مقام پر رکھیں اور کپڑے کو اوپر سے اس لوشن سے بار بار توکرتے رہیں۔ ترک کرنے کے لیے کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔

۲۔ ہیماملس، مدرٹنگچر دس قطرے اور پانی ایک اونس بلا کر مندرجہ بالا طریق پر لگاتے رہیں۔ یہ دوائی بھی خفیف کیسوں میں مفید تو ہوتی ہے۔

۳۔ اگر آبے پڑ چکے ہوں تو کینتھر س مدرٹنگچر ایک حصہ اور پانی دس حصہ ملا کر اداس میں کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر ماؤف مقام پر مندرجہ بالا طریق پر رکھیں اور تر کرتے رہیں۔ نیز کینتھر س  $3 \times 3$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد مریض کو اندر بھی دیتے رہیں۔

۴۔ اگر زخم بہت گہرے ہوں تو کون آئیل میں کپڑے کا ٹکڑا تر کرنے کا مقام ماؤف پر رکھیں اور مندرجہ بالا طریق پر بدول کپڑے اتارنے کے اس کو تر کرتے رہیں اور نیز کینتھر س  $3 \times 3$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد مریض کو اندر بھی دیتے ہیں۔ کون آئیل بنانے کی ترکیب :-

تیل اسی ایک حصہ اور چونے کا پانی ایک حصہ دونوں مساوی بلا کر اچھی طرح سے حل کر لیں، کون آئیل تیار ہو جائے گا۔

۵۔ اگر جلیں بہت گہری ہوں اور جلد جل کر مردہ ہو چکی ہو، تو مذکورہ بالا طریق پر کون آئیل میں کپڑے کا ٹکڑا بھگو کر جلے ہوئے مقام کو ڈھانپ دیں۔ بدول کپڑا اتارنے کے اس کو تر کرتے رہیں۔ نیز کالی ہائی کو دس گھنٹہ کے بعد اندر دیتے ہیں۔

۶۔ پیپ پڑنے کی حالت میں ہیمپرسلف  $6 \times 6$  ہر چار گھنٹہ کے بعد دیں۔

## دیگر خارجی ادویات

کاربالک ایسڈ ایک حصہ اور زیتون کا تیل چھ حصے دونوں کو بلا کر دوائی تیار کر لیں اور جلے ہوئے مقام پر خواہ خفیف ہو، خواہ شدید دونوں حالتوں میں اس تیل کے ساتھ کپڑے کا ٹکڑا تر کر کے مقام ماؤف پر لگائیں اور اوپر سے اس کو تر کرتے رہیں۔

جو نہی مریض جل جائے تو اس کو فوراً نرسوں یا میٹھے تیل میں بٹھا دینا چاہیے جلی کا فوراً آرام ہو جاتا ہے۔ اگر سدا جسم نہ جلا ہو تو صرف جلے ہوئے مقام کو

فوراً تیل میں ڈبو دیں اور جب تک جلن بند نہ ہو ڈبوئے رکھیں اور بعد میں بھی تیل سے تر کیا ہوا کپڑا جلے ہوئے مقام پر پیٹے رکھیں اور اوپر سے اُس کپڑے کو ترکرتے رہیں۔

رال ایک تولہ لے کر اس کو تیل اور پانی میں رگڑ رگڑ کر حتیٰ کہ یہ ایک بڑی عمدہ مرہم بن جائے، رگڑتے رہیں جب مرہم کافی مقدار میں تیار ہو جائے تو اس میں کپڑے کا ٹکڑا تر کر کے مقام ماؤف پر لگائیں اور اوپر سے کپڑے کو مرہم سے ترکرتے رہیں خواہ آبلے پڑ چکے ہوں اور خواہ زخم گہرا ہو چکا ہو۔ سب حالتوں میں یہ ایک نہایت مفید دوائی ہے۔

## پالا مارنا - سردی لگنا

(CHILBLAINS FROST BITE)

عرصہ تک سردی لگنے سے مقام ماؤف پہلے سُرخ اور دردناک ہو جاتا ہے۔ پھر زرد اور سفید ہو کر سخت اور سُک ہو جاتا ہے، یا تو رفتہ رفتہ خون کا دورہ وہاں پر ٹھیک ہو کر مقام ماؤف بحال ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دورانِ خون بند ہو کر وہاں پر سخت سوزش ہو جاتی ہے۔

### علاج

سادہ کیسوں میں: اگر کسی کس ۱x ہر تین گھنٹہ کے بعد استعمال کریں۔ پستلا جوان لڑکیاں جن کو خون حیض دیر کر کے اور تھوڑی مقدار میں آتا ہو۔ اگر ان کو سردی لگے تو یہ دوائی شافی ہوتی ہے۔

خوراک: ۳x ہر چھ گھنٹہ کے بعد۔

اگر مقام ماؤف متورم ہو اور اُس میں سخت جلن ہوتی ہو تو رشتا کس ۶x ہر ۶ گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے اور نیز رشتا کس کی مرہم رشتا کس مدرٹنکچر ایک ڈرام اور ویزلین ایک اونس، اوپر لگانی چاہیے۔ نیز جب ورم کا رنگ سیاہ ارغوانی ہو گیا ہو۔ تو وراٹم ورائیڈ ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے اور وراٹم ورائیڈ کا لوشن وراٹم ورائیڈ مدرٹنکچر وراٹم، سپرٹ آف وائٹن و وراٹم اور پانی ایک



اونس، اوپر لگائیے۔

جب سردی کھائی ہوئی جلد جسم پیٹ گئی ہو۔ تو پٹرولیم  $۳ \times$  کا ایک قطرہ ہر تین گھنٹہ کے بعد دینا چاہیے اور نیز مرہم کیلنڈولا (کیلنڈولا) مد ٹکچر ایک ڈرام اور ویزلین ایک اونس، اوپر لگانی چاہیے۔

جب پیپ پڑنے کا ڈر ہو، تو میر سلف  $۶ \times$  ہر چھ گھنٹہ کے بعد دینی چاہیے۔

### ضروری ہدایات

سردی کھائے ہوئے عضو یا جسم کو بدرجہ گرمی پہنچانی چاہیے۔ یکایک گرمی پہنچانے سے وہاں پر سخت سوزش ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ پہلے ہاتھوں کو سرد پانی میں جھگو کر اُن سے مقامِ ماؤف پر مالش کریں۔ پھر خشک ہاتھوں سے مالش کریں، اور بعدہ فلائین کے ٹکڑے سے آہستہ آہستہ مالش کریں۔ جب ماؤف مقام میں حرارت اور سرخی محسوس ہونے لگے تو فوراً اس کے اوپر روئی رکھ کر اوپر سے باندھ دیں۔

## دوبنا

(DROWNING)

ٹوبے ہوئے مریض کو پہلے پیٹ کے بل لٹا دینا چاہیے، اس طرح سے کہ اس کا سر پاؤں کی نسبت تھوڑا نیچا رہے تاکہ پانی منہ کے راستے باہر نکل جائے جب چھاتی اور پیٹ کا پانی خارج ہو جائے تو اُسے فوراً سیدھا لٹا دیں اور اس کے سر اور شانوں کے نیچے کپڑے کو لپیٹ کر رکھ دیں تاکہ وہ باقی دھڑکی نسبت تھوڑے اوپنے رہیں اور تنگ کپڑا جو کہ اُس کے گلے میں پہنا ہوا ہوتا رہے، اس کے منہ اور نتھنوں کو صاف کریں اور اس کا منہ کھول کر زبان کو باہر کی جانب کھینچے رکھیں اور مصنوعی تنفس جاری کرنے کی کوشش کریں۔

مصنوعی تنفس جاری کرنے کے لیے مریض کے سر ہانے کھڑے ہو کر اس کے بازو کو کلائی سے ذرا اوپر کپڑو اور آہستہ آہستہ بڑی ہوشیاری کے ساتھ اوپر سر کی جانب اٹھاؤ۔ حتیٰ کہ دونوں بازو سر کے ساتھ بل جائیں، ایسا کرنے سے

پسلیاں کشادہ ہو کہ تازہ ہوا پھیپھڑوں کے اندر جائے گی۔ دوسیکنڈ تک وہاں ہی بازوؤں کو رکھو۔ پھر آہستہ آہستہ بازوؤں کو نیچے سینہ پر لا کر اچھی طرح سے دباؤ۔ اس سے ہوا باہر نکلے گی۔ اسی طرح سے یہ حرکات جاری رکھو۔ حتیٰ کہ سانس خود بخود آنے لگے۔ دوسرا شخص مریض کی ناک میں نسوار پھونک دے اور ایک پورے کرام کے ساتھ حلق میں مس کریں اور چہرے پر سرد اور گرم پانی کے چھینٹے یکے بعد دیگرے دیتے رہیں۔ تنفس جاری ہونے کے بعد مریض کے تمام جسم کو بخوبی پونچھ کر گرم کبلوں میں لپیٹ دیں اور اس کی ٹانگوں پر کپڑے کے اندر ہی مالش کریں۔ گرم پانی بوتلوں میں بھر کر یا گرم اینٹوں کے ٹکڑے مریض کی بغلوں، رانوں، نگوں اور فم معدہ پر رکھیں تاکہ اس کا جسم گرم ہو جائے۔

جب مریض کو نکلنے کی طاقت آجائے تو گرم چائے یا تھوڑی سی برانڈی یا وسکی میں ذرا سا گرم پانی ملا کر پلائیں اور اسے گرم بستر پر لٹائے رکھیں، جہاں مریض لیٹا ہوا ہو۔ وہاں تازہ ہوا کی آمد و رفت کا بخوبی انتظام ہونا چاہیے۔ اگر نیند آجائے تو مریض کو سونے دیں اور لپٹ نہیں لیجئے نہ جوں۔

## فصل دوم

### زہریلے جانوروں اور کیڑوں کا ڈسٹا

#### سانپ کا ڈسٹا

(SNAKE BITE)

۱۔ سب سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ دورانِ خون کو مقامی طور پر روک کر زہر کو پھیلنے نہ دیا جائے۔ اس لیے زخم کے نزدیک دل کی جانب رستی سے مضبوط باندھ دینا چاہیے۔ ایک اور مضبوط بند ذرا اس سے اوپر باندھ دینا چاہیے۔

۲۔ مریض خود یا اس کا کوئی رشتہ دار یا تیمار دار زہر کو بڑے زور سے چوس کر تھوک دے۔ اگر چوسنے والے کے منہ کے اندر کوئی زخم نہ ہو تو ڈر کی کوئی بات نہیں۔  
 ۳۔ سانپ کے دانتوں کے نشان پر تیز پاتو وغیرہ سے تین چار گہرے شکاف دیں تاکہ زہر یونوں وہاں سے بخوبی خارج ہو جائے۔ پھر زخم پر پانی کی دھار ماریں۔  
 بعدہ ان شکافوں میں پرینگے ٹیٹ آف پٹاش بھر دیں اور اوپر سے پٹی باندھ دیں یا خون خارج ہو جانے کے بعد زخم پر دیکتا ہوا کوئلہ رکھ دیں یا تیزاب سے جلا دیں یا گرم لوہے سے داغ دیں۔ سانپ کے کاٹے ہوئے زخم پر سینگی لگانا بھی مفید ہوتا ہے۔

۴۔ مریض کو دسکی یا برانڈی کافی مقدار میں پلا دیں۔ اگر مریض کو غنودگی یا بے ہوشی طاری ہونے لگے تو اسے سونے ہرگز نہ دیں اور اگر اس کا جسم سرد ہوتا جائے تو گرم پانی کی بوتلیں رانوں، بغلوں اور نلوں میں رکھیں۔  
 ۵۔ آر سینکم ۱x یا ۲x اندر دیتے ہیں۔ جب کہ یکایک کمزوری بہت ہو جائے۔

### مزید چند ادویات اور ان کی تشریح

گولڈرینا : سانپ کاٹنے کا بڑا مفید علاج ہے۔ اس دوا کے استعمال سے جسم پر سانپ کے زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اسے بخود غلط یا تقدم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں سانپ کثرت سے ہوتا ہے وہاں اسے استعمال کرتے رہنا چاہیے۔

یوفوربیا پروسٹاٹا : امریکہ کے پرانے باشندے (ریڈانڈین) اس دوا کو سانپ کا زہر دور کرنے کے لیے صدیوں سے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں۔  
 پلو میر یا سلی نس : اس کا مدرٹشکچر ۱۵-۱۵ منٹ کے وقفے سے پلایا جاتا ہے اور خارجی طور پر لگایا بھی جاتا ہے۔

سڈرن : یہ بھی بڑی مفید دوا ہے۔

سیلا جی نیلا : اس دوا کو دودھ میں حل کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں۔

آئیوڈیم : اس کا مدرٹنکچر بیرونی طور پر لگایا جاتا ہے اور ۱۰-۱۰ منٹ کے بعد ایک ایک قطرہ پلایا جاتا ہے ۔  
 جیم نیما سلوسٹری : رگڑ مارا، اس کی جڑ پیس کر دی جائے ۔  
 سسائی رنجیم : مدرٹنکچر دس سے پندرہ قطرے فی خوراک ۔  
 انڈیگو : خالص نیل کا پوڈر سانپ کے کاٹے ہوئے زخم پر لگانے سے زہر کا اثر دور ہو جاتا ہے ۔ مگر خیال رہے کہ نیل نباتاتی ہونا چاہیے ۔ کیمیاوی طور تیار کردہ نیل جو بازار میں بیکتا اور کپڑے دھونے میں استعمال ہوتا ہے اس مطلب کے لیے بیکار ہے ۔

## بچھو کا ڈنکا مارنا

(SCORPION BITE)

سوئی کی نوک سے ڈنک نکال دیں اور اس پر مٹی کا تیل یا پٹرول یا سرکہ یا نمک یا پیرمنٹ یا ایون یا کافور یا تمباکو کا سفوف یا مار کا سفوف لگا دیں یا دیا سلائی کا مصالحہ پانی کی بوند میں رگڑ کر اوپر مل دیں ۔ یا پیاز کا پانی مقام زخم پر لگائیں ۔  
 لیڈم مدرٹنکچر مقام ڈنک پر لیپ کوئیں نیز لیڈم ۶x ہر دس منٹ کے بعد مرض کو اندر دیتے جائیں، آمونیا بھی مقام زخم پر مٹنا بہت مفید ہے نیز پیاز کا چھلکا مقام زخم پر بار بار باندھنا زہر کو چوس لیتا ہے، زیادہ ورم ہونے کی حالت میں ۳۰۰ یا ۲۰۰ کی خوراک ہر ۵ منٹ کے بعد دیتے جائیں ۔

## بھڑیا شہر کی مکھی کا ڈنکا مارنا

(BEE BITE)

ڈنک کو نکال کر اس کے اوپر دیا سلائی کا مصالحہ یا نمک یا سرکہ یا پٹرول یا آمونیا یا سوڈا یا پوٹاش وغیرہ لگائیں، درد کے دور کرنے کے لیے ایون میتھاں یا کلوروفارم یا ایتھر یا برف لگائیں لیڈم مدرٹنکچر مقام زخم پر لگائیں ۔ نیز لیڈم ۶x ہر دس منٹ کے بعد اندر بھی دیں ۔ پیاز کے چھلکے کو اوپر باندھنا بہت

مفید ہوتا ہے۔

# دیوانے کتے کا کاٹنا

(MAD DOG BITE)

دیوانے کتے کے کاٹنے کے بعد فوراً ہی زہر کو منہ کے ساتھ چوس کر تھوک دینا چاہیے۔ جب اس طرح سے زہر آلودہ خون خارج ہو جائے تو گرم لوہے یا دھتے ہوئے کوٹلیے یا جلتے ہوئے سینگار سے زخم کو گرمی پہنچانی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ جلد نہ جل جائے اور اس طرح سے گرمی پہنچانے سے جو کچھ پانی وغیرہ زخم سے نکلے اس کو با احتیاط صاف کر دینا چاہیے۔

مریض کو روزانہ گرم حمام میں غسل کرنا چاہیے۔ نیز ہائیڈرونی بی نم ۳۰ تین مرتبہ روزانہ ایک ہفتہ تک دینی چاہیے۔ اگر ان تمام احتیاطوں کے باوجود بھی ہلکاؤ کے علامات آشکار ہونے لگیں تو مریض کو فوراً گرم حمام میں بٹھا دینا چاہیے۔

حکومت کی طرف سے پاکستان و ہند میں کئی ایک مقامات پر دیوانے کتے کے کاٹے کے ہسپتال کھلے ہوئے ہیں۔ کتے کے کاٹنے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے مریض کو وہاں لے جا کر علاج کرانا چاہیے۔

## پسو یا مچھر یا کھٹمل وغیرہ کا کاٹنا

(MOSQUITO BITE)

نیش زدہ مقام پر فوراً نمک پانی میں گھس کر یا سوڈا یا آب پیاز یا پشکڑی لگائیں۔ یڈم مدر ٹنکچر کا لیپ کریں

## باب نہدہم

# زہرِ اُر و اُن کا علاج سیمیا و اُن کے تریاق

زہر وہ چیز ہے جو کہ جسم انسانی میں داخل ہو کر نہایت مضر صحت اثر پیدا کرے یا زندگی کو خطرے میں ڈال دے یا مہلک ہو۔

اقسام زہر: ۱۔ معدنی زہر مثلاً سنکیا وغیرہ

۲۔ نباتاتی زہر مثلاً افیون وغیرہ۔

۳۔ حیوانی زہر مثلاً سانپ وغیرہ کا زہر۔

لمحاط اثر یا فعل کے بھی زہر کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ جسم کو جلا دینے والے زہر مثلاً گندھک یا شورہ وغیرہ کا تیزاب۔

۲۔ خراش پیدا کرنے والے زہر مثلاً جمال گوٹہ اور سنکیا وغیرہ، اس قسم کا زہر

جس جگہ جسم پر لگتا ہے وہاں پر سوزش یا جلن پیدا کر دیتا ہے۔

۳۔ نظامِ عصبی پر اثر کرنے والے زہر مثلاً ایکونائٹ یا کچلا یا افیون وغیرہ۔

۱۔ جسم کو جلا دینے والا زہر جو نخی کہ اندر داخل ہوتا ہے۔ خوراک

کی نالی کے تمام طول میں سخت جلن اور درد پیدا کرتا ہے۔ لگا تار متلی اور قیئیں

ہوتی ہیں اور اکثر قیئوں میں خون ملا ہوا ہوتا ہے یا جھلتی کے چھوٹے چھوٹے

ٹکڑے خارج ہوتے ہیں۔ مریض کے منہ اور حلق کی رنگت اندر سے سفید

ہوتی ہے۔ یعنی جل کر اس میں سفید یا زرد داغ پڑ جاتے ہیں، پیٹ میں اچھا

ہو جاتا ہے اور تمام قولے حیات سست اور معطل ہو جاتے ہیں۔

۲۔ خراش پیدا کرنے والے زہر: ان کے کھانے سے تھوڑی دیر بعد

سوزش کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ منہ، حلق اور معدہ میں جلن ہوتی ہے۔

مارے پیاس کے مریض بقیاب ہو جاتا ہے۔ اولاً متلی اور قیئیں آتی ہیں پھر

دست آنے لگتے ہیں۔ نبض نہایت کمزور پڑ جاتی ہے، یا بند ہو جاتی ہے۔ جسم سرد پڑ جاتا ہے اور چمچیا ہو جاتا ہے۔

۳۔ نظام عصبی پر اثر کرنے والے زہر، بعض زہر تشنج پیدا کرتے ہیں۔ اور اعضا تن جاتے ہیں۔ جیسے کچلا وغیرہ کا زہر۔ بعض گہری نیند لاتے ہیں جیسے افیون وغیرہ، بعض ہڈیاں پیدا کرتے ہیں۔ اور مریض بکواس کرنے لگتا ہے۔ مثلاً دھتورہ بیلادونا وغیرہ۔

## عام علاج

زہر خوردہ (مسموم) کے علاج میں معالج کا سب سے اولین فرض یہ ہے کہ مریض کی زندگی بچ جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اختیار کرنے چاہئیں۔

- ۱۔ زہر کو معدہ سے خارج کر دینا۔
  - ۲۔ زہر کا تریاق یا فاؤ استعمال کر کے اس کو بے اثر کر دینا۔
  - ۳۔ ایسے طریقے اختیار کرنا کہ مریض کو زہر سے جو نقصانات پہنچتے ہیں ان کی بخوبی تلافی ہو جائے۔
- اول زہر کو معدے سے خارج کرنے کے لیے دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔

- ۱۔ قے آور ادویات کا استعمال کرنا۔
  - ۲۔ سٹامک پمپ کے ذریعے معدہ کو دھو دینا۔
- اگر قے آچکی ہوں تو پھر ان دونوں طریقوں کے عمل میں لانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

## قے آور ادویات

اول۔ تمام قے آور ادویات میں سے زنک سلفیٹ سب سے بہترین ہے۔ اس سے تھیں گرین (قریباً دو ماشہ دو چھٹانک گرم پانی میں ملا کر پلا

دی۔ بچوں کو ۵ گرین یعنی اڑھائی رتیاں)

۲۔ کھانے کا نمک دو یا اڑھائی تولہ، پاؤ بھر نیم گرم پانی میں حل کر پلا دیں۔

۳۔ رائی کا سفوف ایک یا سوا تولہ، ٹھنڈے پانی میں ملا کر دیں۔

۴۔ سلفیٹ آف کاپر (نیلا تھو تھا) پانچ گرین دو چھٹانک گرم پانی میں ملا کر استعمال کرائیں۔

۵۔ اپی کے کو انا بمقدار ۳۰ گرین (۲ ماشہ) نیم پاؤ گرم پانی میں ملا کر پلا دیں۔

۶۔ امونیم کارب ۳۰ گرین یعنی ۲ ماشہ نیم پاؤ گرم پانی میں ملا کر پلا دیں۔

نوٹ ۱: اگر مریض نے پارہ یا ٹارٹرائمیک کھایا ہو تو پھرتے لانے کے لیے نمک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

۲: اگر کوئی بھی دوائی تے لانے کے لیے میسر نہ آ سکے تو بہت سا گرم پانی

مریض کو پلا دیں اور حلق میں انگلی یا پر سے خراش کر کے تے کرائیں۔

دوم: جب یہ علم ہو جائے کہ مریض نے فلاں زہر کھایا ہے تو اس زہر کا تریاق

فادینا چاہیے۔ فاد میں مندرجہ ذیل اوصاف ہونے چاہئیں۔

فاد فوری اثر زہر پر کر سکے اور اس کے ضرر رساں اوصاف کو زائل کر سکے،

نیز فاد اس قسم کا ہو کہ خواہ مریض کو کتنی مقدار میں دیا جائے وہ کوئی نقصان نہ دے

اور زہر کے ساتھ مل کر وہ ایک بالکل بے ضرر کیمیائی تبدیلی پیدا کر سکے۔

مذکورہ بالا مختصر تمہید کے بعد اب ہر ایک مشہور زہر کا ذکر ذیل میں دیا جاتا

ہے۔

## سفید شکھیا۔ سم الفار۔ آرسنک

(ARSENIC)

سفید شکھیا عموماً زہر خورانی کے کام آتا ہے۔ اگرچہ شکھیا کی اور بھی قسمیں

ہیں۔ یہ بہت تھوڑی مقدار میں مثلاً ایک رتی یا دو گرین بھی مہلک ثابت ہوتا ہے۔

علامات زہر: عموماً نیم گھنٹہ کے بعد ہی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ جی متلاتا

ہے۔ قہقہے آتی ہیں۔ ابتداء میں معدہ میں سخت جلن ہوتی ہے لیکن پھر سارے جسم



میں پھیل جاتی ہیں۔ غضب کی پیاس لگتی ہے اور اسہال آتے ہیں۔ نبض تیز اور کمزور چلتی ہے۔ پیشانی میں درد، تشویش بے چینی اور جلد جسم ٹنڈی چپچی - سانس تکلیف سے آتا ہے۔ مقعد پھل جاتی ہے اور دست مروڑ کے ساتھ آتے ہیں۔ ہڈیاں ہوتا ہے۔ مریض پر بدحواسی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ پیشاب بند ہوتا ہے۔ اور آخر سخت نقاہت یا بے ہوشی کے عالم میں مریض انتقال کر جاتا ہے کبھی ایک آدھ گھنٹہ میں اور کبھی دو تین روز کے اندر مریض فوت ہو جاتا ہے۔

اگر خوش قسمتی سے مریض بچ بھی جائے تو بھی عرصہ تک معدہ اور انتڑیوں میں سوزش اور پیٹ میں درد ہوتا رہتا ہے اور ویرینہ زہر کے علامات مثلاً جی متلانا، پیاس، مروڑ کے ساتھ اسہال - نیند نہ پڑنا وغیرہ ستاتے رہتے ہیں۔

## علاج

اگر قہیں آنی شروع نہ ہوئی ہوں تو مقوی ادویات (قے آور دوائیں) مثلاً زنک سلفیٹ ایک ڈرام دے کر قے کرائیں یا گرم پانی میں نمک پلا کر اور بار بار مریض کو پلا کر اچھی طرح سے قے کرائیں تاکہ معدہ بالکل نجابی ہو جائے، یا ٹامک پمپ سے معدہ کو بہت جلد بہ احتیاط دھو ڈالیں، اگر پہلے ہی شدید قہیں آرہی ہوں تو مریض کو سرد پانی دیتے رہیں تاکہ قہیں کھل کر ہو جائیں، ٹھنڈا دودھ بھی پلا دیں، نیز دودھ میں انڈے پھینٹ کر مریض کو پلا دیں۔ یا میٹھا تیل اور چونے کا پانی ہم وزن مقدار میں پلا کر مریض کو پلا دیں۔ جب پانی مریض کے اندر ٹھہرنا شروع ہو جائے تو ایک یا دو ادونس کسٹرائیل پلا دیں تاکہ امعاء میں سے بھی زہر خارج ہو جائے۔ گرم پانی کی بوتلیں بھر کر جسم کو گرم رکھیں۔ نیز برانڈی یا وسکی بھی پلا دیں۔

## پارے کا زہر

(MERCURY)

نوٹ: وارچکنا (کروموسبلی میٹ)، رسکیور (کیلومل)، اور شگرف (سنے بر) وغیرہ مرکبات سیما زہریلی مقدار میں کھانے سے زہر ہو جاتا ہے۔

علاماتِ زہر: مریض کے منہ میں بڑا ناخوشگوار معدنی نائقہ ہوتا ہے اور تھوک بکثرت پیدا ہوتا ہے اور منہ سے رالیں بہت بہتی ہیں۔ سوڑے دُکھتے ہیں۔ انتوں کے کناروں پر نیلی سی لکیر پڑ جاتی ہے اور دانت بھی دُکھتے ہیں۔ سانس بدبودار آتا ہے۔ گلا گھٹنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ منہ اور حلق میں سفیدی سی پائی جاتی ہے۔ زبان سفید ہو جاتی ہے اور اس پر تسکن پڑ جاتے ہیں۔ قیئیں اور اسہال بار بار آتے ہیں اور ان میں بلغم اور بعض اوقات خون ملا ہوا آتا ہے۔ جلد ٹھنڈی اور چھچھی ہوتی ہے۔ نبض تیز لیکن کمزور ہوتی ہے۔

## علاج

مریض کو آٹھ دس انڈول کی سفیدی سیر بھر پانی یا دودھ میں پھینٹ کر پلا دیں اگر انڈے نہ مل سکیں تو گھیوں کا آٹا پانی میں گھول کر پلا دیں، یا شاک پمپ سے معدہ کو دھو ڈالیں۔ پینے کے لیے آتش جو ایک بہتر چیز ہے اور رفع ضعف کے لیے برانڈی یا وسکی پلا لیں۔

پارے کے خفیف کیسوں میں مثلاً کیلو مل زیادہ کھانے سے تھوک بکثرت آنے لگتا ہے اور زہر کی خفیف علامات پیدا ہو جاتی ہیں، ایسی حالت میں نائٹرک ایسڈ x کے دو تین قطرے نصف چھٹانک پانی میں ملا کر دن میں دو مرتبہ پلا دیں۔ نیز ایسا ہی غرارے کرنے کیلئے استعمال کرائیں۔ نیز ایلیم (مچھکڑی) دو ڈرام لے کر ایک پاؤ پانی میں حل کریں اور اس کے ساتھ غرارے کرائیں۔

پارے کے پرنے زہر کی وجہ سے اگر مریض کے جسم پر پھنسیاں پیدا ہو جائیں تو ہیر سلف x ۳ یا ہائیڈراسٹس x ۱۰ استعمال کرائیں۔

جب پارے کے زہر کی وجہ سے استخوان کے امراض پیدا ہو جائیں تو آرم x ۶ کا استعمال کرائیں۔ اگر کوئی حقتہ مفلوج ہو گیا ہو تو نکس و امیکا x ۶ دیں انٹریوں کے عوارضات میں آرسینیکم آیوڈائڈ x ۳ ایک مفید دوائی

## سیسہ کا زہر

(LEAD)

علامات زہر: حلق اور شکم میں کڑل کی دردیں اور کچاوٹ ہوتی ہے عضلات شکمی سخت ہو جاتے ہیں۔ قبض ہوتی ہے۔ پیشاب بہت تھوڑا آتا ہے۔ نبض کمزور اور سخت چلتی ہے۔ اس زہر کی پہچان یہ ہے کہ سیاہی مائل نیلی لکیریں مسوڑوں کے گرد پیدا ہو جاتی ہیں۔

### علاج

شاک پیپ سے معدہ کو دھو ڈالیں۔ سوڈیم سلفیٹ یا میگنیشیم سلفیٹ یا ایم (پھسکڑی) پانی میں گھول کر مریض کو بار بار پلائیں۔ نیز دودھ اور انڈے بھی مریض کو بہت مقدار میں دیں۔

## تانے کا زہر

(COPPER)

یہ دھات خود تو زہریلی نہیں، لیکن اس کے مرکبات زہر کا اثر رکھتے ہیں۔ علامات زہر: انتڑیوں بلکہ تمام شکم میں کڑی ہوئی دردیں، قیئیں اور اسہال شدید درد سر، تانگیں اور بازو ٹھنڈے کوتاہ دمی اور ضعف۔ پیشاب بھی کسی قدر بند ہو جاتا ہے۔ اور یرقان کی علامات بعض اوقات آشکارہ ہو جاتی ہیں۔ اگر زہر اپنا اثر بدرجہ کر رہا ہو تو مسوڑوں کے کناروں کے آس پاس ایک ارغوانی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔

### علاج

اگر قیئیں آنی شروع نہ ہوئی ہوں تو شاک پیپ سے معدہ کو بخوبی دھو ڈالیں اور اس کے بعد کئی ایک انڈوں کی سفیدی اور زردی ملا کر مریض کو دیں اور دودھ بافراط پلائیں یا گیسوں کے آٹے کو پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں۔

تانبے کے مزمن زہر کو دور کرنے کے لیے فاسفورس  $۳x$  یا فاسفورک ایسڈ  $۳x$  کی کئی خوراکیں مریض کو دین نیز گرم حمام میں غسل کرائیں۔

## سنگ سمرہ کا زہر

(ANTIMONY)

ایک ڈرام کی مقدار قاتلانہ اثر رکھتی ہے لیکن ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک رتی بعض حالتوں میں نوجوان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔  
علاماتِ زہر: اس کے نگلنے کے فوراً ہی بعد منہ کا ذائقہ معدنی ہو جاتا ہے متلی اور قیئیں آتی ہیں اور معدہ میں جلن اور درد ہوتا ہے۔ نقاہت بہت بڑھ جاتی ہے۔ سر دپینے (تریلی) آتے ہیں۔ کرپل پڑتے ہیں۔ دست آتے ہیں اور نگلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جب علامات بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں تو تشنچ ہو کہ مریض سخت نقاہت کی حالت میں جاں بحق ہو جاتا ہے۔  
اس دھات کے زہر کی مزمن علامات یہ ہوتی ہیں۔ متلی، قیئیں۔ اسہال، کمزوری، نقاہت۔ بھوک کا مرجانا اور سر دپینہ (تریلی) بافراط۔

## علاج

دودھ سے معدے کو دھو ڈالیں۔ چائے بغیر دودھ اور میٹھا کے مریض کو پلاتے جائیں۔ چائنا کا استعمال بھی بہت فائدہ بخش ہوتا ہے۔

## آیوڈین کا زہر

(IODINE)

ٹنکچر آیوڈین یا لینی منٹ آیوڈین کو غلطی سے پی جانے سے زہر ہو جاتا ہے نیز آیوڈین ۳ گرین تک کھانے سے زہر ہو جاتا ہے۔ آئی ڈو فارم کو کھا جانے یا خارجی استعمال کرنے سے بھی بعض اوقات زہر کے علامات پیدا ہو جاتے ہیں۔  
علاماتِ زہر: حلق میں کچھاوٹ، معدے میں درد اور جلن، تھوے اور

دست آتے ہیں۔ سرگھومتا ہے۔ شدت کی پیاس لگتی ہے اور مریض بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پیشاب میں البومن اور پھیپھڑے خارج ہوتے ہیں۔

## علاج

مغی رتے آور، ادویات سے قے کراییں یا سٹاک پیپ سے معدے کو دھوئیں، یا میدہ یا گیہوں کا آٹا تھنڈے پانی میں گھول کر بہت سا مریض کو پلائیں۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ بھی اس کا تریاق ہے۔

## کاسٹک سوڈا۔ کاسٹک پوٹاش۔ ایمنیا نوشاد

AMMONIA CAUSTIC POTASH CAUSTIC SODA

بہت زیادہ مقدار میں غلطی سے کھا جانے سے زہر کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حلق۔ منہ۔ خوراک کی نالی اور معدہ میں انتہا کی سوجن اور درد ہوتا ہے مریض کا دم گھٹتا ہے۔

## علاج

۱۔ سرکہ نصف چھٹانک، نیم سیر پانی میں ملا کر پلائیں اور اسی طرح سے دوبارہ پلائیں۔

۲۔ لیموں کا رس یعنی لائیم جو س ایک یا دو چھٹانک سیر بھر پانی میں ملا کر دوبار کر کے پلائیں یا لیموں کا ست سوا ماشہ یا ڈیڑھ ماشہ پاؤ بھر پانی میں ملا کر پلائیں۔

۳۔ اعلیٰ کا گودا یا اعلیٰ کا ست سوا ماشہ کے قریب لے کر پانی میں حل کر کے پلائیں۔

۴۔ اناروانہ دو تولہ پانی میں گھوٹ کر پلائیں اور حسب ضرورت کئی بار اسی طرح سے پلائیں۔

جب زہر کی علامات زائل ہو جائیں تو پھر مریض کو دودھ بار بار پلاتے رہیں یا پانچ چھ انڈوں کی سفیدی پانی میں پھینٹ کر پلائیں یا بادام روغن گرم

پانی میں ملا کر پلائیں۔

## شورہ کا زہر

(POTASSIUM NITRATE)

غلطی سے ایک اونس (دھائی تولہ) یک مُشت کھانے سے زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں اور موت تین سے چھ گھنٹوں کے اندر واقع ہوتی ہے۔  
علاماتِ زہر: معدہ میں شدید جلن۔ قیئیں، نبض سست اور کمزور  
نقاہت۔ ٹانگوں میں کڑل، سر و پسینہ اور تشنچ ہوتے ہیں۔

## علاج

معدہ کو شاک پپ سے دھوئیں، تھے اور ادویات استعمال کرائیں اور  
محركاتِ دل پلائیں۔

## قاسفورس کا زہر

(PHOSPHORUS)

دیا سلانی کا مصالحہ یا چوہے مار لٹی (ریٹ پیٹ) غلطی سے کھا جانے سے  
زہر ہو جاتا ہے۔

ایک گرین (نیم رتی) ہلک ثابت ہوتی ہے اور موت نیم گھنٹہ سے لے  
کر کئی دنوں کے اندر واقع ہوتی ہے۔

علاماتِ زہر: معدہ میں جلن اور قیئیں۔ بعض اوقات خون آمیز اور  
ان میں سے لہسن کی بو آتی ہے۔ تھے میں جو مادہ خارج ہوتا ہے وہ اندھیرے  
میں چمکتا ہے۔ اگر مریض جلدی نہ مرجائے تو تین چار روز کے بعد مذکورہ بالا  
علامات موقوف ہو جاتی ہیں لیکن طبیعت بڑی بوہل اور سُست رہتی ہے پھر  
بعدہ سخت قنیم کا یرقان ہو جاتا ہے۔ نقاہت بدرجہ کمال ہوتی ہے۔ نبض  
کمزور چلتی ہے۔ پیشاب کم پیدا ہوتا ہے اور اس مرض میں ابومن خارج

ہوتی ہے۔

### علاج

تھے اور ادویات دے کرتے کرائیں یا سٹاک پمپ سے معدہ کو دھو لیں  
تین گرین کا پر سلفیٹ (توتیا) نیم پاؤ پانی میں حل کر کے مریض کو پلائیں اور اسی  
طرح سے یہ دوائی ہر پانچ پانچ منٹ کے بعد پلاتے جائیں۔ حتیٰ کہ تھے آنی شروع  
ہو جائے۔

نوٹ: اگر مریض کو پہلے کوئی روغن یا تیل پلایا جا چکا ہو تو چاہیے کہ سٹاک پمپ  
سے فوراً معدہ کو دھو ڈالیں کیونکہ تیل میں یہ زہر حل ہو جاتا ہے اور فوراً ہی  
خون سے اندر جذب ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ بعد میں مینگنیشیا سلفیٹ چار  
ڈرام لے کر پاؤ بھر پانی میں ملا کر پلائیں تاکہ دو چار دست آجائیں اور پھر  
آتش جو یا انڈوں کی سفیدی پھینٹ کر پلائیں۔

## کانچ کا سفوف

(GLASS)

نوٹ: باریک پسی ہوئی کانچ بعض اوقات غلطی سے کھا جانے سے معدہ و امعاء  
میں خراش و سوزش ہو کر خطرناک علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔

علامات زہر: معدے میں سخت درد ہوتا ہے قیئیں آتی ہیں۔ جن  
کانچ یا سیسے کے ذرات نکلتے ہیں۔ دست آنے لگتے ہیں جن میں خون ملا ہوا  
ہوتا ہے۔

### علاج

مریض کو فوراً کھچڑی یا چاول یا ابلے ہوئے آلو کھلائیں تاکہ یہ غذا کانچ کے  
ذرات کے ساتھ لٹ پٹ ہو کر معدہ میں خراش پیدا نہ ہو سکے اس کے بعد نمک  
یا زنک سلفیٹ یا رائی دے کرتے کرائیں۔

# تیزابی زہریں

(ACIDS)

۱۔ گندھک کا تیزاب (سلفورک ایسڈ) اگر غلطی سے یہ تیزاب چار ماشہ پی لیا جائے تو مہلک اثر کرتا ہے۔

۲۔ شورہ کا تیزاب (نائٹرک ایسڈ) اگر غلطی سے یہ تیزاب آٹھ ماشہ کی مقدار میں اندر چلا جائے تو مہلک ثابت ہوتا ہے۔

۳۔ نمک کا تیزاب (ہائیڈروکلورک ایسڈ) سولہ ماشہ کی مقدار میں مہلک اثر کرتا ہے۔ ان ہر تیزابوں میں سے کوئی ایک خالص تیزاب پی لیا جائے تو مندرجہ ذیل علامات زہری پیدا ہوتی ہیں۔

علامات زہر: منہ حلق اور معدہ میں سخت درد اور جلن ہوتی ہے۔ سیاہ رنگ کی قیئیں بہ آمیزش خون آتی ہیں۔ مادہ قے جب زمین پر گرتا ہے تو جوش کھاتا ہے۔ پیاس بہت سخت لگتی ہے۔ قبض ہوتی ہے اور پیشاب نہیں بنتا۔ مریض کے لیے کھانا پینا بلکہ سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ منہ اندر سے جل کر سفید ہو جاتا ہے۔ مریض بہ سبب ضعف کے آخر کار تشنج سے دم بند ہو کر ایک دو روز میں کوچ کر جاتا ہے۔

## علاج

ان زہروں کو خارج کرنے کے لیے ٹامک پمپ یا قے آور ادویات ہرگز استعمال نہیں کرنی چاہئیں، کیونکہ لعاب دار جھٹی پہلے ہی گل چکی ہے، وہ پھد جلتے گی۔

مندرجہ ذیل ادویات میں سے جو بھی شے میسر ہو سکے کام میں لائیں۔

۱۔ سفیدی چونا ایک تولہ ایک سیر پانی میں ملا کر۔

۲۔ دیوار کا پستر بمقدار ڈیڑھ تولہ سیر بھر پانی میں ملا کر۔

۳۔ کھڑیا مٹی یعنی چاک سو یا ڈیڑھ تولہ سیر بھر پانی میں ملا کر۔



۴۔ چونے کا پانی (لائم واٹر) سیر تبھر کے قریب ۔

۵۔ سبھی ۲ تولہ سیر تبھر پانی میں گھول کر پلا دیں اور بعدہ روغن بادام یا روغن زیتون پانی میں ملا کر پلائیں نیز دودھ یا دودھ میں انڈوں کی سفیدی پھینٹ کر پلائیں یا گھول کا آٹا یا میدہ یا اراوٹ ایک گلاس پانی میں گھول کر پلائیں ۔

اگر ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگیں تو گرم پانی بوتلوں میں بھر کر ٹکڑ کر دیں اور بذریعہ حقنہ غذائی مریض کی پرورش کرتے رہیں ۔

## کاربالک ایسڈ کا زہر (CARBOLIC ACID)

جب کاربالک ایسڈ مغلطی سے کھا لیا جائے تو مندرجہ ذیل علامات زہر کی پیدا کرتا ہے ۔

علامات زہر : ہونٹ اور منہ سفید ہو جاتے ہیں ۔ منہ حلق اور معدہ میں درد ہوتا ہے ۔ قبض کبھی آتی ہیں اور کبھی نہیں آتیں ۔ بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے ۔ مریض خراٹے لیتا ہے اور پتلیاں سکڑ جاتی ہیں اور اگر موت جلدی واقع نہ ہو تو پیشاب برنگ سیاہ اور مہزی مائل آنے لگتا ہے ۔

## علاج

سٹانک پمپ سے معدہ کو دھوئیں اور اس کے بعد کیسٹرائیں ، بادام روغن ، روغن زیتون یا اسی کاتیں ، یا گھی نیم پاؤ کے قریب لے کر نیم سیر گرم پانی میں ملا کر مریض کو پلائیں ۔ یا گرم گرم دودھ پلاتے جائیں یا پانچ سات انڈوں کی سفیدی پانی میں پھینٹ کر پلائیں ۔ برانڈی دے کہ طاقت کو بحال رکھیں ، اور اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہوں ، تو گرم پانی کو بوتلوں میں بھر کر رانوں اور بغلوں وغیرہ میں رکھیں اور مریض کے جسم کو گرم رکھیں ۔

# نباتی زہری



## میٹھا تیلیا کا زہر۔ ایکونائٹ

(ACONITE)

اگر غلطی سے ایکونائٹ کی جڑ کوئی شخص کھالے یا ایکوٹین ۱/۴ حصہ گرین کا کھا لے یا ایکونائٹ مدرٹنچر بہت مقدار میں (ایک ادس) کوئی دوائی کے طور پر پی جائے تو زہریلے علامات پیدا ہو جاتے ہیں اور تین گھنٹہ میں ہی بد قسمت مریض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

**علامات زہر:** چار پانچ منٹ کے اندر اندر ہونٹوں، زبان، حلق اور منہ میں جھنجھٹا ہٹ اور سنسناہٹ محسوس ہونے لگتی ہے اور عضلات کی طاقت معطل ہو جاتی ہے۔ شکم میں درد ہوتا ہے۔ قیئیں اور اسہال آتے ہیں۔ جلد جسم سرد، نبض کمزور اور تنفس وقت سے آتا ہے اور مریض کو موت کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور باوجود اس کے کہ تمام جسم سُن اور مفلوج ہو جاتا ہے لیکن اس کا دماغ آخر وقت تک صاف رہتا ہے۔

### علاج

ٹانک پمپ سے معدے کو دھوئیں یا مقوی (تھے آور) ادویات دے کر تھے کرائیں، زہک سلفاس گوم پانی میں یا بوریکس دودھ میں ناکریا کیسٹر آئیسل دیویں۔

ڈیجی ٹیلس بمقدار بیس قطرے نصف چھٹانک پانی میں ملا کر فوراً پلائیں اور اگر پھر بھی ڈیجی ٹیلس کی خوراک دینے کی ضرورت ہو تو اسی طرح ایک اور خوراک پلا دیں۔ محرکات مثل برانڈی یا وِسکی یا سپرٹ امونیا ایروینٹک یا تیز کافی

پلوئیں۔

## افیون کا زہر

(OPIUM)

جو ان آدمی کے لیے تین رقی خالص افیون یا نیم رقی مارفین (جو ہر افیون) مہلک ہوتا ہے۔ لیکن بچوں کو رقی کا آٹھواں یا سولہواں حصہ اور مارفین کا ایک حصہ رقی کا ہلاک کر دیتا ہے۔ پاک و ہند میں بچوں کو سلانے کے لیے مائیں اُن کو افیون کی عادت ڈال دیتی ہیں جو کہ نہایت ہی ضرر رساں ہے اور کئی معصوم بچے اس بد بخت عادت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ننھے بچوں کو سلانے کے لیے ہرگز ہرگز افیون کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔

علاماتِ زہر: سر درد کرتا ہے، چہرہ تھمتا جاتا ہے۔ رفتارِ نبض تیز ہو جاتی ہے اور حلق خشک ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ اعضاء بوجھل ہو جاتے ہیں اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ تنفس سست خراٹے دار اور بے قاعدہ ہو جاتا ہے۔ نبض کمزور، چہرہ زرد اور جلد جسم گرم اور تر ہو جاتی ہے۔ پتلیاں سکڑ کر نہایت چھوٹی ہو جاتی ہیں اور پھر اُن پر روشنی یا تاریکی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ موت عموماً عضلات تنفس کے مفلوج ہونے کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔

بعض اوقات افیون کے زہر سے قیئیں آنے لگتی ہیں اور بچوں کو تشنچ ہوتے

ہیں۔

## علاج

معدہ کو فوراً پوٹاشیم پرمنگنیٹ کے سولوشن سے دھو ڈالیں یا ڈیڑھ تولہ رائی کا سفوف پاؤ بھر گرم پانی میں ملا کر مسکوم کو پلائیں تاکہ اُس کو قے ہو جائے۔ چونکہ پوٹاشیم پرمنگنیٹ افیون کا تریاق یعنی فاد زہر ہے اس لیے اس کا استعمال کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ یہ تریاق اپنے سے پانچ گنا افیون

کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص نے بیس رتی افیون کھالی ہو تو اُس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے چار رتی پوٹاشیم پر مینگے نیٹ کافی ہوگی۔ اگر افیون کی مقدار معلوم نہ ہو سکے تو چار یا پانچ رتی پوٹاشیم پر مینگے نیٹ پانی میں حل کر کے مریض کے حلق میں داخل کر دیں۔

مسموم کے منہ پر سرد اور گرم پانی کے چھینٹے یکے بعد دیگرے مارتے رہیں تاکہ مریض کو ہوش رہے اور مریض کو ہرگز سونے نہ دیں۔ اُس کو جگاتے رہیں۔ گرم گرم ٹہوہ اور برانڈی وغیرہ مسموم کو پلاتے رہیں۔

اگر مریض کا دم بند ہونے لگے، تو مصنوعی تنفس جاری کرائیں۔ مریض کو زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی بھی اجازت نہ دیں، کیونکہ ایسا کرنے سے بھی ہارٹ (دل) فیل ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

## دشتور کا زہر

(STRAMONIUM)

اس کے بیج ایک یا ڈیڑھ ماشہ کی مقدار میں ہلکے ہوتے ہیں۔ علاماتِ زہر: چہرہ سُرخ، پتلیاں پھیلی ہوئیں، سر میں چکڑا اور حلق خشک۔ نگنا دشتور ہو جاتا ہے۔ مسموم ہلکی ہلکی باتیں آہستہ آہستہ کرنے لگتا ہے۔ کبھی اپنے کپڑوں یا بستہ کو نوچتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد مسموم پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ کبھی تشنج ہونے لگتا ہے اور کبھی دم بند ہو کر موت واقع ہوتی ہے۔

### علاج

سٹامک پمپ سے معدہ کو دھو ڈالیں یا رائی یا زنک سلفاس یا گرم پانی میں نمک حل کر کے مسموم کو پلائیں۔ تاکہ قے ہو جائے اور اگر مسموم کو ہوش ہو تو پھر کیٹہ آئیل پلا دیں حذوف کو رفع کرنے کے لیے برانڈی یا دسکی پلائیں۔

اگر جسم سرد ہو تو مالوں اور بھلوں میں گرم پانی کی بوتلیں رکھیں اور اگر دم بند چولے لگے تو مصنوعی تنفس جاری کرائیں۔

# بیلادونا یعنی سیرج کا زہر

(BELLADONNA)

علامات زہر - پتیاں پھیل جاتی ہیں - بینائی میں فورا آ جاتا ہے -  
چہرہ سُرخ، سر میں چکر اور تشنچ کے دودے ہوتے ہیں - ہڈیاں شدید ہو جاتا ہے -  
حلق خشک ہو کر سکڑ جاتا ہے اور اکثر اوقات جلد پر سُرخ پھنیاں نکل آتی ہیں -

## علاج

شاک پمپ سے معدہ کو دھو ڈالیں اور قے آور ادویات دے کر جیسا  
کہ اوپر سٹرامونیم کے بیان میں ذکر آیا ہے - قے کرائیں - تیز چلے یا قہوہ پلائیں  
افیون اس کا تریاق ہے -

# جمالگوٹہ کا زہر

(CROTON OIL)

علامات مرض : معدہ میں سخت درد، پانی کی مانند تیلے تیلے دست آتے  
ہیں اور قیئیں خون آمیز آتی ہیں - چہرہ زرد اور کچا ہوتا - نبض کمزور اور خفیف  
چلتی ہے - جسم پسینہ سے تر ہوتا اور پیشاب کم پیدا ہوتا ہے اور یا بالکل پیدا ہی  
نہیں ہوتا - کبھی ہڈیاں بھی ہو جاتا ہے -

## علاج

شاک پمپ کے ذریعہ معدہ کو دھوئیں، مٹی (قے آور) ادویات دے  
کر قے کرائیں مثلاً زنک سلفاس گرم پانی میں بلا کر یا نمک گرم پانی میں بلا کر  
سموم کو دیں اور قیئیں کرائیں - چار یا پانچ انڈوں کی سفیدی دودھ میں

پینٹ کر دیں۔ رفع ضیغ کے لیے محرکات دیں۔  
نوٹ: دودھ اور گھی بڑا کر پلانے سے بھی قیئیں آجایا کرتی ہیں۔

## کھمب کا زہر۔ کھمبی

(MUSLI:ROOM)

برسات کے موسم میں پاک و ہند میں بکثرت پیدا ہو جاتی ہیں۔ لوگ انہیں پکا کر کھاتے ہیں۔ سفید رنگ کی کھمب تو اچھی ہوتی ہے لیکن سیاہ یا سبز یا سرخ وغیرہ رنگوں کی کھمب زہریلی ہوتی ہے جس کے کھانے سے زہریلا اثر ہو جاتا ہے۔  
علامات زہر: پیٹ میں سخت درد قیئیں اور اسہال اور مریض سخت بے حال ہو جاتا ہے۔ خرانے دار سانس لیتا ہے۔ جسم سرد ہوتا ہے۔

### علاج

شاک پمپ سے معدے کو دھو ڈالیں یا قے آور ادویات مثلاً رنگ سلفاس یا سفوف اپنی کاک یا رانی گرم پانی میں ملا کر مسموم کو پلائیں تاکہ قیئیں ہو جائیں۔ بعد ازاں ایک اونس کیسٹریل پلا دیں، محرکات کا استعمال کرائیں۔ گرم پانی کی بوتلوں کی ٹنگور کریں، ٹنگر بیلا ڈونا بمقدار دس قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر مریض کو دیتے جائیں۔ یہ فاد زہر کا کام کرتی ہے۔

## کچلہ کا زہر۔ پیپٹیا کا زہر

(IGNATIA NUXVOMICA)

نوٹ: یہ دونوں زہر تاثیرات میں بالکل برابر ہیں۔ اگر کوئی تشخیص غلطی سے سفوف کچلہ یا سفوف پیپٹیا بہ وزن ڈیڑھ یا دو ماشہ کھالے یا ان میں سے کسی ایک کو پانی میں گھس کر ایک یا ڈیڑھ یا دو ماشہ کے قریب کھائے یا پلا

تو مہلک ہوتا ہے۔ سٹرکینیا (جو ہر کچلہ) دو چاول سے ایک رتی کی مقدار میں زہر قاتل ہوتا ہے۔ دس سے بیس منٹ کے اندر اندر علاماتِ زہر ظاہر ہو کر موت پانچ چھ گھنٹوں کے اندر واقع ہوتی ہے۔

**علاماتِ زہر:** تشنچ کے دورے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ہوتے ہیں۔ پسینہ آتا ہے اور دم بند ہوتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ مسموم کا جسم اکڑ کر آگے پیچھے یا ایک جانب کو مڑ جاتا ہے، بے چینی بہت بڑھ جاتی ہے۔ ٹکٹکی بندھ جاتی ہے عضلاتِ شکم اور سینہ اینٹھ کر سخت ہو جاتے ہیں۔ قوتِ سماعت اور قوتِ بصارت ذکی الحس ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسموم بے ہوش نہیں ہوتا۔

### علاج

اگر تشنچ شروع ہونے سے پہلے پتہ لگ جائے تو شاک پمپ سے معدہ دھو ڈالیں۔ ورنہ مقوی رقیقے (اور) ادویات دے کر قیئیں کرائیں۔ گرم دودھ بکثرت پلائیں اور نیز کیسٹرائیل بھی پلائیں، وراٹرم و ریائیڈ مدرٹیکچر ایک ڈرام فوراً پلانے سے ڈاکٹر ہر برٹ صاحب کا تجربہ ہے کہ تشنچی دورے کم ہو جاتے ہیں اور یہ دوائی تریاقِ زہر کا کام دیتی ہے۔

## تمبکو کا زہر

(TOBACCO)

**علاماتِ زہر:** جی متلاتا ہے یا قیئیں اور دست آتے ہیں، نقابہ بدرجہ کمال ہوتی ہے۔ سرد پسینہ اور نبضِ سُست و بے قاعدہ چلتی ہے، بالآخر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور آلاتِ تنفس مفلوج ہو کر مسموم فوت ہو جاتا ہے۔

### علاج

سبز چائے بکثرت پلائیں۔ بعدہ برانڈی دیں۔ جسم پر مالش کریں اور گرمی

پہنچائیں اور مصنوعی تنفس بشرط ضرورت جاری کریں۔

## بھنگ اور گانج کا زہر

(HEMP)

مسموم کو قے آور ادویات دے کر قے کرائیں اور اس کے سر پر آب سرد کی دھار ڈالیں اور اسے سونے نہ دیں۔

## کونیم یعنی شوکران کا زہر

(CONIUM)

علامات زہر: حرکت عضلات بند ہو جاتی ہے۔ ٹانگیں اور بازو کمزور ہو جاتے ہیں۔ چال لڑکھڑاتی ہے اور بے باعث عضلاتی فالج کے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن مسموم کو ہوش آخری دم تک رہتا ہے۔

### علاج

سٹامک پمپ سے معدے کو دھو ڈالیں یا قے آور ادویات دے کر قے کرائیں۔ محرکات کا استعمال کرائیں۔ شکر کنین کی جلدی پیکاری کریں۔ جسم کو گرم رکھیں۔ مصنوعی تنفس جاری کرائیں۔

## ڈیجیٹلس کا زہر

(DIGITALIS)

علامات زہر: تھیں، اسہال، درد قولنج، سر درد، نبض سست اور بہت بے قاعدہ، نظر دھندلی، پتلیاں پھیلی ہوئیں۔ نقاہت، تشنچ اور بالآخر



بے ہوشی۔

## علاج

سٹامک پمپ سے معدہ کو دھوئیں لیکن مقوی رتے آور) ادویات استعمال نہ کریں۔

## کافور کا زہر

(CAMPHOR)

علاماتِ زہر: سر چکراتا ہے۔ غشی یا ہذیان ہو جاتا ہے۔ معدہ میں سخت جلن ہوتی ہے۔ بصارت دھندلی پڑ جاتی ہے اور جلد سرورچھچھے پسینہ سے تر ہوتی ہے۔ سانس لینا اور چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے اور مسموم کے تنفس سے کافور کی بو آتی ہے اور بالآخر عالمِ بے ہوشی میں کوچ کر جاتا ہے۔

## علاج

بذریعہ سٹامک پمپ معدہ کو دھو ڈالیں یا قے آور ادویات دے کر قیئیں کرائیں۔ نیز کافیہ اور برانڈی وغیرہ پلائیں لیکن اگر مسموم نے کافور کا ڈھیلا نگلا ہو تو پھر نہیں پلانی چاہیے۔ ایسی حالت میں قے آور ادویات دے کر قے کرا دینی چاہیے۔

## تارپین کا زہر

(TURPENTINE)

علاماتِ زہر: مسموم خراٹے دار سانس لیتا ہے۔ پتلیاں سکر جاتی ہیں تنفس سے تارپین کی بو آتی ہے اور پیشاب سے بنفشہ کی سی بو آتی ہے اور بالآخر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔

## علاج

شامک پمپ سے معدے کو دھو ڈالیں یا تھے آور ادویات دے کرتے کرائیں  
مارفین کی جلدی پچکاری کریں اور لعاب دار چیزیں مثلاً آش جو وغیرہ پلائیں -

## شراب کا زہر - الکوحل

(ALCOHOL)

بکثرت شراب پینے سے بعض اوقات ملک علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ عموماً  
ڈھائی چٹانک الکوحل زہر بلا اثر رکھتی ہے -

علامات زہر: اگر یک دم بہت سی شراب پی لی گئی ہو تو فوراً بے  
ہوشی طاری ہو جاتی ہے اور اگر معدے کو جلدی نہ دھویا جائے تو بعض اوقات  
موت واقع ہو جاتی ہے -

پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور تنفس سے شراب کی  
بو آتی ہے -

## علاج

بذریعہ شامک پمپ معدے کو دھو ڈالیں - یا رائی دے کرتے کرائیں - سر  
پر سرد ٹکڑے کریں اور باقی جسم کو گرم رکھیں - تیز کافیہ پلائیں اور اپو مارفین ۱/۲  
گرین کی جلدی پچکاری کریں - اگر شراب کی بدمستی موجود ہو تو اپو مارفین کی  
۱/۲ گرین کی جلدی پچکاری کرنے سے شرابی چپ چاپ ہو جاتا ہے - ٹھنڈے پانی  
میں غسل بہت مفید ہے -

## کوکین کا زہر

(COCAINE)

پانچ گرین سے زیادہ مقدار میں یہ سم قاتل ہوتی ہے -  
علامات زہر: نبض کمزور اور تیز چلتی ہے تنفس سست اور آہستہ

جلد زرد اور خشک ہو جاتی ہے۔ سر چکراتا ہے اور غشی ہو جاتی ہے۔

### علاج

تھے آور ادویات دے کر معدے کو دھو ڈالیں، بعد میں محرکات مثل برانڈی یا دسکی پلائیں۔ سٹرکنین کی پچکاری کریں، ایل نائٹریٹ سنگھائیں اور حسبِ ضرورت مصنوعی تنفس جاری کریں۔

کوکین کے مزمن بد اثرات کو دور کرنے کے لیے ایونیا سٹیوا مدرٹنکچر استعمال نہ لائیں اور کوکین کی بُری عادت ترک نہ لائیں۔

## مٹی کے تیل کا زہر۔ پٹرول کا زہر پیرافین کا زہر

(KEROSENE OIL PETROL PARAFINE)

علاماتِ زہر: حلق اور معدے میں سوزش اور درد ہوتا ہے۔ پیاس بہت لگتی ہے اور قیئوں میں تیل کا تر مرا اور بُو ہوتی ہے۔ نبض بے قاعدہ اور کمزور چلتی ہے۔ بے چینی بہت ہوتی ہے، چہرہ زرد اور تفسر، جسم سرد اور بالآخر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔

### علاج

شامک پیپ سے معدے کو دھو ڈالیں یا تھے آور ادویات دے کر قیئیں کرائیں جسم پر ماش کرائیں اور گرمی پہنچائیں، برانڈی یا دسکی پلائیں۔ سٹرکنین کی جلدی پچکاری کریں۔

# گوشت کا زہر۔ مچھلی کا زہر

(MEAT & FISH)

باسی یا خراب گوشت کھانے سے زہریلی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ کبھی خشک مچھلی کھانے سے بھی زہر چڑھ جاتا ہے بعض قسم کی مچھلیاں زہریلی بھی ہوتی ہیں۔

علاماتِ زہر: دردِ سر۔ دردِ شکم، قیئیں اور دست آتے ہیں نیض کی رفتار تیز ہوتی ہے اور حرارتِ جسم بڑھ جاتی ہے اور نقابہ بہت بہت ہوتی ہے۔

## علاج

شٹاک پیپ سے معدے کو دھو ڈالیں یا کوئی اور قے آور ادویات دے کر قیئیں کرائیں اور پھر ایک چھٹانک کسٹرائیل پلا دیں تاکہ دست آجائیں اور پیٹ صاف ہو جائے۔ اگر ضعف زیادہ ہو تو براڈی یا دسکی پلائیں، دودھ یا آتش بخ میں دودھ ملا کر بطور غذا دیں۔

# کلوروفارم کا زہر

(CHLOROFORM)

علاماتِ زہر: حرارتِ جسمانی کم ہو جاتی ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں پلے سُکرتی اور پھیل جاتی ہیں۔ سانس کمزور پڑ جاتا ہے اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔

## علاج

شٹاک پیپ سے معدے کو دھو ڈالیں یا قے آور ادویات دے کر قیئیں کرائیں۔ جسم پر مالش کرائیں۔ گرم پانی کی بوتلوں سے جسم کو گرم رکھیں۔

مریض کی زبان کو باہر کھینچے رکھیں، تاکہ ہوا اندر زیادہ داخل ہو سکے۔ اور  
ٹھنڈے پانی کے پھینٹے منہ پر ماریں اور حسب ضرورت مصنوعی تنفس جاری کریں۔

## باب ہستم

# ننھے بچوں کے امراض

(DISEASES OF INFANTS AND CHILDREN)

☆ ☆

## بچے کو قبض ہونا

(INFANTILE CONSTIPATION)

دودھ پینے والے بچے کو ۲ گھنٹے میں تین سے لے کر چھ دفعہ پاخانہ آیا کرتا ہے۔ لیکن جوں جوں بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے یہ تعداد بھی کم ہوتی جاتی ہے اور صرف دو دفعہ ہی پاخانہ آتا ہے اور پھر اس کے بعد صرف ایک حاجت ہی کافی خیال کی جاتی ہے۔ وہ بچے جنہیں ابتدا میں ماں کا دودھ نہیں پلایا جاتا۔ اکثر قبض سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ مرکبورس ڈسٹس x کی تین تین گرین کی چار پڑیاں بنالیں اور ایک ایک گھنٹہ کے وقفہ پر دیں۔

برائی آدنیا: جب بچہ کا پاخانہ بالکل خشک ہو اور بمشکل خارج ہو، پیاس زیادہ۔ منہ، زبان اور ہونٹ بھی خشک ہوں۔  
خوراک: x یا ۲ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس وامیکا: پاخانہ تھوڑا آئے۔ لیکن حاجت برقرار رہے۔ جب ساتھ ہی پیٹ درد ہو اور درد کا آرام پاخانہ آنے کے بعد ہو جاتا ہو۔  
خوراک: x یا ۳ x ہر گھنٹہ کے بعد۔

الیومینیا : پاخانہ مٹی رنگا۔ پتلا لیکن پھر بھی بچہ بمشکل خارج کر سکے اور متواتر کوشش کرتا رہے۔

خوراک : ۲۰۰ ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ادبیم : جب کئی کئی روز تک بالکل ہی پاخانہ نہ آئے تو اس کی اونچی پٹری دینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔

خوراک : ۲۰۰ ہر دو یا تین گھنٹہ کے بعد۔

نیٹرم پیور ۲x۱ دینے سے بھی قبض رفع ہو جاتی ہے۔

کیسٹر آیل : چار یا چھ ماشہ میں شہد یا شکر ملا کر بچے کو چٹا دیں۔ قبض رفع ہو جائے گی۔

## ضروری ہدایات

کیسٹر آیل یا بادام روغن یا روغن زیتون بچے کے پیٹ پر مل دینے سے بھی قبض رفع ہو جایا کرتی ہے، نیز تھوڑی سی صاف روئی لے کر اور کیسٹر آیل میں جگہ کر بچہ کی مقعد میں ٹھونسنے سے بھی پاخانہ آجایا کرتا ہے۔

گلیسرین کی بتی جس کو گلیسرین سپازیٹری کہتے ہیں بچہ کی مقعد میں داخل کرنے سے بھی پاخانہ آجایا کرتا ہے۔

جب قبض سخت ہو اور سُدے جمع ہو گئے ہوں تو گلیسرین کی پچکاری کرنے سے پاخانہ آجاتا ہے۔ بچہ کی ماں کو دودھ اور گھی زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔

## بچہ کا پیٹ درد

(INFANTILE COLIC)

ماں کی طرف سے معمولی سی بے احتیاطی بچہ کے لیے پیٹ درد کی شکایت پیدا کر سکتی ہے۔ بعض حالتوں میں جب کہ ماں ثقیل غذا کھا جاتی ہے اور اس وجہ سے بچہ کا معدہ اس کے سخت اجزاء کو ہضم نہیں کر سکتا تو اسے پیٹ درد کی شکایت ہو جایا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں بچہ رویا کرتا ہے۔ دوہرا ہوتا

ہے یا ٹانگیں اوپر کو کھینچتا ہے۔

### علاج

ایکونائٹ : جب پیٹ درد بوجہ یکایک ٹھنڈ لگنے سے پیدا ہو۔ بچہ بے چین ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی اسے سخت بخار بھی ہوا کرتا ہے۔ نبض تیز پیاں زیادہ۔

خوراک :  $3 \times$  ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

میلادونا : بچہ کا چہرہ سرخ، اجتماع خون سر کو ہو۔ اس دوائی کا خاص اثر بچوں پر ہوا کرتا ہے۔ بچہ بہت روتا ہے۔ درد کبھی کم اور کبھی فوراً ہی زیادہ ہو جاتا ہے۔

خوراک :  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر دس یا پندرہ منٹ کے بعد۔

کیمومیلہ : اس دوائی کو بچوں کی دوائی کہا جاتا ہے۔ بچہ کا پیٹ درد۔ جب کہ ساتھ ہی دانت بھی نکل رہے ہوں۔ پیٹ میں ہوا پیدا ہو جاتی ہے بچہ بوجہ درد چہینتا ہے اور چپ نہیں کرتا لیکن جب اسے اٹھا کر ادھر ادھر گھمایا جائے۔ تو اسے آرام معلوم ہوتا ہے۔ رات کو اور گرمی سے دریں زیادہ ہوتی ہیں۔

خوراک :  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

نکتہ : میلادونا اور کیمومیلہ باری باری سے بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں ادویات اکثر بچوں کے پیٹ درد میں کافی ثابت ہوتی ہیں۔

سانٹا : پیٹ درد کے ساتھ جب بچوں کے پیٹ میں اُپھارا ہو۔ پیٹ کے کپڑے ایسی حالت میں اکثر اوقات خارج ہوا کرتے ہیں۔

خوراک :  $1 \times$  ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

نکسوامیکا : بچہ چڑچڑے مزاج کا، ساتھ ہی مروڑ آتے ہوں اور پیٹ درد بھی ہو۔ یا قبض ایسی ہو کہ پاخانہ تھوڑا آئے۔ لیکن حاجت متواتر رہے۔

خوراک :  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

پیٹ پر سینک دیں اور بچہ کی ماں کی غذا کی اصلاح کریں۔

# بچہ کے اسہال

(INFANTILE DIARRHOEA)

بچوں کے دست کی وجہ انٹریوں میں کسی خراش کرنے والی چیز کی موجودگی ہوا کرتی ہے۔ جب ماں کا دودھ کم ہو تو بھی دست آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالتوں میں یہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ کوئی اور مثلاً گائے وغیرہ کا دودھ انہیں دیا جائے۔ ایک اچھی صحت کا دودھ پینے والا بچہ چوبیس گھنٹوں میں تین سے لے کر چھ دفعہ پاخانہ پھرتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ تعداد دس سے بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی خاص بُرا اثر بچہ کی صحت پر نہیں پڑتا۔ جب پاخانہ بغیر بو کے ہو تو کسی خطرہ کا احتمال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن برخلاف اس کے جب بچہ کا پاخانہ پیلا ہو جائے، رنگت اس کی زرد یا جھاگ دار مادہ اس میں پیدا ہو کر بُو دار بنائے تو ایسی حالتوں میں مناسب علاج ضروری ہوا کرتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ : جب یکایک بہت مقدار میں دست آنے لگ جائیں، بچہ ایسی حالت میں سخت بے چین ہوا کرتا ہے اور بخار بھی ساتھ ہوتا ہے۔ منہ خشک پیاس زیادہ۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

بیلادونا : سبز رنگ کے دست جن میں جھاگ بکثرت خارج ہو، ایک منٹ میں بچہ اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن فوراً ہی اس کی حالت بدتر ہو جاتی ہے۔

خوراک : ۳x ہر پندرہ منٹ کے بعد۔

کیمومیل : بچوں کے دستوں کے لیے یہ دوا چند اُن خاص ادویات میں سے

ہے جو یومیہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ بچہ چرچرے مزاج کا ہر وقت بقتار رہتا ہے۔

ہلکا رنگ یا زردی مائل دست جن میں سفید دہی کی طرح کے ٹکڑے تیرتے ہوں۔

ایک رخسارہ گوم اور سُرخ دوسرا زرد اور ٹھنڈا، دانت نکلنے کے زمانہ میں اسہال



آتے ہوں۔

خوراک : ۲x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پوڈوقائیم : پانی کی طرح کے زرد رنگ والے اسہال، جو کچھ کھانے، یا دودھ پینے کے بعد فوراً ہی شروع ہو جائیں۔ سبز رنگ کے پتلے دست، بچہ دانتوں کو رگڑتا ہے اور سر اُدھر اُدھر مارتا ہے۔ دست صبح کو خاص کر زیادہ آتے ہوں۔

خوراک : ۳x ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔

آر سیٹیکم : بچہ از حد کمزور، پیاس زیادہ، لیکن بار بار اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہو۔ بے چینی زیادہ، دست نہایت بوجھل، گلے سرسے مادہ کی مانند ان سے بو آتی ہو۔

خوراک : ۳x یا ۴x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

چائنا : جب دست بغیر درد کے ہوں اور ساتھ ہی ہوا بہت خارج ہو۔  
خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

اپی کاک : سادہ اسہال کی ایک اعلیٰ دوائی ہے جب کہ بچہ کو زور لگانا پڑتا ہو اور پاخانہ کے ہمراہ خون کی لس بھی آتی ہو۔ جب کہ زیادہ کھانے کے باعث اسہال شروع ہوئے ہوں، نیز موسم گرما کے اسہال کے لیے یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ بچہ بیمار صورت ہو۔

خوراک : ۱x ٹری ٹورلین ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آئرس ورسی کولر : موسم گرما کے اسہال کی یہ ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جب کہ اسہال صفراوی آتے ہوں، ہیضہ، طفلان شیرخوار میں جب کہ اسہال کے ہمراہ قیئیں بھی آتی ہوں تو یہ دوائی مفید ہوا کرتی ہے۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورس کار : جب کہ پاخانہ کے ساتھ خون بھی آتا ہو اور کونٹھنا بہت

پڑتا ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

مرکیوری اس ڈلس : پاخانہ سبز۔ سفید۔ مٹی کے رنگ کا۔ پانی پانی لائنوں

لے آتے ہوں۔ کو نتھا۔ اُبکائیاں اور پیاس ساتھ ہو۔

خوراک : ۱x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

ورلڈم ایلیم : اسہال ہیضہ میں یہ دوائی مفید ہے۔ جب کہ اسہال بکثرت بمقدار کثیر اور پانی پانی آتے ہوں اور زور سے نکل جاتے ہوں اور ساتھ ہی قیئیں بھی آتی ہوں اور نقاہت بہت ہو۔ پیشانی پر ٹھنڈا پسینہ آتا ہو اور شکم سرد ہو۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

فاسفورس : اسہال مزمنہ کی ایک اعلیٰ دوائی ہے۔ جبکہ بچہ دُبلتا ہو ۲ انگلوں اور جلد جسم کا رنگ زردی مائل ہو۔ کمزوری بہت ہو اور سینہ کے امراض بھی ساتھ ہوں۔

خوراک : ۶x یا ۳۰x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

## ضروری ہدایات

بچہ کو بار بار دودھ نہ پلائیں، بلکہ دیر دیر کے بعد دودھ پلائیں ابومن وارٹر (انڈے کی سفیدی کا پانی) تھوڑی مقدار میں دینے سے اسہال کے بند ہونے میں مدد ملتی ہے، دودھ پلانے والی کو کھٹی میٹھی اور ثقیل اشیاء مثلاً مٹھائی، اچار، پکڑوں، امرود، لوکاٹ، کھیرا، ککڑی وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

## بچہ کو پیش ہونا

(INFANTILE DYSENTERY)

دیکھو بیان پیش کتاب ہذا۔

مختصراً مرکبورتس کار ۳x، آر سینکیم ۳x، ایوز ۳x، کینتھر ۱x، اپنی کاک ۳x، رشتاکس ۲x، بیپ ٹیشیا ۵ وغیرہ ادویات اپنی اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں۔

# بچہ کو ہیضہ ہونا

(INFANTILE CHOLERA)

## علاج

دراریم ایٹیم ۵ یا ۱۰ ، آر سینکیم ایٹیم ۳۰ ، کیفر ۵ ، اپیکاک ۱۰ یا ۲۰ ،  
پوڈو فائلم ۵ ، کیومیل ۳۰ ، کوپرم آرس ۳۰ ، بیلا ڈونا ۱۰ یا ۲۰ ، کلکیریا  
فاس ۳۰ ، مرکبوس ۳۰ ، ریویم ۳۰ ، کرڈن ٹنگیم ۳۰ وغیرہ ادویات اپنی  
اپنی علامات کی موجودگی میں کام آتی ہیں ۔  
مفصل جان و علاج اور ضروری ہدایات کے لیے دیکھو بیان ہیضہ کتاب ہذا ۔

# بچوں کا بخار

(INFANTILE FEVERISHNESS)

علامات : اس بخار کا حملہ عموماً بارہ گھنٹہ سے لے کر چھپیس گھنٹہ تک ہوا  
کرتا ہے ۔

اکثر بخار کا حملہ بعد دوپہر یا شام کو ہوا کرتا ہے ۔ پہلے سردی لگتی ہے ۔  
اس کے بعد جلد جسم گرم ہو کر خشک ہو جاتی ہے ۔ نبض سخت بھری ہوئی اور  
تیز چلتی ہے ۔ زبان خشک اور اس پر فرجی ہوئی ، پیاس ، تنفس تیز اور مٹیاب  
تھوڑا اور بہت زنگین ، بعض اوقات سرد ، معدہ اور معاسکے افعال میں  
نقص اور کئی اشتہار کی علامات بھی ساتھ ہوا کرتی ہیں ۔ بعض اوقات مذکورہ  
بالا علامات سخت بیماری کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں ۔ اس لیے فوری توجہ دیکار  
ہوتی ہے ۔ اگر بچہ متواتر آہیں بھرتا رہے ۔ تو سمجھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ جسم  
پر ضرور نکلے گا ۔

اسباب مرض : پینہ کا دوب جانا ، نمی یا سردی میں رہنا ، گرمی یا سردی

کایک ایک بڑھیا گھٹ جانا۔ بھیگے ہوئے کپڑوں کا پہننا، ناقص یا نا کافی غذا کا کھانا۔ اندرونی یا بیرونی چوٹ کا آنا اور تھکاوٹ۔

## علاج

ایکونائٹ : بخار تیز جس کی وجہ سے بچہ بے چین ہو۔ پیاس زیادہ، نبض تیز، بخار کی وجہ، سرد ہوا کا لگنا یا ٹھنڈک ہو، جلد خشک اور گرم ہو۔ اور جلتی ہو۔

خوراک :  $1 \times$  یا  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : اجتماع خون سر کو آنکھیں ابھری ہوئیں اور سرخ، سخت سر درد، بچہ نیند میں اچانک چونک پڑتا ہے اور جھٹکے لیتا ہے، مدہوش، نبض تیز اور نرم آسانی سے دب سکے۔

خوراک :  $3 \times$  ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔

ایٹیم کروڈم : جب بخار بوجہ بد مضمی شروع ہو گیا ہو۔ بچہ کی زبان پر سفید تہ سی جی ہوئی، بخار رات کو زیادہ، دھوپ لگنے سے بخار شروع ہو جائے ساتھ ہی قے بھی آتی ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

سلفر : منظر ادویات جب پورے طور پر کام نہ کر سکیں، یا اندرونی اعضا میں اجتماع خون کا خطرہ ہو تو خصوصاً ایک نائٹ کے بعد اس دوائی کو دیا جاتا ہے۔

خوراک :  $3 \times$  یا  $30$  بہ تین گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : بچوں کے لیے یہ دوائی بھی نہایت مفید ہے۔ بچہ کا جسم آگ کی طرح بوجہ بخار جلتا ہوا۔ چہرہ سرخ، زبان پر کثافت، قبض، پانہانہ کی حاجت ہو لیکن خارج نہ ہو۔

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کیمو میلا : تیز طبیعت، چڑچڑے مزاج کے بچے خصوصاً جب رات نیند نہ رہے ہوں۔ بچہ ہر وقت روتا رہے لیکن جب اسے اٹھا کر پھرایا جائے تو چپ رہے ہوں۔

کر جائے۔ ایک رخسارہ سرخ دوسرا زرد، بخار رات کے وقت زیادہ، پیاس بھی زیادہ ہو۔

خوراک : ۳x ہر ایک یا دو گھنٹہ کے بعد۔

آر سینیکم : بخار لبا ہو گیا ہو۔ کمزور بچے، پیاس زیادہ لیکن تھوڑے تھوڑے پانی کی طلب۔

خوراک : ۳x یا ۴۰ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

## ضروری ہدایات

آرام سے بستر پر چپ چاپ پڑا رہنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا پانی بار بار دینا مفید ہوا کرتا ہے۔ اس سے بچہ کو پسینہ آنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ بخار کے دوران میں دودھ ایک اعلیٰ اور ضروری غذا ہے۔

## دانت نکالنا

(TEETHING)

عموماً پیدائش کے پانچ یا چھ ماہ کے بعد بچوں میں دانت ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر بیرونی صفائی، کھلی ہوا اور خوراک کا خاطر خواہ انتظام ہو تو دانت نکلنے پر کوئی خاص تکلیف پیدا ہونے کا اندیشہ نہیں ہوا کرتا۔ اگر بچہ کمزور ہو تو تکلیف دانت نکلنے کے وقت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس عرصہ میں دسیت آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سرد رہتا ہے، بخار اور کھانسی ہو جاتے ہیں۔ اور تشنچ، چرچہرا پن اور کمزوری وغیرہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔

## علاج

ایکونائیٹ : بچہ کو نیند پورے طور پر نہ آئے، جلد خشک گرم، پیاس از حد، بے چینی متواتر اور بخار زیادہ، خصوصاً رات کے وقت یا تو قبض ہو یا اہمال سبز رنگ کے بہت زیادہ آئیں۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

آر سینکیم : بچہ بہت کمزور جلد زرد رنگ کی، پیاس زیادہ، لیکن تھوڑا تھوڑا پانی ایک وقت پئے، دست بدبودار، پانی پینے کے بعد فوراً قے کرے بے چینی زیادہ۔

خوراک : ۳x یا ۴۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

بیلادونا : بچہ سوتے ہوئے فوراً اور جھشکوں میں چونک پڑے، آنکھیں ابھری ہوئی، چہرہ سرخ، سرگرم، تشنجی دورے، ہاتھ مڑے ہوئے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

بوریکس : اعصابی کمزوری اور اعصاب میں خراش پیدا ہو گئی ہو، خفیف شور سے بھی بچہ چونک پڑے۔ نیچے کی طرف جانے سے ڈرتا ہو اور اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جاتا ہو۔ منہ میں پھالے، دودھ پینے کے وقت رونا شروع کر دے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

برائی اونیا : منہ، زبان اور ہونٹ خشک، بخار بھی ساتھ ہو۔ بچہ بے حسی و حرکت پڑا رہنا چاہے۔ خشک کھانسی، پیاس زیادہ، قبض، پاخانہ خشک۔

خوراک : ۳x یا ۴۰ ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

پوڈوفاسیلیم : بچہ کو بوجہ دانت نکلنے کے دست لگے ہوئے ہوں، نہایت بدودار سبز کھریا مٹی کی طرح سفید، دانت اور کانچ نکلنے، گرم موسم میں اور کھانے پینے کے بعد تکلیف کی زیادتی، بے چینی، سوتے ہوئے بچہ آنکھیں کھلی رکھے، دانتوں کو دبائے اور سر کو ادھر ادھر ٹپکے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب : خنازیری مزاج والا بچہ۔ سر میں پسینہ کی کثرت۔ ہاتھ پاؤں اور جسم ٹھنڈا، نیند کم اور مزاج چڑچڑا، دودھ مضہم نہ ہو سکے اور جما ہوا دودھ بذریعہ قے خارج ہو۔ پیٹ پھولا ہوا، کمزوری زیادہ۔

خوراک : ۳x یا ۴۰ ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کیمومیلا : بچوں کے لیے یہ خاص ودائی ہے۔ بچہ تند مزاج، غصہ دار، ہر

وقت رہے، ضدی، کبھی ایک چیز مانگے اور کبھی دوسری۔ سبز، زرد یا سفید رنگ کے پانی کی طرح پتلے دست جن پر دہی کی مانند سفید ٹکڑے تیر رہے ہوں۔ پاخانہ بُو دار۔ بخار رات کو زیادہ، بچہ یہی چاہے کہ اُسے اٹھا کر گھماتے رہیں، ورنہ رو پڑے۔

خوراک : ۳x ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

کریوزوٹ : سوڑے سوچے ہوئے سیاہ رنگ کے جن میں سخت درد ہو۔ دانت نکلتے ہی خراب ہو جائیں اور ان میں سڑاند پیدا ہو۔ پاخانہ نہایت بُو دار۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

مرکیورل : بچہ کو رات کے وقت بخار زیادہ ہو جائے، اسہال سبز رنگ کے نخل بڑا ہوا۔ مروڑ زیادہ ہو۔ پیاس زیادہ اور پسینہ بکثرت، سوڑے سوچے ہوئے اُن میں سے رال ہر وقت بہتی رہے۔

خوراک : ۳x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

نکس و امیکا : بچہ تند، تیز مزاج، قبض کی شکایت، جب مصنوعی خوراک کی وجہ سے بچہ کا ہاضمہ خراب ہو گیا ہو یا مروڑ آنے لگ جائیں۔

خوراک : ۳x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

## بچوں کا سوکھا

(MARASMUS)

اس مرض میں بچہ روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اُسے دست آنے شروع

۱۔ ڈاکٹر ڈیوی سے لکھا ہے کہ ۱۲x یا ۱۲ سے کم طاقت استعمال نہ کی جائے۔ ورنہ ناکامی کا سامنا کرنا ہوگا۔

۲۔ کلکیر یا فاس ۶x دانت نکلتے کے زمانے میں کبھی کبھار ایک خوراک دینے سے دانت با آسانی نکل آتے ہیں۔

ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ بچہ کے پیٹ والے غدودوں کی خرابی ہوا کرتی ہے۔  
 بچہ کی گردن یا ٹانگیں کمزور اور پتلی ہوتی شروع ہو جاتی ہیں۔ چہرہ مڑھا جاتا  
 ہے۔ شکل ڈراؤنی سی بن جاتی ہے۔ بھوک زیادہ لگا کرتی ہے۔ کھانسی بھی  
 شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر تپ دق ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں میں بھی نقص پیدا  
 ہو جاتا ہے۔ تو بچہ بڑھنا بند ہو جاتا ہے۔

## علاج

ابروٹیم : لاغری زیادہ نیچے کے دھڑ میں ہو۔ سوکھے کے مرض میں پیٹ  
 پھولا ہوا اور پیٹ کے غدود بڑھ گئے ہوں، قبض اور دست باری باری سے  
 آتے ہوں۔ بخار چڑھا رہے۔ جسم پر جھریاں پڑ گئی ہوں۔  
 خوراک : ۳ x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

ایتھیوزا : دودھ پیتے ہی جھٹکے کے ساتھ باہر نکل جائے یا جی ہوئی حالت  
 میں تھے ہو جائے، کمزوری کی وجہ سے بچہ کھڑا نہ ہو سکے۔  
 خوراک : ۱ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

آیوڈین : بھوک بہت بڑھی ہوئی۔ بچہ ہر وقت کھاتا رہے۔ اور  
 کمزوری بڑھتی جائے۔ پیٹ پھولا ہوا اور اس کے اندر کے غدود سوجے ہوئے  
 جلد سیاہ رنگ کی۔

خوراک : ۳ x ہر دو گھنٹہ کے بعد۔

کلکیریا کارب : دانت دیر سے اور تکلیف کے ساتھ نکلیں۔ پیٹ  
 پھولا ہوا اور بڑا معلوم ہو۔ سر کی ہڈیاں دیر بعد ملیں، پرورش میں فرق پڑ گیا  
 ہو۔ دودھ مضام نہ ہو سکے۔ سر میں پسینہ کی زیادتی ہو۔ ہاتھ پاؤں اور جسم ٹھنڈا  
 دست بہز بو دار یا بھورے، کل جسم لاغر۔

خوراک : ۳ x ہر تین گھنٹہ کے بعد۔

نیٹرم میور : گردن بہت پتلی، کمزوری پہلے گردن سے شروع ہوا اور نیچے  
 کی طرف بڑھتی جائے، بھوک کی زیادتی، لیکن کمزوری بھی بڑھتی جائے۔ کبھی



قبض اور کبھی دست -

خوراک : ۳x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

سلیشیا : سر میں پسینہ کی زیادتی جسم ٹھنڈا ، دست لگے ہوئے یا قبض ایسی کہ پاخانہ گوتلا ہو - پھر بھی خارج نہ ہو سکے - انٹریڈیاں کمزور ہو گئی ہوں ، سردی سے تنفر - ہر وقت دھکا رہنا چاہتا ہو -

خوراک : ۳x یا ۶x ہر تین گھنٹہ کے بعد -

سلفر : بچہ باوجود نہلانے کے گندہ نظر آئے اور اس سے بو آئے - جلد پر جھریاں پڑی ہوئیں - کھجلی اور ٹھنسیاں جسم پر نکلی ہوئی ہوں - دست ہمز تپتے ہو دار

خوراک : ۶x یا ۳۰ ہر چار گھنٹہ کے بعد -

## اُم الصببیاں یعنی دور کی بیماری

(CONVULSIONS)

اس بیماری میں بچہ کے جسم پر تشنج پیدا ہوتے ہیں ، اس مرض کا بھی دورہ ہوتا ہے - اس کی وجہ دانت نکلنے کی وجہ سے پیدا شدہ خراش ، پھوڑے پھنسیوں کا دب جانا ، معدہ میں ناقابل ہضم غذا کی موجودگی ، پیٹ کے کیڑے دفعۃً درکار پیدا ہونا وغیرہ ہیں - بچہ کی آنکھیں اُپر کھینچ جاتی ہیں اور پتلیاں گھومنے لگتی ہیں جس کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے - ہاتھ اور پاؤں یڑھاتے ہیں اور مڑ بھی جاتے ہیں - جب حملہ مرض نرم ہو تو صرف چہرہ پر ہی تشنج پیدا ہوتے ہیں -

### علاج

ایکے ٹائیٹ : بخار زیادہ ، بہت بے چینی ، جلد خشک اور دست

جاری ہوں -

خوراک  $3 \times 1$  ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔  
 بیلا ڈونا : اجتماع خون سر کی طرف، چہرہ اور آنکھیں سرخ، پسٹیاں پھیلی  
 ہوئیں۔ بچہ بے ہوش ہو اور سوتے ہوئے چونک پڑے۔

خوراک :  $1 \times 1$  یا  $3 \times 3$  ہر نیم گھنٹہ کے بعد۔  
 کیمو میلا : ہاتھ پاؤں اور چہرہ پر تشنج طبیعت چڑچڑی، ایک رخسارہ  
 سرخ اور گرم، دوسرا زرد اور سرد۔

خوراک :  $3 \times 3$  ہر نیم یا ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 سائی کیوٹا : یکایک بدن میں تشنج پیدا ہو۔ سر آگے یا پیچھے کی طرف جھک  
 جائے۔ اچانک ہی بچہ اکڑ جائے۔ بعد دورہ کے بچہ از حد کمزور معلوم ہو۔  
 خوراک :  $5$  یا  $1 \times 1$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔

سائنا : وہ بچے جن کے پیٹ میں کيرے ہوں۔ بچہ مانتوں کو پیسے اور  
 ناک میں انگلیاں ڈالے اور کان کریدے۔

خوراک :  $5$  یا  $1 \times 1$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 کوپرم : بچہ دوران تشنج میں چپخے، اکڑاؤ تمام جسم پر ہو اور چہرہ کے  
 عضلات اکڑے ہوئے ہوں۔

خوراک :  $3 \times 3$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد۔  
 پیسی فلورا انکارناٹا : جب دانت نکالنے یا چروں کے باعث تشنج ہوتا  
 ہو تو ایسی حالت میں اس دوائی کی خوراکیں جلدی جلدی دی جاتی ہیں۔  
 خوراک :  $5$  کے دو قطرے ہر پندرہ یا بیس منٹ کے بعد۔

### ضروری ہدایات

مرض کے اصل سبب کو معلوم کر کے اس کو دور کریں۔ بعض حالات  
 میں یہ زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے کہ ایسے ہی ذرائع اختیار کیے جائیں کہ جن  
 سے تشنج کا دورہ رک جائے اور تشنج کو فی الفور آرام آجائے۔ لیکن مرض کے  
 اصل سبب کو بعد میں دور کیا جائے۔

تشنج زدہ بچے کو بیس منٹ تک گرم پانی میں بٹھانا مفید ہوتا ہے اور اگر سر زیادہ گرم ہو۔ تو سر پر سرد پانی سے بھیگا ہوا تولیہ رکھنا چاہیے۔ گرم پانی میں تھوئی سی رائی ملائی جائے تو زیادہ مفید ہے۔

نصف اولس (سوا تولہ) پس ہوئی رائی ڈیڑھ سیر گرم پانی میں ڈال دیں اور اس میں تولیہ یا کھادی کا ٹکڑا بھگو کر مریض بچہ کے گرد لپیٹ دیں اور اوپر کپل اڈھا دیں۔ دس بارہ منٹ کے بعد جب کہ جلد جسم سرخ ہو جائے تو تولیہ یا کپڑا کو اتار دیں اگر ضرورت ہو تو دوبارہ اسی طرح عمل کریں۔

جب بخار شدت کا ہو اور تشنج ہوتے ہوں تو سرد پانی سے بخار کی حرارت کو کم کر دینا چاہیے۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے شیر گرم پانی لیں اور اس میں مریض کو بٹھا دیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس میں سرد پانی ملا تے جائیں۔ جب حرارت جسم ۱۰۲ درجہ تک پہنچ جائے۔ تو مریض کو باہر نکال لیں اور جسم پونچھ کر سوکھے کپڑے پہنا دیں۔

اگر نقص ہاضمہ کا غرضہ ساتھ ہو تو تشنج بچہ کے حلق میں انگلی ڈال کرتے کرایں یا قے آور دوائی دے کرتے کرایں اور بذریعہ انیما تریویوں کو صاف کریں۔

## بچہ کی کانچ نکلنا۔ ڈھونڈری

(INFANTILE PROLAPSUS ANI)

دیکھو بیان کانچ نکلنا کتاب ہذا۔

مختصراً اگنیثیا ۳x، نکسوامیکا ۳x، مرکوریس ۳x، پوڈوفالیم ۶x، میورائٹک

ایٹس ۶x کام آتی ہیں۔

## برانکو نمونیہ

(BRONCHO PNEUMONIA)

(برانکو نمونیا کا حال دیکھو کتاب ہذا میں)

مختصراً فرم فاسن  $\times ۳$ ؛ کالی میور  $\times ۳$ ؛ ایکونائٹ  $\times ۳$ ؛ کیمو میل  $\times ۳$ ؛ سائنا  $\times ۳$ ؛ اینٹیم ٹارٹ  $\times ۳$ ؛ اپی کاک  $\times ۳$ ؛ میپر سلف  $\times ۳$ ؛ لائیکو پوڈیم  $\times ۳$ ؛ برائی ادنیا  $\times ۳$ ؛ چیلی ڈونیم ۵ ادویات کام آتی ہے۔

## دبہ - پسلی چلنا

(CROUP)

یہ عارضہ نہایت مہلک ہے بچوں کو ہوتا ہے۔ نرخرہ اور سانس لینے کی نالیوں کی رطوبتی جھلٹی میں سوزش اور ورم ہو جاتا ہے اور ایک لیسدار گاڑھی رطوبت پیدا ہوتی ہے جس سے ایک کاذب جھلٹی بن جاتی ہے اور اس کی وجہ سے تنفس کی راہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا علاج کر کے جلدی انسداد نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ تنفس کی راہ بالکل بند ہو جاتی ہے اور نتیجہ مہلک ہوا کرتا ہے۔

## علاج

ایکونائٹ؛ دیگر درمی امراض کی مانند یہاں بھی ایکونائٹ کا درجہ افضل ہے۔ یہ دوائی ہر نپدرہ یا بیس منٹ کے بعد تین یا چار مرتبہ دینی چاہیے۔ بعد ازاں نیم گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کے بعد دوائی کی خوراک دیتے جانا چاہیے۔ حتیٰ کہ بخار کی شدت کم ہو جائے۔ اس کی موٹی موٹی علامات یہ ہیں۔ شدت بخار یا تھوڑی تھوڑی خشک کھانسی تیز سانس بے چینی اور گھبراہٹ۔  
خوراک:  $\times ۳$  بطرز مذکورہ بالا۔

سینجیا؛ ایکونائٹ کے بعد جبکہ بخار کم ہو جائے تو سینجیا کی باری آبا کرتی ہے۔ اس کی علامات یہ ہیں۔ کھانسی خشک اور ہر دفعہ کھانسنے سے میں ایسا معلوم ہو کہ جس طرح چیر کی کلڑی میں آری چلتی ہے۔ دم کھٹنے والے دورے۔ بخار کم ہو یا بالکل

نہ ہو مگر پسلی چسے -

خوراک :  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

نکتہ : ایکونائٹ اور سپنجیا دونوں ادویات باری باری سے دینے سے بہت اچھے نتائج نکلا کرتے ہیں - یہ دونوں ادویات باری باری سے نصف نصف گھنٹہ کے وقفہ پر دیتے جانا چاہیے -

ہیمر سلف : جب بخار میں افاقہ ہو جائے اور خیرہ میں تری پیدا ہو جائے کھانسی تر ہو اور چھاتی میں خرخر کی آواز پیدا ہوتی ہو لیکن بلغم شکل سے خارج ہوتا ہو -  
خوراک :  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

آیو ڈیم : خنازبری بچوں کو جب کہ ڈبہ کا عارضہ ہو تو یہ دوائی موزوں تر ہو کر رہتی ہے - کھردری کھانسی جس میں سیٹی بجنے کی سی آواز پیدا ہو اور ساتھ ہی سینہ میں درد ہو اور سانس وقت سے آتا ہو -

خوراک :  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد -

اینٹیم ٹارٹ : جب کہ چھاتی پر بہت بوجھ ہو اور ایسا محسوس ہو کہ سینہ بلغم سے پُر ہے - سانس رُک رُک کر آتا ہو اور قے کرنے کی طرف طبیعت کا رجحان ہو -

خوراک :  $3 \times$  ہر دو گھنٹہ کے بعد -

سلفر : جب مرض کا زور کم ہو جائے تو سلفر کی خوراکیں دی جاتی ہیں -

خوراک :  $3 \times$  ہر چار گھنٹہ کے بعد -

فیرم فاس اور کالی میور : یہ دونوں ادویات باری باری سے دی جاسکتی ہیں -

خوراک :  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

برویمیم : جب بخار اتر جائے لیکن پسلی چلتی رہے اور سانس درست نہ ہو تو یہ دوائی مسیحا کا کام کرتی ہے -

خوراک :  $3 \times$  ہر ایک گھنٹہ کے بعد -

نکتہ : برویمیم کے ڈائی لیوٹن جلدی خراب ہو جاتے ہیں اس لیے استعمال

کرتے وقت تازہ ڈائی لیوٹن تیار کر لینا چاہیے -

بیمار بچہ کو آرام سے بستر پر ٹٹائے رکھیں اور کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنا دیں۔ تنگ کپڑے نہ پہنائیں۔ گلے کے بٹن ڈھیلے کر دیں۔ کمرہ ایسا ہو جس میں تازہ ہوا اور دھوپ آتی ہو۔ کمرہ بہت سرد نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہوا اس میں بہت خشک ہونی چاہیے۔ سردی کے موسم میں اگر کمرہ میں انگیٹھی جلانی ضروری ہو تو کونلوں کے اوپر پانی سے بھری ہوئی کیتلی رکھ دینی چاہیے اور کیتلی کے اوپر ڈھکنا نہیں دینا چاہیے۔ تاکہ بخاراتِ آبی کمرہ میں پھیل سکیں۔ گلے کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے گرد فلائین کا کپڑا لپیٹ دینا چاہیے یا اینٹی فلو جبین کالیپ گلے کے گرد لگا کر اوپر رومی رکھ کر باندھ دینا چاہیے۔ اینٹی فلو جبین کالیپ پھوٹی ٹپلیوں کے اوپر بھی کر دینا چاہیے۔ لیپ کرنے کا طریقہ اینٹی فلو جبین کے ڈبہ کے اوپر ہوتا ہے۔ پالنی، برائی اور نیا کی مالش تمام ٹپلیوں پر کرنی چاہیے۔

خوراک : جب مرض کا زور ہو تو تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد دیتے رہنا چاہیے۔ پانی تازہ دینا چاہیے۔ گرم پانی نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی بہت سرد پانی دینا چاہیے۔ جب ذرا افاقہ ہو تو دودھ، ساگو دانہ، اراروٹ دے سکتے ہیں، اگر بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہو تو ماں کو اغذیہ میں پرہیز لازم ہے۔ ثقیل اغذیہ کھانی چاہئیں۔



# ہماری مقبول عام ہومیوپیٹھی مطبوعات

|       |                         |                                                                               |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۴۰/-  | ڈاکٹر کاشی رام          | ۱۔ امراض نسوان (باتصویر)                                                      |
| ۲۰۰/- | "                       | ۲۔ سائیکلو پیڈیا آف ہومیوپیٹھک ڈرگز<br>یعنی مخزن المفردات تین وولیم (کمل سیٹ) |
| ۳۰/-  | "                       | ۳۔ نسخہ جات ہومیوپیٹھی                                                        |
| ۳۰/-  | "                       | ۴۔ ایلین کی نوٹس کلید میٹر یا میڈیکا۔                                         |
| ۳۰/-  | "                       | ۵۔ بالو کیٹک سائنس                                                            |
| ۵۰/-  | ڈاکٹر دولت سنگھ         | ۶۔ میٹر یا میڈیکا مع ریپرٹری                                                  |
| ۵۰/-  | "                       | ۷۔ پریکٹس آف میڈیسن                                                           |
| ۲۵۰/- | "                       | ۸۔ رفیق ہومیوپیٹھی (ہومیوپیٹھک علم العلاج پر<br>ایک معرکہ الار کتاب           |
| ۱۵۰/- | ڈاکٹر جے۔ بی۔ کینٹ      | ۹۔ لیکچرز کینٹ میٹر یا میڈیکا                                                 |
| ۲۵    | ای۔ بی۔ نیش             | ۱۰۔ نیش لیڈر                                                                  |
| ۶۰/-  | ڈاکٹر داس بشبر          | ۱۱۔ دوا کا انتخاب                                                             |
| ۲۵۰/- | ڈاکٹر ہنی مین ایم۔ ڈی   | ۱۲۔ آرگن آف میڈیسن                                                            |
| ۴۰/-  | ڈاکٹر عبدالقیوم طاہر    | ۱۳۔ بورک میٹر یا میڈیکا ریپری                                                 |
| ۲۵۰/- | ایچ۔ سی۔ ایلین۔ ایم۔ ڈی | ۱۴۔ ایلین کی نوٹس                                                             |
| ۶۰/-  | ڈاکٹر ولیم بورک ایم۔ ڈی | ۱۵۔ بورک میٹر یا میڈیکا (۵۰ ملٹی اشارات)                                      |
| ۷۵/-  | ہیش چند بھٹا چاریہ      | ۱۶۔ خاندانی علاج                                                              |
| ۲۵۰/- | ڈاکٹر ریاض علی          | ۱۷۔ ریپری کی دزیادی مرض                                                       |
| ۸۰/-  | "                       | ۱۸۔ ریپری نفرت و خواہشات                                                      |
| ۵۰/-  | "                       | ۱۹۔ موہک                                                                      |
| ۴۰/-  | "                       | ۲۰۔ گلے کے غدود و جگر خانا                                                    |
| ۲۰۰/- | "                       | ۲۱۔ گھرا ڈاکٹر                                                                |

تمام ہومیوپیٹھک کتابوں کی فہرست ہم سے طلب فرمائیں۔

بی جین پبلشرز دہرا دویوٹ لمیٹڈ

۱۹۲۰/ مئی نمبر ۱۰۔ چونا منڈی۔ پہاڑ گنج۔ نئی دہلی ۱۱۰۰۵۵